




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2369/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2369/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2369/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2369/A





J. v. For
2369/A 2nd ed. 1st edition






Ex Libris Vallot 8.

55450.

PETRI FORESTI
ALCMARIANI
OBSERVATIONVM,
ET CVRATIONVM
MEDICINALIVM

Liber vigesimus-octavus,
DE MVLIERVVM MORBIS.
Vnà cum SCHOLIIS.



Ex Officinâ Plantinianâ,
APVD CHRISTOPHORVM RAPHELENGIVM,
Academiæ Lugduno-Bat. Typographum.
CIO. ID. IC.

PETRI FORRESTI

ALCMARIANI

OBSERVATIONVM

MT. CERVATIOMVM

MT. DICIN ALIVM

ALCMARIANI

ET MT. CERVATIOMVM

ALCMARIANI



Viris ornatissimis,

D. CORNELIO PYNACKER


I. V. D. in Lugdunensi Batauor.

Academia Antecessori,

D. ANTONIO BRVNONI,

apud Hornanos Doctori Medico,

*Amicis meis veteribus summa obser-
uantia colendis.*



A VCIS antè die-
bus, viri amicissimi,
quàm è viuis pa-
truus meus D. Pe-
trus Forestus dece-
deret, Obseruatio-
num suarum librum Vicesimum
octauum, qui est de Morbis & Affe-
ctibus mulierum, extrema manu
imposita absoluendum, & in publi-
cum emissendum statuerat, multisq.
artis Medicæ cultoribus certâ spem
de Obseruationum suarum colo-
phone

phone publicando spem fecerat . At
posteaquam inopina morte opti-
mus & vigilantissimus senex maxi-
mo patriæ nostræ luctu præventus
fuiſſet, innumeros promiſſorum ex-
ſpectatione fruſtraſſe videbatur: niſi
ego, cū ſcirem boni heredis eſſe
etiam fidem & promiſſa defuncti
teſtatoris, quoad fieri poteſt, præ-
ſtare, viri clariffimi & optimi patru
mei deſiderio, multorumque peti-
tionibus vna opera ſatisfaciendum
eſſe duxiſſem: quāquam ob aſſiduas
& multifarias in hoc meo reipub.
munere occupationes, tardiùs quàm
aut ego ipſe vellem, & fortasſe mul-
ti deſiderabant. Licet enim hæc iam
publicis uſibus deſtinata eſſent, ali-
qua tamen in iis opus cura à mea cu-
ra & labore, quem duabus de cauſis
potiſſimū lubenti animo ſuſcepi.
Vna ne patriæ meæ & tot viris ami-
cis ſymmifſtis vtilitatem huius ope-
ris

ris tam longo usu obseruati & dili-
genti experientia firmati inuidisse vi-
deri possem. Altera quod vos viri
amicissimi præter ceteros sæpe ab-
sentem me litteris, præsertim graui
& potenti suadela ad patrui mei po-
stuma scripta non solum hæc præ-
sentia sed reliqua omnia recensenda
redigenda & publicanda, perpetui
hortatores fueritis. Quarum postre-
ma tantum apud me ponderis, tan-
tum momenti habuit, vt cogitaue-
rim nimis me excordem officiique
immemorem habendum fuisse, si
hunc librum nulli, aut non potius
vobis consecrasssem. illud namque
temeritatis, hoc ingrati hominis vi-
tio adscribendum. Quotus enim
quisque est qui non putasset me te-
mere ausum, si hunc foetum postu-
mum & orbem, omni tutela pror-
sus destitutum, in luminis oras, in
hominum manus & adspectum edi-
dissem.

dissem. Quis me non ingrati meritò
accusasset, si alios quàm vos spectatē
fidei meos, & patruī mei amicos
huius postumi tutores & suscepto-
res eligendos animo meo cogitas-
sem. Quocirca hac in re nihil anti-
quius putavi quàm hunc librum ve-
stri nominis notis insigniendo ami-
citiae & gratitudinis publicum mo-
numentum affigere. Vos ergo pro-
pitios huius susceptores præstate, ve-
stra tutelari præsentia eum cohone-
state. Quod si feceritis ad reliquas
patruī mei Observationes studiosè
redigendas & quamprimùm publi-
cæ vtilitati consecrandas magnum
animum addideritis. Valete Viri Or-
natissimi. Alcinariæ, ipsis Kalendis
Martii, anno 1599.

Vestri studiosiss.

ADAMVS FORESTVS.

MEM.
PETRI FORESTI
MED. ARTIS OPERIBVS

CLARISSIMI.

NORIS vt hospes, ossa quanti marmore.
Sub hoc reposita sint viri, sic accipe.

Sunt illa PETRI, è gente quem FORESTIA
Cali benignior, bono mortalium,

Magni beârat aura mente Hippocratis.

Hac, artis vsu fontibusq; Iatrice

Orbi reiectis, ceu perenni lumine,

Iam maior annis septuagenario,

Nil mente fractus, hos vt artus exuit:

Desiderat lugetq; ciuem patria,

Æther recepit, quo fide retenderat,

Famâ relictâ posteris industria.

Nunc hospes i, quò fata te vocant tua,

Sua gratulatus optumo FORESTIO.

Præptori & amico vet.

Petrus Hogerb. Med.

mœrens B.M.P.

* 4

EIVS.

EIVSDEM
IN HAS
OBSERVATIONES

AD
ADAMVM FORESTVM

professione & amicitia sibi
coniunctissimum,

Epigramma.

PROTVLIT in lucem vigilans ut cura
FORESTI

*Artis & ingenij clara trophæa sui:
Et, velut euictæ stabuli squalore, retextit
Paonias æui nobilioris opes;
Ars ne longa, brevis ne vita sit artis ab usu,
Præstitit hic magno vix minor Hippocrate.
Pars opere è tanto nostros ne desit in usus,
Progenio ingenuè promissæ, Adame, tuo,
Viq; malis norint muliebribus arte mederi
Solertem incautus præ facis ire ducem.
Hæc petitur, quæ stat benefactis gloria. mactæ,
Ingenio patrui, mactæ FORESTE tuo.*

IN

IN LAVDEM

CL. V.

PETRI FORESTI,

Parodicum Carmen è Propertio.

MOENIA facundo si debent Graia Galeno,
Si debet Celso maxima Roma suo:
Debet & immensum Batauium bona fama
FORESTO,

Illius aeternum nobilis à calamo.

Qui nunc egregias medicandi suscitât artes,

Nataq; Latœi munera numinibus.

Cedite Romani scriptores, cedite Graij.

Nescio quid maius nascitur Hippocrate.

Tu canis egroti subter prœcordia flammâs,

Phthisin, & attritis hydropa visceribus,

Utq; mali possint corrumpere corpora succi,

Hæustus & infectis spiritus æeribus.

Felix, qui tristes herbis medicare dolores,

His licet in vanum sæpe sua ira manet.

Felix ille, tuis qui tentat legibus æger,

Crudelis morbi carpere nequitias.

Quamvis ille malo lassus superante recumbat,

Curatur facili non minus auxilio.

Tu reuocas Cœ veteris prœcepta senectæ,

Quæq; iuuet radix, quæq; sit herba nocens.

Tale teris docto medicamen pollice, quale

Cynthius ipse suis temperet articulis.

* 5 Te se-

*Te sequitur Latia dulcis facundia linguae,
Sen iuuet hanc scripto, seu fluere eloquio.
Attica nec desit, ut tu omni à parte valeres
E Medicâ tristem tollere barbariem.
Quod facis, & facto astringis tibi secula
cuncta,
Ne possint laudes vlla tacere tuas.*

T. Velius Med. Horn.

MEM.

PETRI FORESTI

medici nostræ ætatis ce-
leberrimi.

Duo ultimi versus annum obitus denotant.

HEV! nimium patriæ fatis ereptus iniquis,
Occubuit, medicâ celeberrimus arte,
FORESTVS:

*Insignis pietate senex, quæ Phœbus, & omnes
A Phœbo Musæ sacris fouere sub antris
Vnguibus à teneris; & donec vita manebat,
Certandi inter se studio, sua dona tulerunt.*

*Quæis tantum semper, geniû comitâte labore,
Claruit ante alios, quantû inter cætera Phœbe
Sydera, fraternis per cælum lucida flammis.*

Tunc

Tum grauitate valens, qualem sese ore ferebat
Inter tot, tantosq; viros, quos aula potentes
Vidit, & ipse suis toties ad posse reduxit
Artibus, attracto dū Mors nigra cornua neruo
Lunat, in aduersos vibrans sua spicula vultus,
Quae mox auertit, vacuasq; retorsit in auras.
O Libitina, ferā monstrum crudelius hydrā!
Quantum erat ut sineres, alios cōtenta tulisse,
Hoc saltem superesse caput, quo vindice tuos
Vidimus, ad motis ferē quēis sua praeuit alis
Pharmaca, diuersā querens ratione salutem.
Nec sumus ingrati, tibi nos debere fatemur
Quod datus est nobis, & adhuc iuuenile va-
gantem

Inuida ad algentes non retro traxeris umbras.
Nunc Morbi reuocate animos, mæstumq; ti-
morem

Mittite, non equidem vobis infestior alter
Hippocrates Batauus nascetur origine quisquā.
Ecce iacet tumulo, quem formidare soletis,
Et vaga quem dederat cursum fortuna peregit
Ægrorum luctu, factog; hīc sine quieuit.
Sed taMen IngenII post sæCVLa Longa
Vigore
VIVet, & eVeCiVs CapVt InternVbILa
Condet.

I. Rietwijck Alcmār,
Iuris candidat.

O E E

ODE

AD N. V.


AD AMVM FORESTVM.

IACTABAT olim natus Apolline
 Templum perenni marmore nobile,
 Videbat extructasque ad aras
 Thura suas redolere fumo:
 Castum quòd herbis Hippolytum sacris,
 Nouerca mendax quem dederat neci,
 Extorset Orco, spiritumque
 In laceros reuocasset artus.
 At tu patrimæ Virginis artibus,
 Forestiorum floscule nobilis
 ADAME, dum disiecta magni
 Scripta voluminibus FORESTI
 Componis, atque in luminis aureas
 Depromis oras, dum patrui cies
 Manes, videbunt rariores
 Regna feri tenebrofa Ditis.
 Namque ille auari nauigium senis
 Doctis morari nos docet artibus,
 Prædamque cogit iam relictæ
 Protinus exposuisse ripæ.
 Quid ergo dignum promeritis tuis
 ADAME ponet posteritas tibi,
 Pro laude qua vincis Deorum
 Templaque, marmoreosque vultus?
 Sed nil superbo Pyramidum situ,
 Rubiginoso nil chalybe est opus:
 Sibi ipsa sat ponit perennes
 Pyramidas, statuasque VIRTVS.

Philippus Pynacker.

AD

A D
LECTOREM REI MEDICÆ
STVDIOSVM
PRÆFATIO.

VM superioribus annis, bene-
uole Lector, libris De penis,
virgæ ac scroti morbis finem
imposuerimus, ordinis ratio
nos monet, ut libros de morbis
muliebribus hætenus desideratos in lucem
edamus: sed ut ingressus commodior & aptior
sit ad eosdem intelligendos, breuem uteri ana-
tomen, sine cuius cognitione curatio sæpe fru-
stranea, imò nulla est, prius huc adferemus.
Anatomen enim ducem ad Dei cognitionem
rectè Galenus appellauit: nec immerito, quan-
doquidem nonnulla occurrant, qua nos in ipso
cursu remorantur, quorum actionem scire
nullo pacto possumus, nisi ope & adminiculo
anatomiae. & quandoque ad viuam sectionem
deueniendum, non hominis quidem, ut veteres
facit arunt, quod nefas imò Christiano me-
dico indignum, sed brutorum: cum præsertim
animaduertere liceat, ob viuam humani cor-
poris anatomen, qua prisci medici utebantur,
adeò male eos audiuisse, ut nec viuos homi-
nes

Galenus cur
non secuerit
homines.

nes secare; sed ne hominis quidem cadauer li-
ceret. & hanc ob causam Galenum adductum
puto; ut ab humani corporis anatome abstinere-
ret, quod principum lege vetitum erat. Sed
hodie cum ob communem viuorum utilitatem
concedant reges & imperatores quotannis
in academiis anatomias publicas, merito
medicina studiosi huic actioni sese accingent,
nec laborem & operam recusabunt in hac me-
dicina parte addiscenda suscipere: cum &
hac incipientibus sit necessaria. quandoqui-
dem omnium medicina partium is est con-
sensus & connexio, ut altera ab altera dis-
iungi sine artis dispendio non possit. imò sine
huius adminiculo, ars manca & mutila erit:
nam in hac admirabile fabricam, nec non di-
uini numinis opus conspiciere licet; ut non im-
merito philosophi hominem Μικροκοσμος uoc-
cauerint. quod & in uteri historia videre est.
Ad cuius affectiones antequam accedam, &
quales & quot sint qui ipsum infestant recen-
seam, paucis uteri situm eiusq; compositionem
accipe, & primū de nomine hoc habe. Tribus
dicitur nominibus. Primò matrix ab eo quòd
mulieres partu suo matres efficiantur. Secun-
dò Græcis ὤστρον appellata est, hoc est, nouissi-
ma: aut quòd nouissima omnibus intestinis ia-
cet: aut quòd annis quatuordecim vacua sit
apud

Nomen.

puā virgines, & nouissimè post mutationem
 itatis effectus suos per partus mulieribus re-
 rasentet. Tertio verò δελφὺς dicta est, quod
 fratres efficiat omnes qui ex vna nascantur.
 Quoad situm posita est inter duas coxas, inter Situs vteri.
 vesicam & rectum intestinum; subiacet verò
 vesicæ, & longanoni. Incumbit uterus ante-
 riore parte ab osse pubis, posteriore ab osse sa-
 cro; à lateribus ab ossibus ilium tanquam fir-
 missimis ac tutissimis vallibus circumdatur, ex
 quibus sacro osi & pubi connectitur, ita ta-
 men ut aliquo modo tendi ac in se concidere
 possit, intertextis nimirum membranis carneis
 & laxis, quarum interuentu uterus voluntariè
 non nihil mouetur. Figura vteri tum rotunda, Figura.
 tum oblonga est; supra deprimatur magis quàm
 infra. fundi tamen figura, ut inquit Vesalius,
 non prorsus rotunda existit; verùm anteriùs
 posteriùsq; depressa; superiùs obtusa, & duos
 (vtrinq; scilicet vnum) retusos ostendens an-
 gulos, qui vitulorum fronti cornua productura
 assimilantur. quæ tamen non in utero humano,
 sed bruto videre est, ut vult Reald. Columb.
 Magnitudo non equalis, ut testatur Gal. lib. De
 vulue dissectione, in omnibus existit, multo si-
 quidem minor est eius quæ peperit, quàm præ-
 gnantis, illius quæ nunquam peperit minor:
 nec non et ætatem ratione, quibus nondum ve-
 neri

Galenus cur
non fecerit
homines.

nes secare; sed ne hominis quidem cadaver li-
ceret. & hanc ob causam Galenum adductum
puto, ut ab humani corporis anatome abstinere-
ret, quod principum lege vetitum erat. Sed
hodie cum ob communem viuorum utilitatem
concedant reges & imperatores quotannis
in academiis anatomias publicas, merito
medicina studiosi huic actioni sese accingent,
nec laborem & operam recusabunt in hac me-
dicina parte addiscenda suscipere: cum &
hac incipientibus sit necessaria. quandoqui-
dem omnium medicina partium is est con-
sensus & connexio, ut altera ab altera dis-
iungi sine artis dispendio non possit. imò sine
huius adminiculo, ars manca & mutila erit:
nam in hac admirabile fabricam, nec non di-
uini numinis opus conspiciere licet; ut non im-
merito philosophi hominem Μυρρονος uov vo-
cauerint. quod & in uteri historia videre est.
Ad cuius affectiones antequam accedam, &
quales & quot sint qui ipsum infestant recen-
seam, paucis uteri situm eiusq; compositionem
accipe, & primū de nomine hoc habe. Tribus
dicitur nominibus. Primò matrix ab eo quòd
mulieres partu suo matres efficiantur. Secun-
dò Græcis ὤστρον appellata est, hoc est, nonissi-
ma: aut quòd nouissima omnibus intestinis ia-
cet: aut quòd annis quatuordecim vacua sit
apud

Nomen.

puā virgines, & nouissimè post mutationem
itatis effectus suos per partus mulieribus re-
sēntet. Tertiò verò δελφὺς dicta est, quod
rātres efficiat omnes qui ex vna nascantur.
Quoad situm posita est inter duas coxas, inter
vesicam & rectum intestinum; subiacet verò Situs vteri.
vesicae, & longanoni. Incumbit uterus ante-
riore parte ab osse pubis, posteriore ab osse sa-
cro; à lateribus ab ossibus ilium tanquam fir-
missimis ac tutissimis vallis circumdatur, ex
quibus sacro ossi & pubi connectitur, ita ta-
men ut aliquo modo tendi ac in se concidere
possit, intertextis nimirum membranis carneis
& laxis, quarum interuentu uterus voluntariè
non nihil mouetur. Figura vteri tum rotunda, Figura.
tum oblonga est; suprā deprimitur magis quàm
infrā. fundi tamen figura, ut inquit Vesalius,
non prorsus rotunda existit; verum anteriùs
posteriùsq; depressa; superiùs obtusa, & duos
(vtrinq; scilicet vnum) retusos ostendens an-
gulos, qui vitulorum fronti cornua productura
assimilantur. quae tamen non in utero humano,
sed bruto videre est, ut vult Reald. Columb.
Magnitudo non equalis, ut testatur Gal. lib. De
vulue dissectione, in omnibus existit, multo si-
quidem minor est eius quae peperit, quàm prae-
gnantis, illius quae nunquam peperit minor:
nec non et aetate ratione, quibus nondum ve-
nerè

neri indulgere tempus permittit. Etenim minor etiam alio est iis qui nondum coierunt. In infantibus minor quam vesica est; in virginibus vero quæ ætatem florentem agunt, vesica est æqualis in iis partibus quæ suprâ sunt sic quæ verò ætate progressæ & venerem expertæ sunt, ac multo magis quæ iam pepererunt, in illa est maior, ita ut plerisque ad finem coli intestinum conquiescat. Ceterum postquam editus est fœtus, contrahitur quidem, sed ita ut maior sit quam ante partum. Figura eius in mulieribus non est circumuoluta, ut in animalibus quæ rationis expertia sunt, sed est cucurbitæ quæ medicis utuntur ad similes; ut ait Soranus: rotundum enim ac lato fove, qui ad fundum est incipiens ad proportionem in angustum oscillum redigitur, (osculum namque appellant primam & prominentem eius partem) quod sequitur cololum dicitur, quod remanet cervix: in hanc mentulatur, quæ in vaginam demittitur, cuius longitudo ea est, quantum undecim apicibus digiti metiri possumus; rugosa est & membranosa, non cartilaginea; ut Herophilo placuit: ab his rugis attritio fit, ex qua miram voluptatem amantes coeundo percipiunt. Substantiam crassam uteri carneam & nerueam quoque natura voluit esse mixtam, ut dum fœtum continet, facilius extendi & dilatari possit.

possit. Tribus generibus fibrarum intertextis
 constat, ut Gal. optimè docuit, rectis inquam,
 obliquis & transuersis, ut semen pro fœtue ef-
 fingendo attraheret, contineret, statoque tem-
 pore excerneret. Interna uteri cavitates una
 est, in qua tamen, licet una sit & exigua, iu-
 xta immissi seminis qualitatem, non modò fœ-
 tus unus, sed gemini, tres, imò trecenti & 64.
 ut notant annales Hollandiæ: qui deinde non
 cellulis, sed propriis membranis inter se distin-
 guuntur. Neque adhibenda Mundino Anato-
 mico fides, qui septem cellulas in utero reperi-
 ri vult, cum experientia & acularis inspectio
 aliter nos doceant. Rei veritas hæc est, mulie-
 ris uterum unica cavitatem præditum esse, quæ
 intus satis levis conspicitur; quamvis nonnulla
 foramina adsint, quæ nihil aliud sunt quàm
 venarum & arteriarum capita, quæ Anatomici
 acetabula vocant, quoniam concavæ partes
 sunt, quibus semen adheret, tunc arterie arte-
 rias, venæ venas producunt. In cervicis uteri
 finibus vulvam versus nonnullæ carunculae
 prominent, à quibus voluptas ac delectatio
 in coeundo non parum augetur: sub hisce vul-
 vae labellis duæ adsunt à lateribus late mem-
 branae, nymphae à veteribus dictæ, quarum
 utilitas est, ut à pulvere, frigore, & aëre ute-
 rum tueantur: sub nymphis in nonnullis virgi-
 nibus

Acetabulo-
 rum uteri
 usus.

Nympharum
 usus & finis.

Vnde men-
ses fluunt.

Vasa semi-
naria mulie-
rum, in quo
differant à
viris.

Vteri con-
nexio.

nibus (non omnibus) alia membrana cernitur,
Hymen dicta à veteribus, quæ cum adest, raro
tamen adest, obstat quominus penis in uterum
immittatur: nam crassa est valde, supra vesi-
cam versus foramine donatur, per quod menses
fluunt. Uterus humanus eiusq. ceruix, præter tu-
micam sibi propriam peculiaremq. à peritoneo in-
uoluitur. Vasis quoq. seminariis prædita est ma-
trix quemadmodum in viris: hoc uno tamen dif-
fert, quod in mulieribus breuiora sunt. Testibus
quoq. non destituuntur, qui superiori in parte
nonnihil depressi videntur, apud quos sita sunt
duæ latæ particule membranæ, nonnullis car-
neis fibris donatæ, quas membranas Vesalius
musculum vocauit: in harum summitate à testi-
bus, hoc est, præparatibus vasis deferentia pro-
ficiscuntur, quæ in femellis non minus anfra-
ctuosa sunt, quàm in viris ipsis & in meatus
cauum terminantur. Auxilio vasorum semina-
lium, illiusq. membranæ quam Vesalius pro mu-
sculo describit, sacro ossi uterus appædet. in fine
verò una cum ceruice, ossibus pubis, & coxen-
dici. A matricis lateribus bina constituuntur,
quæ duo oblonga ligamenta videntur esse, ner-
uea cauâq. ligamenti etiam munere fungi cre-
duntur: & ad summum os pubis minimè perue-
niant, ut Vesalius existimauit; sed per ea fora-
mina transeunt, quæ in nervosis tenuitatibus
muscu-

muscutorum obliquorum descendentiū, ascen-
 dentium, & transuersorum sita sunt, sicut in
 viris, per quæ vasis seminariis aditus patet:
 etenim feminis hi tendines perforati cernun-
 tur: quamuis Vesalius id inficietur. Processus hi
 ab utero exorti prope id foramen, quod os ma-
 tricis vocatur, extra abdomen exeunt, supra
 pubem ascendunt: desinunt autem in parti-
 culam quandam excelsam in vuluæ apice cir-
 cumuolutam supra id foramen unde lotium
 exit. & hac est præcipue sedes illa delectationis
 mulierum dum venerem exercent, quam non
 modo si mentula confricabis, sed vel minimo
 digito attrectabis, ocius aura semen hâc atq̃ il-
 lâc præ voluptate vel illis inuitis profluet. Hanc
 eandem partem uteri dum venerem appetunt mu-
 lieres, & tanquam æstro percitæ virum appe-
 tunt ad libidinem concitata, si attinges, duriuscu-
 lam & oblongam redditam esse cõperies, adeo
 ut nescio quam virilis mentulæ speciem præ se
 ferat. Hos processus, atq̃ eorundem usum primum
 animaduertit Reald. Columb. Anatom. ut te-
 statur lib. xi. cap. de utero. A venis arteriisq̃
 seminalibus tum vena tum arteria ad matri-
 cis corpus tendentes deciduntur; non ut per has
 menstruus sanguis expurgetur, ut communis
 est sententia, sed ut laudabili sanguine tum il-
 la, tum cõceptus fœtus ali commode possit. Non
 enim

Quo pacto
 cogere po-
 teris mulie-
 rem semen
 emittere.

Menstruus
 sanguis non
 expurgatur
 per venas
 uteri.

Wiles uteri.

Lotium non
exit per cer-
vix uteri.

enim haec sunt venae quarum opemenses flumina
mulieribus : sed illa à venae cauae divisione
exorta, quae in uteri cervicem ad ipsius latera
inseruntur. Vtero duo nervorum genera dona-
ta sunt; à sexto scilicet pari, & à spinali me-
dulla uterus in eum finem à natura factus est
ut semen utriusque sexus ad statutum tempus
contineret, & pariendi tempore infantem in
lucem produceret. Hoc huic historiae de utero
addendum est, ad eius cervicis extremitate
vesicae cervicem desinere, ubi foraminulum ad-
est immediate sub pubis osse: non enim hac in
parte articularum audienda est sententia existi-
mantium per uteri cervicem lotium exire. In fe-
minis ad vesicae collum non adsunt illae glandu-
lae parastatae, veluti in viribus, quod vesicae
collum in feminis, tum brevius, tum latius est
quam in viris. Verum cum de omnibus his va-
riè variè scripserint, & ne Lectorem diu mul-
tumque nostra praefatione detineamus; ipsum ad
Galenum & alios Anatomicos qui de hac re
ex professo scripserunt relegamus, haecque in-
praesentiarum sufficere arbitramur: & ad
ipsam rem (quod promisimus) accedamus.
Vale amice Lector, & nostris hisce frui ac
utere laboribus.

OBSER-

mitatem, plurimum gignatur. Hinc prouida natura
 viam quandam inuenit, qua corpus sese exoneraret
 statim quibusdam temporibus, id est, lunaris cursus spa-
 tio: sapius verò ipsa decreſcente, vt annotauit Aristo-
 teles. Sed vt ſolet natura, cum excrementa purgat,
 etiam iis in aliquam vtilitatem interim abuti; ſic &
 vterus interim eo ſanguine nutritur, quicquid in co-
 alimenti eſt hauriendo, reliquum verò pellendo. Rur-
 ſus & ad conceptionem vitur. Hinc enim alterum
 principium habetur, vnde concipitur ſœtus, augetur &
 alitur dum eſt in vtero. Ex quibus fit, vt ſi hac purga-
 tio præter naturam ſiſtatur, mulieri multa mala eue-
 niant; teſtante Hyppocrate 5. Aph. 57. cum ſcribit:
 Mulieri ſi menſtrua defecerint, mala inſequuntur.
 Sunt autem hæc, primum vtero propria, mox & com-
 munita vniuerſo corpori. Eueniunt autem non modo
 ſi ſupprimantur, ſed etiam ſi minuantur plurimum.
 Ac primum deſtituitur conceptione: hæc enim vna eſt
 e cauſis ſterilitatis maxima Vnde quibus per ætatem,
 aut non adhuc accedunt, aut deſicere, non concipiunt.
 Dum autem fluunt, quantum ex hac parte, ſemper
 poſſunt concipere. Ariſtoteles tamen voluit, mulieres
 quaſdam eſſe quæ concipiant, etiam ſi non fluant men-
 ſes; vt quibus non plus ſit ſanguinis quàm aliū reſtet à
 purgatione. Sed hæud ſcio an id ex principiis Galeni
 admitti queat. Conſtat tamen multas concepisse an-
 tequam paſſæ eſſent menſtrua. Præterea vteri ſtran-
 gulatione vexantur, vt de cauſis eius dicemus; & ſcir-
 rhoſo tumore, & cancro, & eryſipelatis; & aquoſi-
 tate replentur; & flatibus & vlceribus prauis gracile-
 ſcunt; & quedam præter modum; vt mulier illa de
 qua Gal. ſcribit 6. Epid. 3. 29. mutantur in viros fe-

Quando
menses flue-
re incipiunt,
& quando
desinant.

mino. Adde partes quæ in consensum veniunt: capu-
primum, 6. Epid. 1. aph. & oculi, & ventriculus ma-
affectus; demum & iecur, vnde & hydrops aliquand
consequitur. Sed de his suo loco latius. Fluere autem
incipiunt mulierum plurimis menses circa decimum
quartum annum, iuxta Aëtij & Pauli sententiam
paucis verò ante decimum tertium, aut duodecimum
plerisque autem post decimum quartum erumpunt
ex eiusdem Pauli testimonio. quo etiam tempore &
pubescunt mulieres, & mammae ipsis intumescunt
Et sic mensis purgatio est naturalis; (nisi vel quanti-
tate excedat, vel præter statas periodos effluat) &
stato tempore incipiunt & desinunt secundum na-
turam. In aliis, vt dixi, citius erumpunt 12. 13
vel 14. anno; alii rursus non ante 20. ob pituitam &
sanguinis paucitatem. Aliquibus nunquam, vt Aristot
meminit. Desinunt verò 40. aut paulo post; idq; in
aliquibus. In aliis non ante 60. & hoc pro copia ve
defectu sanguinis. Quæ enim multo sanguine & ca-
lido abundant, citius frequentiusq; purgantur. Quæ
verò crassum, vel lentum, vel paucum habent
sanguinem, tardius & parcius purgantur. Iam quo-
que maiorem copiam efficiunt ratio vite plenior,
otium, temperamentum frigidius, tenuitas sanguinis,
vel acrimonia, amplitudo vasorum, quæ plurima &
maxima ad vterum perueniunt. Aliis singulis men-
sibus, nonnullis vno aut plurimis mensibus intermissis,
quibusdam sapius vno mense redit purgatio. Non ta-
men cunctis eodem tempore, eademq; mensura, &
per totidem dies prodeunt. Nam multis ad duos tresve
dies, non paucis vsque ad quintum profluunt: alii
etiam vsque ad septimum: rara verò ad duodecimum
purgata

dictamnum adiunxit ; vnde mulieri toto quinquennio non purgatæ , ac sterili , purgationem euocauit ; vt & deinde conceperit.

SCHOLIA.

HACTENVS de membris genitalibus maris dictum est , & de eorum symptomatis & affectibus : nunc verò de membris generationis in feminis disserendum est , deq; vteri symptomatis & morbis. Habet enim & sortitur vterus varia symptomata , quæ eidem propria sunt . vt , mensium suppressio , profluvium , stillicidium ; albus fluor vterinus ; gonorrhœa duplex ; vteri stragulatus , ascensus , descensus , prolapsio , & conuulsio ; hinc furor , dolor : adhuc quoque sterilitas , abortus , aliq; vterum gestantis incommoda . Iam quoque varij alij morbi vterum obsident ; mola , inflatio , hydrops , calculus : & in ceruice rhagades , condylomata , & hæmorrhoides . Frequentissimum malum est cum menstrua subsidunt , aut intempestiuè abundant . Album quoque profluvium crebrò eas consumit , aut saltem odiosas reddit . Omnium periculosissima sunt vuluæ dolores , inflammationes , vlceræ , carcinomata , vomica , atque epiphoræ : conuersiones letiferae sunt , quas strangulationes vocant , & quotidiana tormenta . Vulua interdum contrahitur , vel concitata misere procidit , vulneratur eadem interdum . quæ omnia ex mala serè membri habitudine contingunt . De iis omnibus in hoc libro dicemus ; & omnium primò de mensium suppressione . Ceterum vterus , idem Mater ab Aëcio dicitur , & Hystera . mater quidem , quod omnia animalia inde tanquam à matre oriantur : hy-

Vteri symptomata , & varij affectus ac morbi.

Quare vterus matrix vel mater dicatur.

Vide Aëtium
lib. 16. cap. 1.
de situ, ma-
gnitudine,
ac reliqua
uteri for-
matione.

Vnde men-
strua.

Hæra autem, quod omnibus visceribus hystera, id est posterior, sita sit. iacet enim vterus inter membranam peritoneum vocatam & vesicam, rectumque intestinum. Sed hæc ad anatonem pertinent, tum situs eius ac figura, tum reliqua quæ ad totum vterum pertinent. Vide Galenum De usu partium, & quæ Aëtius breuiter recenset. Vterus ad concipiendum, ad usum venereorum, ad semen recipiendum retinendumque, sætu incrementum, atque perfecti enixum, oportune venter subiectus fuit: ut ad longum legere possimus apud Galen. 14. De usu partium. Et quia mulier viro frigidior, idcirco easdem partes ad generis instaurationem intus habet, quæ in viris extra sunt fabricatæ. At excrementa quæ in ipsis mulieribus redundant, seu redundans sanguis, ad omnium infirmissimas partes (quæ genitales sunt) feruntur. Mittuntur namque menses in venas quæ utero committuntur, & non attrahuntur: nimirum cum vterus ad delationem eorum nihil conferat, ut 5 De simpl. medic. facult. testatur Gal. Qui quidem sanguis femininus ipsis antequam concipiant singulis mensibus purgatione salubri eicitur: ubi verd iam concepere, alimentum foetibus accommodatum euadit. Diximus paulo antè quod mulierum natura frigida & humida præ virorum esse debuit: hoc certè ita ad generationem cōducebat; ut vnde alterum principium quod maxime pro materia est, decidit. Sed & in societate maris & femina alterum foris, hoc est, marem, negotiari oportuit; alterum domi, hoc est, feminam, liberos alere & rem familiarem seruare. Ob has igitur causas facillè femina copiam crudi sanguinis & excrementosi acernant; ut qui per exercitationes non absumentur, & per naturam, ob caloris infirmitatem,

hoc medicamento sequenti: & dicatholici ℥vj.
elect. indi maioris ℥iij. syr. capill. ven. de artemi-
sia, añ. ℥β. cum ℥iij. decocti melissæ, pulegij, ar-
temisiæ, fiat potio sumēda manē hora quarta ma-
tutina: qua & aluum copiosē deposuit. Post ge-
minam purgationem, consului vt altero die se-
quenti balneo se lauaret: & artemisiæ, foliorum
lauri, conyzæ, origani, maioranæ, melissæ, nepi-
tæ, chamæd. chamæpit. thymi, pseudonardi, seu
lauendulæ, rorismarini, añ. iij. florū chamæmeli,
meliloti, flor. rorismarini, sambuci, añ. p. ij. bac-
carum iuniperi, lauri, añ. p. j. seminis lini, fœnu-
græci, añ. ℥j. coquantur in aqua q. s. pro balneo;
in quo sedeat, & aliquam portionem herbarum,
tum reliquiarum dictarum, ponat in sacculum,
quem supra ventrem intra vmbilicum & pecti-
nem detineat. illudque balneum continuetur
manē per quatuor aut quinq. dies; & in eo mo-
retur optimē calfacto, si potest, per horā vnam.
Et cū ex eo egredietur, vngantur venter infra
vmbilicum, inguina & pæden, parsque poste-
rior ei opposita, & renes, calido hoc vnguento:
& olei lilior. amygd. dul. butyri recentis, medullæ
cruris vituli, añ. ℥j. olei irini, amygd. amaran.
muccag. althææ, sem. lini, fœnugræci, añ. ℥ij. succi
rutæ, artemisiæ, añ. ℥β. ceræ q. s. fiat vng. molle.
quo vngantur partes dictæ, seque mox in lecto
componat; ac sumat rursus tunc theriacæ veteris
℥j. cum iure cicerum. At cū illa se à lotionē in
balneo excusaret, imperavi vt saltē dicti decocti
fumum per infundibulum reciperet. His per-
actis, appetente tempore eruptionis, nempe pri-

mo quadrato lunæ, consului vt venam in tale
 incideret. Obseruatum enim est, ex quadrato
 lunæ motu feminas pro ætate purgari: primam
 purgationes quadrato primo ex adolescentia
 vltimas ex quadrato vltimo, desinentibus men-
 sibus; reliqua media ætate pari modo ex secundo
 & tertio expediri menstruas purgationes. E
 quibus naturalis collectio excipitur, iuuenibu
 nouilunio missio sanguinis utilis est; senibus ver
 senescente luna conuenit. At cùm hæc mulie
 albidior ac carnosior esset, venæ non apparebāt
 ideo vt infra femora adhiberentur cucurbitula
 cum scarificatione, iussi. Vbi frigidi abundan
 succi, & frigida sit corporis intemperies, cum
 crassis & frigidis humoribus; post præparationē
 & purgationem, etiam hîc sanguinem emittere
 ex malleolis conuenit. non tamen in multa co-
 pia, vena incisa, vel adhibitis malleolorum sca-
 rificationibus; potissimùm si mulieres albidio-
 res ac carnosiores fuerint. eæ enim paruas in cru-
 ribus venas habent, & sanguinem asseruare te-
 nuem solent; iuxta Galeni sententiam lib. De
 curat. rat. per venæ sect. Post adhibitas illas cu-
 curbitulas, aliis iam dictis remediis præcedenti-
 bus, menses aperti fuere. Ego in his quæ albæ
 sunt & pauci sanguinis, quoties inciderunt in
 eam obstructionem vt suppressi vel imminuti
 sint menses, vtor scarificatione crurum, & corni-
 culis trahentibus: nec parum conferre vidi. Si
 hîc non iuuisset, deuenissem ad decoctum ligni
 Indici, admiscendo dictamnū. Sic aliàs lac-
 chinus doctissimus lignum Indicum coxit, &
 dictam-

OBSERVATIONVM
ET CVRATIONVM
MEDICINALIVM

Liber vigesimvs octavvs:

DE MVLIERV M MORBIS
ET AFFECTIBVS:

PETRO FORESTO *Alcmariano*;
Reip. Alcmariana Medico, auctore.

OBSERVATIO I.

*De mensibus, seu menstruis purgatio-
nibus, retentis.*



ATRONA nobili annorum 25.
cū longo tempore menstruæ
purgationes essent retentæ, cor-
poris grauitas superuenit, ac
nausea & cibi fastidium: quæ
cū somnolenta euaderet, & ad
omnem motum segnis, à pituita copiosa & ve-
narum ora obstruente conieci, menses iam dudū
constitisse. nam colore candida apparebat; sub-
inde & plumbei coloris; pituitam assiduè excrea-
bat; & vt ab eadem intellexi, etiam eandem ali-
quando euomebat; vrina insuper erat aquosa.
Hæc cū in ea animaduertērem, & consilium à
me peteret, vt consuetō more fluere possent, cū
iam tribus annis eas ipsas non expecta esset; &

A

ad

2 DE MULIERVM MORBIS,
 ad cachexiam inclinata esset, temperamento naturali etiam pituitosa, curationem hoc modum institui à pharmaco materiam pituitosam minuente: & pilul. de hiera simplici, pilul. mastichinar. de agarico, añ. ʒ j. excipiantur aqua artemisiæ, & fiant pilulæ viij. quæ circa noctis dimidium sumebantur. Deinde bis in die capiebat eisdem hoc clareto: & rad. petros. fœniculi, apij macerata in vino albo (acetum nocet vtero) añ. ʒ j. rad. rubiæ tinctori, seu erythrodani, valerianæ, añ. ʒ j. rad. præniæ ʒ iij. artemisiæ, pulegij, chamæpit. melissæ, calaminthæ, añ m. j. thymi ʒ j. ʒ. florū rosimarini p. j. sem. anisi, dauci, fœniculi añ. ʒ j. ʒ. seminis carthami ʒ ʒ. polypodij querc. ʒ coquatur in aqua communi pro lib. j. ʒ. colaturam adde syrupi de artemisia, de byzantiis sine acetum de eupatorio, añ. ʒ j. adiecto saccharo albiss. pro sapore delectabiliore, aromatizetur ʒ iij. cinnamomi selecti, & fiat clareti instar. cuius agrotant bis in die capiebat cyathos duos, vnum manè, & meridie hora quarta alterū. Deinde illam purgauit cum pharmaco sequenti, quo magis se delectare dicebat, quā pilulis: & benedictæ laxat. elect. hieræ picræ, diaphœnici, añ. ʒ ij. agarici trochis. ʒ ʒ. dissolue cum decocto artemisiæ, pulegij, ad ʒ iij. addēdo syr. de artemisia ʒ j. misce. Sumpsit summo diluculo, & septies aliuū excreuit. Die sequenti in diluculo exhibita fuit ʒ j. theriacæ veteris cum ʒ ij. vini albi. manè, inquam, sex horis ante cibum. Cū humor ille vnica purgatione expurgari non posset, rursus mense proximo sequenti claretum repetiuius, ac eandem purgauimus.

hoc

& Gradus ac Gatenaria testantur) 3. j. folior.
 fenæ 3. vj. agarici feminini albi levis 3 ij. zin-
 zib. albi 3 β. glycyrr. ras. 3 β. vuar. pass. ab arillis re-
 purg. 3 j. fiat omnium decoctio in aqua commu-
 ni pro 3 viij. stent infusa per noctem: manè for-
 tiss. expressioni adde, syr. de artemisia, de quin-
 que rad. añ. 3 j. misce pro ij. dosibus. Deinde im-
 peraui, vt hoc modo purgaretur: & pilul. sc̄ti-
 dar. aggreg. añ. 3 j. agarici trochis. pilul. mastich.
 añ. 3 β. cum syr. de artemis. fiant pilulæ viij. den-
 tur post mediam noctem. Egregiè enim confe-
 runt semel in hebdomada eiusmodi pilulæ ma-
 stichinæ cum agar. vel de hiera simpl. cum aga-
 ric. Istis enim diuertitur materia ad intestina, ne
 amplius ad vterum confluant, aut in eo coacer-
 uentur. Deinde paulo ante tempus mensiū iussu
 vt sanguis extraheretur ad vncias tres quatuor-
 ve, vel paulo plus, ex saphena seu talo, cum in
 poplite nostri chirurgi non soliti sint venam se-
 care. Sumta etiam 3 j. pul. dominarū, adiecto 3 j.
 pul. sabinæ cum vino Rhenano, mensibusq. ita
 apertis, rectè se habuit. Pulueris dominarū hæc
 erat descriptio, qua tunc utebamur: & in officina
 nostra Delphis apud Theodorum Clutium, qui
 cognatā vxoris meæ duxerat, parata habebatur:
 & seselios, cumini, marathri, añ. 3 ij. β. curcumæ
 3 iij. nucis muscatæ, calami aromatici, añ. 3 β. ga-
 langæ, zedoariæ, cassiæ lignæ, macis, caryophyl.
 anthos, añ. 3 ij. cinnamomi 3 β. croci 3 j. misce.
 Sed & hoc modo ab aliis paratur: & cinnamomi
 electi, curcumæ, sacchari, añ. 3 ij. zinziberis, ca-
 ryophyl. macis, nucis muscatæ, añ. 3 β. baccarū
 iuniperi,

iuniperi, lauri, galangæ, añ. 3 ij. sem. zedoariæ
 croci, añ. 3 j. misce. fiat pul. Alius pul. do-
 minarum: & rhab. 3 ij. β. galangæ 3 j. rad. ze-
 doariæ, sem. fileris montani, cinnamomi, nucis
 muscatæ, añ. 3 vj. macis 3 β. caryophyl. 3 ij. cu-
 mini, sceniculi, calami arom. gran. iuniperi, bac-
 carum lauri, anisi, añ. 3 β. sacchari candi 3 ij. fiat
 pul. Amstelami apud quosdam in vsu erat hic
 vltimus. Sed primus mihi magis placet, quod
 commodè frequenter vsus sum.

SCHOLIA.

Quæ pars
 afficiatur
 in mensium
 suppressione.

Quis affe-
 ctus præter
 naturam sit
 mensium
 suppressio.

Causæ.

Ex parte
 vteri.

SEMPER sanè ipsi vtero tribuenda affectio vide-
 tur, eo vel primariè, vel secundariè & per con-
 sensum affecto; etiam si totius corporis vitio fiat: rectè
 enim dicemus, vterū ipsum affici, cum non perueniant
 ad eum ea, quæ antea, cum secundum naturam se ha-
 beret, venire solebant. Quòd verò hoc vitium sit sym-
 ptoma in genere retentorum immodicè, liquet apud
 Gal. lib. De differ. & 3. De causis sympt. Cum igitur
 inutiles suppressiones curare volumus, à quibus de
 malo metus est, inuestigabimus causas omnes, quibus
 supprimantur vel minuantur. porro minutio est, ut
 vel periodi rarae sint; vel si in tempore, ut exi-
 guum sit quod profluit. Causa igitur alia sunt ex ipso
 vtero, alia ex totius affectu. Ex ipso quidem vtero,
 vel quia sanguinem non suscipit; vel, si suscipiat, non
 expellit. Ex toto verò, quoniam sanguis ad vterum
 non pellitur. quòd verò non pellatur, aut penuria est,
 aut crassities eius, aut auersio in alias partes; adde &
 rectricis naturam opus destituere, quoniam occupatur
 animi

propriè loqui intendimus, quæ præter naturam existit
ex quâpiam præternaturali causa orta, vel totius cor-
poris vitio, vel vteri & partium eius proprio; vt exem-
plis etiam subsequenribus ostendemus.

OBSERVATIO II.

De menstrua purgatione subito retenta.

ANNO 1581. Margareta Godefridi, Del-
phis, cùm sororis eius filius, quatuor
aut quinque annorum, in aquam incidisset,
& viri adstantes statim puerum non extrahe-
rent, ipsa in aquam saltavit, & ferè cum puero
aqua obruta ac suffocata fuit, nisi duo viri tam
illam quàm puerum extraxissent. Ad hanc euo-
catus sub noctem 14. Maij, cùm ipsa circa præ-
cordia valde afficeretur; (nam & menses ei pro-
fluebant dum in aquam saltaret; atque illi tunc
subitò restricti præcordia valde infestabant)
statim, vt sudor prouocaretur, decoctū sequens
propinaui: & decoctionis aquæ florum cha-
mæmeli ℥ iij. oxymellis simplicis ℥ j. misc. calidè
cùm ebibisset, in lecto vestibus bene cooperta
egregiè per torā ferè noctē sudavit, & vnā men-
ses suppressi statim debitè fluxerunt; ita vt dein-
de aliis remediis opus non fuerit. At famula
cuiusdam zythepsæ, seu cereuisiarij, paulo plus
quàm annos viginti nata, cùm consuetas purga-
tiones menstruas haberet, & nudis pedibus pa-
uimentum aqua detergeret, tum scopis purga-
ret (vt hîc sæpe fieri assolet, quia nostræ Batauæ
mulier-

14 DE MULIERVM MORBIS,
 mulierculæ valde munditie intentæ sunt, & curiosæ ut omnia niteant;) subitò menses eideb;
 retracti fuere, & longo deinde tempore confusio-
 nis periodis non fluxere: unde & nauseabundus
 cibos fastidiebat; & circa lumbos tandem, tum
 scapularum capitisque & totius corporis dolorolo-
 tum gravitate corripiebatur. Hæc cum lotio conco-
 sultandi causa me accessit, quod crudum erat me-
 & ideo de inappetentia, & nausea, ac cibi fasti-
 dio, tum dolore circa ventriculum iudicavi. Sed
 causa ab eadem intellecta, quod menstrua pur-
 gatio hoc modo retenta esset, neque aliquot pe-
 riodis fluxisset; cum viderem famulam hanc non
 quaquam opulentam esse, ut sumptus ferre poss-
 set, atque Galenus nos docuerit 6. De medicamentis
 compos. quod secundum ægrotantis posses-
 sionem, opulentiam, aut pauperiem, medicamenta
 pretiosa vel parvi valoris à Medico sint præscri-
 benda; ideo potius decoctum mihi præscriben-
 dum proposui longum, quod simul digerere
 præpararet materiam pituitosam (cùm talis e-
 obstructione in illa coaceruata esset; atque adeo
 pituitosa ipsa erat) & expurgaret, in quo omnes
 scopi curandi continerentur, & subtiliandi, &
 digerendi ac euacuandi simul: nam hoc modo
 ferè aperiuntur menses. Tale itaque decoctum
 præscripsi: & rad. apij, petros. valerianæ, fœnicu-
 li, añ. ʒj. melissæ, artemisiæ, calaminthæ, pulegij
 matricariæ, añ. m. j. sabinæ m. ʒ. florum chamæ-
 meli, roris marini, añ. p. j. sem. anisi, carui, dauci
 añ. ʒj. ʒ. seminis nigellæ (egregiè menses educit
 uti & eius farina in panno ligata, & supposita; v-
 &

verò ratio est ex his quæ ab initio posuimus, quòd illæ plurimum sanguinis acervant, & cum eo plurimas ruditates; hæ verò minimum. Et quidem ita fieri videtur, ut viragines & calidæ mulieres quam minimū purgētur, præsertim si multo utantur exercitio: contra verò humida, siquidem omnia secundum naturam esse habeant. Quod addo, quoniam calida sicca, ut etiam Iacchinus doctissimus dicebat, si bili multa abundant, & ita cacochymia teneātur, ob sanguinis acuitatē & tenuitatem plurimum purgantur: quoniam non absumentur in corporis alimentum: contra verò humidis sæpe venæ obstruuntur; itaque aut non aut ægè purgantur. Subdit Hippocrates: Et nisi crebrò profluant, intumescunt. Sic clarius legitur, Iacchino teste, quàm, celerrimè: volens significare, vnum ex morbis, qui his naturis succedunt, esse hydropē, ut supra explicauimus. Tum & pinguidibus per naturam exigua purgatio fit, quia angustas habent venas, & pauci sanguinis, vnde & non concipiunt. Sed cur, dices, ante 14. non fiunt? Quare ante 14. annum purgatio menstrua non fiat. an quia magna copia in augmentum absumentur? unde & aliquibus, quæ diu augentur, plurimum etiam tardant; & illis fortè tarditas non erit præter naturam. Hoc nosse oportet, ut sciamus, & quæ sint corpora quibus noceat tarditas, & quibus prouocationem tentare debeamus, ne imprudenter tentemus id quod fieri non possit. Cur verò post quinquagesimum annum ut plurimum non fiant, causa est caloris diminutio, ob quam & sanguis non adeò abundat in venis; & si abundet, non est ea vis natura, ut per longinquas partes possit expurgare, & per venas angustiores trudere, earumq; ora aperire. Vnde quibusdam ad sedem effluit, quibusdam ad aliam partem, si fortè per naturam

Quare ante
14. annum
purgatio
menstrua
non fiat.

Cur non
post quin-
quagesimū
annum.

Supprimun-
tur menses
quibusdam
secundum
naturam.

turam redundet: & sunt ea via faciliores. Cùm itaque mulieres menstrua purgatione omnino careant, vel naturale est, vel præter naturam. Naturale quidem, quantum ad ætatem attinet (ut diximus) si vel infra 14. vel ultra 50. annum. Tum & aliis modis nam prægnantibus secundum naturam menses supprimuntur, quoniam absumitur in fœtus alimentum omnis sanguis qui abundat. Quamobrem & menses tunc effluere præter naturam est, & debilitas fœtus significatur, & abortus; ut Hippocrates 5. aphor. testatur. Quamvis quibusdam sæpe sanguis sine noxa effluat, ut si abundet: nec obstat, os uteri eo tempore prorsus esse occlusum. Id memini evenisse uxori Domini Præsidis Hollandiæ Cornelij Susij, quæ tamen non est passa abortum: potest enim ex utero ceruicis effluere. Aliud tempus cessationis est à partu. Mulieres enim duas vel tres periodos intermittunt: quod accidit ex multa purgatione in partu facta, unde corporis est copia inanitum. Nam & mulieribus lactantibus supprimuntur menses, citra noxam aliquam. Similiter & cantatrices & saltatrices, quoniam quicquid in eis superfluum est, nimia exercitij vehementia consumit, non purgantur: & in summa (ut inquit Aërius) mulieres calidioris naturæ & temperaturæ, & forribus exercitiis utentes, & agrestes, parum purgantur. Supprimuntur etiam secundum rationem, vel extenuati, longam in diem passu, longosq; morbos. Hi ergo non est quod tentemus prouocationem. Atque facile cognoscimus an secundum naturam menses supprimantur; quoniam mulier nulla inde molestia vel totius corporis, vel uteri, afficitur, ut inquit Aërius. Atqui non de hac, sed de ea mensium suppressione non propriè

ergata sunt. Quae plus habent sanguinis, ad quinq;
septem dies purgantur. Plerisq; etiam minus dua-
m heminarum mensura quatuor dierum spatio, in-
positis duobus viginti diebus, aut ad summum tri-
mota, singulis mensibus deferuntur. Sana igitur mu-
ri (inquit Hipp. 1. De morb. mulieru) sanguis men-
uus exit victima iugulata sanguini similis, rubens.
fluit autem duarum heminarum Atticarum men-
ura. Quae non, ut Fuchsius Aph. 30. lib. 5. olei men-
ura aestimanda est, sed sanguini; ut redeat circiter ad
es semisextariolos Luterianos; ut refert Hollerij in-
terpres: natura tamen, aetate, & similibus perpensis,
q; diebus iam dictis. initio vero & fine pauciores &
enuiores sunt purgationes; intermedia purgatione
lures & crassiores, praesertim ubi multa fluunt.
Aristoteles cap. 2. 7. De Histor. animaliu, moueri scri-
bit decremento luna; & hac crescente colligi: unde ca-
pille sexum femineum luna tribuunt. Aliter tamen
sepe experimur. Iunioribus vero, ut alij volunt, ad luna
lenilunia; alijs ferè decresciente. Hinc versus:

Luna vetus veteres, iuuenes noua luna requirit.

Solent autem erumpere plurimis cum vbera ad duos
digitos prominent, & vox in grauiorem mutatur; quo
tempore ad usum veneri maximè incitantur: sunt
enim per id aetatis nobiles; nempe 14. anno, aut 11.
vel 12. ut diximus. Sed haec sunt vita breuiores; ut qui-
bus erumpunt tardius, viuunt diutius. Testatur ta-
men Siluius se ex Iohanne Capella, seniore Medico
Francisci Regis, vnde quaque doctissimo, intellexisse,
visam ab illo puellam annorum nouem vterum ge-
stasse. simile etiam affirmat Sauonarola. At iuxta Pau-
lum & Aetium 14. anno primum fluere, antea dictum

Quando in-
cipit primò
occurrere
purgatio
menstrua.

A 5 est.

Quando
desinit.

IO DE MULIERVM MORBIS,

est. Porro, inquam, desinunt menses plerisque ante
quingagesimo: pauci vero usque ad sexagesimu
durant: nonnullis, praesertim obesis, à trigésim
quinto anno menses cessare incipiunt; ut eisdem aut
ribus visum est. Ceterum sanguis qui profuit cop
paulatim usque ad vigorem aetatis augefcit: deinde
aliquandiu aequalitatem seruans, paululum penitus
crefcit, aut minuitur. At ubi ad finem tendit, paul
tim rursus minuitur, donec in totum desinat; eodem
Aetio teste. Dicimus itaque, praeter naturam sisti, at
minui, quoties primum extra statuta tempora ha
accidit: quae tamen terminos certos non habent; se
pro naturarum varietate euariant. Sed postremo
terminus cessationis est, annus quingagesimus: vna
& in eo aliqua etiam nostra aetate pepererunt. Bre
uiter, aliis aliter naturalis purgatio cessat, 40. 45. 50.
aut 60. aetatis anno; pro copia videlicet, ut dictum est
vel defectu sanguinis. Quod si vel post 14. incipiant
vel ante annum 45. cessent, ex aliqua causa prae
naturam id fieri censendum est. Fit vero etiam varietas
multa non in celeritate apparēdi solum & duratione
sed & in copia effluuii maiore, vel minore: idq; ex na
turarum diuersitate. Dicebat enim Hippoc. 6. Epid. 1.
aph. 7. aquosae mulieribus diu menses durare; & n
crebro fluant, intumescere: per aquosas mulieres in
telligens praehumida praeter naturam corpora; quae se
penumero frigidiora etiam sunt. His igitur inquit di
purgationem hanc durare; seu intelligas per multan
aetatem fluere, seu quod singula periodi multum tem
poris occupant. His ergo cum secundū naturam fluan
abundantiores, colligendum est, quod contrario modo
affectis, id est, calidis & siccis, pauciores fiunt. Horum
ver

nimi vel corporis morbo. Sic multis ob mororem in-
 entem, & timorem suppressi sunt menses: sic ob dolo-
 em aliquem corporis abortum. Ex parte autem vteri, Ex parte
vteri.
 uod sanguinem non suscipiat, venarum affectio est,
 t siue frigido desentur, siue sicco squaleant & canni-
 eant. Quod verò non pellat vterus, obstructio in cau-
 a est, siue à crasso & viscidis fiat, siue tumore præter
 naturam, siue cicatrice obducta post vlcus, siue sua de-
 ilitate, ex intemperie frigida aborta, aut pinguitu-
 line. Fit & obstruatio contorsione oris vteri. Vnus
 uoque & præcipuus vteri affectus retentionis men-
 ium causa, eius densitas atque duritia existit; siue à
 natura corpus eius tale conditum fuerit; siue certo tem-
 ore vterum occupauerit: angustia item venarum
 vteri statim à principio congenita; ubi scilicet hac par-
 e femina malè est formata, aut eorumdè vasorum
 ompressio, ex his quæ circum iacent facta est, cum
 idelicet corpus immodicè pinguescit. Nec non &
 iusdem vteri intemperies, ut paulo antè diximus,
 quadam tum natura, tum sub quibusdam affectibus
 rta, suppressionis mensium causa existit. Interdum Ex vitio
sanguinis.
 uoque menses retinentur ipsius sanguinis occasione,
 uorians quod vacuatur vel crassum est, vel glutino-
 um. Quin etiam si ipse sanguis menstruus sine vitio
 it, sed ipsius potius inopia fiat retentio, & menstrua
 suppressantur, aut quia aliò auersa copia vacuatur,
 nihil inde mali suspicandum est euenire. proinde neque
 ac ratione curam ciendorum mensium suscipimus.
 nisi quia concipere nequeunt, ideo tamquam sterilitatis
 ausam tollentes, menses euocamus. Ceterum in vasis, Ex vitio va-
sorum.
 quæ ad vterum pertinent, si obstructio quadam, vel
 obseratio prius facta sit, sic quoque menstruum reti-

B

nebitur;

18 DE MULIERVM MORBIS,
 nebitur; vt Gal. testatur 3. De causis sympt. & Com-
 ment. aph. 28. lib. 5. Vitio itaque vel propriæ substan-
 tiæ ipsius vteri, vel vasorum, quæ ad ipsum pertingun-
 aut eiusdemmet sanguinis, qui ad ipsum deuenit, con-
 tingit menses supprimi. Nos autem cum Donato
 Altomari cunctas has causas vteri vitio prouenire fa-
 temur: quemadmodum etiam si ob robur vasorum
 eiusdem vteri sanguine ipso ad alias particulas delat-
 contingat menstruum detineri, eidem vtero vitium
 tribuimus. Sic si ob inflammationes, seu eius cervicis d-
 storiones, aut peruersiones, seu callos, aut carnis ex-
 crescentias istic exortas, aut pinguedinis copiam, men-
 sium purgatio prohibeatur, ad vteri vitium referend-
 erit: nec minus si pellicula aut circa collum, aut os u-
 lum vteri fuerit aduata: quemadmodum his accidi-
 quæ imperforatæ appellantur. Siue etiam vlcerum ci-
 catrices, quæ vasorum oscula in vtero excatarunt
 (vt cicatrix obducta post abortum, ob quem vteri o-
 fuerit exulceratum) menses detinebunt, etiam vter
 occasione id fiet. At totius etiam corporis culpa ali-
 quando prorsus, vt diximus, non purgabitur semina-
 tum propter plura exercitia, tum propter tenuen-
 victus rationem, tum propter succorum ad alias par-
 ticulas inclinationē: & cum hæc ipsa mediocria sunt,
 minus quàm pro naturæ debito purgabitur, vt eodem
 3. De caus. sympt. à Gal. scriptum est. Nos verò cun-
 ctas tum externas tum internas suppressionis mensii
 causas totius corporis culpa dinumerabimus, ab exter-
 nis orientes. Assiduæ igitur cura, immodicus timor, ac
 mæror ingens, menses supprimunt (Aëtio teste) item
 alimenta vel infra vel supra modum ingesta: nam mo-
 dicum alimentum statim transpirat; multum verò
 meatu

Ex parte to-
 tius corpo-
 ris causæ.

Externæ
 causæ.

meatus obthurat, & excretionem intercipit. Cibi quoque frigidi & crassi, & potus aquae frigidae, intrassant sanguinem, & calorem naturalem hebetiorem reddunt. Et sicuti nimius calor exterior exsiccat menses, ita & frigus constringit. Nimia quoque exercitij vehementia (quoniam quicquid superfluum est consumit) menses suppressere valet. item quemadmodum magnus labor, & exercitium continuum; ita & plurima euacuatio, praecipue sanguinis narium & haemorrhoidum, menses suppressit, hinc mulieres agricolarum & laboratorum parcius purgantur. Contra rursus nimia tranquillitas, & vita supra modum otiosa, & exercitij omnino dimissio sanguinem intrassant, & calorem naturalem extinguunt: hinc minus per venas uteri sanguis fluit. Internae vero causae sunt, calidio-

Internae.

res aut frigidiores totius corporis temperatura: calidiores siquidem hoc excrementum discutiant ac consumunt, frigidiores vero crassiorem ac tenaciorem sanguinem gignunt, vasa uteri obstruunt. Habitus quoque graciles, aut obesi nimium: graciles, inquam, quoniam nihil penitus superflui sanguinis habent: obesi vero, seu pingues, propterea quod reliquis magis exsanguis sunt, minimasque venulas habent. Nam sanguis qui in ipsis est paucissimus, ferè in pinguedinem transit: & propterea tales minimè omnium concipiunt, inquit Aëtius, auctoritate Ruffi & Aspasiae. Obdiuturnū etiam aliquem morbum (ut & prius dictum est) femina extenuata non purgatur; vel propter praecedentem per naves aut sedem, aut quampiam aliam partem, sanguinis euacuationem: etiam per venae sectionem immodicè factam, potissimum ex cubiti venis, ut quodam exemplo post ostendemus. Hac enim

Lib. 16. cap.
2. De men-
sum reten-
tione, ex
Ruffo &
Aspasia.

B 2

sangu-

sanguinem ad superiores corporis partes retrahent
menstruas purgationes comprimit; Gal. auctore L
cur. ratione per vena sectionem: Nec minus & rel
qua excretionum genera; velut est multus dolor, ass
duus vomitus, alui profluvia, pustularum omne gen
per cutem erumpens, morbiq; acuti & magni; men
ses suppressere possunt, vt liquet ex eodem Aetio. Qu
dam etiam (vt ipse inquit) ob plenitudinem non pur
gantur. Hactenus de causis: iam de signis, hoc prin
interposito exemplo, agemus.

OBSERVATIO III.

*De mensium suppressione, sanguine ad
alias partes delato.*

PVELLA rustica tonsoré adiuit mense Maio
vt ex consuetudine quadam, sed peruersa
(vt apud nostros fieri solet) sanguis ex brachio
dextri vena ipsi extraheretur, cum flores suos
haberet vel tempora. Vulgares enim suo idio
mate menstruas purgationes vocant tempora
quod statis quidem temporibus prodeant, ita &
flores appellant: quoniam, inquiunt, vt flos fru
ctum antecedit, sic mulieres non concipiunt an
tequam menses fluxerint. Copioso itaque san
guine ex vena detracto, menses ilico retracti
fuere, & substituerunt: & semper cum periodus
rediret, neque menstrua purgatio subsequeretur,
in brachio eodem tempore palpitationem quan
dam, eamque satis molestam sentiebat; cumque
id ter quaterve contigisset eo tempore cum mē
ses redire solebant, tandem consilij causa me ac
cessit

bonum.

essit, & quomodo menses ex venæ sectione illi
 restricti essent narrauit, symptomate illo, nempe
 altus & palpitatiois, singulis mensibus eam
 manifestante. Imperaui vt mense sequenti cum il-
 lam palpitationem persentiret, venam in talo,
 (saphenam vocant) incidere iuberet, & sangui-
 nem ad vncias quinque vel plures effluere sine-
 ret; cum rustica & satis robusta esset. Ea sectio-
 ne peracta, menses statim fluere cæperunt, sym-
 tomate illo ablato; singulisque periodis exinde
 edierunt more solito, & rectè curata fuit. Eo-
 dem modo & Monacha illa seu Sororcula apud
 liuam Vrsulam, de qua egimus De vomitu san-
 guineo, cum singulis mensibus & staturis perio-
 dis sanguinem, seu menstruas purgationes san-
 guineas euomeret, sanguine ex talo seu saphena
 detracto, à fædo hoc malo liberata est, & singu-
 lis periodis optimè menstruæ euacuationes re-
 dierunt. quæ quidem cum hac rursus colligo,
 anno 1589. adhuc viuit, & liberratè hîc orta, vi-
 rum deinde duxit, prolesq. ex eo numero quin-
 que excepit. At alteri puellæ, quæ Delphis apud
 Sartorem habitabat, & per nares statuto tempo-
 re, menstruis purgationibus restrictis sanguis
 effûdebat. Verùm & huic cum nostro consilio
 saphena secta esset, menses deinde debito suo
 tempore fluxere, & probè sanitati restituta fuit.

SCHOLIA.

CAUSÆ cum sint varia, variantur curationes;
 vt postea aliis exemplis quoque docebimus. Ve-

Signa de-
mōstratiua.

DE MULIERVM MORBIS,
rūm cū causā tam omnes dinumerauimus, signa h
quoque prius explicauimus, antequam ad methodu
curationis idueniamus. Signa verō agnitionis su
per se manifesta, cū matrona vel puella plangant e
conquerantur se flores non habere. Nupta quoq
mulieres cū purgationes ordinarias aliquando ha
buerint, si restricta sint, id quoque aperiunt, & quō
non possint concipere. Quibusdam interea, cū insta
periodus, exiguum valde signum menstrui albi ve
rubri exeuntis quādoque apparet: tamen post res ve
duos dies agrotant, plangunt, ac conqueruntur d
ventre, capite, pectore, & sequuntur symptomata.
Galeno 6. De loc. affect. enarrata. Iam & haec signa
occurrunt, ut habetur de harmonia gynaeciorum, gra
uedo cum tensione lumborum & dolore, & sup
pectine, & inguen, capitis etiam & ceruicis; cui &
bases oculorum consediunt: frequentius & anorexia
ei succurrit, sonitus aurium, feruor cum rubore vul
tus, inambulationum etiam instatid, & partiumq; mulie
brium siccitas: quae omnia occurrunt diebus purgatio
nis. Et si diu suppressi sunt menses, si a Medico non
pungentur, timor aliquibus in ilibus, & phyma in ex
tremum ilium parte exaritur, quā timor supparatus
longo tempore vix sanatur. Indicio quidem est ex in
terius partibus quāpiam esse inflatam. Non nul
lis etiam in extrema ilium parte pauius excitatur, ut
liquet ex Gal. lib. 6. De loc. aff. Quod igitur prater
naturam menses detenti sunt, ex pluribus indiciis di
gnosce valebis: primum autem ac maximū est Hip
poc. 34. Aph. 5. lib. cū dixit: Si mulier quae neque
gravidā est, neque peperit, lac habet, huic menstrua
defecerunt. At nulla apparente in mammis lacte, ut
refert

refert Gal. 6. Dodoc. affect. hac indicia aderunt: gra-
uitas totum corpus molestat; fastidia cibi incidunt;
horror inaequalis cum febre quandoque: & si vteri os
laudatur, cum quadam id erit duritie; propter quod
differunt ab his quae cōceperunt: quibusdam dolor cum
grauitate in vteri regione accidit, modo in vna, quan-
doque in altera parte. quinetiam in coxam dolor tran-
sit, ac crus ipsum, quod e regione est, per incessum clau-
dicat: praeterea lumborum, colli, & scincipitis dolor (vt
paulo antè diximus) qui etiam oculorum fundamen-
ta infestat, sequi solet: item febres ardentes, & vri-
nae nigricantes cum rubra quadam sanie, perinde ac
si aquae, ex qua nupex mactata carnes abluta fuerint,
fuliginem quā miscuisset: quemadmodum refert Do-
natus ab Alto mari, saepius se in illustrissima Domina
Maria Sanseuerina, Comitissa Nola, talem urinam
inspexisse. Quibusdam etiam vrina aut difficulter red-
ditur, aut omnino supprimitur. Signa verò specierum
& causarum, tam totius, quàm ipsius vte i propria, ex
propriis earundem indicis, agrotantium sermonibus,
corporum habitibus, ac ex praecedenti victus ratione,
haud agrè dignosci queunt. Primum exmittentibus
etiam signa quibus causae distinguuntur capiemus, &
debilitatem eorum coniciemus: eo quod excrementis
scatent, & morbus aliquis toti communis adest, vt in-
temperies: & priuatione aliorum, vt quia sanguis
adhuc mediocris est quāritate & qualitate, neque ob-
structionis nota adsunt, aut alterius mali vtero pro-
prij. Aversio verò & penuria sanguinis signa habent
euidencia, tum ex praesentibus, tum his quae praesse-
runt circa agram. Ita facile cognouimus in istis tribus
puellis quod reterii essent menses, cum aliò sanguis flae-

Signa spe-
cierum.

Coniecturae
artificiales.

rer; vni scilicet per nares, alteri per vomitum, & pri-
 ri ex vena sectione sursum purgatione rapta. Sangu-
 nis verò qualitas, id est, crassities & lentor, coniectu-
 ratur, primam victu præcunte, qui contrarius ex-
 remianci fuit, cum in cibo & potu, tam in exercita-
 tionibus vel animi, vel corporis. Sic puella quædam an-
 no 1589. cum ætus ingens esset, dum menstruas pur-
 gationes experiebatur, in maxima copia bibit aquam
 frigidissimam. vnde non solum menses restricti fuere
 sed mox symptomatis grauioribus eandem apprehen-
 dentibus, lotium plane restrictum fuit, & incidit i-
 syncopen tanquam ex sanguine concreto, ita vt null
 remedia, quamuis apta, a me adhibita profuerint, a
 ipsa, vix quatuor aut quinque diebus superuivens
 extincta fuerit. Hæc decumbebat apud cærenisarian
 viduam, in cuius capite malleus pro insigni erat. Ali-
 coniectura ex his, quæ in corpore apparent, & sunt pi-
 tuitosi sanguinis soboles: de colore albo, vel plumbeo
 de tactu frigidus, de mole corporis subrumida, somni
 profundus, pigrum, fastidio cibi. Rursus quod & se-
 rius incipit purgatio, & cum multo labore vix quit-
 quam proficit. Sed hæc communia magna ex parte
 sunt affectui proprio uteri, id est, obstructioni, quæ a
 crassis & viscidis: & sæpius hi affectus coincidunt; vt
 scilicet & totius sanguis talis sit: vt & si grauitas &
 tensio circa dorsum & pubem sentiat; & si quia
 excernitur, pituita potius attinet colore & consisten-
 tia. Quibusdam harum & perpetuo aliquid pituito-
 sum educitur: appellant album fluorem. Sed de eo pro-
 prio capite agemus. Sic igitur frigidiores temperatū-
 ras dignoscemus, iuxta Aërium lib. 16. cap. 55. somno-
 lentiores sunt, ad omnemq; motum segniores; colore
 candi-

Ex sanguine.

Ex multo
 aqua potu
 gelidissima
 menses re-
 stricti, & in-
 de mors
 subsequuta.

Ex his quæ
 in corpore
 apparent.

Ex tempera-
 tura frigida.

indidiores, seu plumbeæ; venulis subnigrescentibus, tio aquoso; pituitam iugiter excreant; interdum & tuitosos humores euomunt. Si corpora ob immen- Ex calidz.
m calorem exarescunt, calida temperatura, tales mulieres, eodem Aëtio teste, lib. citato cap. 52. sunt om- mo viriles, colore fusca, compacta neruis, robusta, ve- ossa, lumbos & nates ampliores habent, pectore & umeris latioribus, & pilosis: talis vt virago nihil pror- us, vel paucissimè expurgatur. Pinguiores autem fa- ile cognoscuntur ex habitudine. Alij verò affectus ob- Affectus ob-
ruentes noti esse debent ex propriis signis, vt pingue- struentes ali-
o vteri ex totius pinguedine: durities sentitur tactu, quomodo
& oedema, & phlegmone: erysipelas vehementem cognos-
nsert calorem: conuersio ad latus, obstetricis digitis cantur.
sentitur, & propria signa habet. Signa à causis pri- Cause ex-
mitiuis vel externis per inquisitionē facile habentur, terna quo-
sue in aëre vel aqua versata fuerit mulier: ita quoq. modo di-
si percussa fuerit, vel vulnus ei sit inflatum, aut vlcus gnoscantur.
in vtero, ipsamet enarrabit. Refert Tharantanus, do- minam quandam, cum sepem transires, palo seu sti- pite per ipsam vuluam in matrice vulneratam fuisse, plurimumq; inde sanguinis promanasse: sed, vulnere curato, ob relictam indidem cicatricem menses restri- ctos, vt vix postea quid suis temporibus egresserit, ne- que deinde imprægnata fuerit. Et sic de alijs casibus potest fieri interrogatio, nunquid sustinuerit multos labores, vel tenui victu vsa fuerit, vel morbi præcesse- rint, aut aliæ euacuationes: quæ omnia ex relatione agræ, tum diligentis Medici inquisitione cognoscun- tur. Ita & causæ internæ. Si humores calidi biliosi abundare, vrina est intensa, pauca quantitatæ, pul- susq; velox, mulier macilenta, biliosa, iracunda, velox

B 5

in

Causa in-
terna quo-
modo co-
gnoscantur.

in motu, coitus appetens, sitibunda, & agilis in su-
actionibus: apparent labia fissa, magis si comitatur sic-
citas, estq; colorata. In frigidis omnia contraria, di-
colorata, somnolenta, urina remissa, sitis nulla, cru-
ditas & gravitas in stomacho, egestionis & super-
fluitates pituitosa, mulier phlegmatica, pinguis, no-
appetens coitum. Quae ratione vteri sunt, vel sangui-
nis, vel vasorum, aut totius corporis, iam diximus.

Signa pro-
gnostica.

Quod ad prognostica attinet, etiam haec adiungemus.
Quod igitur mulieribus, quae non purgantur consueti-
more, sanguinis reiectionis ac siderationis pericu-
lum imminet, seu apoplexia, testatur Aëtius cap. 52
lib. 16. Et quaedam in melancholicum atra bilis mor-
bum aut insaniam delabuntur. Talem aliquando no-
puellam prae manibus habuimus, quae in insaniam inci-
dit ex mensibus suppressis; quae tamen à nobis fuit cu-
rata vera sectione ex talo: eius historiam posuimus
cùm de cerebri & capitis affectibus ageremus. Qua-
propter proroganda euacuatio eis non est, quippe
cùm menstruorum oppressio offendat, maxime si à
partu supprimantur. nam non abundantiam modò,
sed insignem etiam humorum pariunt prauitatem; vt
3. De morbo vulgar. testatur Gal. Quibus autem vlce-
rum cicatrices oscula vasorum in utero excacantur,
& propterea menses fuerint detenti, penitus incur-
biles sunt: quemadmodum curari quoque non possunt,
vbi pellicula quaedam circa collum statim à principio,
aut osculum vteri, fuerit adnata, nisi illa perforetur,
aut refecetur; vt liquet ex eodem Aëtio. Graue ma-
lum est si diu retineantur, & haec symptomata subse-
quuntur: priuatio prolis, mania, epilepsia, vteri suf-
focatio ex materia coaceruata & corrupta; tensio,
vteri

teri tortuositas, vteri inflammationes, apostemata, dolores intolerabiles in vteri regione, grauitas totius corporis, mala coctio, appetitus deiectio, nausea, ructus, assus, difficultas anhelitus, hydrops, vrina & secū re-
 mētio, anxietas ac tristitia, cephalalgia, dolor oculorū
 colligantiam, & febres ob oppilationem, podagra, color sordidus, impetigines, furunculi, vertigo, cum alia
 nēdicta Scholio primæ Observationis huius libri; tan-
 tem mors. Mulieri verò sanguinem euimenti men-
 truis erumpentibus solatium fit. Menstruis deficienti-
 us, sanguis ex naribus fluens bonum. Multo menses
 leuiores, nec per idem tempus semper venientes, pur-
 ationem indicant esse necessariam. Si menstrua plura
 iunt, accidunt morbi, & si non fiant, ex vtero morbi
 contingunt. Vrina lactis modo alba & densa, aut ob-
 scura liuensq; mensium suppressorum, aut locellorum
 affectorum, argumentum est. Vrina albescens ruffe-
 scensq; cum squamosis resolutionibus nigricantibus,
 eadem arguit, modo mensium suppressorum reliquæ
 adfint notæ. Quibusdam ex mensibus diu suppressis,
 accedit syncope, tremor cordis, & subita mors. Si
 coitu assiteret, eo non vitatur, suffocata aliquando mi-
 sera muliercula pereunt. Virginibus quoque barba in-
 nascitur, forma corrumpuntur: & si curationem non
 admittunt, vel recipiunt, moriuntur. Ideo his omni-
 bus tempestiuè succurrendum est.

5. aph. 3. 4.

aph. 3. 6.

& 39.

OBSERVATIO IIII.

De Suppressionē mensium, plenitudi-
 nis ratione.

Cum r v d r Bartholdi, mulieri Alcma-
 riana, si quæ altera boni habitus, vidua,
 sed

sed valde formosæ, facie admodum honesta cum rubore decenti, temperatura sanguineâ tempore quo menses fluere consuevit moderatè foras profectæ, cum tempestas valida oborta esset, & tempus admodum ventosum ac pluuiosum, subitò menstrua purgatio restricta fuit. At eo tempore melancholia hypochondriaca laborauit, & sæpe capitis dolore, cum faciei rubore alioqui bonæ habitudinis; nec postea plenitudinis causa purgabatur. congruo autem menstruum tempore (vt talibus fieri assolet, ex Aëtio lib. 16. cap. 59. De curatione earum quæ plenitudinis ratione non purgantur) magis grauabatur dolorisque circa lumbos & lumen percipiebatur flatuque replebatur; quem & saltus, distensionēs, horroresque totius corporis necessariò subsequēbantur; plethora verò hoc malum augebat & huius causa potissimum existerat: quod præcipuè cognoui ex insigni venarum tumore. Haec cum mea cognata esset, & me vocasset, vt hoc malo liberari posset, & iterum debito tempore purgari; cumque aluum non redderet, ventum prius subducto ex bolo sequenti: & cassiæ recens extractæ ʒ j. elect. hieræ picræ ʒ j. fiat bolus: altero die secta fuit vena basilica in brachio dextro vsque ad uncias octo. Eiusmodi enim copiosa sanguinis missione sanantur, iuxta Aëtium (cubiti, inquit, ac malleoli venas secare oportet; tum ipsa optimè ferebat, & consueta erat venæ sectioni: de qua latius in Scholio. Postea & hoc decocto loco syr. præparantis & incidentis, & ad melancholiam hypochondriacam & menses facientis

cientis, ut vteretur consului: & rad. petros.
eniculi, apij, valerianæ, añ. ℥j. radicis buglos-
(ob melancholiam hypochond.) ℥ss. pulegij,
alaminthæ, melissæ, fumariz, artemisiæ, verbe-
æ, summitatum lupul. matricariæ, betonicæ,
quia sæpe dolebat capite) añ. m. j. florū chama-
neli, rorismarini, añ. p. j. sem. anisi, ammi, apij,
eseli, añ. ℥j. ℥ss. polypodij quercini ℥j. fiat decoctio
in aqua communi pro lib. j. ℥ss. col^æ adde syr. de
quinque rad. de artemisia, syr. de epithymo, añ. ℥j.
syr. de fumar. ℥ss. clarificetur & arom^{at} cum ℥iij.
cinnamomi selecti, & fiat ad modū clareti, quo
bis in die utebatur. Postea huic decocto addidi
folior. senæ ℥j. agarici feminini electi albi ℥j. ℥ss.
epithymi ℥ij. rhab. selectissimi ℥j. schœnathi ℥j.
& fiebat decoctio pro ℥ix. & imperavi ut per
noctem relinqueretur in infusione, & manè ex-
pressioni forti adderent syr. ex infus. ros. & de
epithymo, añ. ℥j. pro iij. dosibus matutinis. ca-
piebat omni mane, vel secundo quoq. die, prout
alius mouebatur. Deinde redibam ad decoctū
præparans primò præscriptum; coque finito il-
lam rursus purgavi, in ℥v. eiusdem decocti in-
fundendo folior. senæ ℥iij. sem. anisi ℥j. epithy-
mi ℥ij. semel ebulliendo manè, forti expressio-
ni addendo confectionis hamech, diacatholici,
añ. ℥ij. agarici trochis. ℥j. syr. de epithymo ℥ss.
misce. & detur in diluculo: quo plusquā septies
aluum deposuit. Deinde cū tempus instaret
mensium, imperavi ut rursus ex talo vena ape-
riretur, extrahendo circiter uncias quatuor. Tem-
pus autem secandi venam non erit multum ante
statum

30 DE MULIERVM MORBIS,
 statū mensū tempus, sed tribus quatuorve diebus
 consuetos mulieri circuitus anteuertens; Galenus inquit. Deinde dedi ꝓ pulueris domo-
 narū cum vino Rhenano: & aperti sunt menses.
 Hoc modo hic pul. in officina paratus Alemari
 habebatur: & sem. seselios, ammeos, cinnamomū
 añ. ꝓ ij. ꝓ. cumini ꝓ iij. sem. fœniculi, apij, carui
 nucis muscatæ, calamī aromatici, galāgæ, añ. ꝓ
 ꝓ. zinz. macis, caryophyl. añ. ꝓ j. croci ꝓ iij. ꝓ. fia
 pul. Hæc sequentia magna cum laude quondam
 exhibita fuere Dominae Bredenrodianæ, pote
 vniuersalia medicamenta ad menstruas purga-
 tiones prouocandas, in dolore splenis & vteri
 obstructione: & corticum tamarisci ꝓ j. ꝓ. rad.
 petros. apij, fœniculi, añ. ꝓ ij. agrimon. end. ci-
 chorij, betonicæ, artemisiæ, matricariæ, mercu-
 rialis, costi vulgaris, absinthij, abrotani, saluiæ
 menthæ, hyssopi, añ. m. j. capill. ven. recent. m.
 polytrichi m. j. baccarum lauri, iuniperi, añ. ꝓ ii
 sem. petros. anisi, fœniculi, añ. ꝓ ꝓ. ammeos, carui
 seselios, añ. ꝓ ij. aristolochiæ longæ ꝓ iij. rad. ireco
 ꝓ j. sauinæ m. j. ꝓ. cum vini pintis quatuor, meli
 lis despumati ꝓ vj. sacchi ꝓ viij. fiat potio. Erit de-
 licatior si addatur cinnamomum, & in modum
 clareti componatur.

SCHOLIA.

CVM suppressorum mensium cause tot sint, pr
 earum diuersitate curationem quoque variā
 contingit. Et ita cū hac mulier ob plenitudinem no
 purgaretur, licet subitò prius fuerint menstrua pur-
 gationes restrictæ, iamq; quatuor periodi præterissen
 quò

id mensēs non fluxissent, & tunc prius consilium
 teret; tamen cum viderem plenitudinem in causa
 se (erat enim boni habitus) ideo, aliis consentientibus,
 iuxta Aëtium, tum cubiti primò, deinde tali venam
 cundò aperire iussi. Hanc eandem sanguinis detra-
 ctionem Amatus quoque approbat cent. 1. curat. 41.
 & Matthæo de Grado & Nicolo Florentino; ut qui in
 muliere, cui prius secta fuerat vena basilica, cum hie-
 re ad eam accitus esset, sanguinem ex saphena misit.
 centur. 1. curat. 15. in virgine illa decem annorum
 & octo misit sanguinem in brachio ex vena commu-
 ni: neque Galeno ita adstrictus fuit, (qui venas in
 cubito, lib. De curat. per venæ sectionem, hic non ad-
 mittit, sed in poplitibus aut malleolis, cum reuellere
 purgationem assolent) quin Pauli sententiam & Aëtij
 equutus sit, qui in plethoricis primò ex cubito, deinde
 ex talo sanguinem mittunt: quos postea Auicenna
 imitatus est, & deinde ceteri practici. nec enim neces-
 sarium est in verba Galeni iurare, vel ipsius exemplo,
 qui in libello De libris propriis, seruos eos vocat, qui-
 unque se vel Hippocraticos, vel Praxagóricos, vel alios
 alterius sectæ appellari volunt. Quicumque igitur siue
 Romanus, siue Græcus, vel Arabs, aut Iudeus optimè
 loquutus fuerit, illi quoque fides adhibenda est. Et ideo
 nos quoque, ratione Practicorum excellentium moti,
 in hac nostra cognata, plethora laborante, prius san-
 guinem in cubito, deinde ex talo demisimus. Possunt
 tamen conciliari iuxta Donatum ab Alto mari. Nam
 Aëtius magnam supposuit plenitudinem, qua cum co-
 piofa euacuatione indigeret, vires, aut reliqua haud-
 quaquam permitterent: quapropter cubiti venas
 primò, deinceps eas qua in talo secari iussit, ut ex
 utrisque.

Si ob pleni-
 tudinem
 menses sup-
 primantur,
 curatio.

Venæ sectio.

Conciliatur
 Aëtius cum
 Galeno De
 venæ se-
 ctione.

utrisque simul tanta possit sanguinis copia euacuari
quantam vnica sectione plenitudo requirebat. Galienus
verò non adeò magnam plenitudinem inspiciens, &
aduerso vires robustas in mulieribus plenitudine
laborantibus supponens, eandem in poplitibus, seu
venis vena sectionem fieri, decretum reliquit. Et
dixit quoddam secta in cubito vena mulierum reuelari
purgationem assolent, ac purgationes menstruas co-
primunt, ad superiores corporis partes sanguinem
trahentes, tamquam verum admittendum, vbi p-
eas poplitibus seu tali vena non incidantur. At vbi
ex plenitudine laborant, tunc sufficit sola incisio
tali vena, quemadmodum fecimus Obs. 2. precede-
in famula Zythepse. Sic etiam fecimus Obs. 3. in a-
tribus puellis, quæ ex mensium suppressione laboraba-
sanguine ad alias partes delato. In his etenim, à qu-
cunque parte fluxerit, sanguis est reprimendus,
ad vulua iter congruis præsidii reuocandus, ne for-
inde repulsus ad aliquod nobile membrum (teste Aë-
lib. 16. cap. 42.) vertatur. Ideo vena sectio in talo p-
fuit puella tempore mensium restrictorum sanguin-
euomente; & illi quæ ex naribus sanguinem profu-
debat, ac alteri puellæ cui per vena sectionem in cubi-
menses retracti erant. Iubet idem Aëtius in his & si-
doribus, vomitu, reliquisq; huiusmodi excretionib;
corpus euacuari. At vomitus minus conuenisset S-
roracula, quæ vltro sanguinem tempore menstruoru
euomebat. Sic igitur si auersione (si quidem ad se-
perna) suppressi sunt menses, erit vtendum eisdem fr-
ctionibus, cucurbitula pubi affixa, & coxis, vena ta-
secta, quo ad vterum materia retrahatur. & hæc e-
cura earum, quæ sanguinem vomunt, vel excreant

Quibus sola
incisio tali
venæ suf-
ficit.

Quibus san-
guinis eua-
cuatio alio
itinere auer-
titur, quo-
modo suc-
curatur.

Se

ed si per sedem auertitur, difficillimum erit; ut si per
 emorrhoides. Siue enim trahentibus utatur, ea & ad
 dem trahunt: siue ad sedem astringentibus cohibeas,
 a vicinitate cohibent & qua feruntur per vterum.
 Quamobrem vbi illis qua trahunt vsus fueris, locali-
 us ad vterum erit vtendum; de quibus priuatim paulo
 ost dicetur. Sed in iis qua ob sanguinis copiam id pa-
 iuntur, qui non transfluit, sed ad alia loca vertitur,
 opia minuetur ex vena tali, & fiet auersio ad vteru.
 Ia menses cient, superiores vero potius cohibent. Il-
 ud vero noscendum (vt dicebat Aëtius) haud multo
 effici nocumento qua ob tales causas non purgantur;
 cut nec ob alimenti penuriam, vel ob laborum ex-
 essum. Concipere tamen nequeunt, cum vteri pur-
 ationes defecerint. Sic Sororcula cum graue esset
 malum quod singulis periodis sanguinem quasi men-
 truum per superiora euomeret, secta vena tali, men-
 trua purgatio retracta ad vterum, eaq; postea suis pe-
 iodis fluente & purgata, deinde vbi viro nupsit, non
 emel, sed pluries concepit, vt antea dictum est. Verum
 ti & prius admonuimus, non perpetuo venam scin-
 lere mulieribus necesse est; sed quibusdam malleoloru
 scarificationes, vel crurum satis esse queunt eua-
 uanda superfluitati; vt mulieribus albidioribus, ac car-
 nosis, quibus parua sunt vena, & qua sanguinem te-
 nuem aceruare solent. Sic ego in Obser. prima, & nu-
 der in puella carnosissima pingui, in qua vena non appare-
 ant, circa talum, & alteri inter femora commodè
 cucurbitulas cum scarificatione apposui: & pariter in
 aliis quoque albidioribus. Rectè autem illi (vt retuli-
 mus) qui tali venam malunt quam poplitu secare.
 Paucis enim mulieribus sub poplite apparet, nostriq;
 C chirurgi

Non fem-
 per vena
 secanda.

De quanti-
tate sangui-
nis educēdi.

chirurgi raro eam incidunt. Ideo circa talum eligen-
da erit quæ maior, quæq; pedem perreptat, & facili-
tunditur. Debent autem euitari loca tendinum; & op-
timè vtemur in hoc casu (monente Iacchino) phlebo-
tomo, non lanceola. De tempore secandi venam dixi-
mus Obs. precedenti. Quantitatem autem nedum ple-
nitudinis quantitas, sed virium robur metietur: Et
vbi quippiam non vrgeat, eandem sectionem vena ite-
rare tutius erit, quam semel vniuersim vacuare; aut
in eodem crure, vel in altero, vt videbitur. Conduc-
etiam nedum istis diebus, in quibus sanguinem vacua-
verum & ante eos quatuor aut quinque, vt exte-
nuantem victum procures; eodem Gal. teste. tenui-
inquam, victus eisdem exhibeatur, veluti est ptisan-
succus cum aceto preparatus, & olera ad hunc etiam
vsum idonea. Erit enim exercitiorum, victus, reliquo-
rumq; ratio omnis ad copiae diminutionem facien-
Sanguine verò euacuato, medicamenta quæ menses
promocare possunt adhiberi debent: de quibus postea
etiam iuxta Aëtium potiones & fomenta (de quibus
suo loco dicturi sumus) adhibendo: & cucurbita pul-
& inguinibus affigenda sunt: siquidem menses euo-
cant; vt liquet 13. Meth. medendi. Vbi verò menses
effluere inceperint, mulieri, inquit Aëtius, omnimoda
quies imperanda est, & in lectulo continenda: ac pri-
mo quidem die à balneis & cibis arcenda; proximo au-
tem ptisana cremor cum anetho paratus pro cibo ex-
hibendus; deinde olerum, quæ huic vsui idonea vide-
buntur portiuncula. Tertio die lauanda, ac consuetus
victus ratione regenda erit. Hæc Aëtius: quamuis præ-
stabit à balneo abstinere cum menses fluunt, nisi for-
tè calido vii velit ad promotionem. Et ita curati-
earum

arum quæ plenitudinis ratione non purgantur,
abunde ex his industriò lectori constare poterit.

OBSERVATIO V.

*De Medico imperito, qui menses nitebatur
euocare in puella planè extenuata.*

EMPIRICVS quidam in puella extenuata,
ex longo morbo, cum valetudinaria per-
maneret, mensesque deficerent, nitebatur fru-
stra consuetas ante morbum purgationes, nunc
in extenuata retentas, prouocare cum calidiori-
bus, etiam venam pertundendo in talo, licet
sanguis non efflueret. Hæc cum ad nos consul-
tandi causâ accessit, atque ubi illam planè ari-
dam & exsanguem vidi, venit mihi in mentem
historia illa quam refert Galenaria, quam hîc re-
ferre libet: Quando, inquit, in corpore mulieris
non est sanguis superfluous, tunc si per men-
strua non emittatur, non est mirandum: quia
natura intendit corpus restaurare, ut multoties
accidit in mulieribus cum patiuntur diuturnas
agritudines, vel febres diu perdurantes: quia
tunc natura intendit sanguinem retinere pro
corporis conseruatione & restauratione: & ita
tunc sanguis non superfluit, nec per menstua
emittitur: vnde tunc prouocari non potest; sicut
accidit (idem inquit) cuidam scholari nouiter
practicanti; cum vellet menstua prouocare in
quadam muliere extenuata ex quartana, quam
longo tempore passa fuerat; vnde nunquam po-
tuit:

tuit: quare misit ad me mulierem, qui eam videntem, dixi, nunquam posse prouocari, donec mulier esset bene restaurata. Quare & ego huic mulieris puellæ consului, vt vberioribus cibis reuerteretur. Nam quæcunque (vt ait Aëtius lib. 1. cap. 40. De curatione earum) ob innutritum nem non purgantur, vel gracilitatem, siue morbo, siue id alia ratione contigerit, eas primo reficere oportet, & corpori carnē congruo exercitio moderatoque labore, ac vberioribus cibis restituere. Si enim carnosæ euaserint, maxime inde spes erit, menses sponte erupturos. quod non euenerit, tunc eos commodius potionibus & pessulis prouocabimus. Ideo huic puellæ tenuatæ consulimus vt cibis restaurantibus vteretur, & vbi magis carnosæ euasisset, si tunc debito more menses non fluere, rursus me accederet, vt tunc cōmoda remedia adhiberemus.

S C H O L I A.

Error mul-
torum.

Cum autem varias causas esse suppressionis prouocamus, licet curatio earundem suppressionum mensium in remotione causarum easdem inferentiam constet cum contrarietate; tamen in hoc saepe contingit error, tam in regimine vitæ (vt vocant) quam in ipsis medicamentis menstruas purgationes cohibentibus vel restringentibus: nam calefacientia, & subliantia, & aperientia, causam aliquando augent; ita victus ratio calida exiccans & extenuans. His igitur cognitis, videndum quomodo menses suppressos moueas. Cauendum imprimis, ne his tentes euoca-

quid

quibus non debes, vel quibus est impossibile. Nam con-
 tinuè, in vanum laborari in his quæ omnino extenuata
 sunt. & ita frustra eas mulieres cruciant, quæ post
 purgationem sanguinis euacuationem factam per nares aut
 in aliis regionibus, qui menses prouocare volunt, aut post
 longum morbum, ad quem sequuta
 iam sit atrophiam, vel extrema extenuatio. Et ita
 non omnis retentio statim indicat sui ablationem &
 prouocationem: nam à causa naturali, (vt diximus)
 in anicula, in puella nondum ad ætatem
 deuenta, in saltatricibus, viragine, (quæ omnes
 molestia non afficiuntur) neq. extenuatis à longis mor-
 bus, menses prouocandi sunt. Ex quibus quoque sequi-
 tur, in vanum laborare qui ante vel post tempus purga-
 tionis, menses volunt prouocare. Sicut etiam in his, quæ
 habent sanguinis ob cachexiam, quæ veram &
 perfectam sanguinis generationem impedit. Et ideo neq.
 quibusdam etiam, licet fiant à causa non naturali, vt
 ob extenuationem humorum paucitate cibi, & sanguinis
 toto vel in utero, quæcunque causa fuerit, in his,
 quam, non debent irritari, sed solum regimen re-
 ceptum præscribi; vt apud probatos auctores videre
 poteris. In cachexia videlicet malum illum habitum
 corrigendo, vt multus ac bonus sanguis generetur. Sic
 in atrophiam, & sanguinis penuriam, alimenta, quæ
 multum sanguinis generant, danda sunt. Interea quæ
 penuriam sanguinis fit, si ex formatione euenerit,
 in frigidis siccisq. curam non habet. Si verò ex tem-
 peramento calido & sicco, curam habet per contraria,
 refrigerantia scilicet & humectantia: semper in me-
 moria habenda, quomodo temperamenta sensim
 mutantur, idq. victus ratione maxime in omnibus sex

Quando
 frustra pro-
 uocantur
 menses.

Si ob ca-
 chexiam vel
 atrophiam
 veniat, quo-
 modo cu-
 randa.
 Ex sanguinis
 penuria.

Cautio.

Si ob nimiam
caliditatem
menses sup-
primantur,
curatio.

Si ob frigi-
dam corpo-
ris intempe-
riem menses
suppriman-
tur, curatio.

generibus; quod sanè fieri ob conceptionem requir-
mus. Rectius, inquit Aëtius autoritate Ruffi, quide-
foret ad integram sanitatis tutelam, victus ratione
excogitare, à qua ita mulieris corpus desiccaretur,
menstrua purgationis non indigeret: sed hoc conc-
ptioni prorsus aduersaretur. Causa ergo cōcipiendi,
quoniam omnes ferè mulieres incōsultò viciunt, pu-
gationes sunt necessariae: propterea congruit curatio
quoq. subscribere, qua menses intercepti euocantur. Ca-
lidiores itaq. & plurimum exercitatas mulieres quā
maximè humectare oportet, dulcium aquarum balnei
vberiori humidiorēq. cibo ac potu; quales ptisanae &
chondri sorbitiones sunt, & quae ex lacte preparantur
& ex oleribus, lactuca, cucurbita, & huiusmodi. E car-
nibus, agni, hœdi, ac nouelli sues, praesertim cicures, &
feminae: è piscibus, quicunq. teneras carnes habent: e
auibus altilis: è fructibus, ficus recētes, vuae matura, po-
pones, cucumeres: è potionibus, vinum tenue, candidū
non adeò antiquū, & dilutum. Tales itaque maximè
humectabimus, quacunq. ratione calidiores fuerint, siue
ex naturali temperamento, siue ab exercitiorū excessu
aëremq. humidum eligemus ac paulo ad frigidū ver-
gentem, somnoq. longiori vtēmur: quietem imperabi-
mus, & iubebimus vt exercitiū vitent: & immodico
affectus, iram, maestitiam, timorem; & vt supradictū
vtantur; cremore ptisanae, ex lacte parato: & prae-
terea dicta, carnibus gallinarum, caponū, & pullorū, &
iure carniū, lacte, & recentibus ouis gallinarum, &
summatim dicta, renutritoria victus ratione. Talia &
extenuatis conueniunt. Si ob frigidam corporis intem-
periem menses non profluant, oppositam curationē insti-
tuemus. Nam calidioribus cum cibo, cum medicamētis
vtēmur

emur & fortioribus exercitiis, ac pluribus laboribus,
 iuxta eundem Aëtium; vino item fuluo, odorato, vete-
 ac minimè dulci. Inter medicamenta verò ea eli-
 mus, eodem Aërio autore, quæ calore suo sanguinē
 solvunt; veluti est thymum, pulegium, calamintha,
 chamnum, abrotanum, & alia huiusmodi multa
 iuxta eundem descripta. Ita & curabimus illas quæ
 initio otio non purgantur, iuxta eundem, quas labo-
 ribus addicemus: labores verò qui mulieribus maximè
 congruunt, deambulationes sunt, & à iumentis gesta-
 ones aliquanto vehementiores. In ceteris verò tan-
 tuam frigida & pituitosa curabuntur; atque omnino,
 ut Hippocrates ait, opposita dabimus iis quæ sanguinis
 elationem impediunt. Ac si eveniat ut aqua frigida
 & cruda bibita offendant, aliam optimam perquiremus,
 quam cum vino albo & tenui commiscebimus; ciba-
 iaque pro frigidis, calida; pro crassis, attenuantia offe-
 remus. Pinguiores autem mulieres victus ratione re-
 gemus; quæ summæ (inquit Aëtius) attenuandi vi-
 res habet: atque ea adhibebimus quæ idem lib. 3. De
 alimentorum facultatibus scripsit, & De macie cor-
 pori reddenda. Neque tamen interim fomenta & po-
 sitiones prætermittimus. Si enim materia inferius de-
 clinabit, haud agrè euacuabuntur, & corpus gracilius
 evadet: & quamvis per inferiorem alvum purgatio
 non admodum tuta sit, cum inde corpus labefiat, mu-
 lieri tamen ita se habenti hæc quoque adhibenda est.
 Sæpe enim sola purgantis medicamenti portio mensuris
 evocandis sufficit. Cathartica acerrima, qualia ab
 Aëtio referantur, pinguibus idonea fuerint, & suppo-
 sitoria, tum fomenta & epithemata qualia scripsit ad
 temperaturas frigidiores conferre. Contra in graci-

Lib. 16. cap.
 43. & 55.

Aëtius lib.
 16. cap. 53.

Curatio ea-
 rum quæ ob
 nimiam pin-
 guedinem
 non pur-
 gantur.

Curat.

In gracilibus & extenuatis curatio.

Ex paucitate sanguinis.

Ex copia.

Ex qualitate sanguinis frigida, crassa, & viscida.

Ex obstructione venarum matricis.

libus & extenuatis (vt etiam antea diximus) contrario modo instituenda curatio, siue ex fortibus exercitiis, vel morbo procedente, vel ex fame aut ieiunio aut aliis euacuationibus magnis originē habeat: vtendum enim cibis multum nutrientibus & humectantibus, tum iis quæ auctores præscribunt ad corpus gracile restaurandum. Et ita quoque ex paucitate sanguinis, vt paulo antè admonuimus, præcipua curatio consistit in victure sumptiuo, humectante, & sanguinem multiplicante. Si verò ex copia sanguinis, hæc ipsa copia minuenda erit venæ sectione, vt Scholio præcedente docuimus; exercitiis & cibis tenuibus, & reliqua victus ratione omni ad copię diminutionem faciente. Quæ verò ob qualitatem sanguinis frigidam, crassam, viscidam; hæc corrigenda erit contrariis. Sed quia communis est curatio his quæ ex obstructione venarum matricis id patiuntur, ideo simul hæc tractanda. Quæ igitur obstructions in venis his patiuntur, quas etiam solas docet curare Gal. in lib. De venæ sect. sic tractantur ab eo. Incipit antea per dies decem corpus totum parare, & obstructions tum eius tum vteri tollere. hoc autem est (teste Iacchino) corpus fluxile reddere. Id primùm victus ratione extenuant facit, id est, quæ tenues succos, fluxilesq; efficiat: id qualitate ciborum, & potionum fit: & præterea condimentis, quæ sale, aromatis & herbis acris parantur, cuiusmodi est origanum, satureia, thymum, cuminum, anethum: tum exercitationibus fortioribus, & vigilia. Hoc posito, medicamentis rem aggre- ditur, & primùm quæ humorum copiam crudorum extenuant per totum corpus, & parant, vt purgari possint: vt oxymel & simplex & scilliticum cum de-
cocto

Sto betonica, vel thymi, vel alterius incidentis, & extenuantis & incidentis. A qua portione, picra potius propinat. Inest autem picra vis primum purgandi venas à pituita, extenuando & extergendo: est & vis tollendi obstructions, per incidentia medicamenta, quæ longè penetrare possunt. Eligit autem maximè purgantem, ut est hiera plurimum aloës reapiens: nam variis modis paratur. Hoc ergo medicamento vteris 10. diebus illis bis aut ter. Interim medicamenta exhibenda quæ menses ducunt, ut sabina, dictamnium, pulegium, &c. modus exhibendi, in mestrato à balneo statim cum adhuc calent. Intentio igitur est obstructions tollere: idq; primò facit humores respiciendo, parando, purgando, vacuando. preparatio per extenuantia, calida, sicca, acrida, amara, fit, modò fortiora, modò debiliora. Tempus præfigit decem dierum; quod accipit Paulus. Sed hoc ridiculum, cum pro varietate humorum, variare vim medicamentorum oporteat: quibusdam ergo vix quindecim aut viginti sat erunt. Purgationem per hieram facit: non negat tamen, quin & aliis, maximè agarico: quoniam vis inest illi extenuans, & admiscetur aromatis. Sed & diaphœnicon ad hoc facit, & hiera ex colocynthide, & Archigenis. Vltimò adhibet venæ sectionem in poplite, vel potius in tale, idq; per duos dies, parum trahendo quotidie, quo à supernis ad inferna maior attractio fiat; vel ut sanguis obstruens, iteratis tractionibus melius deriuetur à parte. Vult fieri vtrinque cathexin, si fortè in vno magis obstructio sit. Sed cur postponit venæ sectionem? An quia non potest vacuari sanguis obstruens è venis vteri, nisi dissectus & paratus sit, & imminuta ex parte obstructio? Hoc igitur

C 5

facit

42 DE MULIERVM MORBIS,
facit postremo: quoniam venæ sectio paratiorem san-
guinem exigit, ut possit educere à loco: quoniam non
fortiter, sed solum vacui ratione. Verum de venæ se-
ctione, de cucurbitulis, & scarificatione, satis prius
dictum est. De remediis vero quæ bibuntur, quæ Ga-
lenus scribit, experta sunt eo modo quo scribit. Rhasi-
strochis. de myrrha multam vini habet: potio item ex
herbis in vino insolatis: rectè utimur & aqua porre-
tana. omnia methodo inuenta remedia, experientia
comprobata. Expedit autem & localibus uti; quam par-
tem Galenus omisit: ut sunt sessiones in balneis, qui-
bus vis insit dissolvere & extenuare crassa, ac venas
dilatare; qualia sunt sulphurea, & quæ arte parantur
ex stœchade, chamamelo, anetho. De his superius quo-
que egimus. Mox & pessus & suffusus. nam iuxta Hip-
poc. lib. 5. aph. 28. muliebria educunt, id est, menses. Cau-
sam ponit Gal. extenuationem, quæ fit ab eo fumo.
Vsus est, per fellulam perforatâ obductâ omni perspira-
tione per vestes. Nos trochiscis ex gallia utimur. Simi-
liter conueniunt pessi ex ladano & aliis, ut postea dice-
mus: pro diuitibus moschum & zibettum adiungimus.
Hæc autem exemplis subsequētibz clariora euadent.

OBSERVATIO VI.

De puella ex sola refrigeratione, vel nuda in-
temperie frigida, menses restrictos habente,
& de altera muliere, mensium suppressione
laborante, à succo pituitoso venarum uteri-
ora obstruente.

PU ELLÆ annos octodecim natæ, cū in
hyeme, aëre frigido, linteamina lora extra
urbem

bem in pascuis (vt fieri solet) exposita aëri,
 rsum inde ablueret, menses restricti fuere ex
 rigiditate & nuda tantum intemperie, absque
 umore. Vrina inspecta quæ alba erat, & cum
 osa in vteri fundo manifestam frigiditatē sine
 ondere aut grauitate sentiret: statim imperaui
 t vinum generosum biberet, & vt hoc decocto
 teretur eo tempore quo menses solebant fluere:
 dictamni cretici, pulegij, matricariæ, artemi-
 iæ, sabinæ, añ. m. j. florum chamæmeli p. j. cice-
 um rub. ℥ j. melissæ m. β. coquatur in vino Rhe-
 mano pro lib. i. dulcoretur parū saccharo, arom^e
 um ℥ β. cinnamomi selecti, & fiat claretum. &
 menses optimè fluxere. Accessit ad me, consul-
 andi causa, & altera mulier pituitosa, quæ ex pi-
 uita copiosa, & succo crudo ac frigido, men-
 struas purgationes vltra dimidium annum non
 viderat. Imperaui, vt victu extenuante vteretur
 & humores incidente, eo modo, quo paulo antè
 diximus Scholio præcedente. Deinde cum sco-
 pus huius curationis esset subtiliare, digerere, &
 demum euacuare, & tandem menses euocare;
 omnium primò ad materiæ minorationem præ-
 scripsi id quod sequitur: R. elect. lenitiui ℥ j. dia-
 phœnici ℥ ij. cum ℥ iij. decoct. pulegij, artemisiæ,
 betonicæ, fiat potio; capiat in aurora, & dormiat
 per horā; postea surgat & ambulet. Die sequenti
 sumet hūc syr. & syr. de artemisia, de duabus rad.
 oxymelitis simplicis, añ. ℥ j. aquæ decoct. beto-
 nicæ, artemisiæ, pulegij, ℥ vj. misce, pro ij. vici-
 bus: capiat manè hora vna ante auroram dimi-
 dium calidè; & super id dormiat ad lubitum. ho-
 ra quar-

vrina
 alba n.

ra quarta pomeridiana sumat alteram dosim.
 Diebus sequentibus capiat hunc syrupum: B
 syr. de eupatorio, de duabus rad. syr. de artemisia
 añ. ʒj. & aquæ decoctionis hyssopi, pulegij, cala
 minthæ, origani, artemisiæ, ʒ ix. fiat syr. pro iij
 dosibus. Istis syrupis finitis, denuo purgetur: i
 electuarij lenitiui ʒ β. diaphœnici ʒ ij. electuarij
 ind. maioris ʒ iij. dissolue cum decoct. artemi
 siæ, capill. ven. sem. anisi, fœniculi & pass. ʒ iij
 mellis ros. colati ʒ j. detur calidè hora ante diem
 tamen cùm incipiet operari, non amplius doro
 miat. Post quatuor horas à sumto pharmaco ca
 piat hoc lauatiuum: & iuris cicerum rub. ʒ v
 sacch. rub. ʒ j. β. Deinde vno atque altero die in
 termisso, cùm pilulis delectaretur, etiã has pilu
 las præscripsimus: & pilul. scetid. aggregat. aga
 rici trochis. añ. ʒ j. cum syr. artemisiæ fiant pilula
 vij. habuit inde vij. sedes copiosas. Deinde accessit
 ad illa quæ menses prouocarēt. Ideo iussi vt tem
 pore congruo cùm menses fluere solebant, san
 guinis missio fieret ex vena in dextro pede, ve
 sinistro, secundum quòd magis vena apparere
 & tumentior in vno pede quàm in alio esset. E
 si vena in nullo pede appareret, vt poneret su
 per ipsam duas vel tres sanguisugas, ʒ iij. extra
 hendo. Hoc enim tempore iuuant illa quæ san
 guinem circa vterum trahunt; vt sunt dolorifica
 ligaturæ in coxis factæ, vel frictiones sanguinem
 ad partem trahentes. Vtile quoque est partes il
 las prius fouere aqua tepida, vel decocto malua
 rum vel liliorum, vt partes illæ relaxentur; ob
 quod sanguis ille facilius descendit. Ista etiam

conue-

conueniunt si multus sanguis sit in corpore, aut
status, aut ob venarum obstructionem vterive
tensionem suppressus; adhibitis nihilo minus
mediis quæ obstructionem tollunt. Interim,
quam, & illa apponenda quæ sanguinem ad
uterum trahunt: qualia etiam conuenire dixi-
mus in iis quibus multus sanguis ad partes su-
periores fluit, & per nares vel per sputum, aut
vomitu reiiicitur. nam vbi præcesserint reme-
dia iam dicta, etiam hoc tempore vtile erit fre-
quenti cucurbitularum appositione supra emun-
ctoria sanguinem circa uterum trahere. Appo-
nuntur sine scarificatione his quibus non est ni-
lius sanguis: in quibus autem est multus, sca-
rificatio facienda est. Nam cum sanguini patet
exitus, facilius ad illam partem fluit; sed multus
non est trahendus. euacuatio enim sanguinis co-
piosa aliam euacuationem impedit. Aufertur
copiam propter quam expultrix illum sanguinem
expellit, vt supra monstratum est. Verum in hac
muliere consulimus vt sanguis paulatim dedu-
ceretur ad uterum cum ligaturis & frictionibus,
& sectione malleoli seu tali. Sed hæc non fa-
cienda (vt etiam antea admonuimus) nisi quo
tempore solebāt menses fluere; aut quibus num-
quam fluxerunt, ad finem mensis; vel in princi-
pio quibusdam iunioribus. In qua parte humo-
res liquefacti aut rarefacti videntur aucti, lini-
menta ex modicè calfacientibus & relaxantibus
sunt adhibenda. Ideo etiam imperaui vt vnge-
rentur partes inferiores ventris, inguinum, & re-
num, post fotum. & axungia gallinæ, anseris, &
anatis,

46 DE MULIERVM MORBIS,
 anatis, añ. ʒ j. olei amygdul. chamæmel. liliorum
 ʒ j. ʒ aristol. vtriusque, iridis, asari añ. ʒ j. ceræ n
 uæ q. s. fiat vnguentum. Inseßus non parau
 mus, cùm in hyeme essemus, sed ʒ j. huius pu
 ueris dominarum exhibuimus cum vino Rh
 nano albo: & cumini ʒ j. curcumæ ʒ ij. cinn
 momi, nucis moschatae, granorum paradisi, cal
 mi arom. galangæ, zedoariæ, sem. fœniculi, leu
 stici, apij, carui, aristol. rotundæ, baccarum lauri
 sem. nigellæ, añ. ʒ j. fiat pul. Paratur diuerso mo
 do isti pulueres, cùm magistrales sint; qualis
 hic est: & cinnamomi ʒ vj. cumini, anisi, leuisti
 ci, carui, añ. ʒ ʒ. myrrhæ, rad. dictamni, curcum
 añ. ʒ ʒ. lupinor. apij & nigellæ, añ. ʒ iij. calan
 aromatici, pulegij, aristol. longæ, añ. ʒ ij. croci ʒ
 asari ʒ ij. sabinæ ʒ ʒ. misce. fiat puluis. Si menses
 nō fuissent aperti, dedisē ʒ j. trochis. de myrrh
 quibus in robustioribus feliciter sæpe vsus sum

SCHOLIA.

Vbi frigidi
 redundarint
 succi, cu
 ratio.

VBI cum frigida corporis intemperie, crassorum
 ac frigidorum adsit redundantia succorum, qui
 sanguini admixti mensium purgationem impediunt
 vt in hac muliere secunda conungebat; ipsas prius de
 centi medicamento purgare conuenit, donec concocti
 & preparati fuerint: deinde quæ menses prouocare
 possunt, adhibenda sunt. Parentur autem (vt ante
 quoque diximus) tum extenuanti victus ratione, cibi
 semper ac potibus aliquid odoratum admiscendo; tum
 etiam extenuantibus ac incidentibus medicamentis; v
 melle ros. & oxymelite; modo vterus aut quapiam
 ali

neruosa pars affecta non sint, propter acetū. Valent
rupi de tribus, aut duabus rad. de hyssopo, cum deco-
hyssopi, pulegij, calamint hē, orig. abrotani, & simi-
m. Concoctis iam humoribus ac preparatis, purgatio
hibenda cum hiera, agar. in pilulis. Quando multa pi-
ta in corpore collecta est, vbi partes inferiores quoq.
m vnguentis sint preparatae, vt in Obs. praecedente
lendumus, tunc dabimus pilul. de hiera, & aromati-
ventriculū & intestina purgant, humores attri-
āt, & preparant corpus ad assumptionē syruporum
erientium, aut acrium medicamentorum. Duabus
it tribus horis danda sunt ante pastum, vt in exitu
lecto. Deinde syrupi incidentes & attenuantes san-
guinem, aut humores mixtos cum sanguine, dandi
unt; vt syr. de rad. de artemisia, & alij antedicti.
antur cum decoct. herbarum iam paulo antē dicta-
um, vel iringiorum, aut quinque rad. aperientium,
el cum decocto sabina, aut artemisia, aut leucoi. Si
multa pituita in corpore collecta fuerit, euacuanda
st multum ante tempus purgationis mensium, & id
niter, ne redundantia humorum auferatur. Sed suf-
cit dare pilulas supra dictas, addito agarico, vel asa-
o, aut carthamo: vel pilulas benedicta; vel holum
abimus cum hiera vel diaphœniconē. In robustiori-
us pilulas foetidas, de sagapeno, aggregariuas, aut de
garico. A purgatione sanguinem ex malleolis mittere
anuenit, vt diximus; aut scarificationes adhibende, si
ene non appareant. Deinde medicamēta, quae deten-
os menses euocant conscribenda sunt: & primò fa-
ilibus, postea mediocribus, vltimò fortibus vtendum.
Verum cum plures circa medicamenta menses prouo-
cantia hesitent, saepeq; audiamus ab auctoribus, & se-
piusimè

pissimè à Galeno, mentionem fieri medicamentorum
menses educentium; idèd quarendum est quæ ea sit

Menses edu-
centia quo-
modo diffe-
rant à diure-
ticis & vri-
natiuis.

& quomodo id operentur. Igitur quinto De simpl. a-
scribit, ea quæ menses mouent in hoc ab vrinatiuis
stare, quòd cum vtrumque genus calidum sit, quæ
men vrinas mouent longè sint sicciora, id est, quæ p-

uatim nomen diureticorum meruere. Nam men-
ducentia calida sunt, sed modicè siccant. Causa e-
quoniam quæ siccant, crassiorem sanguinem reddunt
vnde & purgationē non facilem. Dubitatur circa ha-

Dubium.

Nam non videtur hac esse differentia: siquidem ea quæ
valentissimè vrinam cient, vim etiam habent men-
ducendi, vt exemplo particularis materia patere p-
test: Sabina, pulegium, asarum, cinnamomum, cal-
mintha. Ea sunt Gal. exempla. Rursus certum est, ha-
sicca tertio ordine esse: ergo non hoc distabunt, quæ
magis siccant quæ vrinas ducunt. Dubitatur iterum

Aliud du-
bium.

Hac vrinam cient, ergo menses non mouent. nam quæ
ad vias vrina deducunt, deriuant ab vtero: quare e-
profluuium per vterum imminunt. Sic in profluui-

Arguitur
Galenus de
insufficiētia.

vt dicemus, ad sistendum vtimur vrinatiuis. Argu-
tur etiam eo loco Galenus (teste Iacchino) de insuffi-
cientia. Quomodo enim vult, calida hæc & sicca men-
ses mouere, quasi semper ex vna causa supprimantur
vt ex crassitie? Hic enim solùm conferre possunt.

scimus aliis nocere; vt si ex penuria: item si ex phleg-
mone, vel scirrho, vel ex plurimo calore naturalis ten-

Responsio.

peramenti. Respondetur primùm ad id quod postremum
est obiectum, non esse mentem Galeni illam solùm esse
causam; sed illam respicit maximè, quoniam & ma-
ximè euenit. Est enim frequentissima ex obstructione
quæ ex humoribus. vnde & ab huius curatione men-

ducentia nominavit. Ad id verò quod prius quere-
tur, dicimus, menses ducentia, etiam quæ propriè di-
cuntur, respectu scilicet huius generis causarum, esse in-
plici differentia. Vel enim solum sanguinem crassio-
rem & frigidiorē liquant, & fundunt, & erunt
modicè calida & sicca; vel præterea obstructions tol-
lere possunt, quæ impediunt. Primum genus diminu-
it iuuat, augendo sanguinis motum nonnihil: secun-
dum genus oblesos, & prorsus defectos. Ea igitur quæ
sanguinē fundunt solum, propriè menses ducentia di-
cuntur: quia per se naturā in opere mittendi iuuant ea
ratione. (Facilius enim pellitur quod tenuius.) At reli-
qua, quodāmodo ex accidenti magis, quatenus iuuant
obstructions tollendo, propter quas detinebatur
sanguis. Dices, Nonne ipsa quoque fundunt & liquant?
Respondes: Quæ vehementer talia siccando cogunt,
non liquant: ideo quod ad hanc rationem attinet, es-
sunt incommoda, sed iuuant propter obstructions. Sic
igitur ad obiecta respondetur, non dici ea quæ vehe-
menter cient vrinam, menses ducentia, propterea quod
cogunt & cogunt; nisi fortè ex accidenti hoc faciant.
Quod si Galenus exempla eorum posuit, transiit à
mensibus ducentibus verè dictis, ad ea quæ obstructions
collunt. Quod verò dicitur, vrinam ducentia auertere
ab utero ad vesicam, concedimus, si propriè talia sint,
id est, vehementer calida & sicca: sed si moderata,
tunc utrumque faciunt preparando sanguinem. na-
tura verò eo beneficio pro exigentia in utraque parte
utitur: ad vrinam renum attractione; ad vterum pul-
sione, quam procurat & commodi gratia in hoc cor-
pore, & propagationis ratione. Alia verò immodica
auabunt modico usu, aperiendo & extenuando. Sed

Propriè
menses du-
centia quæ
dicantur.

D

hac

Per accidēs
menses pro-
uocantia.

50 DE MULIERVM MORBIS,
hæc cogunt sanguinem, inquit Gal. Respondetur,
quis multis vtatur, non si modicè. Eadem ferè hab
Montanus, cùm dicat, quadam per accidens prouoca
menses: vt si paucitas sanguinis in causa sit, alere co
pius quæ sanguinem generant: si humores crassi ratio
ne caliditatis adurentis, frigida & humida: qua ratio
ne Diosc. lactucam menses prouocare dixit, plurimi
ambiguitatem legentibus afferens, cùm id improprie
dixerit. Iam si sanguis crassus, viscidus, cum multa pi
tuita, eget incidentibus & calescentibus; quæ potius
sunt diuretica; tamen in hoc casu inuant ad prouoca
tionem mensium. At si ob meatus & orificia obstru
cta, tunc verè menstrua prouocari dicuntur. Arabes
tres ordines horum medicamentorum ponunt: Pri
mum faciliorem, vt decoct. phaseolorum, cicerum rubi
fænic. apij, caulium, anethi, chamæmel. asparag. melissa
Mediosrium secundum, menthastrium aquatum, cumi
num, stæchas, ammi, satireia, flores schoenanthi, spica
absinth. petros. amomum, leuisticum. Tertium deni
que fortiorem, vt rubia tinctorum, iuniperus, sabina, ni
gella, myrrha, pæonia, castorium, cassia lignea, euphor
bium, & similia. Quedam insuper sunt simplicia, ali
composita: (vide Plinium, Paulum, Aetium atque
Gal. & Neotericos) vt sunt trochis. de myrrha, aliq
pastilli & pulueres dominarum. præter alia, localia re
media, vt exemplum sequens latius docebit.

OBSERVATIO VII.

*De vidua longo tempore menses suppressos
habente ex pituitosiore sanguine.*

MARIA Gerardi, vidua Alcmariana, an
norum 36. minus quidem pituitosa, cùm
purga-

urgationes menstruas longo tempore non ha-
uisset, in inguine tum coxa valde afficiebatur:
umque muliercularum tentasset remedia, sed
infructuosa, & dolor in coxa & inguine accresceret,
et metueret apostema; anno 1557. mense De-
cembri, cum ingenti ex suppressa menstrua pur-
gatione dolore affecta, de nocte me vocauit.
Cum feces non deponeret, clysterem libenter in-
ieci, sed non admittebat. balneo igitur alius
oluta ex pul. hieræ ℥ ij. & diag. colocynth. añ.
r. iij. mellis crud. ℥ j. & talis parum. Bis excreuit,
entostitibus emissis, cum iuuamento aliquo,
et referebat. Ad materiæ præparationem hoc
pozema descriptum est: & cort. rad. fœniculi,
pij, petros. rad. dictamni albi, valerianæ, añ ℥ ss.
grimonæ, cassutæ, capill. ven. artemisiæ, florum
hamameli, añ. m. j. sem. anisi, sileris montani,
mmi, fœniculi, añ. ℥ j ss. cicerum rub. p. j. coquā-
tur in aqua communi pro lib. i ss. col^x adde syr.
de artemisia ℥ ij. syr. de scolopend. de cichor. cum
hab. (aderat enim obstructio quædam in he-
pate & liene) añ. ℥ j. misce. Sumebat manè hora
vij. cyathū vnum, & hora quarta pomeridianā.
Hæc quarto Decemb. die præscripta fuere. Sexto
verò quod sequitur: & cassiæ mundatæ ℥ vj. dia-
phœnici, confectionis hamech, añ. ℥ j. aquæ ar-
temisiæ ℥ iij. syr. de artemisia ℥ ss. misce. Quin-
quies aluum deposuit, & caput dolor mitigari.
Deinde & hoc apozema descriptum est: & rad.
fœniculi, ireos, asparagi, añ. ℥ ss. rad. cappar. ta-
maris. añ. ℥ ij. sabina, artemisiæ, menthæ, nepi-
tæ, calaminthæ, florum hamameli, centaurij mi-

52 DE MULIERVM MORBIS,
 noris, pulegij, satureiæ, prassij, melissæ, verbenæ
 añ. m. j. sem. anisi ʒ ij. cumini præparati ʒ j. fi
 omnium decoct. in duplici vase in aqua artemi
 lilior. albor. & vino Rhenensi, pro lib. i. ʒ. arono
 cum ʒ ʒ. cinnamomi, & dulcoretur cū saccharo
 & sabinæ exiccata ʒ j ʒ. caryophyll. nucis mo
 schata, añ. ʒ j. ligentur in nodulo, & pendeant
 dicta decoctione, & exprimatur dum potio flu
 matur. Deinde 13. Decemb. ita illam purgavi:
 pilul. de hermod. ʒ ʒ. pilul. mastich. ʒ. j. agaga
 trochis. ʒ ʒ. pul. rhab. gr. iij. diag. gr. j. fiant pilu
 læ vij. cum aqua artemisæ: dentur in diluculo
 Septem sedes inde habuit: deinde extractus e
 sanguis ad ʒ iij. in pede dextro ex saphena. I
 17. Decemb. hoc decoctum rursus præscriptum
 est: & rad. fœniculi, ireos, rubiæ tinct. añ. ʒ ʒ. m
 lissæ, verbenæ, absinth. florum chamæmeli, cha
 mæpit. sabinæ, maluæ, prassij, añ m. j. sem. fœ
 nigr. anisi, añ. ʒ iij. folior. senæ ʒ j. ʒ. prun. dama
 num. ix. ficuū ping. num. iij. coquatur in dupli
 vase in aqua artemis. & vino Rhenensi, pro lib. d
 saccharo dulcoretur, & cinnamomo condiatu
 nodulo sequenti in eadem decoct. pendente:
 trochis. de myrrha ʒ j. Bis in die sumebat, au
 semel, iuxta medicamenti operationem. Pro do
 lore inguinis, manè & vesperi inungebatur ca
 lidè vnguento sequenti: & olei cheirini, chama
 mel. anethini, lilior. alb. añ. ʒ ʒ. misce. Deind
 statim instante mensium tempore accepit pu
 sequentis ʒ j. cum cyatho vno decoctionis sabin
 næ & artemisæ: & pul. dominarum descrip
 Obs. 6. præcedente ʒ ij. trochis. de myrrha ʒ j
 miscell

isce. Sumpsit calidè; & aperti sunt menses, ac
 color coxæ etiam cessauit; remanente tamen du-
 cie quadam in inguine dextro; & illa parte
 meri duritiem adhuc sentiebat. Iussi itaque vt in-
 geret sequenti vng. & olei lilior. alb. cheirini,
 3 ss. butyri recentis, olei amygd. dul. axungie
 alline, pinguedinis vituli, emplastri de meliloto,
 althææ, añ. 3 ij. mucilag. althææ, fœnug. añ. 3. iij.
 ammoniaci in aceto dissoluti 3 ij. vng. alabast.
 ei anethini, chamæmelini, añ. 3 iij. aliptæ mo-
 data 3 j. pul. sem. dauci, cinnamomi, añ. 3 ij. ss.
 eræ q. s. fiat vng. molle. Et cùm menses tardius
 c parcius fluerent, præcepi quoque vt ex hoc
 larero biberet: & rad. galangæ, rubiæ tinctoriæ,
 æoniæ, añ. 3 iij. capill. ven. sabina, iux artheti-
 æ, añ. m. ss. sem. pæoniæ, iuniperi, ammeos, ani-
 , leuistici, cumini, añ. 3 ss. rad. dictamni albi,
 lattæ byzantiæ, cubeb. cassiæ lignæ, rasuræ la-
 idis dactylorum, añ. 3 ij. croci orientalis 3 ss.
 em. althææ, lini, fœnugr. añ. 3. j. trochis. de myr-
 ha 3 j. seminis dauci, iuniperi, añ. 3 ss. bulliant
 in vini Rhenensis lib. iij. & saccharo optimo q. s.
 dulcoretur, & arom. cum 3 j. cinnamomi select.
 Capiebat omni mane cyathum vnum; & in-
 ensius more consueto, ac largius fluxere: & bellè
 fuit curata. Post hoc tempus reliqui Alcmariam,
 & Delphensiū stipendio decoratus, praxim ibi-
 dem exercui. & cùm hæc rursus recolligerem,
 triginta octo annis reipublicæ Delphensium
 Medicus ac Physicus fueram.

SCHO-

SCHOLIA.

Medica-
menta qua
menses euo-
cant.

MATERIA pituitosa preparata, & demum
expurgata, ut iam diximus, exemplūq; iam
supra scriptum ostendimus, & vena in talo secta, vel cu
curbitulis adhibitis, ea exhibenda sunt medicament
qua menses euocant. Eiusmodi autem sunt, quae ex
calfatiunt, non tamen valenter desiccant, ut testatur
Gal. De simpl. medic. facult. Cuius farinae sunt (v
ipse inquit,) pulegium, calamintha, sabina, anethum
dictamnium, asarum, costus, cassia, cinnamomum, ar
stolachia, iris, & eius generis reliqua. Haec enim (ut re
fert) absolutas vteri purgationum retentiones sanant.
At lib. De curandi ratione per vena sectionem, menses
abunde prouocare asserit nepitam & pulegium, si in
melicrato cocto exhibeantur; aut contraria arida, in
broq; subtili discevera, at rursum trita vsque dum pol
linem tenuitate referant, & inde in melicrato insper
sa. Conuenientissimum autem tempus sumendi est
balneo inuolutis adhuc linteis. Verum haec, eiusdem au
toritate, mitia sunt. Hi autem violentiora existunt
sabina & dictamnium, quorum vsu sit antedictis simi
lis: qđo etiam tempore medicamentum datur quo
pūpū amarum appellatur. Confert namq; mulieri
bus quae non probè purgantur, si ʒj. exhibeatur cum
aque calida cyathis tribus, ut eidem Gal. visum est.
De compos. med. secund. loc. & lib. De cur. per vena se
ctionem. Duo autem tempora comoda sunt ad tali
medicamenta accipienda, ut refert Aetius: alterum
appropinquante purgationis tempore, alterum, ut pos
tmodum fomentaq; ac balneum, statim bibant co
medantq;

edantq; cuncta supra à nobis commemorata. Ac in-
 per conueniunt decoctiones thymi, rad. asphodeli,
 rricum rad. mori, mercurialis, carpesia, floris iunci
 orati, spica nardi, ac celtica, similiter acori, in vino
 bo veteri, quod excolatum calidum exhibeatur; &
 a supra pro his quæ frigidam temperaturam ha-
 nt. Probè item facit opopanacis, sagapeni, myrrhae,
 et castorii, ʒj. si exhibeatur. Idem quoque possunt
 mini, fœniculi, oreoselini, dauci, ammeos, & cice-
 um decocta; vt idem auctor refert. Paulus præter
 ec helenij rad. decoctum, artemisia, salvia, absinthij,
 m. apij, seseli, approbat, quæ omnia non solum in vi-
 o (vt inquit Aëtius,) aut aqua mulsa, ex Gal. aucto-
 rate; verùm etiam in aqua decoqui possunt, prout
 magis vel minus mulieres fuerint natura frigidi-
 ores. Quæ etiam ratione habita, magis vel minus calefaci-
 a medicamenta eligi possunt, tum eorū quæ hū con-
 ripimus, tum aliorum, quæ ab aliis commemoran-
 ur; quorum copia magna est; adeò vt si quis omnia
 auxilia in hūc vsum commodare cēdere velit, ei multo
 tio opus fuerit, vt Aëtius inquit. Commendantur pa-
 illi è myrrha ad ʒj. cum aqua mulsa; & pulueres
 ominarum, de quibus supra egimus. His adiungenda Topica.
 opica, vt infessus, balnea mineralia, quale in Italia
 puteolis repertum, Syluiana balneum appellatū. Nos
 rificiale conficiemus; vel hanc infessum, quo Bettus
 lim in Italia Bononiæ utebatur: R. satureia, sabina,
 rtemisia pulegij, rad. aristoloch. rotunda, ireos, cucu-
 neris asinini, cyclaminis, ruta, lauri, añ m. ij. coquan-
 ur in aqua pro balneo. Fiunt quoque suffitus, vt pau-
 o antè dictum est, ex aromatibus, quæ & muliebria
 lucunt, auctore Hippoc. lib. 5. aph. 28. ex castalignea,
 D 4 cinna-

cinnamomo, rubia tinctorum, & gallia moschata, in puluerem redactis, & carbonibus inspersis, & fumum per embotam (vt medicè loquar) suscipientes. Si fiant & sacculi ex herbis iam dictis, qui calefacti in latere irrorati, ex paucò vino applicentur, partesq; circa vterũ foueantur. De vnctionibus iam quoq. dictum est. Pessus quoq. vtendum vbi opus est, primò mitioribus, ex anserino seu gallinaceo adipe, saccharo rubeo, & paucò croco, adiectis herbis contusis, mercuriali ruta, artemisia, vel sabina & pulegio. Si validioribus vtendũ, ex succi mercurial. ℥ iij. adiect. puluere gentianæ, nigellæ, & colocynthide, vel sumẽdo myrrham, galbanum, styracem, aristolochiam, rubiam tinctorũ, alrothanum, calamintum, sabinam, pulegium, resina terebinthinam: ac reliqua eiusmodi adiicienda sunt eisdem prius contusis, ac linteo serico, aut lineo tenui ad formam digiti humani inuolutis; oleoq; irino aut liliaceo prius infusis, mulieris pudendo immittantur adeò vt os vteri attingant: ligentur tamen ad crura vt promptius, vbi opus fuerit, auferri valeant. Plurimas formulas vide apud Rondeletium cap. 61. De mercuriis retentis.

OBSERVATIO VIII.

De muliere utcumque biliosa, ex bilioso sanguine menses detentos habente.

MULIERI annos viginti octo habenti, vtcumque biliosæ, menstrua purgatio restricta erat. sentiebat circa vterum duritiem quandam cum siccitate ac calore, & dolorem purgentem

ntem: coitum valde appetebat, & eo plurimū
lectabatur, quamuis non conciperet, ob men-
s restrictos: erat autem rubra. Hæc quidem
igna menstruam purgationē retentam ex san-
guine bilioso, seu materia biliosa, notabant. Qua-
conſilium petenti conſuluimus vt victus ra-
one vteretur qualem Scholio Obs. 5. præceden-
s conferre diximus. Nam quia non concipie-
at eo quòd non purgaretur, ideo cibo ac potu
umidiore & vberiore humectanda erat. Deinde
venam cubiti dextri internam vt incideret
nandauiſimus ad vncias tres vel quatuor tan-
um. Poſtea hunc ſyrupum pro materiæ præpa-
ratione præſcripſimus: & acetosi ſimplicis ꝑ ij.
oxymel. ſimpl. ꝑ j. ſ. ſyr. capill. ven. ꝑ j. aquar. ci-
chorij, artemiſiæ, bugloſſi, añ ꝑ iij. miſce. Per tri-
dium ieiuna in diluculo bibebat, vnà ſumendo
ꝑ ij. diarod. abb. in tabul. Deinde præſcriptum vt
hoc leniente medicamento vteretur: & caſſiæ re-
cens extractæ ꝑ j. aquæ artemiſiæ ꝑ iij. ſyr. viol. ꝑ
ß. miſce. Mox & hoc vel ſimile apozema: & rad.
cichorij, dentis leonis, graminis, fœniculi, pe-
troſ. macerat. in aceto, añ. ꝑ j. rad. valerianæ ꝑ j.
artemiſiæ, chamæd. chamæpit. capill. ven. folior.
ſalicis, cichorij, acetosæ, meliſſæ, ſummitatum
lupul. añ m j. ſem. petroſ. apij, dauci, añ ꝑ ij. ſem.
quat. frig. maior. añ. ꝑ j. ſ. flor. ſambuci, trium flo-
rum cordial. añ. p. j. hordei mundati p. j. vuar. ab-
arill. repurg. ꝑ j. coquatur in aqua comuni pro
lib. i. ß. colat^r adde ſyr. viol. ex ſucco cichorij, de
byzantiis, añ. ꝑ j. ſacchari, ad dulcedinem indu-
cendam, q. ſ. depuretur, & cum ꝑ ij. cinnamomi
D 5 ſelecti,

58 DE MULIERVM MORBIS,
 selecti, & 3 j. pul. specierum diatrod. abb. iucun-
 diore odore & sapore reddatur. Rursus & hanc
 purgationem ebibendam proposuimus: & diat-
 rod. 3 vj. elect. de succo ros. 3 ij. confect. hamech.
 3 j. syr. viol. 3 ss. cum 3 iij. decocti supra scripti
 fiat potio in diluculo sumenda. Deinde consu-
 luimus vt omni mane acciperet cochlear vnum
 atque alterum ex syrupo sequenti: & syr. de ar-
 temisia 3 iij. syr. viol. syr. capill. ven. añ. 3 j. misce
 Denuo vt ad has pilulas deueniret, præcepit
 pilul. aggreg. 3 j. cum aqua cichor. fiant pilulæ vj.
 & circa noctis dimidium sumantur. Et post tres
 dies hoc balneo vel simili, si vellent, lauaretur suasis
 & artemisia, matricaria, nepita, pseudonardi, fo-
 liorū lauri, thymi, añ. m. vj. folior. cichorij, folior. ro-
 salicis, añ. m. ij. folior. malua, mercurialis, me-
 lissa, añ. m. j. rad. valeriana 3 iij. rad. apij, petro-
 selini, foeniculi, añ. 3 ij. flor. sambuci p. iij. florū
 chamaemeli p. j. coquantur in l. q. aquæ, & fiat
 balneum, seu infusus, atq. bis sese lauet, manè &
 vesperti ante pastum, & ponat super pectinem
 sacculum artemisia repletum; sedeatque in di-
 cto balneo super sacculum iis omnibus quæ deco-
 cta sunt plenum. Præcepi autem vt per tres vel
 quatuor dies continuaret, & cum ex balneo egre-
 deretur, vt venter inter umbilicū & pectinem,
 & pars posterior ex aduerso, tum renum regio,
 sequenti vng. inungeretur: & mucaginis althææ,
 sem. malua, lini, foenugræci, extracta cum aqua
 malua, añ. 3 ij. olei amygd. dul. medullæ cruris
 vituli, butyri recentis, axungia gallina, anseris,
 añ. 3 j. ss. adiecta cera fiat vng. partesq. dictæ ca-
 lidè

le eo inungantur. Consului quoque vt eodem
 tempore sumeret trypheræ magnæ sine opio &
 conseruæ flor. cichorij & capill. ven. veri, añ. 3
 8. commista cum iure ciccerum rubior. ex bal-
 neo egressæ exhibeantur. Et quidem cū tem-
 pus adesset quo menses habere solebat, hæc age-
 ntur præcepti. & vt mox die sequenti ex saphe-
 ris ambabus incis, altera post alteram, vno die
 interposito, tantū 3 ij. sanguinis vel ad summū
 res dmitteret. Quibus præsidis menstrua pur-
 gatio si non subsequeretur, commendabam pes-
 um ex descriptione Aërij lib. 16. cap. 38. quem
 d' biliosas mulieres valere scripsit, ex elaterio
 um carica pingui, aut cyclamine cum vino
 aratum.

SCHOLIA.

Si ex temperie calida menses supprimantur, aut
 etiam ex bile, cū non earatione laedantur, vt di-
 tum est prius, conceptionis tantū gratia prouocan-
 tur. Qualia autem his quæ ex nuda temperie laborant,
 conferant, & qualis victus ratio superius quoq; dixi-
 mus. Eadem etiam conferunt si bilis in causa fuerit
 vna cum intempertie biliosa. Interea tamen humor
 biliosus abundans commodis medicamentis purgandus,
 vt manna, rhab. infuso, syr. ex pluribus infus ros viol.
 & similibus, præcedentibus tamen syrupis etiam qui-
 busdam digerentibus, & decoctis, vt in Obs. præceden-
 te ostendimus; quales etiam sunt viol. ros. & succo ci-
 chorij, & boraginis, atque vbi talis quis pluries fuerit
 exhibitus, purgatio adhibenda. Eo humore expurga-

Si bilis in
 causa sit,
 eiusdem cu-
 ratio.

to, pubi & inguinibus etiam quidā cucurbitulas affi-
gunt, vincula inferius partibus, tum cruribus ac ribi-
adhibent; quæq; sanguinem ac viciū alterare possunt
medicamenta tum intus suscipiunt, tum foris impo-
nunt, Aetio etiam iubente; balneum etiam laudant
aqua dulcis, & infessum ex herbis iam dictis, malua
viol. althææ foliis, hordeo, chamæmeli floribus. pubem
ac inguina vnguentis inungunt, qualia in Obser. præ-
cedente diximus, vel hoc aut simili: R. olei amygd. dul.
& amar. añ. ℥ j. olei viol. de cucurbita, añ ℥. β. adipis
anseris, butyri recentis, añ. ℥ β. ladani ℥ ij. fiat vng.
Pesi quoque conficiuntur ex confusis malua & al-
thææ rad. mercuriali, hordeo decocto; saccharo ru-
beo, adipe anseris, gallina, & similibus omnibus conta-
sis ac simul permixtis, & serico linteo veteri inuolu-
tis: prius tamen antè quàm immittantur, oleis iam
dictis intingunt. Eodem tempore & cremorem sem. 4.
frig. maior. cum hordei aqua vnà cum corticibus pa-
rata, aut aqua capill. ven. vel glycyrr. exhibent. tum &
pastillos ex iisdem sem. adiectis aliis parum calidiori-
bus. Ista si non sufficiunt, ad ea progrediendum qua
menses euocant: de quibus, tum etiam aliis topicis me-
dicamentis, superius plusquam satis dictum est.

OBSERVATIO IX.

De mēstrua purgatione retenta ex
melancholia

VIDVA quædā ex mariti obitu ita tota mœ-
sta & melancholica euaserat, vt in ma-
niam ferè inciderit; adeoque vt sanguis crassus
multus melancholicus, ob crassitiem humoris
eiusdem,

eiusdem, non solum vteri vasa obstruxerit, quo minus menses fluere; verum etiam in toto corpore abundare coeperit; lienis obstructione accedente: quod & dolor in hypochondrio sinistro perceptus indicabat; maxime quod tempore autumnali ad me consultum veniret; quo videlicet tempore humor ille magis abundare consuevit. Ideo ut recte illam curaremus, precepimus ut totius vite institutio ac victus ratio ad calidum & humidum inclinaret; magis tamen ad humidum: cum & hic humor magis cum sicco, quam frigido participaret. Deinde hanc potionem minoratiam, ad feces communes expellendas, quae & vterum quoque respiceret, praescripsi: & cassiae recens tractae ℥ j. confectio- nis hamech ℥ ij. cum ℥ iij. aquae artemisiae, syr. de pomis ℥ β. fiat potio. Deinde cum animaduert- terem sanguinem melancholicum illum in toto abundare, etiam splene obstructo, in cubito si- nistro ex vena lienari iussi ut unciae quinque san- guinis, vel paulo plus, extraherentur: qui san- guis valde crassus & niger erat. Deinde mate- riam ipsam praeparavi decocto sequenti: & fu- maria, summitatum lupulorum, melissae, arte- misiae, borag. bugloss. ceterach, chamæpit. cha- mæd. capill. ven. polytrichi, añ. m. j. rad. cappar. tamarisci, añ. ℥ β. vuar. passab. arill. repurg. ℥ j. florum cordial. p. j. polypodij quercini ℥ j. epi- thymi ℥ β. glycyrr. raf. ℥ iij. sem. fœniculi, petros. añ. ℥ j. sem. citri ℥ β. fiat omnium decoct. in aqua communi, pro lib. j. β. col. adde syr. de pomis, de epithymo, de bugloss. añ. ℥ j. syr. de byzantiis cum

cum aceto ℥ β. misce. Bis in die ex eo sumat; mane in diluculo, & hora quarta pomeridiana: R. diamoschi dul. ℥ j. capiat ℥ ij. cū decoct. iam dicto. Si mulieres simul laborant morbo vterino, à diamoscho abstinendū. Deinde vt hanc purgationem sumeret iussi: R. diacatholici ℥ vj. confectionis hamech ℥ ij. β. (yr. de bugloss. ℥ β. dissol. in aqua ne cum ℥ iij. β. decocti communis, adiectis epithymi ℥ j. β. folliculor. senæ ℥ ij. fiat potio: sumatur hora matutina. Die subsequenti à purgatione dedi ℥ j. theriacæ cum vino Rhenano exiguo. Mox descriptis iisdem balneis, biliosis conuenientibus, & vnguentis iam supra dictis; etiam adhibitis prius frictionibus, vinculis, ligaturis dolorificis in extremitatibus inferioribus; vt tali quoque venam in pede sinistro aperiret præcepimus, at pauco extracto sanguine: adhibitis præterea etiam potionibus menses cientibus, cum puluere aliquo dominarum: de quibus in præcedentibus Scholiis tum Observationibus egimus. Istis si nondum menses fluere, consuluimus vt & cucurbitulas quoque feminibus & poplitibus cum scarificatu affigeret, & metenchryta vteretur ex decocto balnei superscripti in vterum injecta; hoc etiam pessō: R. trypherae magnæ sine opio ℥ j. myrrhæ ℥ ij. galbani, ammoniaci, añ. ℥ j. excipiantur succo parietariæ vel mercenialis, aut artemisiæ; fingaturque pessus ex panno lineo raro, qui filo coxæ alligatus demittatur in vterum. Talis enim utilis est non solum retentis mensibus à melancholia, sed & à bile.

S C H O -

SCHOLIA.

Si menstrua purgatio ex melancholico succo retineatur, prout melancholia naturalis, vel magis adusta sit, ea erit purganda. Preparato itaque prius humore peccante pluries assumto syr. de pomis, de succo borag. aut fumariae, aut etiam de epithymo; deueniendum demum ad epithymi ac senae decoctum, in quo misceatur ℥j. cassiae fistulae, vel ℥vj. vel plures electuarij lenitiui, vel ℥vij. diacatholici, aut ℥ij. confect. hamech. Nec etiam, iuxta quosdam, inconuenit ℥j. agarici in praedicto decocto aducere. Vel prius dentur oxymelitis simplicis ℥ij. syr. acetos. de rad. añ. ℥j. aquae asparagi, florum sambuci, pimpinell. añ. ℥ij. pro ij. vicibus; cinnamomo adiecto, pro sapore delectabiliore: repetatur donec materia digesta sit. Purgetur deinde ut supra. Quidam in purgationibus insundunt myrobalanos: sed quia stipticitatem relinquunt, praestat mea sententia superioribus vii; vel etiam syr. ex infus. ros. cum folijs senae; quo & ego vtor. Humore expurgato, possemus & congruo tempore venam in malleolis incidere; potissimum vbi graciliores ac nigriores mulieres fuerint; ac magis si magnas habere venas appareant. Haec enim crassiorem sanguinem, ac magis melancholicum colligunt; ut liquet apud Gal. De curat. per venae sectionem. Post haec medicamenta quae deventos menses euocant, topica adhibenda erunt. de quibus in precedentibus plus satis; ut non opus sit ea rursus repetere. Quod si diminute fluant, easdem causas habent cum retentione, sed imbecilliores aut pauciores. proin eadem postulant, sed remissiora remedia, & clementi-

Si melan-
cholia aut
atra bilis
redundarit,
curatio.

mentiora: de quibus quoque supra dictum est. Sic Iulſa Teylingia, cognata mea, apud me habitans, valde venusta, cum in minuta quantitate purgationes consue- tas haberet, & circa praeordia doleret, appetitu de- iecto, tanquam hypochondriaco malo affecta, praesum- tis pilulis mastichinis, eo tempore cum menses fluere- nt hoc decocto largius fluxere, quo factum est ut bene dein- de haberet: R. artemisia, melissa, flor. chamamel. añ. m. j. infundantur per noctem in lib. j. vini Rhenani, facta prius leni ebull. addendo cinnamomi & sacchari q. s. pro sapore, claretum fiebat. Altera luatione ad- didi aliquid pulegij, & belle deinde habuit. At filia Gerrudis, in coruo nigro Delphis, octodecim annorũ, cum motus epilepticos aliquando pateretur ex mēstruis suppressis, quamuis eidem nunquam fluxerant; aperta vena circa malleolum, & purgatione debite adhibita, alijsq; remedijs aptis, licet melius habere videretur, nondum tamen mēstrua purgationes procedebant. Quare consului ut ex hoc decocto quinque cochlea- ria omni vespere sumeret, etiam mane: R. sabina, car- dai benedicti, borag. buglossa, ruta, abrotani, absin- thij communis, añ. m. j. fiat decoctio in vino Rhenensi. Hoc remedio tandem menses aperti sunt, nec amplius passa motus epilepticos, probe conualuit. Utebatur verò quotidie hoc solo remedio ad tres menses vel quatuor. Verum cum saepe consillas inflammatas ha- beret, imperavi ne continuò, sed potius per interualla, hoc remedio supradicto satis calido vteretur; & ut idem apozema decoqueret non in vino, sed in cereui- sia communi. Quae deinde bona valetudine vsa, post aliquot annos nupta, nunc mater multarum prolium est. Verum his absolutis, nunc tempestinum erit ut ad
immo-

*immodicas vteri purgationes curandas accedamus,
ab Observatione, more solito, initium sumentes.*

OBSERVATIO X.

*De muliere ex longo mensium profluvio
laborante.*

CUM ex Italia reuersus, Parisiis aliquot mensibus medicinam facerem, antequam Pithueras accederem, mulier quædam quatuor mensibus in lecto detenta, continuo menstruo profluvio ad Pontem diui Michaëlis laborabat. Sicuti clinicus Medicus, qui curat medicamentis, dictus à lectis ægrotantium, quos frequenter frequentare solet, quasi lectularius: (sic filiam Clinici, id est, Medici Martialis appellat) Ita & Clinici dicuntur qui tantopere morbo affecti sunt, vt surgere è lecto non possint. Sic Petronella clinica apud diuum Petrum dicta, cum grabato decumberet, quem Græci κλινικον vocant. Hoc modo & hæc mulier ex lecto surgere non potuit. Ad hanc ab hospita mea, cuius affinis erat, deductus, præscripsi victus rationem conuenientem, quæ restauraret, & simul alia, quæ ad menses sistendos facerent. Turturem quoque accepi moderatè pinguem, ab intestinis & fecibus repurgatum, eum deplumatum lauari iussi in vino rubro constringente & aqua ros. Deinde vnciam vnâ mastiches in ventræ ponebam ac assuebam ne elabi posset; atque ita veru ad ignem rotabam, & inter assandum, loco
E butyri,

butyri, aceto rosaceo aspergebam, pinguedinemque ex eo defluentem colligebam, & vsui re-
 seruabam. Post perfectam assationem, turturem
 ab igne ac veru depositum, in ollam nouam vi-
 treatam coniiciebam, luto philosophico obthu-
 ratam, & in furnum calidum demittendo, vt
 turtur perfecte exiccari posset, vnà cum ossibus
 & carne in pollinem tenuissimum redigebam.
 Huius pulueris magno commodo dabam omni
 mane cochlear vnum, modò cum aqua planta-
 ginis, modò cum alio decocto constringente: &
 pinguedine reseruata inter rotandum extillata,
 imum ventrem, tum pectinem, inguina, & re-
 gionem renū quotidie vt inungerent, mandauī.
 Erat hoc vnū ex arcanis præceptoris mei Elidei,
 apud Bononienses practici clarissimi. Pulvere
 hoc eum vti vidi felicissimè in multis matronis
 nobilibus; omnem enim diarrhœam sanat, ven-
 tris diuturna profluvia, omnemque humiditatē
 consumit, album tum rubrum fluxum mensium
 restringit, sedat matricis dolorem. Venit & tunc
 mihi in mentem illius mulieris Romanæ, quæ
 in Nosocomio Mariæ consolationis longo tem-
 pore ex eodem malo decubuerat: nec sanari po-
 tuerat, donec tandem, consilio vetulæ, nouem vi-
 cibus 3 j. pul. ossium humanorum ex vino rubro
 assumpta, sanata est. Id medicamentū à Cornelio
 Roterodamo Medico habui, qui ante me Romæ
 huic Nosocomio, quod apud Capitolium situm,
 inseruierat. Post hunc enim ipse Romam veni, &
 eodē præceptore, nempe Gisberto Horstio, huius
 Nosocomij protomedico, familiariter vsus sum.

SCHO-

SCHOLIA.

NVNC de immodico fluxu menſtruorum dicturi ſumus. Proprius hic quoque vteri affectus eſt, ſicuti retentio, de qua paulo ante egimus: qua quidem affectiones, cauſa etiam multarum aliarum affectionum exiſtunt. Moderati ſunt menſes in omni muliere ſi ſana ſit, vt duarum heminarum Atticarum menſura (vt antea quoque diximus) ſecedant, aut paulo plures, vel pauciores, atque hoc ad duos aut tres dies, Hipp. auctore lib. De morbis muliebribus: longius autē tempus, vel breuius morboſum & ſterile eſt. Albi & molliſſimis mulieribus, quod multus tenuisq; ſanguis in eis colligatur, diutius permanent, (quod ad ætatem & dies attinet;) nigris verò, duris, ac gracilibus contrarium euenit, ex Gal. ſententia 6. De morb. vulg. Cùm itaque ſolito ſunt menſes plures ac copioſiores, tunc nimiam eorum purgationem appellamus, Græci *ὑπερμενῆς* ſeu *αἰμορρῶν* ὡς ἐπὶ αὐτῶν vocant. Profluunt verò immoderate menſes, modò quidem vno imperu plurimo ſanguine euacuato: nunc verò ſenſim profluente, ſed diutius quàm oportet, nec tempore menſtruo obſeruato. Vtrumq; enim fieri videtur. Sed & in partu modum aliquando purgatio excedit, qua ſecundum naturam fiebat. Tunc verò menſes immodicè profluere dicimus, quando ſanguis profluit. Si enim alij ſint humores à ſanguine, alias habent appellationes, vt vteri fluores: qui quidem etiam colorum diuerſitate euariant, vt modò albi ſint, modò virides, modò tenuem ſaniem ſeroſam referentes, nunc pituitam: de quibus poſtea. nūc de immoderato ſanguinis profluſio per vte-

Profluunt
menſium
duobus mo-
dis euenire
potelt.

Quid per
immodicā
mensium
purgatio-
nem intelli-
gendum sit.

Pars quæ
afficitur.

rum agimus. Id trifariam fieri volunt, vel collatione habita ad priores circuitus, ita ut sanguis copiosior, quàm consueverit, & per plures dies prodeat, vel à partu, vel etiam ab abortu, ad quos plurimus sanguis insequatur: quanquam in hoc veluti & in reliquis naturalibus excretionibus non quantitas duntaxat pro scopo proponenda est, vel qualitas, aut genus substantiæ, ut lib. De differ. sympt. cap. vlt. scriptum est: sed si tempestiuè, vel intempestiuè fiant, ad animalis commodum, vel incommodum. Quapropter tunc nimiam vel immodicam dicemus (ut & Donatus annotauit) propriè mensium purgationem, cum ea amplius non tempestiuè, neque ad animalis commodum fiat; sed potius intempestiuè, & noxa ac nocumentum ex ea mulieribus consequatur. Nam quandoque plus iusto purgabuntur absque earum læsione, propter longam desidiam, & victum liberaliorem. Tamen si ultra modum fluat in partu, abortu, vel sine his, collatione habita ad priores circuitus, ut diximus, etiam lædit. Et sic menses dicentur quoque redundantes, quando purgatio naturalem modum excedit, & euacuatur multus & optimus sanguis, vel post abortum, vel post partum naturalem, vel post vsum medicamentorum aperientium orificia venarum, & post pessaria acris & corroderia, & alias causas, (de quibus postea) quæ sanguinem mouere possunt. Ita & Fernelius: Immoderata autem, inquit, mensium purgatio ultra naturæ vitæq; modum est, quæ aut copiosior sanguis, quàm pro multitudine, aut diutius profluit, aut crebrior, aut non statò circuitu redit. Quòd verò in hac affectione vterus oblesus sit, nemini in dubium venit. Nam mittuntur in venas, quæ vterò committuntur menses, (ut

(ut prius de retentione mensium dictum est) tanquam ad omnium infirmissimas partes, qui eisdem mulieribus valentibus existētib, antequam concipiant, salubres fiunt purgationes. Qua de re si immodicē profluant, ipsum uterum affectum esse indicabunt, aut per se solum, vel simul cum toto corpore, vel aliquibus partibus eius. Affectus verò symptoma est in genere excretorum immodicē; non tamen toto genere præter naturam, veluti reliqua sanguinis profluvia. Nam præter eam quæ mulieribus per uterum erumpit, cetera sanguinis pluscula vacuationes toto genere præter naturam sunt: illa verò sola multitudine seu quantitate, ut liquet ex Gal. 3, De caus. sympt. Fernellius duas differentias constituit, immoderatam, vel crebriorem purgationem. illam ἀπεργον νέκρωσιν τῶν κατὰ μὲν τὸν; hanc ἀτακτὸν καὶ συχρὸν ἔργον καὶ ἀσπον. Alij aliam constituunt naturalem commodam & utilem, etiam si consuetæ purgatione sit maior, ob cibum & potum largiorem, sed quia non lædit, ideo neque restringendam: Aliam verò superfluam & ledentem. Atque hæc rursus in diuturna, aut recens; ante periodum veniens, vel diutius durans, vires deiciens; vel post evacuationes, sanguinis narium fluxum, aut hæmorrhoides, superæniens, magisq; debilitans; vel sine vlla harum ægritudinum præcedente. Alia quoque differentia ex parte sanguinis: qui vel purus, laudabilis, niger, feculentus, fuscus, albus, aut citrinus existit: & ex parte substantiæ crassus, viscosus, subtilis, liquidus, mediocris, aut coagulatus. Hæc sanè atque alia ad curationem prosunt, uti & causæ ipsæ. quæ licet varie esse possint, sunt tamen eiusdem generis cum sanguinis mictu & reliquis sanguinis profluviiis. Erit enim

Quis præter naturam affectus sit mensium profluvium.

Differentiæ.

Causæ.

Anastomo-
fis.

Anastomosis dicta, cum maiora vasa aperiuntur: vel Diapedesis, cum minora: vel Diuresis cum soluitur continuum. Ita & Galenus: Fluit sanguis e venis (inquit) ob earum corrosionem, vel propter osculorum apertionem, aut resudationem: diapedesin vocant. Anastomosis easdem habet causas, quas & per naturam habet: nempe expultricem vim pruritatis. At pruritatur molestia quanti, vel qualis. Sed in eo quod prater naturam, non solet sola quantitas urgere, vt Iacchinus quoque dicebat; at maxime qualitas, salsa, nitrosa, acris. Huiusmodi enim sanguinem vitiosum aliqua natura congregant, vt in lib. De atra bile Gal. scribit, & experientia monstratur, cum sanguis vena sectione extrahitur. Sic ergo gracilibus & biliosis mulieribus fieri aliquando istas fluxiones videmus. sic & in partu eueniunt. Quod si dicas, Si vitio vel quantitate irritatur natura; debuit igitur cum primum purgatum est vitium, aut imminuta quantitas, sponte sua cessare: quod si fieret, nihil haberet prater naturam, vel morbosum, sed utile: purgante scilicet natura excrementa vnde cacochymum corpus reddi posset; & tollente multitudinem vnde mala multa eueniunt: Cur est ergo vt superfluat? Respondet Iacchinus: Vt in superpurgatione vel superpurgantibus contingit, vt irritata natura non pellat modo excrementa propriorum humorum, quae a medicamento trahuntur; sed praeterea & utilia simul: sic & hic euenit, vt incipiat quidem expurgare inutile; sed ex pruritione quasi furibunda opere expellendi excedat. Sic igitur naturale opus symptoma euadit. Quod si Anastomosis a causa procatactica fiat, vt a medicamento venarum ora reserante, non veniet hic fluxus ad immoderationem

nem

nem talem . poterit tamen & hac causa addi , quasi
 profluvium præter naturam faciat , id est , extra tem-
 pus & ordinem naturæ , & medicamentis egebit aper-
 tionem corrigētibz . Diapedesis verò fit ex apertis mi-
 noribus vasis , unde resudare sanguis dicitur , id est , sen-
 sim stillare , non vt in anastomosi confertim . Accidit
 & incontinentia , unde facile eæ venæ onerantur , &
 repleti respuunt : sed sensim remittunt , nec continent .
 Accidit & ipsius sanguinis tenuitate , ob quam resudat
 ab venarum osculis . In diæresi , vel in solutione conti-
 nui , causa est prima protatarctica , vt venas disrum-
 pens , seu dilacerans , quod in partu difficili solet eue-
 nire . Fit & ex corporea causa excedente , vt ex vlcere ,
 & erosione vel arrosione . Arrosio venæ , fit nonnum-
 quam per pessaria acria , vel alia medicamenta causti-
 ca & acria , quæ vlcerationem aut excoarationem ex-
 citauerant : quod deprehendetur , si antea vsæ fuerint
 acerrimis medicamentis . Fit aliquando & arrosio à
 causa interna ; à bile quoque aut sanguine acri , aut
 pituita salsa . Erodantur denique à succo vitioso &
 mordaci , sanguine corrupto , aut aliis humoribus mi-
 sto . Rumpuntur sanguinis copia , aut onere aliquo le-
 uato , à foetu grandiore , partu difficili , aut abortu . Vasa
 vulnerantur imperita manu obstetricis , aut chirurgi
 foetum mortuum extrahentis . Contunduntur sepe
 percussione & casu . Referuntur hæc ipsa ad causas ex-
 ternas quoque aut internas . Externæ verò sunt , seu
 primitiue dictæ , vt percussio , casus , obuiatio rei duræ ,
 vulnus , cursus , saltus , chorea longa ac violenta . Ita
 Domine cuidam apud Valescum , ex pedestri itinere ,
 venæ ruptæ fuere , nec potuit restringi fluxus mēstruo-
 rum , vt inde mortua fuerit . Huc referuntur vsus diu-

Diapedesis,

Diæresis,

Arrosio,

Ruptio,

Causæ ex-
ternæ.

Causa interna.

turnior ciborum acrium, aromatatum, vini albi, & medicamentorum, ac omnium eorum quæ sanguinem tenuiorem gignunt. Causa interna seu antecedentes, vt locorum calor exuberans, sanguinis redundantia, facultas expultrix valens, retentrice imbecilla, vteri intemperies sanguinea, humores acres, subtiles, falsi, biliosi, sanguisq; subtilis, humorum abundantia, partus ineptus, multitudo aut fetus magnitudo, exitus inconueniens, vteri apostema, vlcus. Gordonius ad tres causas eas refert, ad virtutem, membra, humores. Vt virtus expulsiua fortis, contentiua debilis: membrum rarum, molle, laxum, latum, apertu: humores quantitate vel qualitate, calidus, subtilis, acutus, falsus, mordax, putridus, venenosus, aquosus, frigidus. Hæc & similia exemplis subsequenribus illustriora fient: cum causa varia varias curationes quoque postulent.

OBSERVATIO XI.

De superfluo mensium profluvio, cum insigni virtutis debilitate.

CORNELIA Iohannis, mulier si quæ altera pulcherrima, cum duobus mensibus integris continuò superflua mensium purgatione laborasset, admodum debilis euasit: ita vt ex virtutis debilitate hunc fluxu fieri coniectarem. Hæc erat prius rubicunda facie; nunc ob fluxum pallidi & mali erat coloris, hepate quoque debili existente; pigra erat, & parum aut nihil remittebatur fluxus: nam etsi ex debilitate contentiue virtutis guttatim quidẽ & paulatim inordinatẽ

ordinate flueret, tamen quod id incessanter fieret, macilenta plurimum euasit; verum inter exeundum ardorem nullum vel puncturam, aut dolorem, aut aliquam adustionem percipiebat. Hæc cum animaduertissem, & cum ad eam, annum 39. agentem, Alcmariæ in via Prætoria dicta, anno 1549. mense Octobri accessissem, quod ex virtute debili contentiua hunc fluxum pateretur, omnibus modis studui hunc fluxum constringere, præscribendo confectionem hanc in rotulis: ꝛ trochis. de carabe ꝑ ij. flor. ros. rub. exsiccat. balauft. seminis myrtill. plantag. sem. sanguinariæ nostræ vulgaris, añ. ꝑ. pul. marg. perforat. & non perfor. fragmentorum omnium lapidum preciosor. añ. grana iij. redigantur omnia in pollinem, & dissoluantur cum aqua menthæ, ros. q. s. adiecto sacchº, fiat confectio in rotulis ponderantibus ꝑ ij. Iis utebatur bis aut ter in die, supersorbendo cochlear vnum ex syr. infra scriptis: ꝛ syr. myrtini, cotoneorum, rob de ribes, añ. ꝑ. ij. syr. menthacei ꝑ j. misce. pectine, inguinibus & regione renum inunctis cum oleis mox sequentibus. Aliquo modo restringebatur fluxus. Verum cum aliquando quasi sanguis congelatus & trumbosus exiret, has tabulas denuo præscripsimus: ꝛ seminis agni casti, sem. coriandri præparati, añ. ꝑ. j. trochis. de carabe, cinnamomi optimi (ob sanguinem trumbosum) nucis moschata, añ. ꝑ. in pollinem redacta, & in decoct. aquæ plantag. & melissæ soluta q. s. adiecto saccharo fiat confectio in tabulis, vt artis est, qua ad libitum utebatur. Verum cum pro-

E 5 fluui-

fluuium magis vrgeret, hoc sequens conditum
 præscripsimus: & confer. ros. antiquæ ʒ iij. pul.
 ros. rub. carabes (dicitur enim sanguinem dissol-
 uere & constringere) trochis. de spodio cum sem.
 acetosæ, añ. ʒ j. cum syr. myrtino q. s. fiat condi-
 tum. Capiebat ad magnitudinem castaneæ ter
 quaterve, vel pluries in die. Si aluum non redde-
 ret, glande sola irritabamus, & hoc ceratum su-
 pra ventrem inferiorē apposuiamus: & vnguenti
 comitissæ ʒ β. vel ʒ j. mastiches, ros. rubrar. ex-
 sicc. acaciæ, balaust. coralli rub. cornu cerui vsti,
 añ. ʒ j. in puluerem redacta cum oleo ros. q. s. &
 cera, ac parum ladani, simul vniantur, & fiat ce-
 ratum secundum artem supra corium, seu alu-
 tam, vt vocant; & supra ventrem inferiorem,
 tum dorso, applicetur, iis prius inunctis cum
 vng. comitissæ. Fiat in duplici forma, vna pro
 ventre inferiore, altera pro dorso, ac renibus.
 Verum omnibus istis supradictis menses non
 sunt restricti; & quia plus æquo fluerent, & me-
 tus esset de syncope ac morte, id quod sequitur
 dedi vnica vice & vnico haustu cum vino rubro
 stiptico: & boli arm. veræ ʒ ij. trochis. de terra
 sigillata ʒ β. pul. carabes, lapid. hæmatitidis, fra-
 gmentorum omnium lapidum preciosor. añ.
 gran. iij. redigantur in pollinem: & cum sum-
 plisset, menstrua purgatio cessauit. At paucis
 diebus aluus restricta manebat; vnde etiam do-
 lor capitis aliquantulum cum vigilia eandem in-
 festabat. sed sumpto diapruno simplici in bolo
 ad ʒ vj. tantum, paucio saccharo adiecto, aluum
 bis deposuit. Fronti epithema admouit ex aquæ
 plan-

plantag. ʒ ij. aquæ flor. chamæmel. ros. añ. ʒ j. aceti parum & olei ros. deinde inunxit vnguento alabastrino; & pro vigiliis & siti cepit ex mixtura sequenti: & syr. viol. pap. añ. ʒ ij. syr. de succo acetosæ ʒ j. rob de ribes, & ex manu Christi perlata (vt vocant) pro virium roboratione. Ita hæc accidentia omnia cessarunt, & mensibus non amplius fluentibus, hæc, Dei optimo nutu, sanata est.

SCHOLIA.

NON solum causa diligenter sunt perscrutanda, sed & signa ipsa, antequam curationem rectè incipiamus. Ita exemplo præcedente ostendimus, cum fluxus hic esset sine dolore ex virtute contentrice imbecilla, vnde cum diu durasset hæc purgatio menstrua, statim illam restringere oportebat. Sed quod ad signa attinet, cum illa varia quoque sint, præfagientia imprimis perlustranda, quæ ad præuisionem & imminentem affectum quoque vitia sunt: atque hoc generale & proprium habent, quod causæ primitiua, seu procatactica dictæ, plures, vel saltem aliqua præcedant: ita mulieribus choreas ducentibus tempore mensium, prædicere poterimus superfluam purgationem subsequuturam. Sic iuueniculis imprægnatis vix 14. annum excedentibus, ex partu difficili, aut fœtu maiore, vel abortu, ruptis cotyledonibus, fluxus maior subsequi solet: & his quibus vrina nigrior apparet in multa quantitate, cum sedimine nigro, menses mox fluxuri sunt. Sic istis diebus in vxore cereuisiarij cum talis vrina appareret, & circa pectinem valde doleret, abortum
futurum

Signa præfagientia.

N.

futurum prædixi, & quod magnus fluxus consequeretur; uti euenit: quamuis hæc ipsa à nobis curata fuit.

Signa demonstratiua.

Quantum ad signa demonstratiua, licet hæc ex relatione mulieris cognoscantur; statim etiam laboranti, ex 1. lib. Cleopatra & Mosch. sequitur lassitudo corporis, & tenuitas, sædus pallidusq; color, & fastidium, & iuxta Syluium, pedum mollis tumor, virium corporis prostratio, coctio vitata, & ciborum cupiditas; atque in totum omnia quotquot immoderatam sanguinis euacuationem, siue ex hæmorrhoidæ, siue alio quopiam sanguinis fluore eueniente, sequi consueverunt; ut hydrops & conuulsio, qualia & Galenus ait feminas infestare accidentia. lib. 6. De loc. aff. cap. 5. & 2. De facult. natur. Alij addunt, adesse & dolorem pectinis, vel subsequi, anchorarum quoque, & grauedinem crurum & coxarum. Ut autem rite (quod præcipuum est) diuersa causa huius immodicæ excretionis inuestigetur, primum consideranda est erumpentis sanguinis multitudo, & delationis modus. Ex his namq; perdisces, num ex vasorum ruptura, reseratione, aut erosione fiat. Nam amplioribus vasis ruptis, aut apertis, magna sanguinis copia confertim profluit: minoribus verò, vice versa, ut inquit Aërius. Ita anastomosis copia exitus confertim facti: & eo magis, si in corpore affectus præcesserint, cacochymia soboles. Idem coniiciendum, si signa cacochymie sanguinis adsunt, vel morbus præcesserit, qui per crisin sic finiatur: quanquam de profluvio dictum est De feb. sapius. si enim critica illa purgatio fuerit, modò non sit superflua, ut ibidem sapius diximus, non est inutilis, nec constringenda. Ex his iam dictis scimus, si cum copia & confertim fertur, certò anastomosim esse.

Quæ animaduertenda sunt pro causarum cognitione.

Signa, si sit ex anastomosi.

11.

esse. In diapedesi verò sensim excernitur sine dolore, & sanguis tenuis ac dilutus est. At erosione factus fluxus dolorem habet adiunctum, virusq; & sanies una emittuntur. Fit hoc vel circa ceruicē, vel in ipsa vteri cavitāte. Iam quoque si ea quæ præcesserunt, consideres, nam ex ruptura, vel apertione vasorum sanguis profluat, promptè perdisces. Nam eis disruptis, aut vehemens frigus, aut vehemens motus, vel sanguinis abundantia præcessit; ut nunc diximus; aderitq; interim aliquis dolor. apertionem autem eorum non frigida, sed è contrario calidæ dispositiones præcedunt; veluti si multis, eisdemq; calidis balneis mulier usa fuerit, atque terram seu regionem inhabitet calidam, fueritq; antecedens tempus eiusmodi; similiter quoque alimenta, & potiones; nullusq; dolor aderit. Ab erosione si sanguinis profluvium prodeat, dignosces ex supradictis; quod non confertim quoque, sed modicus ac paulatim, & cum maximo dolore defertur, Aëtio quoque teste lib. 16. cap. 64. Quod si erosionis causa redundantes in toto corpore vitiosi succi fuerint, biliosi, inquam, aut pituitosi salsi; tum ex reliquis eorundem humorum propriis indicis, tum etiam ex colore eiusdem qui profluit sanguinis menstrui percipies, iuxta Hippoc. sententiam lib. De morbis muliebribus. Ita ex parte materiæ: nam si sit fluxus sanguineus, vel sanguis in toto corpore prædominetur, totius habitus erit carnosus, eritq; mulier rubicunda, nequaquam male colorata; nec ita debilitabitur; urina erit quoque rubra & crassa: præcessit otium, vita quieta, ususq; ciborum sanguinem multiplicantium. talis non est restringendus, nisi abundet. Si à putrefactione, sanguis fluens erit corruptus, mali coloris, foetidus, & subinde exiens

Si ex diapedesi.

Ab erosione

A disruptione vel apertione signa.

Signa erosionis quomodo cognoscuntur.

Signa ex materia desumpta.

exiens cum punctione & dolore. Ex sanguine bilioso maiorem ardorem, dum exit, sentiet mulier in labiis vuluæ, eritq; ea ipsa macilenta, citrina, & plurimum debilitatur; vrina verò est subtilis, citrina: vsus aromaticum præcessit, synapis, allij, piperis; cibi quoque ac medicamenta acris; labor quoque tum exercitia vehementia præcesserunt: in exitu sentitur caliditas, ardor; & velociter emanat, at in parua quantitate: sitibunda erit, & labia ob calorem quandoq. findentur. Si sit sanguis pituitosus, mulier quoque pituitosa erit, & humida habitudine, mollis, pallida, malè digerit, & venter humilitate superflua abundat, & omnia illa adsunt quæ pituitam notant & eam adaugent. Ex colore sanguinis, vt ex Hipp. paulo antè diximus, etiam notæ habentur. Sic panni linei intincti sanguine, & demum exiccati in vmbra, ex quo humore fiat, nobis declarant, etiam teste Rhase ac aliis Medicis. Albus pituitosus, citrinus biliosus, liuidus melancholicus, purus sanguineus. Ex parte membri: Si à ruptura venarum vteri, multus est & subito eueniens: ex profundo niger, quod quidem verum si à materia adusta: tunc enim denigratur: minus niger magis profundatur in matrice, idq; ob corrosionem; vbi corrosio diuturna, etiam foetet. At si arteria corrodat, subtilior est, & clarior, & calidior, exiens cum maiori impetu, & minore interuallo quàm ex venis. Fit autem magis trumbosus ob calorem, perueniens ad partes frigidiores. Si corrosio sit in collo, tactu percipitur sæpe. Si sit ex corrosione venarum vteri, paulatim cum dolore exit. Causa verò externa & primitiua facile habentur ex relatu ægri, si casus, saltus, & alia præcesserint. Interna verò, vt iam constat ex iis quæ diximus, diligentiori

Signa ex
parte co-
loris.

Ex parte
membri.

Causæ ex-
ternæ facili
cognoscun-
tur.

gentiori animaduersione egent. Si sit ex virtute forti, in toto repletionis signa aderunt, totiusq; corporis aggravatio: talis ferè criticus est. Si verò ex debilitate virtutis, ea aderunt quæ in Obser. precedente diximus. At qualis sit materia & humor ex prado-

Causa internæ difficilior cognoscuntur.

minio, diligentiore examine, tum ex colore, ut nunc paulo antè recensuimus, inuenietur. Siue autem in collo, siue in profundo vteri hareat malum, ex dolore etiam percipietur. Hæc omnia ad curationem faciunt. quod & exempla adhuc dicenda manifestabunt. Sed antequàm ad prognostica signa seriò veniamus, exemplum hic de muliere interseremus, quæ ex abortu purgatione nimia subito syncopem incurrens, non diu post mortua est.

OBSERVATIO XII.

De ingenti & lethali menstrua purgatione ex abortu.

QUOD ex abortu mulieres maximè periclitentur hoc nimio profluvio, in causa est, quòd abortus violenter separat chorion membranam à venarum osculis, & abrumpit. Itaque eadem causa, quæ violenter agit, etiam impetum facit in pellendo sanguinem: quia verò violenter separat, ora aperit vasorū, vnde sanguis cum tanto impetu fluit, ut statim vires dissoluat. Ita euenit mulieri in parte septentrionali prope ædem diui Georgij Delphis, cui ex abortu adeò subsequēbatur sanguinis menstrui purgatio, ut in syncopem incideret: à qua licet nostra industria euaserit; subsequente tamen febre, remediis, & ad fluxum aptis, nullo modo inhi-

80 DE MULIERVM MORBIS,
inhiberi aut sanari potuit, vt tandem, viribus
deficientibus, occubuerit. Aliae nihilominus non
paucae, simili malo laborantes, à nobis curatae
fuerunt.

SCHOLIA.

Signa pro-
gnostica.

TALES quidem ferè omnes cum difficultate cu-
rantur: quamuis multas etiam post abortum cu-
ratas vidimus. Ideo qualiscunque fuerit menstruae
purgationis immodica vacuatio, haudquaquam sper-
nenda est. Nam etiam si subito non moriantur, tamen
nonnullae, cum vteri nimio sanguinis profluuio labora-
runt, hydropem accersuerunt, vt antea quoque dixi-
mus, Galeno auctore 2. De natural. facult. Id quod
etiam timendum diximus in omni menstruae purga-
tionis cessatione, vt idem inquit, cum vtrumque ad
extremam frigiditatem mulierem ducat. Quae verò
mensuum profluvia grauiiores partus consequuntur,
haud ita periculum minantur; quinimmo etiam ple-
rumque sua sponte cessant, vt inquit Paulus cap. 62.
lib. 3. Ac si abortiui foetus causa fiant, repentinum ple-
rumque periculum inducunt, vt liquet tam ex Aëtio
quàm Paulo. Vti & in hac euenit. Verùm ex quacun-
que tandem causa fiat mensuum profluuium, vbi fue-
rit immodicum, animi deliquium minatur & synco-
pen, vt patet 1. De art. ad Glauc. quare etiam quam-
uis naturalem partum consequatur, mortem infert
nonnumquam, velut in reliquis accidit immoderatis
sanguinis profusionibus. Magna quoque cum difficul-
tate curatur, praesertim si ab vlcere, & si diuturnum
sit

sit profluvium: quamvis & nos tales aliquando etiam
 curatas vidimus. Sed & illud quoque advertendum,
 quod Hippocrates ait: Si pręgnanti fluunt menses,
 non posse fœtum sanum esse: hoc enim Galenus 6. De
 loc. aff. verificat: si multus effluat ex venis uteri. Solu-
 tiis enim acetabulis id fieri necesse est. Sed evenit ali-
 quando ex venis cervicis, idq; exiguum; unde nihil no-
 cet: quemadmodum contigit nobilissimę Matronę
 Schoonhouia vxori Domini Cornelij Zuzij Prasidis
 Hollandiæ. Interea tamen menses immoderati non so-
 lum dierum numero, vt si continenter fluant ultra
 dies quatuor, quinque, sex, septemve consuetos mu-
 lieri, sunt æstimandi; sed potius vacuati sanguinis
 quantitas tibi (inquit Syluius) obseruanda ex mulie-
 ris plenitudine, habitu, viribus, tolerantia, colore. Nam
 si talia & tanta euacuentur, qualia & quanta va-
 cuari oportet, confert, & leuiter ferunt mulieres: nec
 antè est cohibendus hic fluor, quàm vires collabi in-
 cipient, & color viuidus perdat, symptomataq; eius
 alia leuiora impendeant; grauiora enim ne expectes. Si
 namque menstrua (teste Hipp. aph. 58. lib. 5.) plura
 fiunt, accidunt morbi; scilicet appetantia prostrata,
 coctio omnis imbecilla, virium omnium deiectio, to-
 tius refrigeratio, decoloratio, emaciatio, ex morbo se-
 nium, sterilitas, pedum inflatio, hydrops, bilis feruor,
 febres biliosę, hecticę, cachexia, liporhymia, syncope,
 mors senibus repentina, iunioribus tandem superue-
 niens. Vide Rocheum. Mulieri quoque (iuxta Hip-
 poc. aph. 39. lib. 5.) menses desolores, per idem semper
 tempus venientes, purgationem indicant esse necessa-
 riam. Mensium fluor redundans iuuenibus molestissi-
 mus, senibus autem vt plurimum lethalis. Si longo
 F tempore

tempore durant, tandem aquas cutem subeuntes inducunt, & animam subinde agere cogunt. In fluxu enim muliebri si conuulsio & animi defectus adueniat, malum. Non confestim sanguinis impetum localibus remedijs reprimere conandum (hac etiam ad curationem faciunt): nam multa sequerentur incommoda, nempe hydrops, neruorum aut oris ventriculi, aut capitis, pathemata. Si per eclipsim solis aut luna fluant menses, sisti non possunt, vt visum Apuleio Platonico; neque si iam diu fluxerunt, quia vasorum ora occalluerunt: id quod saepe accidit propter mulierum verecundiã; maximè si cacochyma, aut potius cachectica fuerint, ac etiam vetula & excrementosa, nisi saepe purgentur, & victu euchymo succi malignitatẽ emendent. Fluor mensium criticus, aut corpus plethoricum expurgans, non sistendus, donec sit quantitate præter naturam. Si magis exuberat in fine veris & æstatis tempore, nempe in principio æstatis, ob sanguinem fit prædominantem: in fine æstatis & autumnii principio, ratione bilis: in fine autumnii & hyemis principio, ob melancholiã adustam: in fine hyemis & principio veris, ob pituitã. quamuis tamen quouis tempore euenire possunt. In corpore sanguineo, iuxta quosdam, non subito restringendus, ob plethoram: liberat enim egram à suffocatione vteri, lepra, phthisi, feb. putrida & apostematibus perniciosis. At mulieri sanguinem euomeni, iuxta Hippoc. mensibus erumpentibus, solutio: & post hemorrhoides in sana muliere euenientes, virtute constante, bonum. In die critico non perdurantes, vitiles, & in iis quæ synochum patiuntur aut feb. sanguineam putridam; vt in nostris Observationibus De feb. multis exemplis ostensum

sum est. Signa mala sunt si symptomata superius enumerata succedant. Nunc ad curationem ascedamus, prius hoc sequenti exemplo in medium producto.

OBSERVATIO XIII.

*De superflua menstrua purgatione
ex anastomosi.*

MVLIERI cuidam cum impetu sanguis menstruus copiosè & confertim emanabat, venis magnis apertis, ex anastomosi. Ad hanc cum venissemus, victum ei instituiamus, qui nihil commoueret, sed quietem faceret: & primum cum satis robusta esset, in ediam quantam ipsa ferre posset imperanimus; sed quia hæ non ita ieiunium ferre consuetæ sunt, iussimus, ut actu frigidum ac potestate esset quodsumeret, & ut cibus eligeretur quantitate moderatus, & qualitate astringens, bonique succi, similisque potus. Sic enim Aëtius circa initia micæ panis ex posca exhibebat, ubi præsertim ieiunium tollerare nequirent; aut oryzam ex posca, aut ouum sorbile, molle, frigidum; in quem usum etiam similagine, amylo cum posca ut vteretur concessimus, atque omnia actu frigida & potestate frigida enim densant & immobile faciunt. Ut à vino omnino abstineret præcepi: Nam, ut Paulus admonet, vinum omnino pro potu vitandum est. Sed aqua pluuiali secundum eundem utendum, in qua etiam ignitum ferrum fuerit extinctum; aut aqua in qua oxalidis, polygoni, seu plantaginis folia fuerint decocta, aut myrti fructus, seu cydonia: ipsa item posca pro potu

84 DE MVLIERV M MORBIS,
vti conuenit, non quidem frigida, sed tepida, vt
Aëtio visum est. Ego iuleb rosatum cum aqua
pluuia commodè admisi: & pro cibo etiam po-
stea carnes siluestres potius, quàm domesticas;
quibus, vbi opus esset, magis assis vteretur, quàm
elixis; vt phasianorum, sternarum, perdicum,
merularum, turdorum, aliarumque paruarum
auium montanarum; è quadrupedum genere,
leporum, cuniculorum, seu capreolorum, si re-
perirentur. Cùm eisdem assis vteretur, in earum
iure polygoni, plantaginis, aut oxalidis folia de-
coqueret, aut etiam fructus astringentes, vt
myrti, seu cydonia. Præterea imperaui vt aërem
eligeret temperatum, aut parum ad siccum fri-
gidumque vergentem; & vt somno temperato
vteretur, vel etiam longiore; cùm omnibus mo-
dis prouocandus sit, si quæ minus dormire pos-
set. Præterea consulimus, vt omnibus modis
caueret à motu, atque exercitio, & vt animi af-
fectus immodicos vitaret, præsertim iram; &
quietem amplecteretur. Nam si motus vitandus,
ne humorum impetus augeatur, quanto magis
dolor, qui valde humores commouet in eas par-
tes, quæ laborant? Quod ad reliqua præsidia at-
tinet, cùm adhuc satis valida foret, statim ex
vena basilica dextri brachij vt sanguis euacuare-
tur, nobis vtile visum fuit. altero die sequenti
eadem quoque fuit sectio iterata, at paucos ta-
men sanguine extracto. de qua venæ sectione in
Scholio latius. Pro purgatione exhibui quod se-
quitur: ꝛ myrob. citrinarum ꝓ ij. infunde per
noctem, facta leui ebullitione in aqua plantag.
manè

manè vbi tepuerit, manibus confricetur, & sumantur huius express. ℥ iij. adde rhab. optimi parum tosti ℥ j. pulpæ tamarind. diaprunis lenitiui, añ. ℥ ij. syr. de ribes ℥ β. misce. Bene excreuit, quia facilis solutionis erat. Altero die dedi syr. sequentem: & syr. de ribes, syr. granat. syr. cotton. añ. ℥ j. aquæ acetosæ, plantag. bursæ pastoris, añ. ℥ ij. misce pro ij. dosibus. Præterea ad auersionem, cum adhuc cum impetu flueret, & magis debilitaretur, adhibuimus frictiones partium superiorum, & brachiis vincula rectè iniicimus. Paulatim venimus ad astringentia, & dedimus terræ lemnia veræ ℥ j. cum decocti plantag. & polygoni ℥ iij. Egregiè iuuabat. Quicquid enim citra mordacitatem resiccat, & glutinosum quid habet, veluti est terra lemnia, sphragis appellata, & samius aster (Gal. auctore 7. De compos. medic. secundum locos) quæ veluti ad sanguinis spuitiones vndecunque natas conferunt, eadem vi sanguinis ex vtero profluuia, & vocatum fluxum muliebrem iuuant; vt liquet ex eodem auctore 9. De simpl. medic. facult. Postea adhibui ℥ j. trochis. de carabe cum ℥ iij. aquæ plantag. & syr. myrtini; lumbos ac ventrè inferiorem, pectinem, inguina, & dorsum inungendo cum vng. comitissæ, adiecto pauco vng. ros. sine opio. Et cum videretur postea paulo debilior, concessi vinum rubrum stipticum cum aqua plantaginis destillata in balneo, & non in plumbo. Atque ita cum menses vltra tres ferè septimanas fluxissent, commodè hæc curata fuit; vtens subinde & condito concinnato

86 DE MULIERVM MORBIS,
ex conf. ros. antiqua, diacotoneo, pul. trochis.
de carabe & spodio, cum semine acetosæ, ad-
iecto etiam syr. myrtino.

SCHOLIA.

HÆC curatio pertinebat ad anastomosim; in qua,
sicuti & in aliis menstruis superfluis curandis,
semper causa ipsa consideranda est, num hic fluxus
statim sit reprimendus, nec ne: nam is qui criticus est,
corpusq; plethoricum expurgat, non est sistendus,
nisi vires planè deiciantur, nec mulier ultra tolerare
possit: tunc enim sicuti omnis fluxus superfluus (vt &
paulo antè meminimus) restringendus est. Neq; is con-
stringendus statim, qui ex repletione abundante, &
sanguine in toto existente, nisi metuatur virium de-
rectio, & sensibilis debilitas: & qui venit per viam
mundificationis, vt vocant, ob repletionem nimiam,
cum bona tolerantia, constringi non debet. Aliquando
enim causam respicimus, quæ prius abscindenda est.
Et ita si fiat ex repletionem vel abundantia sanguinis,
eandem venæ sectione & tenui victu remouemus; in-
hibendo vinum, ova, carnes, & similia quæcunque
sanguinem augent. Alias respicimus fluxum, vt eun-
dem, vbi vires deicit, & reprimamus, & constringa-
mus. etiam ad symptomata quæ obruere possunt, vt est
syncope, tum alia quæ fluxum excedentem sequi so-
lent. In anastomosi itaque, cuius nunc exemplum pro-
tulimus, vbi reliqua non prohibuerint, venæ sectio, re-
mulsionis gratia in cubito facta confert, præsertim in-
ferne; exiguaq; sanguinis quantitas auferatur, & si
opus sit reiteretur. Aversio enim impetum humorum
retardat, & fluxuros in aliam partem conuertit. Sed
dices,

dicēs, De vena sectione non meminerunt nec Paulus nec Aërius. At in lib. De vena sectione, vitur ea Gal. sed in varium profluio. At eadem est ratio, inquit Iacchinus doctissimus: consulit autem ibi, ut non expectetur usque quo vires multum debilitata sint; sed dum adhuc perstant, & impetus profluentis sanguinis adhuc persistit. Quamobrem venam secare opus erit superiorē, sicut ad hemorrhoidas plus iusto fluentes Gal. facit in libro De vena sectione. Sic Benedictus Fauentinus, præceptor meus, etiam in vena perrupta, in principio secat venam basilicam lateris dextri. alij parum, & secundo die iterum exiguum, ut nos fecimus. Præceptor in sua Empirica tribus continuis diebus, sed parum mitti vult. Sicut nos in quodam Consiliario sanguinem expuente, vnā cum Nieuenio Medico Hagano, & Cornelio Ericio, meo collega, egimus. Verum licet Aërius non faciat mentionem lib. 16. cap. 66. attamen cap. 68. illius meminir. Mulierem (inquit) rubro fluore vexatam curaturi, primò ad sanguinis missionem vertemur, quæ non tantum materia ad vterū confluenti aduersatur, sed detentionem, constrictionemq; tutam efficit: nam multa sequerentur incommoda, si repenti sanguinis vel cuiusq; defluxus impetum localibus præsidis reprimeremus; ita ut quidam inde in hydropem, alij in neruorū morbos, aut oris ventriculi, vel capitis improbos affectus inciderint. Igitur si nihil obliterit, id est, si quæ obstant non valde fuerint insignia, sanguis mittendus est; præcipue si ætas vena sectionem non prohibeat. Sed paulo suprà docuimus iuniores serè rubro fluore vexari: ablationem verò sicut in iu, qui sanguinem excreant, partiri oportebit, ut paulatim prolixiore tempore re-

uulsio perseveret: dilataq; vena cubiti sectione, à fronte, vel à naribus, vel à scapulis sanguinem trahemus. Hæc Aëtius. Idem præceptor meus Benedictus Victorius quod vena narium incisa menses retrahunt & diuertunt, dicebat. Iam quoque auertuntur, si supernas partes ligemus; quas & fricare non inconuenit. nam, ut habetur 5. Methodi, frictio contra opposita partis, iuuat. quamobrem etiam consulit Hippoc. ad retentionem, sub mammis cucurbitulam affigere. 5. aph. 50. Sunt enim pectori ad genitalia vena communes. Habent nimirum magnam colligantiam cum utero, per q; eas demandantur menses in mamillas prægnantium, ut conuertantur in lac, & per ventosas iisdem applicatas ab utero fit diuersio. Verum oportet sint magnæ, & diu debent adfixæ esse cum multo igne, ut vehementior fiat attractio: nam, ut referebat Auicenna, retinent sanguinem in hora vna. Ponuntur autem ad radices mamillarum, vel in pectore, eleuatis mamillis. Hinc & Gradus: Mamillis appone, vel sub iisdem, eas eleuando antequam apponantur ventosæ. Alij scapulis vel spatulis apponunt; nonnulli & hepatis ac lieni: sed non diu retinenda, ne phlegmonem pariant. Quod verò suadet Paulus inguina vinciri, id est, crura ea parte (ut interpretatur Iacchinus,) quem in omnibus sectatur Aëtius, dubium habet; nam hoc menses euocat. Sed potius vincula superius artubus iniicienda, donec dolorem cieant, idq; saepe renouando. Inguina igitur vinciritutum non esse arbitratur, cum est magnus impetus; sed in diapedesi, vbi sensim fluat, & longo tempore, non ita inconuenire putat. Attamen præceptor meus iubebat sanguinem deriuare ad partem vteri propinquam;

Vincula;
ligaturæ;
frictiones.

Cucurbitula
sub
mammis.

Ventosæ.

Vtrum vin-
cula ingui-
nibus ini-
cienda.

quans; nempe hamorrhoides prouocando appositus sanguisugis: hoc enim menstruam purgationem restringere affirmabat. Ita & hic alij laudant vomitum, sed leuem, in paratis & facile vomentibus, ad diuersionem quoque: sed talis adhibendus, iuxta eosdem, qui violentia sua humores non commoueat. At fluxus sanguinis narium si irritetur, vel sponte veniat, utilis habetur. Auicenna commendat vrinae quoque & sudoris prouocationem in tenui & aquoso sanguine. Id tamen alijs non placet, etiam materia licet immunita; cum subtiliando humores magis moueant. Secta itaque vena, etiam alijs auersionibus adhibitis, prout res postulabit, utilis est. Deinde verò etiam si ob vasorum apertionem sanguis profluat, per ea quae obturant, curare oportet: quemadmodum si ex eorum vasorum ruptura contingat, quae conglutinant adhibenda sunt. Atqui obturatur osculum dilatatum per astringentia: conglutinatur autem ruptum per eadem, & quaecunque ipsis (vt dictum quoque est prius) in compositione miscentur citra mordacitatem resiccantia, & glutinosum quoddam habentia, vt de terra lemnia diximus. Inter medicamenta sistentia Rhases vititur trochis. de carabe. Fiunt & hi sine opio. *N* aliqui vtuntur cum opio: nam somnus maximè has excretionem sistit; quoniam pruritatem & molestiam omnem tollit, & velut immobilitat: quare in magno metu illi vtuntur cum decocto astringente. Ante hæc verò medicamenta in potu etiam illa exhiberi possunt, quæ in mictu sanguinis sunt dicta, id est, plantag. & polygoni succus. Reliqua omnis curatio partem affectam respicit. Sed primò Paulus & Aëtius in potu dant balaustium ex posca, aut hypocisthidis

Hamorrhoidum prouocatio quomodo iuuat.

Alia auertentia num conueniant.

Medicamenta quæ adhibenda & sistentia & conglutinantia.

Quæ in potu præbenda sunt.

vel acaciae succum, siue lycium, vel etiam vuae acerbæ
 succum siccum. Sesamum quoque posca maceratum
 & mollesactum edendum præbent; aut loti ramenta,
 & eorundem decoctum, & corallorum ꝓ. (vt Aë-
 tius refert) & succum polygoni, aut plantaginis, etiam
 ex posca, & ꝓ. cornu cerui vsti, vel tantundem co-
 rall. rab. lapidusq; hamatitidis ꝓ. cum posca. vel
 ꝓ. vel ꝓ. radice symphyti cum eadem posca, quæ
 semper tepida exhibenda. & vbi hac non suffecerint,
 ꝓ. trochis. de spodio, aut de succino vel carabe, vel è
 terra lemnia cum posca. Curatio partem affectam
 respiciens topicis medicamentis perficitur: primum
 medicamentis sistentibus lumbis appositis & pubi;
 cuiusmodi est quod ex cytini, ex galla, hypocisthide,
 ex colla, quæ ex pelle bouis posca dissoluta: secundo in-
 sersionibus, quas etiam in dysenteria diximus confer-
 re, quibus & in hoc casu multa utilitate vtimur ex
 foliorum myrti, ros. plantag. polygoni, symphyti, vir-
 gultorum rabi, ac lentisci, decocto: etiam prius in-
 guinibus, & pectine, & regione renum, inunctis
 vnguento comitisse, aut alio adstringente. Viuntur
 & pessus ex astringentibus confectis, vt ex punici pu-
 ramine, & galli, & thure, liquore stiptico exceptis.
 Etiam succos supradictos clystere infundunt, sicut
 Galenus docuit s. Methodi, & se liberasse casum dif-
 ficilem ea ratione dicit. Interea antequam illa adhi-
 beantur, causa ratio adhibenda est, etiam si malum
 pausat, ne paulo post reuertatur. Et sic vbi cacochy-
 mia causa est, ea ipsa erit prius tollenda; si sero acris,
 vel salso, plenus sit sanguis, vnde tenuis & acris ap-
 pareat in corpore abundare, tum medicamentis bilem
 ducentibus vtendum erit, quæ etiam aqueos humo-
 res

terra lem.
 troch. cavale.
 aqu. plant.
 lt 1^o ly.

Topica.

Causa con-
 sideranda
 antequam
 topica ad-
 hibeantur,
 vel etiam
 menses con-
 stringantur.

res purgent; ut est elect. de psyllio cum turbitib; tamen cum cautione; vel rhab. & agaricum, vel myrobalani genera contrita, & infusa. si exusta sanies, confect. hamech cum myrobal. indus & fumaria, victu q ratio adhibenda, quæ dulces succos efficiat & temperet: quod etiam portionibus medicis fiat, ut decocto cichorij, lupul. acetosa, tum aliis, ut subsequencia exempla docebunt. Hæc de anastomosi.

OBSERVATIO XIII.

*De mensurais superflue fluentibus ex
apertione vasorum.*

VXORIMEA Euæ Teylingiæ, mihi admodum charæ, ex nobilissima & antiquissima familia Teylingiorum ortæ, ora vasorum vteri aperta fuere, anno 1553. mense Septembris, cum sese in horto, amicis colludentibus & inuicem aqua aspergentibus, nonnihil fatigasset. Cum impetu quoque mensibus apertis, subsequuta est fluxio, non tamen adeo vehemens, ut mulieri de qua mox diximus Observatione præcedenti. tamen ipsa fluxio tribus mensibus perduravit, antequam magna nostra diligentia sisteretur. & conualuit istis præsidiiis subsequentibus, victuq. conuenienti. Venam in valde meticulosa non secumimus; cum & sanguis biliosus esset, & postea etiâ cum minori impetu fluens: in fine nigrior effluebat, & quasi trumbosus: nam hæc subinde tristis melancholiâ aliquam ex longo fluxu perdurante cōtrahebat. Primò exhibuimus hūc syr. & syr. ros. ex ros. sicc. myrtini, añ. ʒj. aquæ lupul. plātag. acetosa, añ ʒij. misce, fiat iuleb

iuleb pro ij. dosibus. Purgauimus autem leuiter cum infuso rhabarb. myrobal. citrinar. cum decocto folior. acetosæ, lupul. plantag. Deinde ut ex sequenti condito vteretur mandauimus: & conseruæ ros. antiquæ ꝑ ij. diacydonii, sine speciebus ꝑ ß. myrobal. citrinarum parum tostorum & puluerisatarum, & indarum, añ. 3 j. addendo rob de ribes, syr. menthacei, añ. q. s. fiat conditum. Capiebat ad magnitudinem castaneæ. Reines autē inunximus hoc vng. vel simili: & vng. ros. olei myrtini, cotoneor. añ 3 j. succi plantag. ꝑ ij. coquantur ad consumptionem succorum; adde coralli rubei, semin. plantag. myrtill. añ. 3 j. hypocisthid. boli arm. añ 3 ij. ceræ q. s. fiat vng. quo inungebatur, adiecto aceto ros. subinde etiam adiecto vng. comitissæ. Cū autem quotidie debilior euaderet, etiam hoc clareto vtebatur: & flor. ros. rubear. p. ij. santali rubri pul^{ti} 3 ij. spec. arom. ros. sine moscho (nam debilem stomachum habebat) spec. diarod. abb. añ. 3 ß. cinnamomi electi 3 iiij. ß. (ut etiam trombi aliquo modo dissoluerentur) cum aqua plantaginis fiat claretum ad circiter lib. 1. ß. adiecto pauco saccharo ad saporem. Postea idem claretum ad libram vnā cum vino rubro stiptico conficiebatur, tribus tantū drachmis cinnamomi adiectis. eo delectabatur. Interea etiam sumebat subinde ex mixtura sequenti: & conseruæ ros. antiquæ ꝑ ij. boli armenæ veræ, mastiches, eboris, sanguinis draconis, omnium subtilissimè puluerisatorum, añ. 3 j. trochis. de spodio cum semine acetosæ, trochis. de carabe, puluerisa-

aerisatorum, añ. 3ß. fragmentorum lapidum
 preciosorum omnium in pollinem redact. 3 ij.
 cum syr. menthaceo & myrtino fiat conditum.
 fuitque hoc conditum adhuc semel reiteratum.
 Et cum nondum fluxus constringeretur, istis pi-
 lulis assumptis tandem menses restricti sunt: &
 mastiches, trochis. de carabe, añ. 3ß. trochis. de
 spodio cum sem. acetosæ 3 ij. scobis eboris, my-
 robal indarum pul^{tarum}, añ. gran. vj. coralli rub.
 flor. ros. rub. añ. gran. v. in pollinem redigantur,
 & cum syr. menthaceo fiant pilulæ ix. Sub
 noctem tres capiebat; & his præsidiiis bellè cu-
 rata fuit.

S C H O L I A.

Hic quoque oscula vasorum vteri aperta erant
 per anastomosim, quamvis non tanto impetu ut
 ut in alia muliere, de qua Obs. 13. diximus. In princi-
 pio licet venam non secuimus, eo quod vxor mea me-
 ticulosa esset: vinculis tamen statim ab initio brachiis
 injectis cum frictionibus vti fuimus. & post infusum
 rhabar. & myrobalan. ad astringentia deuenimus, quæ
 & sanguinem incrassarent; & eiusdem acrimoniam
 obtunderent. Talia etiam intus exhibita prosunt; ut
 album oui fortiter agitaturn, & calfactum, & per se
 tantum assumptum, vel cum puluere gummi tragac.
 aut arabici. mucilago cotoneor. dissoluta in aqua pe-
 culi ros. vel plantag. Valer & syr. de pap. iuiubinus,
 & de ros. siccis. Hæc enim sanguinis acrimoniam ex-
 tingunt, & fluxum retinent à quacunque causa. Su-
 pra partem emplastica frigida cum astringentibus po-
 sita iuuant; ut bolus arm. rubrica fabrilis, terra sigil-
 lata,

N.

Topica.

lata, ac albumine oui excipiuntur & apponuntur. Vel succi herbarum astringentium & refrigerantium excepti farina tritici, vel amylo, inspissatiq³, & parti appositi, fluxum sanguinis retinent: quibus si adiungantur astringentia, fortius repellunt, & sanguinis impetum sistunt. Hæc si non prosunt, Rondeletius sterco porcino caput reductum ad formam cataplasmatidis, addendo pul. ros. ut fætor minuatur. Præter vnguenta, è quibus exemplum posuimus Obs. præcedente, etiam extrinsecus loca vteri perfunduntur seu fouentur tepida posca, aut oleo rosaceo, melino, seu myrteo, pauco vino admixto. Item prosunt cataplasmata ex hordei fabarumq³ farina, symphyti radice, polygoni, ac plantaginis foliis, acacia, alumine, & hypocisthide ex posca composita: aut ex palmulis, malis cydoniis, malicorio, balaustris, alumine, gallis, acacia, & hypocisthide, teneris rubi seu lentisci virgultis, cum eadem posca cataplasma fiat. Vel ceratum ex vng. commitissa, pauco adiecto aceto. Efficaciter quoque prodest taurocollis aceto macerata, donec dissoluatur, deinde valido linteolo inducta lumbis, agglutinetur, ex decreto Pauli & Aëtij. Huc pertinent infessus, de quibus diximus Scholio præcedente, & pessuli: nam pessulorum vsus haudquaquam cōtemnendus est, qui ex foliis plantaginis, seu polygoni succo, aut myrtillorum symphytiq³ rad. contusis pauca addita manna, thure, hypocisthide, ac balaustris, cum eiusdem plantaginis, seu polygoni succo conficiuntur. interim gallarum puluis, ac aluminis scissi, nec non acacia succus cum ouorum rostorum luteis adiungi poterunt; & quandoque cupressi folia, aut rubi, pariterq³ & cytini. Cū verò vsus exigat (ut et tiam Donatus admonet) linteo serico, aut li-

nes

Forus.

Cataplas-
mata.

Pessuli.

neo tenui excipiantur, & ad formam humani digiti
 redacti in rosaceum intingantur ac subdantur. Infun-
 duntur quoq. (vt paulo ante diximus) per instrumen-
 ta ad hunc vsum parata in vterum, quæ Mutæ, χύ-
 ras Græci vocant, plantaginis, polygoni, seu solani succi.
 similiter acacia, vel hypocisthidos; vel decoctū in aqua
 pluuiali malicorij, gallarum, balauſtiorū, hypocisthidis,
 ac foliorū lentisci, cum polygoni seu plantag. succo, aut
 etiam acacia. Sic Galenus ex vtero sanguinis profluuiū,
 quaternis iam diebus profluens, cum nullo alio potuisse
 sisti remedio, plantaginis succo vtens prorsus sanauit.

Quæ per in-
 strumenta
 infunduntur

OBSERVATIO XV.

De purgatione mēstrua ultra 9. menses perdu-
 rante ac lethali ex reſeratione vaſorū vteri.

VXOR doctissimi illius viri Magistri Adria-
 ni Leonini, Pensionarij Delphenſis, incidit
 in mensium profluuium ex reſeratione vaſorum
 vteri, eo tempore cum maritus hectica febre la-
 boraret, à qua etiam mortuus est, cuius mentio-
 nem fecimus lib. 4. Obser. noſtrarum De febre
 hectica. Nam ipsa sæpe noctu surgens, fatigata
 stillatim mensibus fluentibus, in continuo serui-
 tio mariti ægrotantis, mulier admodum curioſa,
 satisq. bilioſa, & viro admodum obsequioſa, flu-
 xum hunc parui faciebat. Admonita inſuper sæ-
 pius per Henricum Vergerium, Medicum do-
 ctissimum, vt remedia apta adhiberentur, & vi-
 ctu conſtringente vteretur, ſuæ ſanitatis negli-
 gens; per me quoque poſtea admonita, nulla
 adhibuit medicamenta: tandem poſt mul-
 tos menses hoc profluuiio laborans extremè
 debi-

96 DE MVLIERV M MORBIS,
 debilitata, marcere quasi confecta, etiam in he-
 cticam incidit. tunc demum acciuit Cornelium
 Medicū seniore quendam Delphensem, cū
 eodem tempore ipse ægrotarem. Hic senex apud
 templum nouum habitabat, & huic nobilissimæ
 matronæ commendatus erat, quod felicissimè
 mēstrua fluentia curaret, & bellè cohibere sciret.
 Verū cū hic nihil proficeret, eius pertæsa
 tonsorem quendam Haganum seniore ad se
 vocat, qui eidem pollicebatur quadam quinta
 essentia, se illam perfectè sanaturum. At aliter
 euenit: nam hecticæ feбри mox & putrida ac acu-
 ta febris accessit, simulque aphthæ obortæ sunt
 fauces quasi præoccludentes, vt iam suffocari
 videretur. Accitus tunc est Cornelius Ericius col-
 lega meus, cū iam vltra nouem vel plures
 menses hoc fædo affectu ad extremam maciem
 euasisset. Postea cū ego à morbo cōualuissem,
 vnā fui vocatus; atque vnā ingressi inuenimus
 illam extremè debilitatam, vt nulla spes salutis
 superesset, neque vlla restaurantia, aut medica-
 menta commoda illam iuuarent. Atque ita ab
 hectica, tum fluxu illo menstruo exstillante, pla-
 nè consumpta, & quasi cadauerosa, etiam ante
 maritum proba admodum matrona & pia obiit.

SCHOLIA.

HÆC erat diapedesis, quia sensim stillabat san-
 guis, vasis minoribus apertis. Quamuis autem
 prima fronte non ita hac superflua purgatio menstrua
 videbatur periculosa, tamen cū nulla remedia adhi-
 berentur,

berentur, in muliere biliosa cōtinuò per multos menses stillante, ob tenuitatem sanguinis, vires sunt deiecta. deinde in hecticam incidit: & quòd eiusmodi calidis vteretur, nec victum obseruaret, tandem & quintam essentiam illam calidissimam sumeret, putrida febris, eaq³ satis acuta hectica superuenit, ac non diu post ipsa è vita discessit. Si enim hac in principio remedia adhibuisset, procul dubio (nec enim erat anastomosis, in qua cum impetu sanguis fluit copiosus; neque sanè tam diu sustinuisset illum fluxum) facile sanitatem consequuta fuisset; cum à diapedesi subitus timor non sit, & ideo leuiora remedia exigat. Et quia hac erat biliosa, & sic etiam ex vitio sanguinis biliosi tenuis affecta; si corpus prius leui purgatione fuisset euacuatum, mox astringentibus malum facilius cessasset, additis etiam iis quæ acrimoniam sanguinis obtundunt, incrassant, & constringunt: qualia Scholio precedente valere diximus. Sic enim humores illi biliosi erant contemperandi & purgandi leniter rhab. & myrobal. vel tamarindis, & aliis; prius quoque sanguinis fluxionem inhibendo, si paulo magis fluat. Si verò sanguis per diapedesim fluat, ob eius tenuitatem, & seri copiam; oportet (inquit Rondeletius) iisdem medicamentis euacuare, quibus si ob bilem euenerit; quibusdam additis aquas vacuantibus, vt brassica marina, sena orientali, decocto fumariæ, succo ros. & aliis purgantibus sine magna calfactione. Victus ratio incrassans & inspissans hic quoque iuuat, & vtendum pedibus animalium, alica, vel amylo, iusculis coctis: omnia, quæ ex farina non fermentata parantur, sunt in hoc casu ex usu. Medicamenta etiam hic conferunt astringentia superius dicta, tum topica ipsa

Curatio
diapedesis;

Si ob tenuem
sanguinem,
curatio.

Ob venarū
raritatem si
fiat, curatio.

ipsa. Ita quoque si ob venarum raritatem fiat, tunc
astringentia & condensantia conuenient, qualia sunt,
quæ ex aquis myrtill. peculiros. parantur, & aliis astringen-
gentibus, vt bolo arm. terra lemnia, vt diximus, & ad.
bistoria, spongia bedeg. & similibus. Infusiones faci-
mus, cum vena intus latitat. Si commodè remedia
possent extrâ adhiberi, pulueres inspissati albumine,
supra partem affectam ponantur. Eadem etiam curât
anastomosim: tum iis quæ ad anastomosim recensui-
mus, etiam hic vti possumus. Puluis ossis sepiæ cum
vino datus fluxum sanguinis retinet. Item carabe, tro-
chisci eorum, de spod. sang. draconis appositus aut as-
sumptus sanguinem erumpentem à quacunque parte
retinet. Conser. ros. symphyti, cydon. caro, & aliorū
fructuum astringentium conditorum ad id vsurpan-
tur. Fiuntq; ex his opiata vel condita. vt hoc modo: R.
conseruæ ros. antiq. ℥ss. conser. symphyti ℥j. trochis. de
carabe, aut terra sigill. ℥j. boli arm. ℥ij. sang. drac. ℥ss.
syr. de ros. siccis vel myrtill. q. s. fiat opiata. Vel R. sym-
phyti, & carnis cydon. condit. saccharo, añ. ℥j. conser.
ros. antiqua ℥ss. pul. ossis sepiæ ℥ij. trochis. de spod.
& de terra sigill. añ. ℥j. pul. diamar. frig. & diapap.
añ. ℥j. syr. cydon. q. s. fiat opiata. Capiat ad quanti-
tatem auellanae, superbibendo aquam bursa pastoris.
Si his non addantur syrapi, sed ex conser. & saccha-
ro parentur, tunc condita esse volunt, vt Rondeletius.

OBSERVATIO XVI.

De mensium proflauio venis uteri per-
ruptis ex graui pondere subleuato.

MULIERI ex graui pondere subleuato, ve-
nis uteri perruptis, menses largiter fluxe-
runt;

runt; ad quam accitus, cum ingentem dolorem in lumbis haberet, & nunc tribus quatuorve diebus durasset, ut vena basilica in brachio tunderetur, nempe dextro, iussi: (nam in dextra quoque parte uteri dolorem tum in lumbis sentiebat) ad vncias quatuor. Deinde imperavi ut dorsum ac pubem inungeret oleo myrrino, pulvere quoque myrti & ros. rub. insperso. Deinde hunc pulvisculum quoque propinaui: ℞ rhab. pulv. ʒ ij. ꝑ. mummiæ ʒ ꝑ. & exhibui cum ʒ ij. ꝑ. aquæ plantaginis. Deinde aliis constringentibus & glutinantibus per os assumptis, & intra uterum injectis per obstericem, curata fuit. Quod si non iuvisset, adhibuissem illud experimentum quo matrona quædam à Guainerio fuit curata, quæ ob elevationem grauis oneris diu talem fluxum patiebatur. Dabat enim ʒ j. tribus vicibus stomacho vacuo ac ieiuno cineris stercoreis caprarum cum aqua pluuiali, & fuit curata, etiam vetula quinquaginta annorum, atque sanata permansit. Alteram etiam curauit asinino stercore, quod à proprietate sanguinem stringere scribit. Succum ex eo recens excreto exprimebat, & dabat cum syr. myrrino & aqua plantaginis aliquot vicibus.

SCHOLIA.

IN solutione continui, si ex casu vel leuato pondere, *Curatio, si ex solutione continui aut ruptura venarum.*
 statim viribus adhuc valentibus vena sectio conuenit; & vincula brachii injecta, & frictiones, & cucurbitæ in spatulis. & si non restringatur, etiam manna dextra vel sinistra, prout dolor magis in vna parte
 G 2 *quàm*

Quæ valent
in fluxu
enormi post
partum vel
abortum.

quàm altera infestet. Postea vtimur remediis iam dictis in anastomosi, quod ad conglutinantia & astringentia attinet. Vel si in causa fuerit ruptura venarum, procedimus cum iisdem quæ valent in fluxu ab acuitate sanguinis, in frigidando sanguinem, & inspissando, & constringendo meatus. Sic etiam in solutione continui, quæ fit à partu, vel abortu, iisdem remediis vtimur, vbi rem vigere videamus: nam temere cohiberi non expedit. Vbi tamen vires deiecit, & syncope subsequatur, tunc cohibendus est. Sic anno 1588. sexto Iulij die ad puerperam ex violento profluvio sanguinis ab utero laborantem de nocte accitus, cum in syncope valde diuturnam prolapsa esset, & pro mortua haberetur, adhibitis frictionibus brachiorum & vinculis iniectis, vbi ad se redisset, vt continuè ex sequenti mixtura sumeret ad libitum, præcipi: R. conf. ros. veteris ℥ j. diacydenij sine speciebus ℥ ij. rob. de ribes ℥ ss. pul. fragmentorum lapidum pretiosorum ℥ j. manus Christi cum perlis ℥.ij. syr. de ribes, fiat mixtura. quæ quidem viribus recreatis fluxus quoq. enormis substitit. Vulgares mulierculæ experimentum habent ad hoc sanguinis profluvium & nimiam euacuationem in puerperis; nempe nucem iuglandem exiccatam in puluerem redigunt, & tribus vicibus cum cereuisia aut vino rubro exhibent, quo remedio fluxum enormem restringunt. Hoc modo Matrona Rotallera nobilis in Haga comitis dicitur curata. Phoca Iohannis (sic enim mulieri Alcmariæ nomen erat) 36. annum agens, anno 1549. mense Nouembri post abortum incidit in fluxum copiosum menstruorum, vt astantes de vita desperarent, adhibita vltima inunctione per sacerdotem, vt in moribundis fieri solet. Ad quam cum accede-

accederem, dolorem quoque vteri patiebatur, ac inflationem quandam. Sed cyathum vnum capiens ex hoc decocto, inflatio cessauit & dolor: R. flor. chamamel. p. j. sem. coriand. preparati, seminis myrtill. añ. ʒ. j. sem. anisi, agni casti añ. ʒ. ij coquantur in pinta dimidia cereuisie communis. Huius acceptis subinde tribus cochlearibus, dolor sedatus est & inflatio, fluxu etiam nonnihil diminuto. Sed cum perseveraret, linimento circa pubem, & confectio in tabulis assumpta, menstrua illa vehemensq; purgatio simul cessauit: R. olei mastichini, myrtill. añ. ʒ. ʒ. olei chamamel. (ob dolorem in vtero) ʒ. ij pul. corall. rub. ros. añ. ʒ. ʒ. cera parum; fiat linimentum: R. trochis. de carabe ʒ. j. spec. triumf. diarod. abb. añ. ʒ. ʒ. pul. margar. perforat. & non perforat. añ. ʒ. j. cornu cerui vsti, coriandri prepar. añ. ʒ. ʒ. redigantur in polline, & soluantur cum aqua ros. & mentha, adiecto saccharo q. s. fiat confectio in tabulis. Nostra muliercula in fluxu post abortum hoc pro arcano habent: carnem fumo indurata ad minus vetustate annu excedentem, quam minutissime concisam in patella terrea supra ignem torrent & exiccant, vt in puluerem redigatur; dant cum vino rubro stiptico, vel alio liquore constringente; feruntq; hoc remedio deploratas mulieres ex fluxu enormi post abortum restitui. Hoc remedio Domina de Roon pro deplorata habita dicitur conualuisse. Bononia post partum & abortum à Medicis hac prescripta in fluxu enormi bellè profuere: R. pilul. de bdellio, trochis. de terra sigillata, de carabe, añ. ʒ. j. cum syr. myrt. fiant pilulæ: exhibitæ sunt manè, & superdormiuit agra. R. margarit. non perforat. spodij, añ. ʒ. j. ʒ. coriand. prepar. cornu cerui vsti, añ. ʒ. ij. corticum medianor.

101 DE MULIERVM MORBIS,
castanea z ij. sem. ros. z ij. lapid hamatitid. pilorum
leporis combustorum, añ. z j. sacchari ros. ad pondus
omnium, cinnamomi quantum placet pro sapore. sa-
matur bis in die cochlear vnum.

OBSERVATIO XVII.

*De menstrua superflua euacuatione
ab arrosione.*

MULIER biliosa, ex acris humoribus ad
vterum confluentibus, superflua men-
strua purgatione laborabat; quod & dolor indi-
cabat, & subinde etiam sanies cum sanguine
menstruo effluens. Diximus enim, arrosionem
aliquando fieri a causa interna, a bile aut san-
guine acris, aut pituita salsa. Cum hinc ex sangui-
ne bilioso fieret in muliere admodum biliosa,
quodque bilem & humores acres redundantes
hæc affectio contineret, habitum ego corporis
respiciens, & recrementa reiecta, omnium pri-
mo symptomati occurrendum esse duxi; deinde
ad erosionem & eius causam veniendum. Ideo
ante omnia consului, cum a me curationem po-
stularet, vt parum sanguinis detraheret in bra-
chio dextro ad reuulsionem, ad uncias tres tan-
tum vel quatuor; & iubebam vt apertio fieret
exigua ipsius venæ, vt ita longiori tempore &
minori quantitate sanguis expurgaretur, & vires
ex larga apertione minus conciderent; id nimi-
rum tantum ad sanguinis difflationem faciebā;
nam copiosa sanguinis missio hinc nullo modo
confert.

confert. Interea etiam præcepi ut fierent frictio-
nes fortes brachiorum & ligaturæ. Postea ad bi-
liosorum humorum, tum acrium purgationem
perreximus, ut qui erosionem augebant. Vbi
enim succi vitiosi in toto corpore redundant, &
erosionem augent, nulli dubium est quin illi
prius sint purgandi, antequam ad medicamenta
veniamus quæ sarcotica appellantur, & carnem
gignentia; ut 7. De compos. medic. secundum lo-
cos constat. Verum ut illi humores etiam con-
temperentur, possumus etiam aliquos syr. con-
uenientes adhibere (ubi detur occasio) antequam
ad purgationem veniamus. Quare ut prius hunc
syr. sumeret mandavi: & syr. ex infus. ros. ex succo
myrtilino, & succo acetosæ, añ. ℥ j. aquæ plantag.
polygoni, acetosæ, añ. ℥ ij. misce, pro ij. dosibus.
Dedi etiam oxysacch. cum aqua plantag. dein-
de ut talis vel similis purgatio exhiberetur con-
sului: & tamarind. ℥ ss cortic. myrobal. citrin. ℥ iij.
fiat decoct. in aqua plantag. & acetosæ, & huius
accipe ℥ iij. syr. ex infus. rosar. ℥ j. rhab. optimi
pulv. sine spica ℥ j ss, vel ℥ j. misce. fiat potio.
Deinde iussi ut perueniret ad topica medicame-
ta: & prius tamen, cum fluxio paulo vehemen-
tior esset, quamvis subinde sine sanie & virulen-
tia, ut applicaret duas ventosas sub mammillis,
ad maiorem restrictionem, & auersionem: &
mandavi ut bonis cibis & boni succi, qui erosio-
nem contemperarent, præcipuè vteretur, alica,
amylō cum lacte, & amygdalato, & emuls. sem.
quatuor frigid. maior. mundat. & hordeato, &
ut succum plantaginis iniici per obstetricem cu-

raret: huiusmodi enim profluvium supprime-
re valet, si cyathi mensura iniiciatur, vt Aëtius
inquit. Verum etiam aliquando fortius aliquod
admiscendum erit, aliàs aliud, pro affectionis
respectu. Nam si vas illud quod corroditur, vn-
de profluit sanguis, magnum & amplum fuerit,
austeris medicamentis opus fuerit, vt balauſtio,
acacia, hypocisthid. gallis, malicorio, & similibus:
si verò paruum, conferrent aloë, manna thuris,
cortex pinus, terra lemnia, lapis hæmatites, &
reliqua huiusmodi, quæ nedum cum succo plan-
taginis, verum etiam vino austero nigro, aut se-
necionis succo subdita, & iniecta conferunt, ex
sententia eiusdem Aëtij. Et (vt summatim di-
cam) quæ mediocriter, & sine morſu detergunt
arque exiccant, commoda sunt, vt quæ carnem
generent; vt liquet tum 3 Method. med. tum se-
cundo De composit. medic. secundum genera.
Vbi igitur sordes vnà cum sanguine emanarēt,
tunc obstetrici iussimus, vt etiam aquam hordei
iniiceret cum succo apij, melle etiam paucò ad-
iecto, & ad restrictionem & refrigerationem
addendo succum plantaginis. Postea succum
plantaginis vnà cum lacte cocto iniici præcepi-
mus. Et vbi solus sanguis, magis tamen cum ar-
dore, efflueret, solummodo succum plantaginis
iniiciebat, aliquando adiecta exigua portione
trochis. de terra sigillata; quos etiam sumebat
per os cum aqua plantag. addito syr. myrt. Inte-
rea vt & ventri apponeret ceratum comitissæ,
consuluimus. Ex his bene habuit, cum corrosio
ad maiorem vlcerationem non peruenisset. Ve-
rùm

tum mulier illa Alcmariana, quæ extra portam in qua facinorosi incarcerati detinebantur, habitabat, ex erosione & vlcere diuturno, longa menstrua purgatione laborabat: & cum Empiricorum ac tonforum opera vteretur, neque in principio bonos Medicos consulisset, licet languida diu superuixerit, facie admodum fœda, pallida, & cadauerosa; tandem cum vix corpus protrahere posset, diuturna cachexia affecta obiit.

SCHOLIA.

DICTVM est prius, quodd si fiat ex erosione cum vlcere, & si dia perseueret, talis superflua menstruorum purgatio, plerumq; esse lethalem; quemadmodum in secunda muliere euenit; multoq; magis si quando ab imperitis tractetur. Si verò sit erosio circa os ceruicis, melius curatur: quod non solum per saniem, sed etiam per tactum cognosci poterit; vt Gal. docuit 6. De locis affectis. Si verò sit profunda, quod quasi per æruginem exeuntem (vt dicebat Valescius) cognoscitur, difficilius curatur. Interea tamen adhibenda sunt remedia apta. Si itaque sit ex erosione, tunc purgato corpore, remediis localibus vtetur, optima tamen instituta victus ratione. Primum remedium est succus plantaginis iniectus, præsertim si valde sordidum vlcus non fuerit. (nam si sordes adsint, extergentibus erit vtendum: exempli gratia, succo apij melle admisto, vel præsiij, vel brassicæ) secundum remedium aqua hordei: tertium lac: & demum omnia quibus ad dysenteriam vtibamur. Quod si dolor vehemens sit, & ardor, etiam decoctum hyoscyami, & papau. cum astrin-

Curatio, si
ex erosione.

G S genti-

gentibus iungemus, (ferè enim in vlcere cruento est maior) & tandem opiatorum medicamentorum aliquid immitteremus cum suprapositis succis. Iuuant & astringentia balnea in cruento vlcere. Valescius verò inquit: Si fluxus menstruorum fiat à corrosione, vel vlcere; id quod scitur per exeuntem virulentiam cum sanie, aliquando cum sanguine mixtam; & ex dolore in loco, ex quo illa virulentia & sanies cum fœtore, & aliquando ad modum fecis vini; tunc verò facta ab initio parua phlebotomia, & mūdificatione corruptorum humorum, & supposito bono regimine, administrentur hæc medicamenta per partes inferiores cum traiectorio; vt sunt aloë, thus, & cortex eius, & sang. draconis, corallus, carabe, myrrha, crocus, lycium, mentha, amyllum, plumbum vsum, terra sigillata, bolus arm. & similia. & aliquando melicrato mūdificentur, cum iis quæ stringunt & mūdificant vlcus, vt de galle adusta extinctæ in aceto, chartæ bombacinæ combustæ, cochlearum vstarum & cornu cerui adusti q. s. inde fiat pul. Vel hic apud eundem magni est iuuamenti: & lapid. hematitid. sang. dracon. carabes, coralli, aluminis iameni, balaust. boli arm. terra sigill. sem. portul. añ. p. & fiat pul. & cribro excipiat. dentur ʒ ij. cum aqua myrtil. aut arnoglosse. & si vis excusari, inquit, à laboribus, accipe trochis de terra sigill. qui describuntur cap. De hamoptoica pass. & da cum succo arnoglosse, vt ibidem docetur, vel cum succo arnoglosse cum traiectorio iniiciantur. Iuuant enim post mūdificationem vteri cum hydromelite, & sunt admodum vtilis.

OBSER.

OBSERVATIO XVIII.

De immodico mensium fluore ob sanguinis tenuitatem, caliditatem & acrimoniam.

FLVOR autem immodicus mensium magna ex parte contingere solet à sanguinis caliditate, tenuitate, & acrimonia: quemadmodum istis diebus contigit mulieri iuenculæ supra modum biliosæ. quæ cùm ad me consultandi causâ venisset, vt hæc ordine fierent mandauimus. primò vt alius clystere sequenti leniretur: & folior. maluæ, violarum, parietariæ, mercurial. añ. m. j. prunor. damas. num. xij. coquantur in aqua communi pro lib. j. colæ adde olei viol. ℥ iij. cassiæ pro clysteribus ℥ j. sacchari rub. ℥ β. vitellum vnius oui, salis parum; fiat clyster. Quod si bolo magis delectarentur, hoc vti suadebam: & cassiæ recēs tractæ ℥ j. sem. berberis puluerisati ℥ ij. fiat bolus. Deinde & syr. ex ros. siccis, agrestæ, de succo acetos. añ. ℥ j. β. aquar. acetosæ, portulacæ, añ. ℥ iij. misce. ieiuna per triduum in diluculo summat. & elect. triumfant. ℥ β. vtatur cum syrupis, purgetur autem hoc modo: & folior. acetosæ, portulacæ, añ. m. β. prun. damas. iniubar. sebesten recent. añ. ℥ β. flor. nymphææ, viol. bugloss. añ. p. j. coquantur in aqua communi; & huius colæ accipe ℥ iij. adde syr. ex infus. ros. pallid. ℥ j. β. pul. rhab. selecti ℥ ij. misce. detur in diluculo: & pilosellæ, bursæ pastoris, ros. rub. cum capitibus, caudæ equinæ, plantag. añ. m. j. rad. consolida

lidæ maioris, rad. sigilli beatæ Mariæ, lentium
 excortic. añ. ʒ ij cupul. glandium, balauftij, su-
 mach, granorum myrti, nucum cupressi, añ. ʒ j.
 gummi arab. acac. hypocisth. añ. ʒ ʒ. contundan-
 tur, fiat decoct. in aqua plantag. pro lib. ij. dulco-
 retur frequenter cum saccharo. Hoc aliquando
 exhibitum fuit Dominæ de Cruningen labo-
 ranti ardore vrinæ, & copioso fluxu menstru-
 rum. Item istud: ʒ farina glandium ʒ ʒ. ossium
 cap. caponum, faucium lucij combustorū, ossium
 daetylōr. añ. ʒ j. coriand. præp. ros. siccarum, anisi
 torrefacti, rad. nenuph. citrinæ, añ. ʒ ij. rasuræ
 eboris ʒ j sem. plātag. acetosæ, añ. ʒ ʒ. puluerifen-
 tur. Vel capiat sequens: ʒ conferuæ ros. antiquæ,
 confer. rad. symphyti añ. ʒ j. coralli rub. lapid. hæ-
 matid. cornu cerui vlti, acaciæ, hypocisth. añ. ʒ j.
 diacydonij sine spec. ʒ j. ʒ. corticis ouor. ʒ j. cum
 syr. myrt. excipiantur; & fiat ad modum elect.
 mollis. capiat ad magnitudinem castaneæ parvæ
 duabus horis ante cibum, manè & vesperi. hoc
 deglutito, parū vini rubri chalybati bibat. Quod
 si neque iis constingatur fluxus, tunc consule-
 rem vt sequens acciperetur: ʒ syr. myrtini, co-
 toneorum, añ. ʒ ij. succi stercoris asinini recentis
 ʒ iij. aquæ plantag. ʒ vj. misceantur; & ieiuna
 per triduum in diluculo bibat. Interea extrinse-
 cus inungat ventrem ab vmbilico ad pectinem,
 & regionem renū manè & vesperi: ʒ olei myr-
 tini, ros. cotoneor. añ. ʒ ʒ. boli arm. lapid. hæma-
 titid. acaciæ, hypocisthid. coralli rub. mummiæ,
 añ. ʒ ʒ. ceræ modicum; fiat vnguentum. Detur
 ʒ j. pul. putaminis ouorum, vel testarum ex qua
 pulli

pulli gallinacci exclusi sunt, vel cornu cerui, vel
rad. nymphææ, vel rad. eius, ad ʒj. cum decocto
vel aqua aliqua astringente, vt bursæ pastoris,
vel plantag. Si his non restringatur, cucurbi-
tulæ magnæ subter mammæ affigantur, ante pa-
stum, & per horam dimidiam hæreant. fricen-
tur brachia, & pessus indatur; vt: & michletæ,
tryphææ, añ. ʒj. β. equiseti, acaciæ, añ. ʒj. spicæ
nardi ʒ β. (sistit enim menses) commista hæc
linteo raro inuoluantur, fingaturque pessus, qui
filo coxæ alligatus, in mulieris pudenda immit-
tatur. Vel loco pessulorum (quoniam mulieres
non faciliè admittunt pessulos) lanam accipito,
& cum succo plantaginis imposito. Insestus
quoque fiat in hunc vel similem modum: & po-
lygoni, ros. rub. plantaginis, bursæ pastoris, pilo-
sellæ, añ. m. ij. folior. symphyti, balaustiorū, equi-
seti, añ. m. j. gallarū, sumach, malicorij, cupul. glā-
dium, gallarum, folior. cypressi, vel nucum eius-
dem, añ. m. β. flor. & folior. verbasci, añ. m. j. de-
coquantur in aqua chalybeata, aut aqua pluuiæ,
in qua ad vmbilicum vsque se irriget. Balneum
egressa inunget se vng. supradictō, vel vng. co-
mitissæ, & renes, & ventrem, ab vmbilico vsque
ad pectinem, partemque posteriorem ei opposi-
tam; & vtatur elect. iam dicto. Aut loco balnei,
ex iisdem fiat fotus; aut ipsius decocti fumum
per infundibulū in vterum recipiat. Et quoties
alius sua sponte excrementa, vt conuenit, non
deiciat, sumat ʒj. pilul. de bdellio circiter xi.
noctis horam: id quod commodè facere lice-
bit semel aut bis in hebdomada. Vt autem hæc
omnia

110 DE MULIERVM MORBIS,
omnia ordine fierent, consului præsentī dome-
stico Medico, cū apud nos manere non pos-
set, vt rite perageret.

SCHOLIA.

ACCIDIT aliquando huiusmodi fluxus su-
perflus propter nimiam debilitatem, aut &
caliditatē sanguinis (vt diximus) quæ sit à bile mixta
sanguini; vnde hæc bilis acris sanguinem exacuit &
subtiliorem reddit, & orificia venarum aperit, ob mor-
dicationem, quam tunc facit. Idcirco remouendo cau-
sam eius, oportet bilem ipsam euacuare, & incrassare
sanguinem; vt hoc modo: R. syr. de end. myrt. añ. ℥j.
ß. aquæ plantag. portul. end. añ. ℥ij. misce. vel detur
syr. quo nos vsi sumus; deinde eodem modo pargetur.
Postea ea quæ intus exhibentur per os, & per vterum,
& reliqua topica adhibeantur; vt iam satis dictum
est. Si plura de his desideres, vide Leonellum cap. pro-
prio: Ita quoque si salsa pituita fuerit causa huius su-
perflui fluxus, vel per aperrionem, vel erosionem, syru-
pus è corticibus citri conueniet, vel mel rosaceum cum
syr. myrtino, vel ex absinthio: & purgabimus hoc vel
simili modo: R. cort. myrobal. chebul ℥iiij. agarici tro-
chis. ℥j. fiat decoct. in aqua plantaginis, in quo ℥j ß.
syr. ex infus. ros. pallidarum dissoluas, & fiat po-
tio. Postea constringatur cum iis quæ nunc dicta sunt.
quale & hoc decoctum est, quo puerpera cū enor-
mem fluxum mensium pateretur vsque ad syncopen;
commodè vsa est: R. sigilli beatæ Mariæ, millefolij, bur-
sæ pastoris, rosar. cum toto, pilosellæ, añ m. j. sem. acé-
tose, plantag. gran. myrti, sumach, añ. ℥j. lenium ex-
cort.

Si fiat ex
falsa pituita,
quid facien-
dum.

cor. gummi arab. añ. ʒ ij. rad. nenuph. citrin. ʒ ij. nucis
moschatae, schoenanthi añ ʒ ʒ. rad. cōsolida maior. exicc.
ʒ ij. decoquantur in lib. ij. vini rub. & lib. i. aquae plan-
tag. exprimatur & dulcoretur decenier saccharo.
Sumebat autem cum paruo cochleari istū puluerem:
R. ros. rub. been albi & rub. spodij, añ. ʒ j. osium ca-
pitis caponis, farina glandium, coriandri preparati,
añ. ʒ ʒ. margar. corall. rub. osis de corde cerui, hya-
cinthorum, sem. anthera, añ. ʒ ʒ. cinnamomi electi
ʒ j. put. & misce cum saccharo ad pondus omnium.
Inungebantur ter quaterve lumbi hoc vng. R. olei
ros. myrtini, cydon. añ. ʒ ij decoct. bursa pastoris, sem.
plantag. sem. acetosae ʒ j. vnguenti comitisse ʒ ʒ.
bulliant simul ad consumptionem aquae decoctionis, &
cum modico cera fiat vnguentum. Quibus hac curata
fuit. Ceterū hīs meminisse oportet, quod plerumq;
vt de signis prognosticis diximus, in diuturnis mēstruis
fluxionibus subsequi solet hydrops: quemadmodum
euenit vxori M. Theodorici, quae prope Templum nouū
Delphi habitabat. Hac enim cū per tres annos men-
sium profluuio laborasset ferē continuō, licet diuersis
remedijs, vt germine ouorum, modō albumine ouorum
cum aqua plantaginis ad constrictionem, tum alijs in-
finitis, iūq; varijs, etiam à me exhibitis, interdū con-
stringeretur; saepius tamen eodem fluxu redeunte, ad
extremam debilitatem deuenit, inde ad cachexiam;
mox ad hydropem, fluxu tandem restricto: ita vt pro
deplorata haberetur; cū & pedes valde intumesce-
rent, & tandem incedere non posset. Vt illud sym-
ptoma, post tam diuturnum fluxum relictum,
curaremus, multis adhibitis remedijs ad hydropem &
leucophlegmatiam, qua ad extremum laborabat,
facien-

facientibus, post vniuersalia remedia quæ aquâ educent per vias vrinales, vtebatur modò dialacca, modò diacurcuma. Et tandem per lotium multam materiam aquosam continuò effudit. Demum ad pedes tumidos, in magnam molem auctos, & œdematosos, balneo sequenti vsus sum: R. foliorū sambuci, sampsuchi, florum chamæmeli Romani, foliorum rorismarini vnâ cum floribus, saluie, foliorum lauri, añ. m. iij, cumini, salis, añ. p. ij. fiat decoctio in aqua & aceto acerrimo adiecto. aqua hæc in magnam cupam reponatur, vimine intertexto & cancellato super imposito, & pedes nudi super eodem ponantur, vestibus vndique circumcincti; fumum ex ea aqua calida recipiat, atq; sudor omni mane ita prouocetur. Postea & in eodem balneo pedes imponantur; idq; omni mane per plures dies, ventriculo ieiuno. Hoc præsidio tandem incipiebāt detumescere crura; tum fasciis circumligabantur; idq; continuando per plures dies, à leucophlegmaria, tum hydrope, miraculi instar, curata fuit. At Matrona cuidam, quæ fluxum muliebrem & menses copiosos ita habebat, vt in syncopem quasi incidere, nec vllis modis restringi possent, mulier quadam exhibuit tria cochlearia aquæ plantag. cum tribus cochlearibus vini rubei, adiiciendo vitellum vnius oui, leuiter tantum ebulliendo. singulis diebus omni mane totum sumebat, super dormiendo. Vix duobus diebus, aut tribus, cum sumisset, fluxus ille enormis cessauit, & sanitati restituta fuit. Hoc eodē remedio postea & plures à fædo illo malo liberata sunt per me, Deo adiuuante. Hæc satis sint dicta de menstrua purgatione rubra. Nunc ad fluorem muliebrem accedamus, quem alij menstrua alba appellant.

OBSER-

OBSERVATIO XIX.

De fluore muliebri, aut menstribus albis.

Vxor illius Cornelij Alcmariani, in platea frumentaria habitantis, qui vascula conficiebat, ultra decem annos cachexia affecta, facie admodum pallida & cadauerosa, per vndecim annos fluore muliebri, vel menstribus albis, detinebatur. Cum autem in patriam essem reuersus, & apud patrem tunc agerem, hæc quidem vicina nostra me consultandi causa accessit: cui inprimis adhibuimus medicamentum quod aluum & simul aquam duceret: deinde diuretica propinauimus: mox ad illa confugimus, quæ ad hydropem valere scripsimus; quibus etiã melius habere visa est. Verùm cum tenuioris fortunæ esset, paulo post curationem reliquit, ac suo more viuens ad hydropem deuenit, & cum tunc pro deplorata haberetur, in maxima copia ebibit cereuissiam Gedanam; qua quidem casu & bona sua fortuna alius supra modum soluta est, & totâ aquâ cum maximo impetu per aluū effusâ, præter mentem curata fuit. Cum autem hæc illi contigissent, hortabar vt nunc aliquibus medicamentis vteretur, quæ hepar roborarent, ne rursus eiusmodi superfluitates aquosæ regenerarentur. At mulier sui negligens, suo more vixit; quanquam ei eadem medicamenta proposuissem, quibus Gal. in Boëthi vxore (de quibus suo loco) vsus fuerat.

H

Proin

Proin post duos trésvé menses iterum in con-
suetum muliebrem fluorem incidit; neque tunc
nostro consilio, aut aliorum Medicorum cele-
brium vti volens, paucos post annos denuo in
hydropem lapsa est; nec vllis præfidiis vtens, ex
eadem hydropé mortua est.

S C H O L I A.

FEMINA aliquando totius corporis culpa non
purgatur, (vt in præcedentibus, cum de retentione
menstruorum ageremus, diximus) aliquando parcius,
aut liberalius, vt iam mox ostendimus. Ita quoque in-
terdum malum quippiam per vterum excernitur, vt
liquet ex Gal. 3. De causis symptom. Quæ quidem af-
fectio vocatur à Græcis πᾶς γυναικείας, vt patet ex
Gal. citato loco, & lib. De diff. sympt. & 6. De locis af-
fectis. quem sectati sunt Paul. lib. 3. cap. 73. & Aëtius
cap. 65. lib. 16. A Latinis verò Muliebris fluxio, seu
Profluuium muliebre appellatur; ab alijs Superfluitas
alba. Is fluxus maximè mulieribus laxis carnibus &
pituitosis accidit; vnde albos flores vulgus vocat, alij
Menstrua alba. Est verò totius corporis recrementi de-
stillatio, vt inquit Paulus. Vel vteri destillatio diutur-
na, vt Aëtio visum est. Vel vniuersi corporis per vte-
rum expurgatio, ipso haud quaquam affecto, vt ex
Gal. colligitur locis citatis: ita vt nec alicuius determi-
nata corporis partis affectio hac dici possit. Iuxta alios
modò est ab vtero solo, modò per consensum aliorum
membrorum: interim ea ipsa est symptoma in genere
excretorum immodicè, præsertim in qualitate; nam
vitiosum est quod expurgatur, vt eodem lib. De differ.

Muliebre
profluuium
quid sit.

Quæ pars
affecta.

& 3. De causis sympt. scriptum est. Fluunt enim ex
 vtero alia humiditates à sanguine, modò permixtæ,
 nunc sinceriores; atque vario colore, aliis albæ, aliis vi-
 rides, aliis fuliginem imitantes, aliis flauæ. Sed inter
 albas differentia est substantiæ. Aliquando enim pitui-
 tam lentam imitatur, aliquando tenuem & aquo-
 sam. Ex qualitate etiam, quoniam aliàs acris est &
 mordax, quod plurimum euenit; aliàs mitior. Corpus
 enim per hanc partem, vt diximus, sese expurgare ten-
 tat, idq; per excrementa varia, pro natura humoris
 qui abundat. Sicitaq. mulieres reddunt per vterum
 quadam excrementa serosa, quam purgationem mu-
 liebrem appellant, quod illis sit peculiaris & propria.
 In quibusdam quotidie, in aliis post mensum purga-
 tionem, nonnullis euenit inter duas purgationes tan-
 tum. Aliquibus hoc vitium à toto corpore dependet; in
 reliquis ab affectibus vteri; vt Rondeletius quoque cen-
 sebat. Generatur autem hic fluxus muliebris, vel ex
 completendi sùctione imbecilla, vel expultrice immo-
 dicè concitata, vel ambabus simul lasis, aut quòd totus
 sanguis tenuis, serosusq; est redditus, vt lib. De differ.
 sympt. à Gal. scriptum est. Atqui sanguis talis fieri po-
 test, vel ex sanguifica facultatis operis frustratione;
 vel ex eius quæ tenue & serosum separat, seu idem ex-
 cernit. Incidere etiam aliquando potest ex retentrica
 ipsa immodicè opus suum urgente, & cute inspissata
 & rembus occlusis; ex eiusdem Galeni decreto. Vel
 ambabus simul lasis ob copiam & sanguinis qualita-
 tem. Et ita secundum quosdam à tribus quoq; causis
 potissimum procedit. Primò à toto sanguine aquoso
 iransmisso ad vterum, quo fluxu subinde sequitur to-
 tius attenuatio, modò non superfluat & diu adhareat;

Quis affe-
 ctus præter
 naturam sit.

Differentiæ.

Causæ.

idq³ etiam ab hepate: quando nimirum à toto prouenit, & hepar debilitatur in sanguificando, ut non possit probum ac bonum sanguinem generare. Secundò à capite, humiditatibus in cerebro per viam indigestionis collectis, vel ex vaporibus eleuatis ad caput seu cerebrum, vbi conuertuntur in aquosam materiam, qua descendit per nucham vsque ad vterum, & euacuatur ab eodem. Tertio ab vtero ipso, quando vterus proprium suum nutrimentum non digerit, & id in humiditates multas mutatur, quas natura propellit foras. Ita & Syluius dicebat: Albus hic fluxus fit ab imbecilla coctione ventriculi, & corporis totius, ex mœrore, vel vsu ciborum pituitosorum. Sic & Fernelius: Causa autem, inquit, que corruptum humorem assiduò gignit, aliàs in vtero, aliàs in principibus partibus consistit. Grauius proinde hallucinantur, qui omniū ex vtero prodeuntium, quemadmodum & omnis suppressionis mensium, causam ab vno requirunt vtero. Etenim quibus mulieribus viscera refrigerata, vel obstructa, vel scirrhus dura, cruditates, malum habitum aut leucophlegmatiam inuexerunt, corruptus humor in varias partes effusus, sepe in vterū procumbit, & illac decurrens, corpus expurgat; quod quibusdam per renes aut per aluum fieri diximus. Sic mulier, apud eundem Fernelium, hydropem mensibus singulis per vterum expurgabat. Altera causa ex vtero quidem rarior existit; eaq³ vel intemperies est, fereq³ frigida; vel imbecillitas ab vteri gestatione, à partu, contusione, aut ab alia externarum causarum vi contracta; vel erosio, vel exulceratio ex inflammatione aut ex abscessu derelicta. His quippe causis oblasus vterus, & proprium alimentum malè conficiens, excrementa multa

*multa progignit, quæ foras elabuntur & excidunt.
Hæc illustrabuntur exemplis viuis subsequentibus.*

OBSERVATIO XX.

*De menſtruis albis, per modum con-
ſultationis.*

GENEROSÆ cuidam & nobili matronæ
ab utero continuò humiditates effluebant,
ita ut hanc ob causam ſterilis permaneret, & ſi
conci-peret, ad felicem partum non veniret. Erat
enim mulieb- re profluuium, quod menſtrum
album vocant: plurimum pallebat, cibos faſti-
diebat, ægrè deambulabat, tume- bant genæ, & to-
tum corpus flaccidum erat, quaſi ad leucophleg-
matia inclinata eſſet. & quantū ex iis notis quas
etiā enarrabat vulvæ rheumatismus, erat id
ex uniuerso corporis humore deſſuente ad ute-
rum; fluxioque erat alba, pituitosa, & ſeroſa;
nam & faciæ ſiue panniculi in umbra exiccati,
album colorem præferebant. Non concipiebat
propter humiditatem uteri, qui ob continuam
deſſuxionem ſemen non retinebat; & ſi conce-
piſſet, partus facilè ante tempus excidebat: uti
etiā eueniebat mulieri cuidam craſſæ cereui-
ſariæ apud Delpheneſes, quæ pluſquam octies
abortum ex leui cauſa paſſa fuerat. Rarò enim
vulvæ habitudo humida ſine rheumatismi vitio
euenit, & ſuperabundantis humoris capax eſt:
veluti enim nauis carina, corruantium humo-
rum locus eſt. In hac nobili muliere continge-

H 3

ba

bat tam ex debili concoctione ventriculi, quàm hepatis mala sanguificatione, totius corporis humore ad vterum profluente. Quamobrem ut huic rectè consuleremus, animaduerso iam profluuij modo, intelleximus similem ferè casum esse cum vxoris Boëthi, cuius historiam Galenus posuit in libro De præcognitione: & hîc casus difficilis quidem est, & idèò particulatim rectè proponitur à Iacchino, viro doctissimo; & diligentissimè examinatur. Medici, inquit, ante Galenum cogitabant de curatione, atque eam in duobus scopis ponebant. Primus erat siccare totum corpus, & partes quæ circa vterum: secundus, astringere & roborare eas partes, quæ à toto suscipiunt. Hæ enim sunt communes intentiones in morbis è fluxione, ut respiciamus mandantes partes & recipientes. Sed hac via, inquit Galenus, cum processissem, nihil est profectum; sed res in deterius labebatur. Attamen meliorem curationem hæc nemo inuenire audebat, cum neque Rationales per methodum, neque Empirici per experientiam meliorem inuenissent. Cum ergò sic dubij essent, tumor circa ventrem apparuit, ita ut grauida crederetur. At Medici hoc non suspicabantur, inquit, quoniam causam tumoris cernebamus, id est, aquosum humorem, qui ex parte quidè excernebatur, sed maiori sua parte retentus, tumorem fecit. Hîc ergo videtur Iacchino erratum fuisse; scilicet astringentibus, intempestiuè adhibitis, id est, non bene antea siccatò corporis habitu. erratum post ab obstetricibus, cum lauarent, & victum prægnantium insti-

instituerent; id est, non respicientes humidum affectum. Rogabat igitur Boëthius rursus ut mulieris cura haberetur: sed persequi tutum non videbatur, inquit Galenus: nemo tamen hunc modum reprehendere audebat, inde omnes hæsitabant. Tandem ipse cogitans super ea re noctu, in mentem reuocauit symptoma quoddam, quod est mollities musculorum, qui circa hypochondria sunt siti: appellat autem mollitiem, talem carnis tactum, qualem in hyposarca affectu sentimus: tumor scilicet laxus & mollis, qui digitis adedò cedat ut carnem ipsam dissoluere te posse videaris. Hic est tumor œdematodes, soboles pituitosi sanguinis, qui per vniuersam carnem est dispersus. Tale quid sensit circa hypochondria, vnde coniecit, affectum hunc esse intemperiem frigidam & humidam, cum humore pituitoso plurimo aggenitum ex viscerum intemperie, quibus debetur concoctio, peruenientem verò ad vterum pellente natura: qua expurgatione prohibita, vterus intumuerat, & viscera ipsa eo humore plena, vicinas partes & sibi incumbentes affecerant: inde mollis tumor. Iam igitur nosse poterat in quo prior curatio defecisset: nempe quòd respexerat solùm superfluam humiditatem siccando: (nam de siccatione solùm meminit) oportuit autem adicere, & calefacientia. Sed alia ratione reprehendendus modus ille veniebat; quoniam astringentibus utebantur intempestiuè; vnde retentis excrementis, tum venter, tum hypochondria frigida & humida intemperie magis affecta erant, atq. aquoso

120 DE MULIERVM MORBIS,
humore intumuerant; ac proinde de hydropē
mulier periclitabatur: vt nostra quoque hæc
matrona, quæ neque grauida erat. Huius secundi
erroris non meminit Galenus; sed innuit, inquit
Iacchinus. Postquam secundo loco curam insti-
tuunt, nihil astringentium meminit: non quòd
prorsus damnanda essent, vt videbimus; sed
quia intemptiuus vsus eorum damnandus est:
hoc est, priusquam corpus egregiè sit expurga-
tum. Instituit igitur calfacere, vt & siccare: & hoc
per arenam marinam excalfactam, in qua ægram
volutari iussit, & operiri; ac victum potumque
instituit perexiguum, ad siccandum; & frictioni-
bus vsus est ad siccationem & extersionem corū
quæ circa cutem, & vt excrementa plurima ad
cutem auertendi gratia ferrentur. Confert enim
in his affectibus è fluxione, vacuatio quæ auer-
sione fit. Sed & potiones quæ deriuent adhibet,
tum per aluum, tum per vrinas. Pro exemplo
facit mel coctum probè, mox refrigeratum ita,
vt speciem præbeat aquæ fontanæ per æstatem,
id est, tunc cū æstas viger tali temperie, melle
vteremur. Nam frigidum prorsus noceret affe-
ctui; & non posset fricatio ex eo fieri, quòd den-
satum hæreat, neque extendatur. Hæc ad cor-
pus vniuersum fieri præcipit. Nam si vellet re-
ferre frigido fontanam aquam quali frigiditate
est per æstatem, esset vsus incommodus. Hæc
diebus septē peracta: quæ cū cōferre visa sunt,
ausus est Galenus solus petere curam mulieris.
Primū ergo aquam ducente per aluū medica-
mento est vsus; qualia sunt quæ suprā De hydro-
pe po-

pe posita sunt: secundò propinauit aquam, in qua
asarū & apium erant incocta: ac postridie medi-
camentum rursus aquam ducens propinauit, vt
ita assuesceret natura ad vrinas, & per aluum ex-
crementa deducere, quæ antea in vterum con-
fluebant. Vsus quoque est quotidie fricationi-
bus ex linteis; primùm mollioribus, mox aspe-
ris, demum ex melle iam dicto. Itaque, inquit,
post dies xv. nihil affectus restabat. Hæc, si aquo-
sus & frigidus humor sit collectus, profunt. Hæc
muliere curata, Boëthius quadringentos aureos
ad Galenum misit. Consului ego itaque cum
Medici domestici præsentis consilio, vt hæc ipsa
matrona nobilis, præter victum exiccantem &
excalfacientem, etiam medicamenti aquam &
humores aquosos per aluū educantibus, vt dia-
carthamo & similibus, vteretur: deinde iis quæ
per vrinam tales humores educere valent: &
tertiò etiam iis vteretur quæ per cutem eos hu-
mores euocare possent. Suasi insuper vt ea ipsa
crebrius repeteret, quo, corpore toto ita probè
repurgato, & humiditas vteri cum exiccantibus
caloremque eiusdem vigorantibus corrigeretur,
ac retentiuua vis matricis simul roboraretur &
constringeretur; vt non solum fluxus ille dimi-
nueretur & cessaret, verùm etiam vt semen re-
cipere posset, ac receptum retinere. Imitabar
scilicet consilium illud 207. Montagnanæ pro
Domina cuiusdam strenuissimi militis, ad
fluxum vteri ab immoderata humiditate, cuius
causa sterilis esset. Tandem ad ea deueni quæ
fluxum illum album simul constringunt, & hu-
midita-

H 5

midita-

122 DE MULIERVM MORBIS,
miditates albas tollunt; qualia etiam apud eun-
dem Bartholomæum de Montagnana referun-
tur ad longum consilio 204. 211. 214. 215. 216.
217. in quibus consiliis multa & apta remedia
inuenies ad menstrua alba: quæ nunc breuitatis
causa omittimus; eadem etiam tunc domestico
Medico perlegenda dedimus, quibus etiam im-
mutatis pro suo iudicio uti posset.

SCHOLIA.

Signa de-
monstratiua.

Signa pro-
fluuij mu-
liebris.

Fluor mulie-
bris quibus
modis diffe-
rat à mensi-
u profluui-
o.

SIGNA verò profluuij muliebris demonstratiua
facile innotescunt, agram interrogando & inspi-
ciendo ea ipsa quæ ab utero prodeunt; præsertim si mu-
lier sentiat tales humiditates ab utero emanare. Sed
antequam ad curationem procedatur, diligentiore
examine opus est, non solum ex qua causa & humore
ortum habeat, verum etiam quomodo causa distin-
guantur, & quibus modis ab aliis affectibus & inter
se differant. Nam fluxus muliebris, ut Aëtius re-
fert lib. 16. cap. 67. ex Archigene, licet diuturna sit
uteri destillatio; ab eruptione tamen sanguinis differt,
ut in qua sincerus sanguis emanet: hic verò fluxus
corruptus apparet; diuersorum tamen colorum, pro
diuersitate redundantis succi, ut dicemus, qui etiam
citra dolorem prodit. Quapropter loci (teste Paulo)
continuo madent humoribus colore variantibus: labo-
rans decolor est, cibum non sentit, eumque fastidit, in
obambulatione difficulter spirat, oculos habet prætu-
midos, nunc cum dolore, nunc citra dolorem. Fluor
muliebris, inquit Fernelius, differt à mensium proflu-
uio, quod non sincerus sanguis, sed corruptum quiddam
prodeat,

prodeat, idq; continenter, aut nullo ordine, nulloque circuitu. Est autem id modo liquidum & albicans, lactis sero aut piisana cremori persimile, modo citrinū; modo pallidum; adeo acere ferè & adurens, ut quascumque partes attigerit, erodat haud leuiter: atque id rursum modo tetrum est & graueolens, modo odore nullo molestum. Ita & Aëtius loco citato: Hic fluxus corruptus apparet, atque interdum ruber, est q; ipsius sanguinis sanies; interdum albus, cremori piisana similis, à sanguine videlicet pituitoso excolatus; interdum pallefcit, ubi bilis amara redundauerit, saepe aqua modo liquefcit, quod à seroso excremento fit. Inferre quoq. solet hic fluor inenarrabilem tristitiam, & pedum tumorem: & in aliquibus perpetua destillatio perseuerat; in aliquibus per interualla quaedam redit, ut ex eodem constat. Paulus lib. 3. cap. 63. dicebat, fieri nunc cum dolore, nunc citra illum; aut cum exulceratione, aut sine illa, aut inflammata, aut sordida, aut pura. Verum aliquibus hoc vitium à toto corpore aliquando dependet, ut nunc ostendimus; in reliquis verò ab affectibus vteri. hæc cum vlcere vteri conuenit ferè; ob id distinguenda est. Distinguuntur autem ex consistencia recrementorum redditorum. Nam quas vlcus infestat, pus reddunt crassius, fetidius, albius: purgatio autem muliebris est velut ichor, aut serū. Differt etiam, quod mulieres quæ vlcus in vtero habent, maximè si in collo fuerit, congressum viri non patiuntur; aut si patiuntur, irritatur vlcus. Quæ verò menses tales patiuntur, nullam sentiunt in coitu molestiam. Quantitate etiam differunt. Maior enim copia serosæ substantiæ emittitur, quàm puris. At si purus sanguis, qualis ex dissecta vena, profluit & cum dolore,

Quomodo
ab vlcere
vteri distin-
guatur.

Quibus mo-
dis differat
à mulierum
feminali
spontanea
excretionē.

Signa car-
narum; &
quales succi
dominētur.

dolore, vteri erosionem indicabit; de qua antea sermo-
nem habuimus: nec tale profluvium muliebri appel-
lari debet: nam in eo vterus nequaquam affectus est;
in hoc proprio morbo laborat, qui erosio seu exulce-
ratio existit: item hic corruptus fluxus qui in mulie-
bri profluvio ruber apparet, ceu sanies sanguinis fit, vt
paulo antè diximus. Differt quoque, iuxta Benedictū
Veronensem lib. 26. cap. 11. à gonorrhœa, seu feminali
spontanea excretionē; cum hæc non sine titillatione &
voluptate aliquando fluat, vel ex debilitate vulvæ
contingat, vt De incontinentia seminis refertur, se-
minalibus vasis imbecilibus: quod enim tunc fluit, al-
bum & limpidum est, substantiæ mediocris, sine gra-
ueolentia: ac minus abundat, quàm rheumatismus
hic vteri; magisq; membra consumit, ac ocyus exter-
minat. At ex rheumatismo, seu fluore muliebri, vt
paulo antè dictum est ex Paulo, genitale ipsum sem-
per humore madidum est: ex seminis incontinentia
non semper humescit. In eiusmodi rheumatismo vte-
ri, turbulenta quoque & graueolens vrina demitti-
tur, crasso humore permixto. Purgatio itaque hæc
muliebri serosa est, quandoque bilis serum aut ichor,
quandoque pituita, & id frequentius quàm sanguis.
Rard fit à melancholia; aut si fiat, tandem cancer ex-
citatur in vtero, vt aliquando in praxi vidimus in
muliere Bononiæ, cum eam vnà cum præceptoribus
inuideremus. Prodeuntium odor (inquit Fernelius)
color, atque substantia floris speciem demonstrat.
Nam perpetuò id quod euacuatur, tale specie est, quale
est quod in animali redundat, vt liquet tertio De cau-
sis sympr. potissimum autem id, si mulier laxis sit car-
nibus, & pituitosa, ex eiusdem Gal. sententia 6. lib.

De

De loc. affectis. Qui itaque exquisitè colorem præ se fert aliquem, is redundantem humorem faciliè indicat. Et ita cognoscitur cuius sit humoris ichor, aut serum, à colore, qualitate, & totius corporis cacochymia. Nam si à bile fit, color est subflavus, & pallidus, humor acris; quam acrimoniam mulieres potissimum sentiunt in parte proxima externa, & in pterygiis. Et color quidem totus bile redundare videtur; maxime quando per consensum totius corporis fit; quod etiam ex moribus & victus ratione deprehenditur. quæ enim acribus vescuntur alimentis, & quæ natura sunt negotiosa, hanc affectionem patiuntur. Sin à pituita, color totius corporis albidus est, & magna quantitas defluit, sed minus acris; ut in hac matrona de qua nunc diximus Observatione precedente, eveniebat. Sunt autem & tales otiosa & desides, quæ hunc affectum patiuntur. A sanguine fiunt tales purgationes plerumq³, ut Rondeletius sentiebat, tantum cum mulieres uterum gerunt, vel quando suppressi sunt menses. tunc aliquando natura loco mensium serosum excretum reddit, quod utrumque rubescit, & tale est, quasi esset aqua paucò sanguine tineta. Tamen & aliis contingit ut animaduertimus, quibus nec menses restricti essent, nec quæ uterum gerebant. Si corpus sit plenum sanguine atro, erit purgatio fusca; vel si cancer iam factus sit, purgatio illa non multum differt à sanguinea, nisi quòd magis fusca est. Si verò obscurum colorem habeant, causam horum ita perscrutabimur: linteum eo inquinatum arefactum, simplici aqua eluemus, & inde à macula colore redundantis humoris notionem capiemus, inquit Aëtius. Si autem fiat sanguifica virtutis vitio, vel eius quæ te-

Si vitio sanguificæ virtutis fiat, signa.

nue

nue & serosum separat seu excernit, id cognoscet ex iis quæ de hepatica affectione, aut de renum affectibus conscripsimus. Inspissatam autem cutem probè ex te ipso percipies; neque magno labore retentricis, aut expultricis, facultatis lesionem, seu vitrarumq³, reperies.

Signa ex vitio vteri.

Ex viscerum aut totius corporis affectu.

Prognostica

Muliebri profluuium rarissimè virginibus accidit.

Rarius autem diximus ex vteri vitio fieri: si ita sit, cognoscetur si reliquæ partes bene habeant, & præcessit retentio mensium vel immodica purgatio, vel alia vteri affectio. Internoscuntur autem causæ, ex solo vteri affectu venire, iuxta Fernelium, si fluor sit parior, & eius affecti adsint indicia. At si ex viscerum totiùsve corporis affectu fluor sit, erit copiosus, nec malè affectorum viscerum notæ desunt. Ceterùm quod ad prognostica, ætate vigentes mulieres rubra fluxio serè comitatur, ex auctoritate Archigeni apud Aërium; declinantes autem candida: quarum utraq³ si suis ætatibus contigerit facilè curatur; sin alienis, difficulter. In omni verò defluxu os vteri aperitur, & veluti relaxatur. quibusdam etiam vterus ipse decidit, ut vsque ad muliebri pudendum progrediatur; vt vetula cuidam Delphensi longo tempore albo fluxu laboranti. Quamobrem magna cum diligentia curanda est affectio hæc, neque localibus auxiliis fluxus confestim reprimendus erit. Nam aliqua inde in hydropem, aliqua in neruorum affectiones, aut oris ventris, aut capitis, vexationes collapsæ sunt; vt liquet ex eodem Aëtio. Corpora equidem inuadit, quibus plurimo partu & coitu partes illæ laxiores factæ sunt; quamobrem rarissimè virginibus. Nihilominus tamen hic affectus non ætate maturas tantùm, verùm etiam virgines quas pallor decolorat inuadit; quo & puellam octauo ætatis anno Fernelius obsessam vidit, ac diu postea

postea grauius q̃ afflictam. His quoque accidit, quæ Quibus
autem po-
tissimum.
praua viuendiratione vtuntur, luxuosa quidem, sed
minimè exercitata. Vnde & nunquam visa agrestes
mulieres id pari, sed urbana: & inter eas, quæ sunt ma-
gis muliebri habitu & quæ sedentariam vitam perpe-
tuò degant. Diligentes in hac curatione esse debemus,
cùm saepe mulieres etiam ditissima consilium à nobis
petunt, ob multa incommoda quæ inde sequuntur.
Nam & coitu lædunt virile pudendū, & steriles sunt:
quoniam per humiditas partes (vt de muliere præce-
dente diximus) semen defluit, & laxius redditur os
vteri continuo affluxu, & minimè validum ad tra-
hendum semen, aut etiam continendum. Sed vlcerum
periculum est, & fœditatis. Sape etiam & pulchræ
mulieres hoc solo scædantur. Adde quòd faciem deho-
nestat, & corpus vniuersum: intumescit facies, &
oculi præsertim: pallet mulier, gracilis euadit, mœsta,
sine appetentia; pigritia adest immersa, lumborum
grauitas & dolor: maritis nullo sunt oblectamento.
Atque hæc affectiones difficillimè curantur, quia pars
illa promptè recipit aliarū partium excrementa, tum
ob situm inferiorem, tum ob multitudinem venarū eo
pertingentiū, tum etiam propter consuetā illam natu-
ralem purgationem. Post tales purgationes solent fieri
vlcera in vtero, & ab vlceribus fluxus immodicus san-
guinis. Si vlcera fiant arrodētia vel virulenta, à biliosa
materia; si putrida & sordida, à pituitosa; carcinomata
à melancholica magis eueniūt. Nulla frequentior mu-
lieri molestia affluit, nisi quòd à viris & sibi hoc pudendo-
rum madore perpetuò displicet. Non raro tamen ex
putredine in corpore, aut vtero, vel ex mista bile fla-
ua, aut seroso excremento, acrimoniam acquirit, &
partes

partes vteri vrit & vlcerat, & tandem doloris impatientia & atrophica enecat, & ob aliquem vteri affectum, alium ex vtero deprauatum infert. vtrumq; autem conceptum impedit: quia semen vel corrumpit, vel lubricando elabi compellit.

OBSERVATIO XXI.

De fluore muliebri post naturalem mensium purgationem.

VXORI meæ charissimæ, post mensium naturalem purgationem, contigit aliquando vt fluorem muliebrem modò tendentem ad naturam sanguinis, modò ad bilem, experiretur: & quia sæpe facies rubore inficiebatur, & venæ turgidæ essent, sanguinem bis aut saltem semel, in vere detraximus; & egregiè iuuabat. Et hoc est quod dicebat Aëtius lib. 16. cap. 64. Mulierem rubro fluore vexatam curaturi, primò ad sanguinis missionem vertemur, quæ non tantum ad vterum confluenti aduersatur, sed detentionem constrictionemque tutam efficit: nam multa sequerentur incommoda, si repente sanguinis vel cuiuscunq. defluxus impetum localibus præsiidiis reprimeremus, quemadmodum etiam de mensibus profluentibus diximus: nam ita quædam in hydropem vel neruorum morbos, aut oris ventriculi, vel capitis, inciderunt, eodem Aëtio teste. & sic item in hoc casu, si nihil obstiterit, id est, si quæ obstant non valde fuerint insignia, sanguis mittendus, ætate consentiente

tiante. Et ita vena basilica secta, pauco extracto sanguine, aliquando etiam partita non solum in mea vxore, verum in aliis egregie profuit. Purgauimus deinde eandem cum decoct. myrobal. citrinar. & puluere rhabar. adiecto syr. ros. ex infus. ros. rubrarum apertarum. Et quia in lumbis sæpe dolebat, loca renum frequenter inungi iussimus vng. ros. sed non ante purgationem totius corporis: nam vbi habitus vitiosus est, omnium primò castigandus est, & in suam naturalem constitutionem reducendus. Curato corpore, ad vterum veniendum: nam quemadmodum oculorum affectus non perfecte curantur, nisi corpus vniuersum curatum fuerit, sic neque vterus. Ideo bilem purgauimus cum medicamentis ad bilem facientibus, aliquo modo astringentibus, vt est rhab. myrob. succus ros. & earum syrupus, & quæ bilis acrimoniam frangunt. Dedi etiam aliquando pilulas ex rhabar. & myrobal. frequenter maceratas in succo ros. nam pilulis magis delectabatur. Conficiebam autem hoc modo: R. rhabar. electi frequentissime irrorati succo ros. ʒ ij. myrobal. citrinarum, chebul. indarum infusarum in succo ros. añ. ʒ j. mastiches ʒ j. spicæ ʒ ʒ. cum syr. ros. laxat. de quibus sumebat semel in hebdomada, in lecti exitu, duas vel tres, vel quatuor ad summum. Postea cum modicè distillaret, succida lana vino & rosaceo madente fouimus, summitatesque superiores, nempe brachia, vinculis deligauimus. quæ præsidia non solum in principio post venæ sectionem adhibet Aëtius, verum etiam post aliquot periodos

dos ante accessionem; in ipsa adeò accessione adhiberi possunt. Constat autem, mulierem coxis accliuibus collocandam esse, cruraque ad partes vteri colligendas extendenda & inuicem complicanda. Quod si sanguis copiosè deferatur, coxas, pectinem, & lumbos spongiis posca madefactis, inquit idem Aëtius, cooperiemus, si modicè, iam dictis fovebimus. Sed & leuiter vrinam prouocantia, & simul bilem contemperantia propinauimus, vt hoc vel simile decoctum: R. rad. cichorij cum toto, end. sum. mitat. lupul. borag. fumariæ, añ. m. j. lactucæ m. ß iuiubar. febesten rec. añ. nu. vij. capill. ven. polytrichi, añ. p. j. sem. anisi 3 ij. sem. quat. frigid. maior. añ 3 j. ß. flor. ros. rub. p. j. sem. pap. albi 3 j. fiat decoctio pro lib. j. coletur & sacch. dulcoretur, & arom. spec. triumfant. 3 j. ß. misce. Deinde bibebat vinum rubrum stipticum Gallicum; & rectè habebat. Dedi quoque ex hac mixtura, vel simili, ad magis restringendum: R. conseruæ rosar. antiquæ 3 j. ß. diacydon. sine spec. 3 ß. conseruæ florum cichorij 3 j. pul. triumfant. coralli rub. vsti & loni añ. 3 j. ß. cum syr. cotoneor. fiat mixtura. Vtero etiam abluto decocto hordei & lentium, cum pauco saccharo, postea etiam adiectis ros. siccis, adhibito insuper in fine fotu magis adstringente, tandem rectè habuit, optimo victu utens. Maximè iuuabat in fine collutio adstringens, moderatè refrigerans; quale illud est ab Aëtio commendatum: succus plantaginis, polygoni, stratiotæ, cydoniorum & mespilorū. Eiusmodi, inquit, collutiones non sunt omittendæ.

Vnum-

Vnumquodque istorum, iuxta eundem, rosaceo aut myrrino oleo perfundatur, fiatque in sessus in myrti, radicum rubi, malicōrij, & similium decoctis. Sed quia alia iuuabant, in sessionibus opus non fuit; neque etiam pessis, tum aliis præsidis, quæ ab eodem cap. iam citato lib. 16. recensentur.

SCHOLIA.

QUOMODO autem aquosus & frigidus humor collectus (si causa huius mali sit) curetur, iam ex parte diximus Obser. 20. precedente, ex mente Galeni. Sed si ulterius generis excrementum in causa sit, quomodo erit curandum? Respondet idem Iacchius: Erit abstinendum à calefacientibus, & purgandum corpus vniuersum, & ea quæ urinas ducunt propinanda, & frictiones totius cutis adhibenda, & victus instituendus, qui maximè ei humori repugnet. Semper tamen multa aquositas cum his admiscetur, & plerumque frigida, quæ tamen vel missione, vel putredine acquirit acrimoniam. Ideo in vxore, cum etiam bilis abundaret, vsi sumus rhab. & myrob. nam & hic conueniunt quæ bilis acrimoniam frangant, quæq; aquam illam biliosam purgent: atque etiam hic ex parte conueniunt illa quæ scripsimus superius conuenire immodicæ purgationi mensum ex bile corrodeute, aut venarum arrosione. Sic bile flaua redundante, hiera cum rhab. myrobal. citrin. decocto, ac syr. ex pluribus infusionibus ros. purganda erit agra. Sed hic abstinendum vult Rondeletius à diureticis, vel aperientibus, nisi in declinatione, aut curato corpore, & cum volumus ad urinas eos humores deriuare: tale

Bile redundante, quid faciendum.

apozema nobis commendat idem Rondeletius : R̄ ci-
 chorea, end. scariola, lupul. fumaria, cicla, mercuria-
 lis, lactuc. borag, añ. m. j. folior. brassica marina m. ß.
 passul. prun. sebesten, añ. par. xx. sena orientalis &
 medulla carthami, añ. ʒ ij. (sufficiet ʒ j. vniuscuiusque)
 flor. cord. p. j. anisi ʒ j. quat. sem. frig. maior. ʒ ij. ta-
 marind. ʒ j. fiat decoctio in sero caprino, vel in aqua.
 in lib. j. ß. dissolue succi ros. syr. end. simpl. añ. ʒ iiij.
 (sufficiet ʒ ij. vniuscuiusq₃) sacchari parum. fiat apo-
 zema media decoctionis. capiat in quatuor matutinis,
 vel iuxta quod aluum moueat. purgat enim aquosam
 materiam biliosam, & simul per renes. Si mulier sit
 delicata, arom^r cum sant. rub. Finitis syrupis, potest
 hac potio sequens sumi : R̄ decoct. glycyrr. ponendo ʒ
 ß. & polypodij ʒ j. myrobal. ʒ ij. Coquantur leuiter
 in vna parte apozematis ; in quartario vno colatura
 dissol. cathol. ʒ j. vel ʒ vi. syr. ros. laxat ʒ j. misce. In
 ditioribus loco cathol. accipe rhab. ʒ j. ß. Vel suman-
 tur pilula in Obs. precedente descripta. Conuenit &
 tryphera persica diasebesten. & reiterari possunt syr.
 vel apozemata, & purgatio. Sed in processu purga-
 tionis, quæ purgant & simul adstringunt magis con-
 ueniunt, quia minus deducunt recrementa ad partem
 affectam, & eandem corroborant & siccant. A pur-
 gatione, ea medicamenta exhibeantur, quæ propriè
 vrinariæ, id est, vrinam cientia dicuntur, quorum silua
 à Gal. scripta est lib. 5. De simpl. medic. facult. calida,
 inquam, ac sicca existentia. Sed hic queritur, quo-
 modo faciant ad vsum, quæ vrinam cient? Siquidem
 omnia cient menses. Mouebunt ergo hoc profluium,
 non sistent. Respondebimus: Ea quæ propriè vrinatiua
 dicuntur, non mouent menses, vt ex Galeno accipi-
 mus;

Num vrinā
 cientia hīc
 conueniunt.

mus; sed potius cohibent, dum sanguinem siccant
 & crassant. Quod si ad ducendos menses aliquando
 utamur, hoc est ex accidenti, quatenus obstructions,
 quibus detinebantur, tollunt. Contra, (inquit etiam
 Iacchinus) si vrinas ducunt liquando vel separando aquo-
 sum, ut Galenus vult; ita ergo sanguis liquatus, & aquo-
 sus humor, feretur ad vterum, sicut ad vesicam: quare
 augebitur affectus. Respondendum, Non fertur ad renes
 humor ille, sed trahitur, prout liquidior sit: ad vte-
 rum autem, neque sponte fertur, nec trahitur, sed
 traditur à natura: facile ergo auerri potest in partes
 alias. Et sic ab his (ut etiam dicebat Donatus) sanguis
 non extenuatur duntaxat; sed & funditur, ac secer-
 nitur; non secus atque lac, quod coagulatur; seroso
 videlicet, & tenui seorsum segregato, crasso verò in sese
 coeunte; siquidem quo facillimè ad se attrahant renes
 quod in sanguine aqueum, tenueq; , ac serosum est.
 Vtraque hæc conferunt, nempe totius sanguinis pri-
 mum fusio, deinde segregatio; quorum neutrum abs-
 que valido calore peragi queat. Hæc itaque peculiari-
 ter ab eodem Galeno ibidem Vretica, siue vrinam mo-
 uentia appellantur, non quia solum moueant vrinas,
 sed quia solas absque vi, etiam menses, aut lac: inter
 quæ apium, atque asarum eligens, mulieri de qua an-
 tea dictum est, eorundem decoctum in aqua exhibuit.
 Hæc namq; per vrinam humorem, qui per vterum
 expurgabatur, deriuando etiam euacuant, ut ipse te-
 statur, cum hoc quod neque mense sciunt, ut quibus-
 dam Arabicis falsò visum est, & renes occlusos libe-
 rant; si id quoque talis affectio, vel muliebris proflu-
 uij causa fuerit: nec minus & per totius corporis fri-
 ctiones humor quoque euacuandus est. Et si ex cute

spissata adhuc talis affectio fuerit orta, iisdem frictio-
 nibus rarefiet; quæ primò mollibus linteis, demum
 asperis faciendæ sunt, vt ex Galeni mente antea ex lib.
 De præcogn. ad Posthumum, diximus. His quippe
 medicamentis vniuerso corpori adhibitis, intacto qui-
 dem utero, huiusmodi muliebres fluores Gal. sanauit,
 vt 6. De loc. aff. scriptum est. At in biliosis minus ca-
 lidis vreticis vtendum est, vt iam ex Rondeletio quo-
 que ostendimus, nisi in fine, aut corpore saltem repur-
 gato, & humoribus acerbis ac biliosis contemperatis
 &eductis. Queritur etiam hic, num astringentibus
 vtendum? Respondetur quòd sic, dum tempestiuè vta-
 ris, postquam corpus vacuatum fuerit, & per ea quæ
 reuellant, & deriuant. Tunc enim assuescit natura
 per cõuenientes regiones quotidiana excrementa mit-
 tere: quare non ludent retenta. At inter initia vti,
 incommodum: neque vehementer iis vtendum. Nam
 via est naturalis purgandi, ne fortè supprimantur
 menses. Et ideo vbi hac non suffecerint iam supradi-
 cta, & muliebri profluuio perseuerauerit, ea exhi-
 benda sunt, quæ de mensium profluuio scripsimus ad
 retentionem conferre: quorum latissimum campum
 habes etiam apud Aëtium lib. 16. cap. 68. Potissimum
 tamen ea eligantur, quæ non admodum efficacia ex-
 istunt; item portulaca commanducata, succuq; ipsius
 potus presidio est: balauitium, rubi fructus, vt inquit
 Paulus. nec minus & equisetum sistit rubrum fluo-
 rem (qualis hic subinde erat in vxore mea) potum ex
 aqua aut vino: vel hypocisthid. aut lentisci fructus tor-
 re factus cum vino. Samius aster, terra lemnia, sphra-
 gis appellata, coagulum leporis aut hœdi, aut ouis, aut
 vituli, aut cerui, confert: vua immatura sicca, picea
 cortex

Quæ medi-
 camenta à
 purgatione
 competunt.

cortex & myrti, & pœonia grana pallida quindécim
assidue pota, aut corall. 3 j. è vino nigro, aut vinacea
trita cum vino; aut corticis loti arboris decoctum,
Aërio teste, præcipue ad fluorem album aut serosum;
& iuxta Gal. 10. De simpl. med. facult leporis coagu-
lum, si cum aceto ebibatur, sanat profluuium mulie-
bre. Quid si cum dolore fluxus deferatur, asininum
lac, præsertim asinæ per pascua pratorum nutritæ,
quicunque fuerit succus, præstat. Confert etiam (vt
antea quoque retulimus) stercoreis eiusdem asinæ suc-
cus; similiter & alicæ aut ptisanæ succus, & rosaceum
quoque vel per se, vel cum lacte infusum. Ne verò ab
humore transeunte vlcus excitetur, sanies profluens
assidue calida aqua eluatur, & ipsis locis moderatè
astringentia adhibeantur, quæ simul abstergerendi vires
habeant; deinceps rosaceum aut myrteum aut meli-
num oleum illinatur, & aqua etiam pura, nihil ad-
stringens habens admixtum, in principio præsertim,
adhibeatur, ob influentis humoris acrimoniam: nec non
& ob eandem causam & alicæ, & oryzæ succus in-
fundatur, ex eiusdem Aërij consilio. Ceterum ubi flu-
xus cessauerit, à veloci ambulatione, à multis pectinis
ac lumborum frictionibus, ab acrimie esu, à calefacien-
tibus, à flatuosis, & ab his quæ vrinam prolestant, diu
abstinendum est; & balneis raro vtendum; neque ven-
ter mouendus est, neque spiritus retinendus. Hæc enim
omnia malum reuocant, vt idem inquit Aërius. Quæ
fortè præcepta (inquit Donatus) Boëthi vxori Gale-
nus instituit, postquam ab eodem affectu ipsam vin-
dicauit, ne in posterum amplius eo morbo egrotaret,
ab eodem Boëtho rogatus, prohibens, ne illi simile
quod vacuauerat, in futurum aliud gigneretur.

136 DE MULIERVM MORBIS,
Nunc verò tempus est vt ad alia exempla earum quæ
à nobis curatæ sunt, porrò progrediamur.

OBSERVATIO XXII.

*De proflauio muliebri in muliere ad-
modum biliosa.*

MATRONA admodum biliosa, bile præ-
dominante magis quàm in mea vxore,
menstrua alba patiebatur, quæ colore flauo etiã
linteolam inficiebant. Primò igitur materiam
communem aggrauantem hoc medicamento
leniente eduxi: & cassiæ recens extractæ ℥ j. pul-
pæ tamarindorum ℥ j. β. myrobal. citrinat. subti-
liss. puluerisatarum ℥ j. saccharo asperso fiat bo-
lus. cepit in diluculo. Deinde hunc syrupum
quinque diebus continuis propinauimus: & syr.
de succo acetosæ ℥ j. β. syr. ex ros. siccis, syr. myr-
tini, mellis ros. colati, añ. ℥ β. aquæ plantag. ace-
tos. end. añ. ℥ ij. misce pro duabus dosibus.
In istis syr. tria complectebamur; alterando vide-
licet intemperiem calidam totius, ac hepatis
præcipuè generantis bilem; etiam corrigendo
materiam aquosam, & quasi pituitosam per
mel rosaceum, quæ semper nonnihil peccat etsi
à subdominio in his superfluitatibus biliosis; ter-
tiò vt quædam stipticitas in membris & humo-
ribus relinqueretur, propter fluxum biliosum:
nam eiusmodi tres intèriones hîc erant spectan-
dæ, vt rectè etiam Benedictus Fauentinus præ-
ceptor meus in sua Empirica cap. proprio anno-
tauit. Deinde illam ita purgauimus: & diacatho-
lici

lici 3vj. elect. de succo ros. 3j. β. rhab. electi 3ij.
 sine spica, (nam magis aperit) myrobal. citrin. 3
 β. cum 3ij. decoct. com. florum & fructuū, ad-
 dēdo syr. ex infus. ros. pallid. 3β. misce. fiat potio.
 Deinde ablata iam causa antecedente, syrupis
 adhuc semel reiteratis, & sumptis pilulis in præ-
 cedente Obs. dictis; iniecto quē cremore hordei
 cum succo plantag. & mucilag. cotoneorum,
 (nam ex acrimonia bilis sentiebat ardorem in
 collo vteri) & exhibita emulsione sem. 4. frig.
 maior. & pap. propinaui & illud quod erat se-
 cretum præceptoris mei, quo multas curauit
 mulieres. Præcepi nimirum vt ieiuna hunc prius
 bolum per sex horas ad minus ante cibum su-
 meret; deinde potum per 15. dies: & albuminis
 oui recentis & non cocti num. ij. thur. masculi,
 boli arm. terræ sigill. añ. 3β. pulueris entur pul-
 uerisanda, & misce, ac patienti exhibeatur: &
 vini rub. stiptici extinctionis chalybis pluries in
 eo 3iiij. gummi arab. tragac. añ. 3β. misce, & fiat
 potus. Detur in diluculo. Hæc erant præcipua ex
 suis arcanis & secretis: & egregiè sæpe iuuabāt.

SCHOLIA.

Cum ex bile, & præcipuè biliosis mulieribus hæ
 superfluitates contingunt, his quidem omnia
 sicca magis quàm humida conueniunt: frictions loco
 exercitiij, antequam surgant, vtilis sunt. biliosus hu-
 mor contemperandus est, tum expellendus ac euacuan-
 dus remediis iam sæpe dictis. Conueniunt syr. de ribes,
 myrtill. cotoneorū cum aqua end. portul. & plantag.

I 5

conuenit

Historia
profluuij
menstruorū
alborum
curati.

138. DE MVLIERVM MORBIS,
conuenit & ʒ j.ß. rhab. infusi in aqua hordei, & ex-
pressi. intus verò panni linei infusi in aqua decoct. alu-
minis laueni; tum alia in Scholio precedente dicta.
Inueni in arcanis M. Iohannis Tiengy, quondam Me-
dicum Amsteladamsensem anno 1538. suam vxorem
curasse in fine mensis Maij, cum laboraret fluxu men-
struorum alborum in tanta copia, vt vires deficerent,
cum multa inflammatione ac sudore copioso, hunc in
modum: Primò descripsit pullum decoctum cum her-
ba acetosa & sem. eius, & cum ʒ ij. sumach ligatis in
nodulo. quod ins paratum cum vino rubro & vitellis
ouorum sumebat pro virium restauratione. Vtebatur
etiam vitellis ouorum frixis in patella cum mentha,
gallitrico, nepita, & costo vulgari, herba acetosa, tam
in prandio quàm cena: diu prius sumendo vitella ouo-
rum. Manè capiebat vinum rubrum & cereuisiam
Hamburgensem vel Collibegensem, cum duobus vi-
tellis ouorum simul cocta, pane modico intrito. Quod
ad medicamenta attinebat, inprimis sumpsit hanc in-
fusionem: R̄ rhabar. selecti ʒ j. agarici optimi ʒ ß. spi-
ce zinç. parum; minutim incidantur, & infundan-
tur in aqua end. & lupul. & post horas xij. fiat ex-
pressio: cui addantur medulle cassie recens extracta ʒ
ß. oxymellis simplicis ʒ ij. misce; fiat potio. Eduxit
quinq̃uies. Omni quoque mane & vesperi per horam
vel duas ante cenam sumebat cochlear vnum istius
pulueris permixti cum saccharo: R̄ farina glandium
ʒ ß. ossium capitis caponum, & faucium lucij combu-
storum, ossium dactylor. añ. ʒ j. sem. coriand. præp. ros.
siccar. anisi torrefacti, rad. nenuph. citrina exicc. añ. ʒ
ij. rasura eboris ʒ j pulueriscentur subtiliter. detur cum
cyatho vno istius potionis: R̄ pilosella, rorismarini,
lentium

lentium excortic. cauda equina, rosar. cum capitib.
 melissæ, menthæ, bursa pastoris, plantag. añ. m. j. ra-
 diciis consolid. maioris, rad. nenuph. citrina, rad. sigilli
 beate Mariæ, añ. 3 j. semin. agni casti, carpobalsami,
 schœnanthi, gran. myrti, rad. cyperi, sem. acetosæ, su-
 mach, añ. 3 j. contundantur crasso modo; decoquan-
 tur in vino rubeo & aqua acetosæ pro lib. i. pro qua-
 tuor vicibus. Postea exhibuit hanc infusionem: R cor-
 ticum myrobal. chebul. 3 j. citrinor. 3 j. tragac. gum-
 mi arab. añ. 3 β infundatur in aqua plantag. & aceto-
 sæ per horas 18. postea fiat expressio; cui addatur dia-
 cathol. 3 β. & eduxit bis satis copiosè. Deinde iterum
 utebatur 6. vel 7. diebus porione & pulvere. & denuo
 sumpsit infus. myrob. & spina dorsi tota inungebatur
 manè & vesperi hoc vng. R ros. cum capitibus, su-
 mach. sem. acetosæ, plantag. bursa pastoris, granor.
 myrti, añ. 3 j. contundantur crasso modo, bulliant in
 aqua plantaginis & acetosæ pro 3 j. exprimatur, cui
 addantur oleorum ros. myrtini, añ. 3 j. bulliant simul
 ad consumptionem aquæ, & cum modico cereæ fiat
 vng. molle. Postea iterum dedit hanc infus. R rhab.
 electi 3 j. corticum myrob. chebul. 3 β. infundantur in
 aqua plantag. acetosæ, post 18. horas fiat expressio. Et
 re urgente hoc cataplasma umbilico appositum est,
 vndique ad latitudinem manus, quo maximum sensit
 leuamen, & sanari cepit: R gypsi 3 j. boli arm. 3 β.
 pulueriscentur subtiliss. & cum albumine oui & aceto,
 fiat cataplasma, quod ponatur supra stuppam cum
 mediocri spissitudine, & applicetur, & cum exicca-
 tum fuerit, iterum humectetur. Est Bartholomæi
 de Montagnana.

OBSERVATIO XXI II.

De fluore muliebri aquoso & pituitoso.

MULIER pituitosa, alba & pallida, menstruis albis supra modum inficiebatur ex materia pituitosa & aquosa: in qua & metus erat de leucophlegmatia: nam & illud quod emanabat, à pituita originem habebat. Hæc cùm consultandi causa ad me accederet, vt hoc ordine medicamentis vteretur, consului. Primò vt materia hoc modo cōcoqueretur post leuem euacuationem seu minorationem materiæ: & diasebesten lenitiui ʒvj. diaphœnici ʒij. aquæ artemisiæ ʒiij. mellis ros. colati ʒj. misce. Syrupus talis sit: & syr. de eupatorio, de artemisia, de rad. añ. ʒj. β. aquæ artemisiæ, agrimonix, nepitæ, añ. ʒij. misce pro duabus dosibus; adiecto cinnamomo ad ʒj. & pul. spec. diamoschi dulc. ʒj. ori suauius reddatur. eoq̃ue finito: & pilul. de hiera, agarici trochis. añ. ʒβ. cum melle ros. fiant pilulæ vij. dentur in exitu lecti. Fiat & tale apozema: & rad. petros. fœniculi, cyperi, valerianæ, rubiæ tinctor. añ. ʒβ. absinthij, hyssopi, artemisiæ, melissæ, nepitæ, menthæ, añ. m. j. pulegij, cassuthæ, valerianæ, añ. m. β. sem. anisi, carui, fœniculi, dauci, añ. ʒj. β. brassicæ marinæ m. β. spicæ nardi (exiccat enim humiditatem) ʒj. β. cicerum rub. m. β. stœchados, florum chamæmeli, roris-marini, añ. p. j. coquantur in aqua communi pro lib.

lib. j. β . col^a adde syr. de absinthio, de eupatorio,
 de artemisia, añ. \mathfrak{z} j. sacchari parum ad saporem,
 depuretur; additis \mathfrak{z} ij. cinnamomi selecti, & \mathfrak{z} j.
 spec. diambrae, iucundiore & odore & sapore
 reddatur. Utatur diebus quinque appetente di-
 luculo. Postea purgetur cum \mathfrak{z} β . diacarthami in
 tabulis. Vel si pilulis delectetur, & pilul. aggre-
 gat. cochiar. de agarico, añ. \mathfrak{z} j. cum aqua beto-
 nicæ fiant pilulae vij. altero die sumat mithrida-
 ticæ confectionis, theriacæ, añ. \mathfrak{z} β . scobis eboris
 \mathfrak{z} β . misceantur; & postridie post purgationem
 manè sumantur sex horis ante pastum. Potest
 etiam sumere decoctum apij & asari, ut Galenus
 faciebat. Utatur deinde condito seu electuario
 sequenti: & conseruæ roris marini \mathfrak{z} j. β . conseruæ
 florum betonicæ, stæchad. si haberi possent, añ. \mathfrak{z}
 β . pul. diarod. abb. aromⁱ ros. sine moscho, dialac-
 cæ, diacurcumæ, añ. \mathfrak{z} j. cornu cerui, coralli rubri
 vsti, añ. \mathfrak{z} iiij. concharum marinar. vstarum &
 lotarum in vino \mathfrak{z} j. cum syr. conser. corticum ci-
 tri q. s. fiat elect. molle. capiat ad magnitudinem
 parvæ castaneæ. Conuenit hîc etiam uti balneo
 naturali, ut sulphureo aut aluminoso, manè &
 vesperî ante pastum per dies decem. Verùm ubi
 non sunt, tale parari potest: & foliorû lauri, ori-
 gani, calaminthæ, pulegij, menthastri, sabinæ, añ.
 m. iiij. artemisiæ, melissæ, nepitæ, betonicæ, sam-
 psuchi, añ. m. iiij. rad. rubiæ tinctorum, cyperi,
 añ. \mathfrak{z} iiij. rad. rusci, asparagi, añ. \mathfrak{z} ij. spicæ nardi,
 iunci odorati, añ. \mathfrak{z} ij. sem. rutæ, dauci, anisi, scæni-
 culi, seseliôs, añ. \mathfrak{z} β . rad. valerianæ \mathfrak{z} ij. coquan-
 tur in aqua pro balneo, quo irrigetur & se lauet.

Viden-

Videndum tamen, quòd si valde fluant humi-
ditates albæ, ne concitator fiat fluxus, vt stiptica
magis addantur. Aliquæ lotionem recusant; & si
hæc matrona idem faciat, calentis decocti præ-
dicti fumum per infundibulum in vterum reci-
piat. Quòd si his remediis fluor non vincatur,
rursus semel in hebdomada accipiat has pilulas:
℞ pilul. mastich. agarici trochil. añ. ʒ ij. cortic. my-
rob. chebul. ʒ ij. excipiantur melle ros. & è ʒ j.
fiant pilulæ vj. dentur iij. pro vice. Fiat & pessus
ad vteri repurgationem: ℞ artemisiæ, sampsu-
chi, dictamini, absinthij, añ. ʒ β. corticis olibani
ʒ j. puluerisatis & exceptis cum succo mercuria-
lis, fiat pessus. demittatur in vterum. Quòd si
fortè magis fluat, tunc astringentibus vtendum
tam per os, quàm etiã intus muliebribus im-
positis, vel infusis. Et vbi hæc affectio inclinaue-
rit, quod ex humore perquàm pauco effluente
cognoscetur, vt prorsus exsiccentur, sequenti
pessu vtetur: ℞ acaciæ, balaustiorum, cucullarũ
glandium, menthæ, olibani, spicæ nardi, añ. ʒ j.
β excipiantur succo polygoni, aut millefolij, aut
plantaginis, vel sanguinariæ; hisque omnibus
linceo raro inuolutis, fingatur pessus, qui filo
coxæ alligatus in laborãtis pudenda immittatur;
muteturque quotidie, recenti alio imposito. Suc-
cini farina cum sorbili ouo detur. Hæc sunt quæ
ad album fluorem prosunt; & præcipuè hic pul-
uis, quo multæ matronæ nobiles, post vniuersa-
lia remedia, sanatæ sunt: ℞ faucium lucij, capitis
caponis exiccat. in furno, añ. ʒ β. osium dacty-
lor. ʒ ij. coriand. præpar. sem. anisi torref. añ. ʒ j.
rad.

rad. nenuph. 3 β. sacchari ros. 3 iij. datur 3 j. cum
vino rubro. Hæc nobili viro pro eius vxore cu-
randa pro consultatione dedimus, vt iis vtere-
tur cum Medici sui domestici consilio.

SCHOLIA.

Hi s verò vniuersa victus ratio ad caliditatem &
siccitatem & potus paucitatem inclinare debet,
abstinendo ab humidis, vt iusculis, & multo potu, &
ab his quæ humorem aut serum generent. Præterea
hisdem curantur quibus vxor illa Baethi, de qua prius
dictum est. Et sic si sit à toto, deponendo, secundum
alios, seu minorando materiam noxiam: secundò di-
gerendo & eradicando illam: tertio hepar confortan-
do, vt possit bonum sanguinem generare. Minoratur
hoc modo: R. pilul. aggreg. 3 ij. agarici trochis. 3 j.
fiant pilul. v. dentur ante diem per horam. Digeratur
hoc modo: R. syr. de eupator. mellis ros. colati, añ. 3 vj.
syr. de end. 3 ij. aquæ absinthij, capill. ven. cichorij, añ.
3 j. purgetur hoc modo: R. diacarb. 3 v. diaphœnic. 3 j.
β. elect. andi maioris 3 ij. dissolue in 3 iij. decoct. flor. &
fructuum melissæ, absinth. passul. ab arillis repurg. li-
quir. ras. sebesten iuiub. adiect. 3 β. mell. ros. colati. Vel:
R. pilul. indar. 3 β. aggregat. 3 ij. fiant pilula v. vel vj.
Si à capite minoretur materia hoc modo: R. pilul. scæ-
tid. cochiar. añ. 3 j. hieræ parum, fiant pilul. v. dentur
hora secunda post cenam. R. syr. è stæchade, mellis ros.
colati, oxymell. simpl. añ. 3 β. aquæ betonica, melissa,
bugloss. añ. 3 j. misce. Eradicetur hoc modo: R. pilul.
scætid. cochiar. agar. trochis. añ. 3 j. cum syrupo è stæ-
chade fiant pilula v. Vngatur nucha oleo cossino cum
lectum

Curatio
muliebri
profluuij ex
pituita.

A toto.

A capite.

Ab utero:

lectum serò intrabit, & hic pul. capiti inspergatur:
 R^z corticum thuris, mastich. sandaracæ, stæchad. arab.
 cubeb. ros. rub. añ. ʒ. ʒ. fiat pul. subtilissimus. Si ab ute-
 ro: R^z pilul. foetid. ʒ. ʒ. pul. bened. ʒ. j. fiant pilule quin-
 que; dentur manè: R^z syr. de artem. mellis ros. colati,
 oxymell. simplicis, añ. ʒ. ʒ. aquar. artemis. melissæ, adia-
 zhi, añ. ʒ. j. misce. R^z pilul. foetid. aggreg. pil. de bene-
 dicta, añ. ʒ. j. diag. gr. j. fiant pilule viij. Istis intentio-
 nibus peractis, mundificetur uterus, & roboretur pecto-
 re ex herba mercuriali, adiecto melle; vel solo melle cum
 bombace, vel ablucendo hydromel. ʒ. vi. mellis ros. colati
 ʒ. ij. & sumen & pectinem inungendo oleo liliaceo, spi-
 cato, & costino simul mixtis. Alij hoc modo fluxum
 muliebrem aquosum ex pituita curant, primò pur-
 gando medicamentis pituitam purgantibus, ut agar-
 carth. elect. de citro sol. diacarth. & concoquunt ma-
 teriam, & modicè calidis, ut melle ros. syr. de artemi-
 sia. Post primam euacuationem syr. de absinthio, &
 alijs quibusdam leuiter adstringentibus, ut in hunc
 modum: R^z pilul. de hiera, vel de arom. añ. ʒ. j. agar-
 trochis. ʒ. j. ʒ. cum melle ex ʒ. j. fiant pilule vi. vel viij.
 in exitu lecti capiat. Postea tantum tres vel iiij. Dein-
 de R^z mell. ros. colati ʒ. ij. syr. de stæchade, de artemis.
 añ. ʒ. j. aquar. beton. hyss. absinth. añ. q. j. misce. arom.
 cum ʒ. j. diarod. abb. vel arom. ros. usq. finitis, R^z pi-
 lul. aggreg. foetid. cochiar. añ. ʒ. j. cum aqua artemis.
 fiant pilule. R^z decoct. hord. ʒ. ij. mellis ros. colati ʒ. j.
 pro absters. medicamenti. & altero die capiat ʒ. j. the-
 riaca mediæ ætatis vel mithrid. v. horis ante prandiu.

Purgatio, si
 serofus hu-
 mor vel suc-
 cus serofus
 abudauerit.

Si serofus humor abundet, purgetur pilulis ex hiera, &
 agarico vel potione myrobal. thebul. syr. ex multiplici
 infus. ros. rub. vel persicarum. Quod si neque vna pur-
 gatio

gatio satis sit, iteranda quoque eadem erit, in minori tamen quantitate; quemadmodum Galenus in vxore Boëthi fecit, primò (vt diximus) medicamento vtens aluum educente, secundo eis qua vrinam educerent, tertio qua per cutem humores aquosos euocabant; quibus remediis (vt paulo antè diximus) quindecim diebus cum vsus fuisset, prorsus prædictam mulierem à morbo vindicauit; & proinde Boëthius quadringentos aureos ad illum misit. Rursus si pituitosus fuerit sanguis, nedum hiera, agar. & myrobal. purgare conuenit, verùm etiam reliquis insignioribus medicamentis pituitam per aluum educentibus, vt cataportis scetidis, ex sagapeno aut agarico compositis, vel etiam iis qua ad hydropem facere conscripsimus: prius tamen ea sunt adhibenda medicamenta, qua iam dictam pituitam conquoquere ac præparare valeant. A purgatione ad vretica deueniendum, de quibus satis dictum est, & ad topica remedia, etiam in fine adiectis adstringentibus, si fluxus perseveret, vt iam satis docuimus Scholiis præcedentibus. Quidam & hic post purgationem laudant stuphas sudorem euocando, humiditatem trahendo ad cutem; vt Rondeletius, qui & vomitum ante cibum vel à cibo commendat, multoq; magis quàm euacuantia; cum fiat auersio in contrariam partem. Si sit ex materia melancholica, & habeat aliquam acrimoniam, velut biliosa curanda est; nisi quòd in euacuationibus vti oportet purgantibus melancholiam, vt epith. cuscuta, thymo, folliculis senæ, decoct. mercurial. & aliis, vt etiam syr. fumar. cum syr. de end. qui magis conueniant: nam syr. alij melancholiam concoquentes calidiores sunt, quàm vt hic conueniant. Supra partem addi possunt metallica,

K

quibus

Si pituita
abundet,
purgatio.

Si ex ma-
teria melan-
cholica.

Quæ in om-
nibus causis
profunt.

quibus in carcinomate palliando vti possumus, vt vng.
ex pomphol. cerusa, tuthia, antimonio, lythar. nutritio,
& similibus; ex his conficiendo vng. empl. cum oleo
myrt. & aceto. Si nulla sentiatur acrimonia, vsurpari
possunt remedia ad pituitam praescripta, id est, quæ
calescunt & exsiccant. In omnibus causis pilula de
bdellio conueniunt: sed quia multa sunt descriptiones,
accipienda est ea, secundum Rondeletium, quæ conchas
venereas recipit. Hæ pilula exsiccant omnia vlcera in-
terna, neque laxant, sed potius constringunt. Vinca
peruinca decoctum ad fouendas partes multum con-
uenit, & in pituitosa lixiuium in principio; in pro-
cessu lixiuium cum paucis alumine magis prodest. Bal-
nea omnia naturalia ad id sunt vtilia, vel quæ arte
parantur ex alumine, sale, vel chalcitide, vel ex lixiuiis
& decoct. herbarum, rad. & florum resiccantium.
Vt: B. lixiuij parati ex cineribus ilicis, vel quercus, vel
ficus, vel cannarum, q. s. ad encathisma conficiendum,
in quo decoque rad. bistortæ & lapathi acuti, añ. lib. ij.
corticis malignati, gallarum, suberin, añ. lib. i. ros.
rub. p. ij. fiat decoctio, in qua dissolue salis communis
lib. ij. aluminis lib. j. chalcit. lib. ss. fiat encathisma; quod
& valebit ad procidentiam ani & vteri. Vtantur potius
encath. quam balneo, quando constringendum est:
balneo autem, quando sudor prouocandus. Et post om-
nia alia remedia, vtatur hoc encath. longè à mensium
purgatione, ne retineantur. Idem encath. valet in
fluxu sanguinis seroso, vel immoderato fluore à rari-
tate venarum per diapedesim. Sit tepidum tantum,
& diutius sedeat in eo, reiectis excrementis alui &
vesicæ. Potest etiam fieri lixiuium ex cineribus concha-
rum vstarum, vel sarmentis, vel piro siluestri, vel aliis
arbo-

arboribus astringentibus, vt sorbo, corno, & similibus.

Ad menstrua alba hac commendantur à Rondeletio:

Ad men-
strua alba.

℞ folior. clemat. daphnoidis, añ. m. j. herbarū vatipicri,
& hedera, añ. m. s. fabar. integrarum num. x. hordei
integri leuiter torrefacti p. j. ros. rub. p. s. fiat decoctio
in aqua artemisia, vino rubro, & aqua cisterna, ad
lib. ij. misce. foveatur locus, vel fiat injectio in vuluam,
& hoc remedio sistentur menstrua alba. Proderit ta-
men vti suffumigio sequenti, post solum vel injectio-
nem: ℞ gallia moschata, & alipta moschata, añ. 3 ij.
ladani, hypocistid. añ. 3 j. styracis, beniouini, ligni aloës,
santal. omnium, añ. 3 j. nucis moschata, macis, caryo-
phyllorum, añ. 3 j. mucag. gummi tragac. q. s. fiant
trochisci, addendo modicum carbonis salicis: & post ex-
iccationem inungatur oleo moscharelino, vel nardino,
& recipiat fumum per emborum, post exactam pur-
gationem menstruam. Deinde apponatur empl. se-
quens: ℞ emplastri pro matrice 3 iij. rad. bistorta,
musci quercus, añ. 3 iij. fiat emplastrum rotundum,
applicetur regioni vteri, post exactam purgationem
menstruorum, vsque ad tempus purgationis, quod
tunc auferatur. Oboritur autem ob virosam hunc hu-
morem circa pudenda faetor quidam, propter quem
vxor à viro plerumq; fastiditur, vulua quoque lubri-
ca fit, & dilatatatur, quo fit, vt genitale profluvium re-
tineri non possit. Viriq; autem affectioni in hunc mo-
dum succurrendum: ℞ symphyti, balaustiorum, rhois
opsoniorum, seu sumach, baccarum myrti, aluminu,
boli armena, añ. q. v. horum pars vna in puluerem re-
digatur, pars altera decoquatur in vino adstringente,
& pauco aceto. Decocto calido vulua saepe foveatur,
pulvere verò post solum insperso: deinde lintheum ma-
defactum

defactum in vino, quo dicenda proximè excepta sint, admoneatur: & gallia moschata, nucu moschata, añ. 3 ij. caryophyll. 3 j. β. moschi 3 β. excipiantur vino, in quo calefacto linteum madesiat, fiatq; ut dictum est. Præterea gossypij lanugo, aut linteum in prædicto vino madesactum, in vterum, in modum pesti, demittatur per noctem, manè auellatur. Hæc dicta sufficiunt de superfluitatibus albis matricis & corrigendis & sanandis.

OBSERVATIO XXIII.

De muliere laborante gonorrhœa.

MULIER valde formosa cum ab aliis examinaretur fluore muliebri laborare, à me iudicata fuit gonorrhœa affici: nam semen album, limpidum, mediocris substantiæ, sine graueolentia emanabat, subinde, non continuò; & membra citius ac ocius consumebantur, quàm in vteri fluore. Ideo præscriptis iis remediis quæ vasa seminaria roborarent, & simul materiam spermaticam infrigidarent, exiccarent, & incrassarent; non certè cum iis procedendo quæ sperma multiplicarent, sed potius ea propinquo quæ semen manifesta qualitate imminuerent. Et quia utcumque biliosa erat, hoc imprimis minoratiuū exhibui: & cassia recens extracta 3 j. elect. de succo ros. 3 j. β. pulpæ tamarind. 3 j. fiat bolus. Deinde syr. incrassantibus his utebar: & syr. myrt. cotoneor. de portulaca, añ. 3 β. aquæ plantag. portulacæ, acetosæ, añ. 3 j. misce. Iis ter quaterve repetitis, hanc purgationem exhibui: & seminis plantag.

plantag. sem. acerosæ, agni casti, coriand. præparati, añ. ʒ ij. myrobal. citrinar. ʒ iij. bulliant in aqua chalybeata, & in ʒ iij. adde syr. ex infus. ros. rub. ʒ j. rhab. selecti ʒ j. misce. detur in auro-
ra. Ter excrevit. Postea quia ardorem sentiebat, aliquot diebus intermissis, cepit ʒ iij. lactis ouili, & succi plantaginis ʒ ʒ. prius ebulliti, ac chalybati, addendo ʒ j. boli arm. veræ. Vtebatur & hoc electuario, vel hac mixtura, capiendo manè ʒ ij. & conser. ros. ʒ j. cornu cerui vsti, farinæ glandium, gallarum, lapid. hæmatitid. seminis agni casti, menthæ exiccata, seminis lactucæ, añ. ʒ j. pulueriscentur subtilissimè, & cum melle adiecto pauco saccharo ros. fiat mixtura. Lum-
bis, prius inunctis vnguento ros. apponebat laminam plumbeam. Quibus optimè habuit. Sed non diu lamina plumbea utebatur, & non nisi prius repurgato corpore.

SCHOLIA.

QUOD mulieribus etiam contingat gonorrhœa, id in Obser. 15. lib. 26. ostendimus, agentes de pastillificis cuiusdam vxore, idq. ex Aërio & Galeno. Ita & Fernelius gonorrhœam dicebat affinem esse muliebri profluvio, sed ab eo differre (ut diximus Scholio Obser. 20. huius libri) quod nec assiduo, neq. quotidie, ut in uterino fluore, sed quibusdam intervallis album nec graueolens fluat, atque eandem causam cum virili gonorrhœa habes. Et ita gonorrhœa commune viri est viris & mulieribus, iisdemq. de causa emanans. Semen enim, ut antea diximus lib. 26. excernitur sine

coeundi desiderio. Vbi enim non est excernendi desiderium, ibi neque voluptas: siquidem voluptas fit excretionem eius quod vehementer angebat. Causas iam diximus cum lib. 26. de penis ac virga vitis ageremus. Est tamen huic affectui similis quodammodo exulceratio pudendorum; aded ut Medici hoc non distinguentes, confundant omnia, & gonorrhoeam dicant. Similitudo verò est ex defluxus colore, scilicet albicante, cuiusmodi est pus effluens. Vtrumque verò sensim stillat. Sed manifesta distinctio est odoris. Sanies enim non sine fœtore est: at illud caret fœtore. Sanies praterea colore rufescit aut liuescit necessario ex transmutatione, aut cruentum quid admistum habet: at semen candidat prorsus. Sed & ex his quæ consequuntur, scilicet dolore & inflammatione quæ circa partem exulceratam fiunt; quibus caret gonorrhœa. Quæ etiam sequuntur, gonorrhœam evidentem faciunt; ut contabefactio corporis vniuersi: quoniam illud excrementum est vrile; quod natura ob generationem resarcire properat, & semper eò sanguinem transmittit; aded, ut multi sanguinem seminis vice coeundo excreuerint. sed & lassitudo, & alia quæ debilitatem facultatū sequuntur. Putat Iacchinus quod Paulus & Aërius confundant hunc affectum cum Veneris insomnia, & male, ut ipse existimat. Hic enim, inquit, frigiditatis vel humiditatis nimia germen est: illud caloris & acrimonia. Rursus ibi ducentium vasorum est: hic verò in seminis qualitate. Quamobrem cura scopus ibi est refrigerare lumbos, & pectinem, ut docet Gal. 6. De loc. affect. & qualitatem seminis temperare: hic verò siccare cum modicè calidis, vel omnino temperatis. Verum hic frigidus opus fuit in muliere biliosa: sed ut
magis

magis temperata essent cauimus, & quæ proprietate ad semen minuendum conferunt quadam frigida selegimus; iisq; ipsis adieciimus mentham exsiccatam in puluerem. Habet tamen gonorrhœa diuersas causas, atque inter eas à lue Venerea, vt docuimus lib. 26. & iuxta easdem modò frigidis, modò siccis, modò calidis, vel omnino temperatis curari debet; vt non sit opus denuo curationem longiore sermone prosequi, cum in variis ibidem locis, libro iam citato, hæc ipsa ad vnguem explicata sit.

OBSERVATIO XXV.

De vteri suffocatione in vidua ex semine retento.

VIDUA annum 44 agens, soror Laurentij Ahenarij, Pastoris in pago Soechiwouda dicto, præceptoris mei in iuuentute, quæ quidem Alcmariæ habitabat prope gruem, anno 1546. mense Maio, grauissima vteri suffocatione laborabat. cumque pro mortua haberetur, & quasi syncope afficeretur, subitò ad eam vocatus fui. Erat autem suffocatio ex semine retento. Mulierculæ præsentem faciem vino aspergebant, naresque ac tempora oblinebant, putantes hoc modo illam posse à syncope excitari; sed hoc modo malum magis augebant. Excitantur quidem hac ratione à paroxysmo syncopis, aut etiam epilepsiæ, vt spiritus conuertantur ad exteriora. Verùm in hoc casu nullo modo conueniunt, neq; atomatica superius adhibita, aut na-

ribus admota. Quare & Gradus supra textum Rhasis, cap. proprio De suffocatione uteri, hunc errorem vulgarium his verbis taxat: Contra hunc textum, inquit, sæpe committitur error ab indoctis: nam in paroxysmo mulieri suffocata succurritur communiter per astantes cum aspersione & irroratione vini aromatici supra faciem infirmæ: ita vt odor ille suavis naribus communicetur, & tandem matrici, quæ talibus odoramentis delectatur, & per consequentiam uterum disponit ad maiorem ascensum: & sic non tollitur paroxysmus, sed aggrauatur (vt huic viduæ eueniebat.) Sed è contra oportet naribus adinouere malè olentia, vt est castorium, sulphur, assa fœtida, ac plumæ perdicum combustæ, & similia; eo quòd uterus fœtidis contristetur, & ea fugiat, vt olentibus delectatur, iisque magis sursum rapitur. Ita Plato vim olfaciendi utero tamquam animali attribuit. sed potius illi est hæc vis propria, quemadmodum spleni ac hepatis proprietates est dulcia appetere. Quamobrè ego hîc vt ab irroratione tum aspersione ac frictione vini abstinere iussi; & vt proprios pilos combustos olfaceret, (cùm plumæ perdicis ad manum non essent) eosque pro odoratu continuò naribus adinouebam; tum frictiones dolorosas pedum adhibebam, præcipuè sub volis cum sale & aceto fortiter fricando: sua enim acuitate & punctione (eodem Grado teste) conuertunt superfluitates ad inferiora, & excitant à paroxysmo. Adhibebamus quoque ligaturas fortes circa coxas, modò relaxando, modò

modò constringendo. nam hæc omnia cùm dolore inferunt, etiam deturbant materiam ad inferiora, & inhibent ascensum vaporum ad superiora. Dum hæc fiunt, necessitate cogente, obstetricem accersiri iussimus, ut intus fricando cum digito muliebria sequenti oleo inungeret: & olei liliorum ℥ j. moschi, croci, añ. gr. iij. vel quinque. Atque hoc modo præter spem à paroxysmo excitata est. Talis autem titillatio cum digito ab omnibus Medicis, ut Galeno ac Auic. tum aliis, commendatur; præcipuè in viduis & castè viventibus, ac monialibus, ut asserit Gradus: minus tamen iunioribus, & elocandis, vel maritum habentibus; cùm excellentius remedium sit ut viro copulentur. Id tamen non nisi re valde urgente, aliis præsidiiis non iuuantibus, faciendum duco; & multo minus illud fordidum exemplum (quamuis à Gal. 6. De loc. affectis laudatum) ipsius Diogenis cynici, cuius manus hymenæum præuenerat, cum Campegio viro pio, probare possum, cùm id mollitiem sapiat. Impudicum quoque consilium illud est cuiusdam mulierculæ, ut pili pudendi vellicentur, quo suffocata ad se redeant. Id quidem factum à chirurgo nimis impudenter dum famula quædam subitò suffocata solo prostrata iaceret; multis præterea in cubiculo existentibus, vidimus; & illa mox cum verecundia excitata, ridemibus aliis, discessit sanata. Ceterum nostræ viduæ iam bellè habenti, ne in idem malum incideret, præcepimus ut ab omnibus dulcibus rebus quoque abstineret: nam, præter vteri suffoca-

154 DE MULIERVM MORBIS,
focationem, solebat etiam ictero malo esse ob-
noxia. Ideo vt & decocto cetaurij, & marthubij,
ac absinthij saepe vteretur, præcepi. At, suffoca-
tione vteri non amplius redeunte, sana permansit.

SCHOLIA.

MATRIX, seu vterus, cum supernis eiusque prin-
cipibus partibus communicat, cordi siquidem
per arterias, cerebro per spina membranas, & iocinori
per venas. Non mirum igitur, si cum in eo affectus
quidam oritur, omnes vel quaedam prædictarum par-
tum consentiant. Affectus hic à Græcis ὄστραξις
ὄστραξις, à quibusdam ἀστροία ὄστραξις dicitur. La-
tini autem Vteri strangulatum, seu Vterinam suffo-
cationem, vel spirationis ob vterum Priuationem vo-
cant: volentibus tamen ipsis utraq; appellatione vnum
quendam affectum explicare, nomen assumendo tum
à parte ipsa laesa vel affecta, tum à superueniente sym-
ptomate. Alij & Præfocationem vocant vteri. Gale-
nus Vterina symptomata appellauit, volens generaliori
vocabulo omnia comprehendere. Ceterum affectus hic,
Paulo auctore (cap. 71. lib. 3) est vteri recursus ad su-
periora, modò sursum, modò in latus; etià Gal. teste 6.
De loc. affec. quamvis Aëtius quoque fateatur, quòd
in hac affectione vterus velut ad supernas partes ad-
scendisse videtur. Nec ob id quòd vbi ita per corpus vte-
rus errauerit, ad septum transuersum perueniens,
respirationem impedit, idcirco strangulatio fit. Sic &
falsa est eorum opinio, qui asserunt, vterum exiccari
vbi suppressi sunt menses, deinde humectari cupien-
tem vsque ad viscera ascendere; cum verò ascendendo
nonnun-

Quid sit
strangulatio
vteri.

nonnunquam septum transuersum contingat, idcirco animal spiratione priuari. Etenim tanquam erroneæ prædictæ opiniones à Gal. eodem 6. De locis affect. impugnantur & refelluntur. Causa igitur alia huius retractionis, seu recursus, inuestiganda erit, prius tamen parte affecta explicata & affectu ipso. Quod verò vterus primò, ac præcipuè in hoc vitio afficiatur, omnium Medicorum consensu liquet. Sed non ita liquet qualis sit affectus. Interim tamen si cum eius retractione, seu peruersione, fiat, nulli dubium est, morbum esse in situ, seu figura ipsius vteri, prout Hippoc. & Gal. 3. De articulis scripserunt. Citra eiusdem peruersionem, tum immodicè intemperie frigida quidam vterum laborare dicunt: licet oriri haudquaquam possit, quomodolibet generationem habeat, nisi intemperies hac principibus partibus impertiatur; cordi, inquam, aut cerebro, seu vtrisque primùm, & deinceps ab eis vniuerso corpori, præsertim in prima ac præcipua eius specie, seu differentia. Perpetuò itaq; (vt Donatus quoq; sentiebat) intemperie, eaq; nimium frigida, in hac affectione vterus laborabit. Qua de re morbum hunc non inflammationem, sed flatusam perfrigerationem esse Soranus dicebat. Interim autem simul cum ea male situatus, seu figuratus erit, pro diuersitate, seu magnitudine causarum ex quibus originem duxerit. Causæ autem referuntur in semen retentum, vel in menstrua cohibita. Neoterici addunt fumos vaporesq; corruptos à materia corrupta in vtero existente eleuatos, cor & pulmonem petentes, & anhelitum coangustantes, ita vt mulieres strangulari videantur. Vapores illi inflant corpus matricis, & propter talem inflationem putant eos attingere diaphragma, vnde

Pars affecta.

Quis affectus præter naturam.

Causæ.

Vetularum
 nugimenta
 redarguun-
 tur.

& officina spirandi coarctatur : & volunt quod isti humores ascendant ad pulmonem, cor coangustando, tum meatus illos ac vias efflationis, vnde & profocatio oritur. Modò ascendant ad cerebrum, & inducunt quasi vertiginem, & saepenumero epilepsiam. Modò petunt stomachum (vt Leonellus dicebat) & inferunt nauseam, & inclinationem ad vomitum; & tamen non fit vomitus: sed vt plurimum subsequuntur ructus, propter quem vapores illi exhalant. Aliquando iidem vapores ad gulam ascendant; & videtur tunc mulier strangulata interitura. Et quandoque inflatur guttur; (vt nuper in puella nobili vidimus) & dicunt tunc vulgò mulieres, vterum ad guttur ascendisse. sed hoc fieri nequit, quicquid garriant vetulae, & anatomia ignara blaterent. Quin potius vapores in causa sunt eleuati ab vtero stomachũ & modò dicta membra impetentes. Conuenit igitur inter omnes Medicos, vt idem asserit Galenus 6. De loc. affect. hunc affectum magna ex parte viduis euenire; hisq; maximè, quæ cum antea probè purgarentur, ac parerent, atque virorum concubitu gauderent, iis omnibus priuantur; ex quibus conicere possumus, quod ob retenta menstrua, vel ob semen cohibitum, mulieres vteri suffocatione seu strangulatione cruciantur, idq; fortasse magis (vt idem Gal. inquit) à semine retento contingere potest, vt pote magnâ vim obtinente. vt est enim in mulieribus humidius, ita & frigidius. Semen etenim in vtero paulatim coaceruatum, aut etiam sanguis menstrualis, vitiosa redduntur, ac perfrigerantur; quibus perfrigeratis, vterus quoque taliter afficitur; à quo demum ad cerebrum ac cor frigiditas transmittitur paulatim tractu temporis; à quibus deinceps vniuersus

ersum corpus celeriter alteratur, ac refrigeratur, ob eam causam corpus hysteriarum mulierum refrigeretur) & symptomata iam dicta inferunt, vel te-
ui quadam substantia, veluti aura, ab iisdem excre-
mentis ad iam dictas partes principes ascendente, vel
continuitate partium traducta alteratione per quan-
tam veluti qualitatis diffusionem mediis corporibus,
um quibus vterus ipse predictis principibus partibus
communicat. Neque mirum videri debet, si vel ex
minima humorum mole tanta consequantur sympto-
mata, (de quibus latius de signis dicturi sumus) etenim
i phalangij quoque ictu totum corpus affici videtur
exiguo veneno per minimum foramen injecto: & lon-
ge maiori admirationi est scorpionis ictus, quod breui
modum tempore gravissima infert symptomata,
quanquam exiguum sit id quod iniicitur, aut nihil
ominino, nullo apparente foramine in ipsius aculeo:
nec non quod canis rabie capri solum sputum (vt an-
tea de morfu canis rabidi diximus) si corpus huma-
num tetigerit, rabiem excitare possit, ex eiusdem spu-
ti qualitate aucta quadam corporis dispositione, ita
vt post sex menses, quando ad magnitudinem nota-
tu dignam peruenierit, discerni possit (vt de hydro-
phobia viuis exemplis aliquando ostendimus) item si-
milibus quoque affectibus infestari possumus iis, qui
pernicioso epoto veneno eueniunt, corruptis in nobis
ipsis adeo humoribus, vt veneni tum qualitates tum
vires aquent. Vitiatum itaque semen aut menstruum
cum retinentur corporibus potissimum vt afficiantur
idoneis, paulatim tractu temporis principalium par-
tium aliqua consentiente, a qua deinceps vniuersum
corpus celeriter alteratur, cuius totum corpus refri-
gerare

gerare valeant, prædicta grauius symptomata inferre possunt: & alias aliæ quoque accidentium species oriri solent pro multitudinis qualitatibus ratione tum menstruorum, tum seminis. Et ita rectè Gal. disputat transmutari posse in veneni naturam. Quod suppositum monstrat alius experientius, quod in corpore nostro possit gigni venenosus humor, qui æquet vim externi veneni. Proinde in phrenetico illo descripto 3. par. Epid. admiratur, non aded quod gigni is humor venenosus possit ex transmutationibus quæ putredine fiunt, vel corruptione; sed quod latere diu possit, (non enim subita est generatio, ut nunc diximus) & postea tamen adori ac occidere. Causa videlicet latet, quousque à natura dimoueri incipiat: & tunc, causa mota, vel inde plus imprimat; vel partem aliquam attingit, quam antea non attingebat; vel vaporem ex se mittit, quem antea non mittebat, unde subitò accidentia infert. Vterus igitur primus est, qui persentiscit malum, & pellere nititur; unde violenter per corpus mouetur, quod veteres errare dixerunt: vel refugit noxam eam, unde sursum retrahitur. At hæc multo dilucidiora cernuntur in viuæ exemplis sequentibus.

OBSERVATIO XXVI.

De uteri præfocatione partim ex menstruis retentis, partim ex semine intus remanente.

NOVIMVS puellam, alioqui pulcherrimam, sed obesam, & parvæ staturæ, utcumque pituitosam, cui nomen Alcida Theodorici, quæ ad

ad pontem lapideum Alcmariæ habitabat, quæ
tunc in grauissimâ vteri præfocatione incidisset
anno 1553. mense Iulio, adeò grauiter labora-
bat per diem integrum ac noctem, vt à paroxys-
mo nullo modo à mulierculis, multis tentatis re-
mediis excitari posset. Ad quam accitus, ex ma-
re intellexi, quòd, incerto ordine, à mensibus
non purgaretur. Erat & iuencula salax, nubilis,
& vnica filia; ita vt non solum ex mensibus re-
tentis, sed & semine intus recluso hoc malum
oriri existimarem, ob grauissima symptomata;
quibus apprehendebatur. Videbatur semimor-
tua; audiebat quidem, sed non poterat loqui.
quia videlicet materia non trahitur, aut extra
mittitur sufficiens ad vocem, aër, qui trahitur in-
spiratione, idem & reiicitur expiratione, ob di-
atationem & compressionem thoracis. ob id
enim non loquuntur, quia aër is satis non attra-
hitur, aut extra propellitur. Alij referunt ad fri-
giditatem humidi & frigidi seminis torum cor-
pus refrigerantis, vt sic transpiratio illis vix suf-
ficiat: de qua re latius in Scholio. Videbatur
igitur hæc tam ex menstruo suppresso, quàm se-
mine retento, laborare ex retro vapore sursum
elato per spinæ membranas & nervos ad cere-
brum. modò enim sine sensu mortua iacebat;
modò haud dissimile morbo comitiali quid pa-
diebatur; modò cum stupida permaneret, crura
atrum videbantur conuelli, sed non diu. Et li-
cet non loqueretur, subinde plorabat, rursus ri-
debat. Venit mihi tunc in mentem illud exem-
plum ipsius Benedicti Veronensis Medici do-
ctissimi

160 DE MULIERVM MORBIS,
Atissimi lib. xxvi. cap. 16. De suffocatione matricis, ex Galeno, cum ita scribat: Vidimus vxorem fratris in praefocationis cuiusdam motu in delirio ridentem atque collachrymantem, cum plumæ perdicis sub naribus cum carbonibus ad motæ essent, incautè pruna ingens ex batillo in pectus excidit: at illa tam diu stetit donec omnino extinctus carbo videretur: eoque die sine dolore fuit; sequenti die de inusto tantum pectore conquesta est, ut ingens adhuc cicatrix videatur. Hoc est quod etiam interpretes Hollerius refert: Quibusdam risus, inquit, aliis lachrymæ, aliis vtrumque; ut Dominæ de Rochepot, quæ cum varicosa esset, eo affectu corripiebatur cum delirio, risu, lachrymis, contractione oculorum. Alteri risus, deinde perturbatio mentis, hinc lachrymæ: à quibus etiam monitæ non cessant. Sed nihil admirabilius, quàm quod duabus filiabus Præsidis Rhotomagensis contingere solebat in motu sursum vteri, quo ex interuallis laborabant. Risu enim longo ad horam, & hora duas, imminente paroxysmo, capiebantur, quem neque metu iniecto, neque hortatu, neque aliis artibus poterant compescere. Parentibus interrogatæ & obiurgatæ respondebant, se non posse continere risum. Aliis prius lachrymæ, deinde risus mouetur in eodē affectu, ut sæpe vidimus, quibusdam lachrymæ tantum, aut risus. At hæc puella diu lachrymabatur, aut ridebat. sed postea taciturna tamquam mortua permanebat. Astantes mulierculæ varia adhibuerant remedia, sed frustra. Cum verò pro deplorata habebatur.

batur, vt fieri solet, ad eam accitus fui. Vt igitur vapores illos venenosos ad inferiores partes retraherem, membra extrema inferiora continuo fricari imperabam; tum coxas & crura ligari, iis modò solutis, rursus fortiter constrictis. Naribus admovebam plumas caponis, cum perdicis ad manum non essent, quæ tamen valde expertæ sunt: nam postea memini cum Noordtwici ad nobilem essem vocatus, famulam quandam in iisdem ædibus consuetam malo vterino grauitè detineri, adedò vt etiam pro mortua haberetur, cum nullis præsidiiis excitari posset à paroxysmo, plumis perdicis combustis naribus ad motis, ad vitam quasi à nobis reductam. præterea & huic nostræ, de qua nunc agimus, globulum assæ fœtidæ sindone obuolutum naribus ad odorandum obieciimus. Gatenaria commendat fumum corij combusti ex calceis detracti, & refert mirabilem historiam, hoc modo viperam in stomachum per os delapsam, cum nec lacte ad os attraheretur, eius fœtido odore per anum egressam & expulsam. quod vix credere possumus, ob venenum viperæ, talem non fuisse ex eius intus latentis morfu extinctum. Sed cum hæc omnia non iuuarent, coacti fuimus suadere, vt aliqua mulier digito in hoc liquore immerso vuluam intus confricaret: & olei lilior. ℥j. moschi optimi gran. v. ambre gr. iij. croci orientalis gr. ij. cauendo ne odor ad superiora tenderet. Hæc enim, vti alia odorata, valent; sicut ziber, seu ciueta, bombax moschatus, aut cotton moscho conspersum, oleum moscho perfusum,

L gallia

gallia moschata, alypta moschata, caryophylli, & similia. At oleo supradicto imposito, excitata fuit. Cùm ad se rediisset, exhibui parum castorii cum cereuisia vel aqua chamæmeli, & purgaui cum pilulis sequentibus: R agarici trochis. pilul. de hiera, añ. ʒ. ß. agni casti, castorii, añ. gr. iij. fiant pilulæ vij. saphenæ venam fecalem si ex solis mēsis suppressis malum ortum fuisset. sed quia in puella salaci, licet pituitosa, semen abundaret, consului matri vt viro collocaret.

S C H O L I A.

Signa præ-
sagientia.

SIGNA præsagientia vteri suffocationem diligenter examinanda, vt mulieres huic malo obnoxie præseruari possint, antequam paroxysmus inuadat. Sic mulieres viuide, si ipsis menses retineantur, facile incurrūt in hoc vitium: quamuis & aliis vacuato vtero fieri solet, vt per immodicam mensium fluxionem, (quemadmodum & sæpe vidimus) aërē tunc vterum implente, atque ita inflante conuulente collo. sic de puellis valde salacibus, quæ non purgantur per menses, quamuis ea purgatione egeant, præsertim cùm viri appetentes ex natura sint, & bene habitæ, de talibus, inquam, possumus prædicere, quòd facile in tale malum incident. Id quotidie experientia monstrat in his quæ ex voto monastico violenter castæ detinentur, & inter crates ferreos cohibentur, ne furore vterino percitæ viros adorianur. In quibusq; enim ditioribus monasteriis, & in puellis nobilioribus, otiosis, delicate viuētib; vsu id crebrò euenit, vt, dum chorea iuuenum nobilium agantur, & obiecta potentiam moueant,

ueant; & semen copiose generetur, neque expellatur, huic malo sapius obnoxia sint. Ita & possumus predicere in muliere viro orbata, quæ consueta erat coitu uti, & nunc ab actu venereos abstinere: quæ licet in continentia viuat, interim non mutat vitæ institutum consuetum, sed in quiete ac deliciis agens, opiparè adparata conuiuia sequitur, quæ quoque libenter & sæpe fabulatur de coitu. Idem contingit quibusdam mulieribus potentibus; & magnificis relictis à suis viris, etiam nobilioribus, quorum mariti in bello versantur, ita ut à complexu cogantur abstinere. In talibus certè expectare ac predicere possemus vteri præfocationem: multo quæ magis in iunioribus, & aliis consuetis incurere paroxysmos certis periodis: quos & tempore autumnii, teste Rbase, magis quàm aliis temporibus expectabimus; cum tunc magis corrumpantur humores, simul concurrente aliqua restrictione pororum cutis. Ita quoque si præcesserit apostema in vtero, & malè curatum ad carcinoma deductum: nam id cum ulceratur, tetros vapores emittit; à quibus talia expectantur. Cum iam instat strangulatus (teste Paulo lib 3 cap. 71.) gravis sopor premit, quæ cataphora dicitur, mens desipit, sensuum instrumenta deprahenduntur, impediunturque, vox obmutescit, crura contrahuntur, deinde maxillæ rubere incipiunt, faciesque repletur. comitatur, inquam, torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, pallida facies, aspectus oleosus. Alij & hæc addunt. Cum magis instat paroxysmus, sentiunt quid in gula tanquam glandulosum hæere, aiuntque tunc muliercule, vterum eò ascendere, nocummento diaphragmati communicato, inobedienti iam factò in dilatatione, vnde principium præfocationis.

Imminentis
signa.

Impendentem ab utero suffocationem ostendunt symptomata eadem, quæ præsentem, sed leniora; ut respiratio & pulsus difficilis, cordis palpitatio, dolor capitis, sæpe cum rubore labiorum, faciei & oculorum; qui etiam interdum clauduntur, ut aperiri nequeant; interdum tristis est aspectus, modò vertigo scotodinos, à vapore putri ad cerebrum elato, spiritum visorium & sæpe animale reliquum perturbante; ut etiam delirium leue accedat, nunc apprehensionis, nunc ratiocinationis, nunc utriusque, per quod affecta secum dicenda, tacenda loquitur; interdum veluti attonita stupet. Ex his plura antecedere solent paroxysmum, & præter perturbationem mentis ac intellectus, & anhelitus difficultatem, etiam in toto & in cruribus potissimum debilitas, & dolor ab umbilico ad muliebria usque, subinde & aphonia. At signa demonstratiua cum alia genus ipsum ac morbum præsentem indicant, alia verò specierum & causarum differentias ab affectibus similibus. Signa igitur generis & paroxysmi præsentis sunt hæc: casus subitus, sicut euenit epilepticis & syncope laborantibus; & fit cum eo defectus saltem sensus exterioris, & anhelitus quasi ablatio, tenetq; manus compressas supra ventrem, tanquam prohibitura ne adscendat, & genua reflexa habet, hypochondria inflantur, tanquam quid pectus & gulam occluderet; etsi nomine proprio vocetur, licet intelligat, respondere tamen non potest, quamuis quoque post paroxysmum omnia recordetur; sensu denique & motu priuata ut mortua sæpenumero iacet. Varij enim sunt, inquit Galenus, præfocationis in mulieribus affectus: quarum quedam sine voce, sine sensu, & sublato venarum pulsu, iacent, mortuis simillimæ: alia quidem

Signa demonstratiua.

Varij affectus in præfocatis.

quidem sentiunt, & mouentur, ac memorantur: quibusdam & sensus intercipitur, non sine anhelandi difficultate: quibusdam crura & brachia distensione comitialiter torquentur: nonnullis modò pulsus parui, ac debiles fiunt, alius penitus intercipiuntur: quibusdam autem neque respiratio sensibilis permanet: aliqua verò, aliis actionibus integris manentibus, magnam respirationem ex hac affectione habent; stomachi etiam dolore vexantur, & saliuam vomunt, si in stomacho aut capite humiditas sita sit. interdum etiam sic exanimat, ut tamquam comitiali morbo prosterneant. Inclinate verò accessione, corpus firmari incipit, male rubescunt, ac oculi post multam grauitatem attolluntur; & ubi iam malum agram relictum est, humiditas quadam ex locis muliebribus excurrent, tactu percipitur; intestina murmurant, ac ipse uterus paulatim laxatur, atque sic exurgens agra intellectum & sensum recipit, ut liquet ex Aërio & Paulo. Obstetrices quoque seu Medice, quæ ipsas exquisitè tetigerunt, fatentur circa uterum notas quasdam apparere. Nam ceruix eius inclinata videtur, interdum veluti sursum retractus sit totus uterus, interdum veluti si ad latus. Nam simul cum utero, ceruicem quoque ipsius retrahi necesse est, Gal. auctore 6. De loc. aff. Sunt autem hæc symptomata varia multum & graua. Non tamen ij esse debemus interim, ut mulieribus adulantes, quicquid affectus illis contigerit, in uterum causam referamus; seu caput doleat, seu ventericulus flatuosus sit, seu venter doleat, seu respiratio difficilis fiat; cum possint hæc aliis de causis fieri. Primum igitur omnium est circa respirationem symptoma; quando saepe adeò vitiatur, ut nihil maius exco-

Signa incli-
nantis ac-
cessionis.

Symptoma-
ta varia mul-
tum & gra-
ua in uteri
præfoca-
tione.

gitari possit de infrequentia, de tarditate, de paruitate. Verum nunquam adeo exigua fit, ut prorsus tollatur, vel exigua linqatur, & prorsus insensilis reddatur. Leditur hinc vox adeo, ut nihil eloqui possint, etsi velint. Alia ad cerebrum attinent, cum sensus & motus aufertur, vel cum furore capiuntur, vel cum conuelluntur toto corpore, quando aut cerebrum, aut spina laborat. Alia ad cor pertinent, ut animi deliquia, syncope: alia ad ventriculam, ut morsus ventris, eructatio plurima. Quae omnia cum ex propriis affectibus earum partium fiant, quarum sunt symptomata; non temerè, ut dixi, in vterum referenda sunt; sed inquirendum cui parti adscribi debeant. quod fiet, si consideratis illis partibus, laborare eas priuatim aliqua ratione cognoscemus: vel contra, noxa esse vacuas. Tunc enim fieri per consensum credendum erit, atque in vterum authorem referentur. Quomodo vterus hac faciat, semper difficile fuit intelligere. Plato enim sursum ferri ait, & spiritus meatum obstruere. Sed quamuis verum sit, retrahi vterum modo ad superiora, modo ad latera; ex hoc tamen censenda haec causa eorum symptomatum non est. Quid enim tale eius retractio, & vitatus situs potest efficere? ut Gal. disputat. Sed neque vno modo semper situm mutat: quod Rhases & Paulus censere videntur, sed variè. Contingit autem ut haec situs mutatio fiat ab eisdem causis, à quibus & cetera accidentia, ita ut simul cum illis eueniat, sed eorum causa non sit. Causam ergo, ut prius diximus, Galenus inuenit, quem & alij sectari sunt, vel ex suppressa purgatione, aut retenta genitura. ita ut tunc casta ferè, nisi detinerentur (ut Iacchinus dicebat) intra crates ferreos

reos viros adorirentur. Sed tamen simulationem mulierum cauere oportet. Sape enim talia mala simulant, quo cogant ad coitum viros: hinc in illam caliditatem ludit autor vulgati versiculi:

Hystericam vitulo se simulat esse marito.

Causa autem varietatis accidentium, est ex qualitate, vel quantitate eius quod detinetur veneni. Qualitas autem sit primum ex materia, ex qua est genus transmutatione. Vidit igitur Galenus, quod ex semini retenti transmutatione deteriora sunt symptomata, quam ex menstrui retentis: & hoc est verum. Quod si contingat aliquando retentis menstruis talia fieri, hoc est rarius, & vna euenient ob coitus diminutionem. Veniunt quidem ex illis dolores capitis, grauitates, vertigines, & cetera quae diximus. At apnoea, conuulsiones, potius ex retento semine, vt syncope, & subita mortes. Neque Iacchino placet in reddenda huiusmodi ratione Galenus, cum omnia in frigiditatem referre vult: cuius ratione animal non egeat respiratione, & pulsu, proinde his priuetur. haec enim causa facit, vt non laedatur ita, si careant respiratione. Sed respirationis causa esse non videtur, quoniam saepe crebram facit, velut praefocati, & paruam. Potius ergo voluntarium motum tollere dicemus, neruorum origine affecta: idque ex natura veneni, cuius est modò vnam principem partem, modò aliam afficere: vt patet per venena discurrendo, è quibus alia cor laedunt, alia cerebrum, alia alias partes nobiles. Sic igitur spina affecta, conuulsiones, & apnoea eueniunt: cerebro verò affecto, furores, sopores graues, epilepsia, sensus & motus priuatio: corde verò affecto, pulsus mutantur,

& omnino eius robur concidit, adeò vt syncope premantur, & aliquando subitò mox pereant.

OBSERVATIO XXVII.

*De muliere præfocata, & pro mortua habita,
tandem in vitam reuocata.*

PLVRI BV S diebus strangulationis deliquio aliquando iacent mulieres, vt pro mortuis habeantur. Huc pertinet, inquit Plinius, nobile illud apud Græcos volumen Heraclidis septem diebus feminæ exanimis ad vitam reuocatæ. Feminarum, inquit, sexus huic malo maximè videtur oportunus: conuersione vuluæ, quasi corrigatur, spiritus restituitur. Ad tertiam vsque diem feminam ab eo malo non effertur, clamat omnis schola. Ego memini, mulierem, cùm Pithueris in Gallia praxim exercerem, hoc malo detentam 24. horis in paroxysmo permanisse, frigidamque extitisse, vt pro mortua haberetur. Ad quam & nos acciti, id quod Hollerius etiam annotauit, in primis num mulier viueret, diligenter cognoscendum rati sumus. nam sæpe fit, vt idem ait, vt grauiore accessione intereant, aut non aliter iaceant quàm mortuæ. Pulsus huic adeò paruus & obscurus erat, vt non sentiretur: & cùm respiratio nulla appareret, ori & naribus speculum tersum bene ac perpolitum admo- uimus, quod expirationis vapor crassus in res- pirante velut obnubit, & maculat (vt & Syl- uius ex Ganerio ponit) nota vitæ certissima: vel
ori

ori aut naribus subdito carptæ & pexæ lanæ flocculos, aut pennam molliſſimam, quæ motu reſpirationem eius teſtentur, modò aſſidentium expirationo hæc mouens tibi non imponat: item cyathum aqua plenum ori ventriculi imposito. Vult tamen Hollerius, infidele ſignum eſſe, quod, floccis naribus admotis, vel vaſe pleno aqua imposito regioni ſtomachi, colligetur. Sternutatoriis potius, inquit, cognoscendum. Ceterum admoto hîc ſpeculo, certò viuere cognouimus. Adhibuimus itaq. fricções infernas cum peplis calidis, & ligacula cruribus iniecimus, & odorifera intus per mulieres imponi iuſſimus, quale eſt thymus inſtar peſſi in vuluam poſitus. nam hoc modo noui aliquas etiam puellas, huic malo frequenter obnoxias, eſſe excitatas. Conducunt etiam zibettum & alia. Naribus malè olentia obiecimur, & adhibito ſternutatorio, hæc tandem ad vitam reuocata à paroxyſmo excitata fuit. Vbi iam aliquid ſumere potuit, exiguum caſtorii dedimus cum aqua chamæmeli. Peſſaria verò, qualia & hîc potiſſimum conueniunt, poſtquam incipiunt loqui, & melius reſpirare, imponi mandauimus ex attrahentibus; vt ſi ſemen aliquod corruptum eſſet, vt hîc erat, ex parte traheretur & euacuaretur. Conueniunt verò maximè ea, quæ ex diſcutientibus ſtatus parantur, vt ex benediſta, hiera, cumino, ſemine rutæ, & ſimilibus; vt & Rondeletius quoque docuit. Atque his, vel ſimilibus remediis miraculi inſtar hæc mulier curata fuit.

SCHOLIA.

Quomodo
vivere pos-
sint, quæ
vteri suffo-
catione la-
borant, etiã
si nihil om-
nino spirant.

CVM vteri strangulationis differentias, pro effi-
cientis causa magnitudine, vel pro specierum
quarundam varietate inter se differentes, plures esse
dixerimus; quia in earum aliqua omnino spiratio per-
ditur, vt huic mulieri euenit: non ab re quæreret quis-
piam, quomodo vivere tales possint, quæ nihil omni-
no spirant? Cùm in confesso sit, spirationem à vita, &
vitam à spiratione separari non posse: aded vt viuen-
tem non spirare, & spirantem non vivere sit impossi-
bile: quinimo vbi cor respiratione priuetur, ilico ho-
minem perire necesse est; vt liquet 5. & 6. De loc. aff.
& lib. De utilitate respirationis. Quare Heraclicæ po-
steriores (vt Donatus quoque refert) iis experimentis
iam dictis explorabant nam agrotans viveret; cùm ta-
men aliquando sublata penitus oris ac narium respira-
tione animal vivere posse constet, modò ea supersit,
quæ in toto corpore ab arteriis & corde perficitur: id
quod in latèribus animalibus manifestè apparet, nulla
apparente in ipsis spirationis nota: hæc enim per totam
hyemem mortuis simillima in cauernis latitant, per
arterias tantùm totius corporis transpirantia. Pari-
item ratione in vteri strangulatione fieri potest, vt
toto corpore frigefacto, (id enim manifestè videtur)
nulla prorsus prodeat ab ore spiratio, supersit autem
ea, quæ à corde & arteriis fit. est enim maximus &
precipuus respirationis vsus (vt sexcentis in locis à
Gal. decretum est) vt intimus calor & refrigeratione
& ventilatione seruetur. Quæ de re exiguus ille calor
in hystericis mulieribus derelictus, arteriarum cordisq;
officio

officio conseruari poterit, quæ actio à quibusdam Medicis transpiratio dicitur; quamuis (vt diximus) quæ sit ab ore & naribus respiratio omnino fuerit abolita; licet etiam aded parua esse possit, vt sensum lateat nedum respiratio, sed etiam transpiratio ipsa: illudq; clarè constat non solum in Gal. sed etiam Aristotelis doctrina, qui lib. 1. De natura animalium cap. 11. talia protulit verba: sed datur viuendi facultas, etiam si desit spiratio. Quamquam itaque perfecta animalia, quæ temperatè calida sunt, præsertim dum sanitate fruuntur, citra spirationem haudquaquam viuere possint, vt liquet ex modò citatis Gal. locis; attamen quæ frigida suapte natura sunt, vt latentia, aut ex accidenti vniuersum eorum corpus tale redditum est, vt in hystericis conspiciamus, citra respirationem non inconuenit vt in vita seruentur, modò arteriarum cordisq; officium eis conseruetur; nec propterea his, quæ de apoplexia scripta sunt, contradicimus. Vel dicendū quod refrigeretur corpus ob frigidum semen in venenum transmutatum; vt in scorpionis & phalangij ictibus præcedente Scholio contingere diximus. Ceterum cum symptomata huius mali enarrauimus, quæ & aliis affectibus quasi similis contingere diximus; sæpe enim vteri suffocatio similis esse videtur lethargo, apoplexia, epilepsia, syncopi, catalepsi & lumbricis: differunt tamen ab iisdem. Habet autem maximam affinitatē præcipuè cum syncope, catalepsi, apoplexia & epilepsia; ita vt quandoq; epilepsiam faciat. Conuenit cum his affectibus, quod repente obmutescant, & cadant, aut non possint consistere. Dissidet tamen à syncope, pulsu. Nam in syncope & animi defectu pulsus cessat: in suffocatione vteri pulsus remanet, sed exiguus, rarus, & languis-

Signa quibus differat suffocatio vteri ab aliis affectibus.

Differentia à syncope.

languidus. In syncope sudor apparet frigidus; & color pallidus admodum est, similis colori mortui: in suffocatione pallida quidem redduntur, sed minus. Differunt etiam propter causas antegressas seu antecedentes. Solet enim suffocatio vteri provenire, post largam mensium euacuationem, quia aëre repletur uterus; vel ob seminis putrefactionem, & retentionem in vtero, quia cum putrescit, eleuantur multi fumi, qui postea distendunt vterum. Dicimus cum Rondeletio, in vtero semen putrescere. Nam in vasis spermaticis non putrescit, sed conseruatur, vel absumitur ad nutritionem vasorum; vel quando est in maiori quantitate, facultas expultrix in vterum reiicit inter somnium. Neque valet eorum ratio, qui dicunt sanguinem putrescere in venis; ergo & semen putrescere posse in vasis spermaticis. Non enim similia sunt. Sanguis enim putret, quia minus coctus est, & plus habet humiditatis excrementosa ac aliorum recrementorum. Semen autem coctum est perfecte, & assimilatum, & ab excrementis repurgatum ac redundans, benignumque dicitur, ob quantitatem, non qualitatem. Quod autem non permisceatur semini virili, & a vulua non alteretur ad conceptum, putrescit, tum etiam ob alia recrementa in vtero collecta. Ergo quibus semen defluxit in vteri cavitatem, & in ea retinetur, ut viduis, quæ defectu coitus os interius vteri clausum habent, frequenter fit suffocatio vteri. Argumento est, quod viduæ difficulter curentur ab accessione, & iis recurrit frequenter; nisi pessa, aut alia ratione, aut medicamento alio, reiiciatur semen putrefactum. Fit etiam suffocatio ob gratos odores naribus attractos, ad quos uterus natura mouetur. Et in hoc differt à syncope,

de, quod odores grati syncopē potius sedent, recrean-
 spiritus : his suffocantur mulieres, nisi parte infe-
 ore adhibeantur : Rhases verò comparabat suffoca-
 onem fortem & pessimam ad syncopen non fortem.
 quidem Auicenna intelligit ad pluralitatem acci-
 dentium, quæ sunt in suffocatione: tamen in syncope
 er essentiam cordis sunt difficiliora accidentibus præ-
 ocationis; licet non tantum duret paroxysmus syn-
 opis. Ab apoplexia distinguitur stertore, qui hic non
 titur; deinde quod partes resolutas non habeant,
 eque sensum amiserunt, quamuis obtusum habeant.
 Jam cum pili extrahuntur, vel punguntur, sentiunt;
 & manu adhibita circa collum indicant se suffocari,
 quod in apoplexia non fit; & apoplectica stertunt cum
 uncatione. Cum epilepsia conuenit; sed etiam differt,
 quod non conuellantur partes, nisi quando suffocatio
 teri epilepsiam facit. Tunc enim conuelluntur. Ab
 epilepsia quoque distinguitur spuma circa os; quæ si
 ad sit, signum est utrumq; iungi symptoma; & sæpe
 difficilis est distinctio, ob similitudinem: sed vultus de-
 larat, qui tumet & rubet in præfocatis, pallet in his:
 & hoc etiam à syncope frigidusq; humoribus uteri di-
 stinguitur, ut diximus. Adde semper generale signum
 retractionis uteri ad superiora, & quod præcessit in
 utero affectus suppressorum mensium, vel retenti se-
 minis. Differunt quoque à lethargicis, cum lethargica
 semper cum febribus sint; hysterica ea non laborant.
 A catalepsi verò, quod qui catalepsim siue comprehen-
 sionem patiuntur, quasi rigidi & refrigerati rema-
 neant, oculis aperti, non audiunt neque vident. A
 lumbricis, secundum Moschionem & Cleopatram:
 nam illæ quæ lumbricis laborant, & in intestinis pun-
 ctiones

Ab apo-
plexia.

Ab epilepsia.

A lethargo
& catalepsi.

A lumbricis.

Ationes sentiunt, & matricem sanam habent. Et quamvis propter silentium similes sunt caducis & apoplecticis, & quæ lumbricos habent, lethargicis quoque & catalepticis: in hoc separantur, quod apud caducas & epilepticas, & quæ lumbricos habent, matricis nulla querela præcesserint, & ipsa matrix suo loco reperiatur. A caro, quod in eo non vterus sed cerebrum afficitur, nec excitari possunt à somno. Quandoque post accessionem insaniunt, & aliena loquuntur, nec ad interrogata respondent: & tunc videtur potius mania per consensum vteri, aut melancholia. Nam melancholia fit epilepsia, & contrà: & melancholia fieri potest per consensum, ut mesenterij, splenis, & aliarum partium: unde hypochondriaca est dicta. Differt etiam suffocatio à furore vterino, ut Aëtius ex Sorano lib. 16. cap. 76. hunc in modum scripsit: Vterinus furor est vteri intemperies ad passionis consensum cerebrum trahens, quem rabidum delirium consequitur, ab vteri suffocatione differens primò causa: neque enim hic retractus vterus aliquod membrum nobile ad affectionis consensum ducit, vel compressione, vel punctione, vel vapore: sed eodem ipse loco persistens per spinalem medullam, aut alias sibi insertas propagines, depravatam qualitatem, quacunque fuerit, ad cerebrum mittit, deinde etiam signo ab vteri suffocatione distat: quoniam egrotæ minimè in hoc sicut in illo affectu maræ ac sine sensu decumbunt; quin potius garrulæ, iracundæ, & inquietæ redduntur. Differt etiam à furore non per consensum, sed primariè cerebrum impetente: nam istarum amentia tota in Venere est; nihilq; aliud vel imaginantur, vel loquuntur, quàm de concubitu, pruriuntq; frequen-

ter

A caro.

Ab infania
& melancholia.A furore
vterino.

per loca pudoris, quorum attactu mirum in modum
 audent. Accidit id morbi genus temperatura calidis,
 etate vigentibus, ac castitatem seruantibus, quæ opti-
 mis cibis vescuntur, atque in deliciis & animi iucun-
 ditate versantur; præcipuè si aliàs libidini Veneriq;
 assueuerint: tunc enim maximè infestantur. nam ni-
 hil aliud huiusmodi agritudo est, quàm ardor & in-
 ensio vteri, cerebro ac toti corpori earum communi-
 cata. Ita nouimus nobilem puellam, succulentam, car-
 nosam, & in deliciis viuentem, quæ nobilis cuiusdam
 iuuenis amore capta, deinde nihil quàm de rebus Ve-
 nereis somnians, loquens, hoc vteri furore affecta fuit,
 & cum delirio mox maniam incurrens, ut à duobus
 viris contineri non posset, frustra ab Emilio Medi-
 co ante me Alcmariæ agente, curatione tentata, bre-
 ui admodum extincta est. Verum nos quoq; paucis ab
 hinc annis iuuentulam virginem formosam & hone-
 stissimam præ manibus habuimus eodè malo laboran-
 tem. Impudicè admodum de Venere loquebatur, tan-
 quam si in prostibulo enutrita foret. sed paulatim in-
 sana facta est, cum nulla remedia admisteret, quæ ad
 intemperiem calidam vteri faciunt, & insania con-
 grua, quæ huc transferenda è loco De mania; ut sunt
 irrigationes capitis, & alia præsidia furori accommo-
 da; de quibus egimus lib. 10. nostrarum Observatio-
 num. Sed peculiaris est pastillus trygonis apud Aëtium
 & alios, ac potus hydrosati. Diacodium aceto aut so-
 lani succo admixtum & impositum ardorem extin-
 guit. Quod si ob deprauati seminis abundantiam af-
 fectus contigerit, nitram & cardamomum cerato as-
 sumito, & pudendis subucito: quiddam enim saluæ
 simile elicitur, & morbus sedatur. Ruta verò & ca-
 storium

Historia de
 furore vteri.

176 DE MULIERVM MORBIS,
storium cum myrtino cerato supposita, genituram
contrahunt, & furorem leniunt. Hæc satis de signi-
distinguentibus uteri suffocationem ab aliis affectibus

OBSERVATIO XXVIII.

*De muliere quæ ex ira frequenter præfoca-
tionem uteri patiebatur.*

MONTANVS, Medicus doctissimus, re-
fert Consult. 89. De præfocatione matri-
cis, quòd hæc ipsa aliquando veniat ex ipso ani-
mi affectu: vt si aliqua mulier præ zelotypia viri
irascatur, & animus valde afficiatur, quòd tunc
aliquando fiat eiusmodi præfocatio. Addit se
nouisse tales mulieres, quæ ita irascebantur, &
afficiebantur à zelotypia, vt statim caderent in
hunc morbum, & perpeffæ sint grauissima ac-
cidentia. Ita & ego nuper habui præ manibus
mulierem, alioqui diuitem, quæ ex leuissima
ira, huius mali paroxysmum incurtebat cum
grauissimis symptomatis; præsertim quoque si
dulcibus vteretur syrupis vel aliis iulebis. Quod
vltimum quidem multis contingere vidi, tam
puellis quàm nuptis. Ita eueniebat vxori cuius-
dam cereuisiarij Delphenis, quæ adeò dulcibus
offendebatur, vt si vel ea gustaret tantum, illico
iterum paroxysmum incurreret: quare & ante
paroxysmum, & post paroxysmum, & in ipso
paroxysmo, amaris semper vti cogebatur. Et
ideo hoc notatu dignum, quòd rarò admodum
sint præfocatæ, quæ dulcia ferre possunt: quem-
admodum

admodum enim odore suavi, ita & sapore dulci
facile vterus sursum rapitur. Decoctum absin-
thij his conueniebat, & pilulæ ex castorio &
assa fœtida, dando ꝑ j. & post paroxysmum eas
euacuando cum hiera picra; fœtida naribus ad-
mouendo, & odorifera inferius supponendo.
Primum enim videndum quid in accessione
agendum sit, seu conuulsionibus ægra tentetur;
seu strangulationem patiatur, seu animo defe-
cerit. Hæc enim tria sunt symptomata, quæ ma-
ximè vrgent, & opem Medici exigunt. Sunt au-
tem remedia communia, quoniã & causa com-
munis est, vnde & cõmunis scopus. Si igitur ex
retentis mensibus, seu aliter, seu semine fiet, vnus
est scopus, vacuatio eius quod in vtero præter
naturam continetur. Sed id commodè non fiet,
nisi vterus in naturalem suum situm reuertatur,
ita vt ceruix recta inclinet ad externa, itaque &
facile profluant. Vnde succedit his secundus
scopus: ob ea peragenda inprimis malè olida na-
ribus admouebimus; cuius contrarium in reli-
quis syncopis fiebat. Et quandoquidem hîc ex
ira vapores in vtero existentes paroxysmum for-
tè mouebant, vt vterus ascenderet; ideo olida
rectè naribus obieciimus. Ita & vtero bene odo-
rata offeremus. Hæc Gal. i. Ad Glau. Eius rei
mira est proprietas; causam autem postea dice-
mus. Facile igitur parabilia accepimus, vt pen-
nas combustas, corium vetus, capillos vstos,
cornua animalium cremata, & castorium. Odo-
rata subtus admouebam; vt hoc, vel simile: &
aliptæ moschata ꝑ ij. ligni aloës, caryophyl. añ.

M

ꝑß.

℞. moschi, ambræ, añ. gr. iij excipiantur oleo de spica, & cum cottone, imponatur aut cotton per se moscho conspersus, aut oleo moscho perfusum. Cùm autem excitata esset à paroxysmo, quia videbatur humore crasso & pituitoso laborare, exhibui 3 ij. pul. hieræ picræ. Dum autem in paroxysmo esset, etiam frictiones adhibuimus, & vincula cruribus iniecimus: & hypochondria fasciâ ligauimus, eaque moderatè constricta, ut uterus minus ascenderet. Extra paroxysmum, quòd dulcia abhorreret, imperavi ut cereuisiam absinthij biberet, qua delectabatur, & à paroxysmo præseruabatur.

SCHOLIA.

SIGNA autem specierum & causarum diligenter sunt examinanda, antequam ad curationem accedamus, non minus quàm prognostica ipsa. Hæc enim mulier (viti & alia) ex ira in hoc malum incidebat, ex commotione videlicet vaporum vel humorum, qui in utero existerant & ascensum inferebant. Fernellius, Galeni auctoritate motus, nonnunquam patauit uterum nihil aut perexiguum è sua sede dimoueri: at egrotarum mulierum modò querimonia, modò precibus adductus, hunc sæpe tactu deprehendit instar globi cuiusdam in ventriculum efferri, eumq; grauius opprimere. Hinc & sæpe manu depressus est, manifesteq; in propriam sedem propulsus. Id quoque sæpe vidimus à mulierculis in hac re exercitatis fieri. Aliquando ex ascensu dūtaxat premitur mulier quodam præcordiorum dolore, spirandi difficultate, aut animi defectione; at sine metu, sine delirio, aut alio

sympto-

Signa ascen-
sus uteri &
strâgulatus.

symptomate grauiore; vt etiam vidimus. Interea, si strangulatus accedat, etiam grauiſſima ſymptomata ſuccedunt. Licet enim aliquando primum exigua mali ſit cauſa, ex vtero ſublatus vapor viſcera ventriculūq; feriens, mox tamen ſublatus in diaphragma thoraciſq; partes, reſpirationem crebram & breuem infert: inde cor obſidens defectionem animi inducit, & ad arcem cerebri conſcendens ſoporem, veterem, deſipientiam, & alia iam ſupradicta. Hæc tamen ſymptomata, vt Fernelius etiā putat, non ſemper à menſtruo, vel ſemine retento ſuſcitantur; quum & eas quæ bene purgantur, & vterum geſtant, & viri conſuetudine fruuntur, plerumque fatigent: quumq; contra ſupra quingentas eodem cœnobio (inquit Fernelius) degere videamus, quæ diu conſuetum Veneris uſum intermiſerunt, nullo hyſterico ſymptomate oppreſſas. Et ita quiuis humor (etiam præter ſemen aut menſtrum retentum) hoc modo in vtero corruptus, eius generis vaporem ex loci natura venenatum expirat, & vnde vita illinc & ſumma veneni pernicies exoritur. Hinc fit vt tametiſi viris diu hæmorrhoides ſuppreſſæ ſint, aut Veneris uſus ſit intermiſſus, nulla tamen hyſtericis ſimilia ſymptomata contingant. Hæc quoties grauiā incidunt, noſcuntur quidem facile; leuiā difficile, quod melancholicis aut cardiacis non admodum ſint diſſimilia. Sed quomodo ab iſdem diſtinguantur, dictum eſt. Si itaque fiat ſuffocatio vteri ab aliis humoribus corruptis, hæc aderunt ſigna: Mulier certis periodis habet ſuas purgationes, in ſuper virum aliquando habet ac coitu vitur. Item an tales humores maligniores facti vnā cum ſanguine peccent, vel craſſi pituitoſiq; , aut melancholici ſint, id etiam ex propriis

Signa à vapore vel quouis humore corrupto.

Ex aliis cau-
fis.

Si ex men-
sum sup-
pressionē
fiat vteri
suffocatio,
signa.

signis saepe dictis innotescet: biliosi equidem fortiora
producunt symptomata; saepe mentis perturbationem
& rationis permixtionem, syncopen, ob cerebri tum
cordis consensum. Declarabunt autem & vitæ insti-
tutum, victus præcedens, anni tempus, vrinarum dispo-
sitiones, tum reliqua, num adsit plethora vel cacochy-
mia. Si autem vapores maligni ex apostemate vteri,
ulcere, vel cancro vlcero aut non vlcero, præfoca-
tionem inferunt, aut humores putridi ab iis exhalan-
tes, ex propriis locis indicia sumentur. At si ex men-
sum suppressione vteri strangulatio excitetur, perue-
niente quidem ad vterum ipso sanguine menstruo, sed
ad interna ipsius ingredi non potente, aut quia crassior
est, quàm ut per ora vasorum possit penetrare, aut
quia clausa sunt ora, propter quod multiplicatus in
venis, eas extendit, atque vicina ipsis vincula mæde-
facit; id citra eius peruersionem non erit, quoniam pleni-
tudo repletorum corpora & in latum, & in profundum
extendit; sed longitudinem abbreviat continuo, propte-
rea vterum retrahi necesse est: ob quam causam vel
sursum, vel ad latus retrahatur oportet. Quo fit
ut si æqualiter vndique trahatur, recta erit & sine in-
clinatione ipsius transmutatio: si verò inæqualiter, ad
partem vehementius trahentem: vasorum itaque ad
ipsum vterum peruenientium & plenitudo & suspen-
sio, causa est, ob quam vterus in ipsius strangulatione
vel sursum, vel ad latus trahatur: id quod semper eue-
nit, quando eadem affectio ex menstruorum reten-
tione originem habet; & præter id quod purgationes
eisdem supprimuntur. spiratione tamen non priuan-
tur, neque animi defectu, nec aliis modò dictis sym-
ptomatis valde laborare videntur. Id igitur cognosce-
mus

nus an symptomata sint leuiora, & menses præter
 consuetudinem suppressi fuerint, perseverante victus
 ratione eadem; mamma an tumentes lacte ex sangui-
 ne in ipsas regurgitante, corpus totum graue, oculo-
 rum, colli & parrium aliarum dolores. Quod mam-
 ma intumescant, fit ob sanguinem, consuetum fluere
 per menses, ad eas reflectentem. sensus iis sunt debilio-
 res, & subinde in febrem incidunt. Sed insignia sym-
 ptomata raro à mensibus retentis & suppressis con-
 tingunt: Interea affecta sentit pondus circa pectinem,
 & hora qua solebat mensibus laborare, percipit torsio-
 nes, dolores q̄ circa partes vteri. Si vnà cum menstruo-
 rum retentione adsit dominium alicuius humoris, illud
 ex eiusdem malignitate apparebit: nam si sit sanguis,
 apparet plenitudo & pondus grauans circa pectinem.
 Sin bilis, erunt symptomata paulo vehementiora, &
 motus promptiores: nam & atra bilis infert alienatio-
 nes, ob fumos cerebro communicatos, vt in melan-
 cholia mæror & timor exaggerantur. Si pituita, cor-
 poris pigritia, albedo, & laxitas, & sputi copia ade-
 runt: sicuti in bile è contra minus sunt quietæ. At vi-
 tiato semini maior quidem quàm menstruis vis adest
 ad noxam vniuerso corpori inferendam, ex eiusdem
 Gal. sententia, & proinde magis spirationis ac pulsus
 abolitiones eo redundante apparebunt, conuulsiones,
 animi defectiones, ac alia paulo antè dicta symptoma-
 ta: & sapius viduis (vt prius quoque retulimus) mo-
 nialibus, atque aliis similibus, ex tali causa proueniet
 vteri strangulatio. etiam vel si optimè purgentur, præ-
 sertim si naturaliter multo semine abundauerint, aut
 affatim à concubitu, quo antea creberrimè fuerant
 usæ, abstinerint. Sæpenumero circa vteri peruersio-
 nem

Signa si fiat
 ex vitiato
 semine.

Historia
Galenī de
vidua præ-
focata.

nem tales fiunt strangulationes, cum videlicet tenue, ac non multum fuerit semen retentum: quandoque etiam cum eiusdem peruersione, seu retractione; cum videlicet semen ipsum plurimum fuerit (vt etiam Donatus annotauit) ac crassum, eodem modo quo sanguis menstruus, tum vasa, tum vincula implens, extendens ac inadesaciens. Quemadmodum accidit in muliere vidua longo iam tempore, qua præter cetera mala, neruorum quoque distensione vexabatur, cui cum manibus tractaretur partes muliebres, adhibitisq; calidis medicamentis, oborta titillatione cum labore ac voluptate, veluti per contum vsu venire solet, crassum plurimumq; semen excreuit, atque ita à molestia sua liberata est; vt idem Gal. testatur lib. 6. De loc. affec. Huic etenim vterus retractus erat, sic obstetrice dicente. Hu itaque & symptomata graua & magis repentina eueniunt, & mox apicæ præhendit, & crura sursum contrahuntur; & aliquid ab vtero ad os ventriculi attolli præsentunt. Minusq; dubitandum, si mulier sit virosa, & iam diu continens, aut virgo, sed Venerem appetens, corpulenta, multi sanguinis, victu calido, humido, flatulento vtens, in otio viuens cum Veneris irritamentis, & si menses illi non sint suppressi, vino generoso vtens, multiq; delicatis serculis Venerem incitantibus & sperma generantibus. Verum, teste Aërio, cum hæc affectio etiam oriatur, vel vtero perfrigerato dum menses prodeunt, vel propter abortum, vel sanguinis eruptionem ab vtero ab aliquo repente suppressam; id promptè ex astantis loquela percipiemus. Nunc adhuc restant signa prognostica: de quibus mox dicemus, hoc rursus interposito exemplo.

Si ex vtero
refrigerato
dum menses
prodeunt,
vel ex abor-
tu, signa.

OBSER-

OBSERVATIO XXIX.

*De præfocatione vteri lethali ex se-
mine retento.*

RECTE dixit Aëtius lib. 16. cap. 70. de vteri suffocatione: Si paroxysmus inuadere assuescat, epilepsiæ more chronicus efficitur, omnino quidem tutus apparens, singulis tamen accessionibus præceps periculum afferens, ut non eodem tantum die, sed intra paucas horas interimat, tuncque pulsus ab ordine suo primò ad frequentiam permutantur, deinde inordinate trepidant: postremò subfrigida quædam humiditas cutis superficiem irrorat. Sic & Paulus lib. 3. cap. 71. Nonnullæ in ipsis accessionibus perierunt subitò; quibus pulsus quidem crebriores & inordinati collabuntur, id est, intercidunt. Idq. multis contingit in accessione vehementi & longa, quemadmodum nuper pulcherrimæ mulieris quæ Delphis in delphine habitabat, quæ crebræ præfocationi obnoxia, nullis remediis iuuantibus, cum accessio etiam diuturna ac vehemens esset, subitò vitam in mortem cōmutauit, quod breui fore, spuma ad os sublata indicauerat. De ea præcipuè timendum est, iuxta Guainerium, cum adfit intensio cum paroxysmi lōgitudine, si spuma ad os defluat; maximè, inquit, si spermatis corrupti vitio prouenire cognoueris. Ideo & nos mortem mox affuturam prædiximus.

SCHOLIA.

Signa pro-
g. ostica.

VBI igitur respiratio tollitur & pulsus, sunt gra-
uissima praefocationes, vti huius mulieris erat.
Nam ab his de vita periculum est; idq; ob affectum
cordis iunctum. Suffocatio quoque vterina seminali
est tanto acutior & periculosior quam menstrua,
quanto semen prolificum tenuius, ac in generatione
actuosius est & efficacius ipso sanguine menstruo.
Dixerunt aliqui, si remedia optime adhibita secun-
dum artem, post diem primum non contulerint, egrae
esse derelinquendas: quod tamen minimè faciendum
est. Nam & tandem plurimas curatas vidimus, &
ipsi curauimus. tum piū esse ducimus, vt quouis
modo succurramus, etiam si res deplorata nobis vide-
atur. Non ignoramus interea, quanto magis retentio
menstruorum vel seminis diuturnior fuerit & diu
precesserit, quod tanto periculosior fiat hac afflictio.
Quod verò grauior & molestior sit vteri suffocatio ex
derento semine orta, quam ex suppressis mensibus,
maiores noxam, ac maiora symptomata inferens, ex
Galeno liquet 6. De loc. affect. Quemadmodum etiam
quod periculosior sit ea, in qua tum spiratio, tum pul-
sus abolentur: quam primam eius speciem, siue diffe-
rentiam nominauimus. etenim nonnulla ex talibus
pereunt; licet quaedam etiam seruata videantur. Ac-
cidit hac affectio omni quidem tempore, sed hyeme
praecipue ac autumno, praecipue autem iunioribus sa-
lacibus, ac sterilibus, maxime si tales per medicamenta
fuerint. Fit quoque magis corporibus delicatis, otiosis,
& strictas venas habentibus, quam laborantibus, &
quibus

quibus est amplitudo venarum. Magis etiam mulieribus sanguineis, aut pituitosis, ex multitudine materia. Ita memini, me saepius in curatione habuisse puellam admodum crassam & obesam, bene habitam, quae Delphis habitabat ad pontem Auenarium, quae multis annis huic malo obnoxia fuit, & saepius à me curata: cuius parentibus consului ut viro eam copularent. Melancholicis autem accidit ex debilitate, magis tamen in hyeme quam in aestate; etiam praecipue in autumno. Suffocata iuuescula, vel alia, à semine, si coeant, paratissima sunt ad impragnationem, & promptè concipiunt. Ita cognata mea Eua Teylingia in Haga Comitibus habitans, cum nuperrimè virum duxisset, statim à suffocatione ilico post coitum concepit: de qua etiam postea agemus. Memini me in curatione habuisse pulcherrimam iuenculam, quae saepe pro mortua habebatur. Consului ut parentes eam viro locarent. quod postquam contigit, statim impragnata fuit & admodum fecunda copiosam prolem deinde ex marito sustulit, ac nunquam eo malo fuit in posterum detenta. Cum verò deficiunt menstrua, & semen superabundat, tanto molestior & prolixior est agritudo, maximè quando partes occupat altiores. Grauida tamen, iuxta Galenum 6. De loc. aff. cap. 5. licet iis diu menses supprimantur, tamen in symptomata haec nunquam aut raro delabuntur: quòd horum parte puriore fetus in utero nutritur, reliquum crassius in vasis ad uterum pertinentibus, ad secundarum in partu expulsionem, servatur integrum, aut non ita corruptum; nisi aliunde, ut ex febre magna, putredinis occasio accesserit. Grauidas nihilominus vidi hoc malo tentari, ut postea exemplo docebimus.

M 5

Suf-

Suffocatio à pituita putri grandævis, & mensium a seminis annos egressis, vt sexagenariis & septuagenariis est familiaris: & iuuenibus victu prauo vtenibus, & potu largo, & intempestiuo aqua potu aut vini, aut esu fructuum crudorum. In his vel in capitis dolorem duorum trium quatuorve dierum, vel cynanchen, vel peripneumoniam, vel spina vel genitalium tumorem, vt quidam sentiunt, magna ex parte de generat. Accidentia leuia paroxysmi breuitatem significant: vehementia & diuturna periculum notant, & saepe mortem cum grauissimis symptomatibus. Fortis enim non est vilipendenda, cum multa praefocata in paroxysmo suffocentur. Quædam vt mortui iacent etiam per duos dies, quos si excedunt raro resurgent: & ideo non est festinandum ad sepulturam: imò ne post tertium quidem diem, vt quidam volunt, cum calor naturalis tanto tempore in interioribus corporis occultari possit. Sed post hoc tempus nulla visa est suscitari. Praefocatio vteri cessatione mensium naturali, 43. anno, vel 50. vel cessat, vel ingravescens interficit. Si menses vel humiditas seminis effluant ad os matricis in suffocata, mitigatur inde passio statim. Mulieri, quæ vterinis molestat, aut difficulter parit, superueniens sternutatio, bonum est, vt liquet ex Hippocrate aph. 35. lib. 5. quo loco per vterina, suffocationes vteri intellexit Galenus, & bonum tum signum, tum causam esse sternutationem, fatetur.

OBSER-

OBSERVATIO XXX.

De præfocatione vteri in prægnante; & de altera in ipso partu eueniente.

PAULO antè dictum est, grauidas nunquam pati vteri præfocationem, vel admodum raro. Attamen cùm hæc recolligerem anno 1589. mense Octobri, vxor nostri pharmacopœi, secundo à conceptu mense vteri præfocationem incurrebat, cùm motu quasi epileptico modò sub noctem, modò in nocte, non sine febre, tanquam certa periodo, idque per quatuor aut quinque vices. sed paroxysmi non diu durabant. malè olentia naribus admota parum iuuabant. infernis non ausi fuimus odorata subicere, ne abortus sequeretur. Syrupus ex absinthio adhibitus, propter amaritudinem, vt existimo, valde iuuabat. Secunda verò vxor Petri Opmeri, quæ annum 42. agebat cùm illam duceret, (nam virgo annosa ea erat antequam matrimonium iniret) anno sequenti, mense Augusto primipara, cùm noctu pareret, atque obstetrix infantem suscepisset, & valde intenta esset in puero mundando, ipsa interea in vteri suffocationem incidens mox exanimis reperta est, & pro mortua habita. Ad quam & ipse accitus in nocte, assam fœtidam pro odoratu naribus applicabam; & emplastrum contra matricem supra alutam seu corium rotundum, paulo amplius dalero, extensum, & in circuitu galbano obductum,

ctum, vmbilico apponi iussi: quibus duobus tantum præfidiis ad se rediit, & ilico à paroxysmo excitata est, atq. ab illa molestia etiam libera-
 liberata, cum magna astantium admiratione. Cùm iam à paroxysmo excitata foret, impera-
 uimus vt emplastrum amoueret: & cùm benè purgaretur in partu, postea bellè se habuit.

S C H O L I A.

SCRIBIT Auicenna, quòd vteri præfocatio non contingat in partu, seu tempore partus; cùm motus ille sit laboriosus, & ad inferiora expellat superfluitatem deorsum: & quia est operatio natura, ideo in ipso non præcedat vapor venenosus ad membra superiora. Et verum est, inquit Gradus, in pluribus, non tamen semper. Vidi enim, ait, quòd in actu pariendi, vel post partum, de proximo euenerit ex euaporatione etiam ad superiora de materiis quæ mouentur in partu, etsi earum materierum fluxus sua corpulentia moueatur ad inferiora. Idem contigit huic secundæ mulieri. Primæ quoque grauidæ existenti: licet hoc etiam raro contingat. Ambæ istæ mulieres erant facie rubicundiore, & calidioris temperaturæ; quales magis hac ægritudine leduntur, & in maiori periculo versantur, quàm in pituitosa aut melancholica temperatura, quæ, ceteris paribus, est minoris malitiei. Ratio per se manifesta est, quia diminutio vel quasi prohibitio anhelitus citius fit ad mortem, vel periculo non vacat, ceteris paribus, in muliere calidæ temperaturæ, vbi est indigentia maioris euentationis, quàm in opposito modo disposita.

O B S E R-

OBSERVATIO XXXI.

*De uteri suffocatione post menses
fluentes orta.*

EV A Teylingia, cognata vxoris meæ, in Hagga Comitatus habitans, nuper nupta, post mensium purgationem, anno 1561. sub finem anni, morbum vterinum seu præfocationem passa est, ex frigore, vt opinor, & ventositatibus: vt aliquando etiam aliis contigisse animaduertimus: erat enim tunc asperrima hyems: quo tempore magis (vt antea diximus) fieri id solet. Theodorus Hoogherbetius Hornanus Medicus, tunc temporis agens in vicinia apud Sororem, noctu ad eam vocatus, assam foetidam naribus applicuit, & exhibuit tres pilulas paruas ex assa foetida & puluere dauci compositas: quibus nonnihil sese remisit paroxysmus. Altero die aduocatur Hugo Nieuuenius Medicus Haganus: is naribus castorium adhibet, & subtus vuluam cottonem ex moscho seu globulum imponere iubet; quibus modò leuabatur paroxysmus, modò denuo redibat. Paulo pòst cùm se remitteret paroxysmus, pro purgatione propinauit diaphœnicum, & hieram picram, sed in exigua dosi. Tercio die ego vocatus sum, cùm magis augeretur, & medicamentum non operaretur; & glande indita vtrunque acuta, copiosè aluum deiecit, & paulo pòst cessauit paroxysmus. At noctu rediit vehementior. Tum vnà præscrip-

præscriptum emplastrum ex galbano, quod
supra corium leuigatum ad palmæ manus magnitudinem supra vmbilicum ponebatur. Illud ceratum de galbano, est secretum Montagnanum
in morbo vterino. Vide apud eundem alia cerata
in suo Antidotario, quæ idem applicat vmbilico
co. Galbanum dissoluimus cum modico aceto
& in corio rotundo extendimus, ac vmbilico
mulieris apponimus. Quo remedio infinita
præfocatas curauimus, & à paroxysmo excitauimus.
At verò etiam nostram hanc cognatam prius
ma fronte iuuare videbatur: postea tamen, ut ait
serebat, ferre non potuit. Quare sacculos duos
quadratos interfutos, ex ruta, artemisia, calamita,
tha, origano, & matricaria concinnatos, circa
ventrem inferiorem paululum calefactos appo-
posuimus, modò vnum, modò alterum, & tan-
dem bene se habuit. Interea tamen altero die
rursus glandem ex hiera, cumino, ruta, melle, &
sale paratam, imponi iussimus; qua & aluura
probè reddidit, multis ventositatibus simul
emissis. Verùm, quod penè omiseram, cùm in
paroxysmo validiore esset, & quasi paraphrenesi
incurreret, fronti pannum lineum aceto &
oleo rosæ inculcatum, apposuius, ad malignos
vapores reprimendos; & egregie contulit: tum
præcipuè ligationes & frictiones crurum, ad in-
feriora materiam & vapores malignos diuertendo.
Atque istis præfidiis restituta fuit, bene habu-
bita, & ad Venerem inclinata. Cùm autem haud
ita pridem nupsisset, viro à me tacitè inquirente
te, num coitus utilis esset cùm apud eam lecto
incumbere

cumberet, annuebam, id vnicum & optimum
medium esse, vt omnis schola Medicorum
estatur. me itaq. abeunte Venerem cū egre-
iē exercuisset, statim quoque ab eo tempore
inprāgnata est, & non amplius vteri prāfoca-
tionem passa est. Nam suffocatae ab vterino
halo, si coeant, (vt Scholio Obs. 29. diximus)
promptē concipiunt.

SCHOLIA.

QUONIAM verò hac affectio duplicem cura-
tionis modum requirit (vt paulo antè dicere Curatio ac-
cessionis.
ceperamus, & Observationes pracedentes idem osten-
dunt) vnum accessionis tempore, reliquum verò ea-
dem non urgente; propterea ea quae accessionis tempo-
re adhibenda sunt, primò conscribunt auctores, victus
ratione derelicta. Nam accessionis tempore, ac etiam
vbi eadem conquiuerit, cibum nullum, aut paucum,
præbere oportet, vt liquet ex Paulo. Iubent itaque
agram ceruicæ, ac scapulis accliuibus collocari, ac in-
guinibus decliuibus: extremas partes deligari, ac fri-
cari; crura præsertim, & pedes: & quemadmodum in
multo effluxu cucurbitas mammillis imponunt, sic
quibus sursum, aut in latus tractus est vterus, ingui-
nibus & coxis adhibent. Communibus enim remediis
est vtendum, cum iis quibus ad excitandam sopitam
naturam, vti solemus: cucurbitulis, inquam, ad pubem
& inguina, & ad coxas, & vinculis ad summas
coxas, & crurum frictionibus ex acribus factis, vt ex
sinapi cum aceto. Scopus enim est ad inferna reuellere
humores & vapores qui sursum tendunt. Sunt mox
clamo-

Quæ nari-
bus admo-
uenda.

Cur vterus
retros odo-
res refugiat.

clamoribus excitanda, compellendo proprio nomine pilos vellicando, ac nares trahenda. Et sic communis ratio curanda suffocationis est, ut ad id quod magis urget, nempe ad suffocationem nos totos conuertamus; neglecta ad tempus causa, ut miseras præfocatus suscitemus: naribus quidem ea admoventes, quæ foetidissimum odorem habent; vtero autem odorata, & ea etiam quæ laxare ac calefacere possint, medicamenta adferemus; iuxta Gal. De ar. cur. ad Glauconem. Sed nemo, inquit Iacchinus, causam dixit; nisi forte & illi sensum odorum inesse dicas, ut refugiat tetros, & ita recurrat deorsum; & ut sectetur gratos. Hæc questio duas habet partes. Prima est, cur tetricis odoribus narium recedat? Quod sanè situm malum inde mutetur vterus, fortè vndiquaq; verum non est. Sed quod à paroxysmo excitantur, idq; vehementi facta concussione in cerebro, vnde & in toto corpore; id sanè sit ex tristitia obiecti. Hoc esse verum patet, quia non foetida modo offeruntur, sed & acuti odores euigilantes, ut apud Aëcium, ruta, & thymus cum aceto; & acetum acerrimum in quo pulegium, calamintha, origanum; conyzæ tenuis, & reliqua eiusmodi acria decocta sint. Hæc enim crassos vapores in cerebro detentos incidere & attenuare possunt, ac simul frigiditatem depellere; thoracemq; pulmonem, & quæ stomacho attinent expurgare. Eiusmodi verò acetum (inquit idem) naribus admouendum est. Hæc enim facile parabilia sunt; ut ruta ex aceto & thymus, vti & penna combusta, capilli, corium vetus: post hæc castorium, assa foetida: hæc enim cum ad sopores & epilepsiam faciant, nil mirum si etiam ad hoc malum, utpote simile. Thymo tamen sine aceto, & pulegio, tum odoriferis solis, non liben-

libenter ego uti soleo. Memini enim quod illustrissima
 vxor D. Principis Auraci, cum primipara Delphis in
 partu esset, ex odore florum redolentium in hoc ma-
 lum incurreret: cui naribus admotis male olentibus, &
 amotis floribus è cubiculo, cautoq; è meo consilio ut pe-
 dissequa vestibulis ex moscho redolentibus non uteren-
 tur, facile ab hoc malo liberabatur. Nam omnia foeti-
 da sunt efficacissima olfacta, aut naribus admota, ut
 galbanum, assa foetida, opopanax, bitumen, petroleum,
 oleum ex gagate (quod non multum differt à petro-
 leo: nam & petroleum & gagate bituminis concreti
 species sunt: quare stultum est emere quod non magis
 efficax est viliores) odor lucernarum extinctarum: nam
 & Paulus lib. 3. cap. 71. linamentum ex lucerna ex-
 tinctum, lanasq; laciniasq; combustas naribus admo-
 uet. Valet & fumus foetidus, qualis eleuatur ex plu-
 mis vstis, aut corio, herbarum foetidarum, ut ruta;
 quae omnia suo ingrato odore, uterum deorsum pellunt.
 Et ita, inquam, nares suffiende, castorio, galbano, sa-
 gapeno, sulphure, aut funiculo lucernario recens ex-
 tincto, aut pennis vstis, seu soleis antiquis, aut cepa-
 rum aliorumve corticibus, aut capillis ipsius propriis
 exustis. Quidam etiam matulam vrinariam inuete-
 ratam, & pannos sulphureos incensos naribus admo-
 uent: sinapi item tritum cum aceto naribus adhibeatur:
 aut rutam viridem manibus contritam suffito: aut
 eadem cum melle lana excepta in anum indatur, ex
 Gal. auctoritate 9 De compos. medic. sec. locos. qui
 etiam quae iam diximus adfert, addens picem liqui-
 dam, & cedrinam, item cornu cerui. Hoc etiam tem-
 pore, iuxta Aetium, sternutationes excitabimus, ca-
 storium, piper, struthium, specilli nucleo naribus ad-
 mouen-

N

mouen-

Cur inferius
fluunt bene
odorata.

Suffitus.

mouendo: osq; patientis aperiemus, ac medium digi-
tum ad vomitum prouocandum intromitemus: &
super hac omnia (vt paulo antè diximus) mulier ma-
gnis vociferationibus excitetur, aut vocetur. Vterum
verò seu pudendum ipsum aromaticis & odoratis suf-
ficiemus. Quemadmodum enim foetida sursum appo-
sita, vterum deorsum propellunt, sic odorata vtero vel
coxis alligata, deorsum trahunt. Ista & secunda pars
quæstionis erat; cur iuuent bene odorata? Gal. inquit,
odorata & quæ calfacere ac laxare possunt, hac ipsa
ratione iuuant, quòd calfaciunt: quæ verò calfaciunt,
extenuant & laxant: vnde fit, vt quod retinetur præ-
ter naturam crassum, & difficile mobile, extenuatum
mox per apertos meatus facile expurgetur. Habent
etiam id vt flatu discutiant; quibus sæpe infestantur.
Hinc suffitus aromatum educit muliebria. 5. aphor. Sed
quæstio adhuc est, cur ad hac, si aperiant solum. Sunt
enim & alia, quæ laxare, & calfacere possunt, vt ipsa
quæ diximus malè odorata; quibus tamen autores non
vtuntur in hac casu, quasi ab his refugiat vterus, &
adstringatur. Fortè quæ pessimè odoratu sunt, viti-
quandam deleteriam, & inimicam visceribus habent;
vnde ledantur, non quia sic odorata, sed propriè tem-
peramentiratione. Exempla verò eorum, quæ immit-
tuntur, primum sunt pessi ex gallia moschata cum
oleo moschato, aut iasmino, aut benzoino, aut de nuce
moschata, aut zibetto compositi, & impositi. Vel vte-
rum infernè per pudendum odoratis suffias, styrace,
cinnamomo, cassia, costò, amomo, ligno aloës, ac si-
milibus. Sufficiendus, inquit Aëtius, vterus aromaticis,
quæ simul remittendi, calefaciendi, flatumq; educendi
vires habent; quale est quod enneapharmacum apud
illum

illud appellatur, & cetera huiusmodi à veteribus ad
 vteri durities descripta, amaracino, gleucino, irino,
 ligustrino vnguento diluta, ac adiecta etiam rata aut
 cumini portiuncula: quæ quidem obstetrix digitis ca-
 piens vsque ad os vteri immittet, leuiterq; ac multum
 defricabit, vt eo irritamento crassus humor, qui semi-
 nariis vasis adhæserit, prouocatus ac quadantenus ca-
 lesfactus excernatur: in q; ipsum vterum clysteri vte-
 rario amaracinum, gleucinum aut foliatum vnguen-
 tum calidum iniiciet. Sic Paulus vnguenta odora-
 tissima in vuluam infundi iubet, vti est amaracinum
 iam dictum, vel malabathrinum. Et sic intra puden-
 dum per obstetricem ea illinantur, quæ laxant, calfa-
 ciunt, & flatus dissoluant; veluti est oleum irinum,
 nardinum, rutaceum, aut in quo cuminum, aut ani-
 sum fuerit decoctum. Pessi item parentur ex his, quæ
 eandem vim habent calfaciendi, laxandi & flatus dis-
 cutiendi; quorum formulas loco De mensium suppres-
 sione inuenies, nisi quoddam odorata quædam iniicere po-
 teris; lignum aloës videlicet, castam, cinnamomum,
 costum, moschum, & interim ea, quæ à vulgo am-
 bra canis, & Zibet appellantur: testudinis item terre-
 stris hepar tritum in pessa subditum ad ʒ j. namq; ad
 vteri strangulatus ac dolores confert. Vel in hunc mo-
 dum: R. gallie moschata ʒ ij. cinnamomi, folij macis,
 caryophyl. añ ʒ j. ambra, moschi, añ. gr. ij. labdani,
 styracis, añ q. s. cum aqua rosata, moschata, fiat ve-
 luti suppositorium, quod indatur genitalibus. Pulue-
 res eiusmodi aliquando inspergimus oleo costino, de
 spica, de lilio, vt inde intinctis digitis obstetrix affricet
 os vteri in virginibus: in aliis etiam interiora. Post-
 quam autem incipiant loqui, & melius respirare,

Vtero quæ
 immittenda:

Pessi:

N 2

nonnulli

Quæ per se-
dem ini-
cienda.

nonnulli tunc quoque in vterum pessaria trahentia immittunt; vt si semen aliquod corruptum sit, ex ea parte trahatur & euacuetur; aut si aer, vel spiritus quidam in ea parte conceptus, aut conclusus, is assumatur. Potissimum autem ex discutientibus parantur, vt ex benedicta, hiera, cumino, semine ruta, & similibus. Hoc etiam tempore in sedem glandes indantur ex ruta, cumino, agarico, sale gemma, hiera, ac melle præparata: aut ex cumino, ruta & caricis eadem parentur. Sape enim per hæc sensibilibus crassus humor effluit. Propterea etiam proderit, vbi hæc non suffecerint, clysteribus stercus subducere, vt inquit Paulus; quorum copiam apud eum cap. De coli dolore reperies. Et ideo, cum magna ex parte plena sint ventorum, glandulis, clysteribusq; iam dictis, tum vntionibus, quæ flatus discutiunt, vtendum erit ex capite De colico dolore. Præcordia item fasciis vinciantur, & distentis manibus os vteri comprimatur; illinanturq; imus venter ac inguina: & saccelli in eisdem locis adhibeantur; prout eodem capite De mensium suppressione docetur. Aliqui hinc (vt Rondeletius) eodem tempore cucurbitulam ponunt supra regionem vteri, id est, inter os pubis & umbilicum, magnam, & cum multo igne: postea emplastrum ceroneum supra eandem partem ex lachrymis: id digerit, calfacit, & materiam absunit. Conficiendum est illud emplastrum ad formam scuti, & in parte illa acuta, dum apponitur parti inferiori, gratum odorem inspirat intra ipsum vterum, & vterum retrahit, aut retractum retinet. Non vult vt apponatur emplastrum de matrice, cum in id aliqua astringentia intrent. Nos tamen sæpissime, & collega meus Cornelius Heydus, magna

magna cum utilitate emplastro contra matricem (ve
 exemplis subsequenter adhuc dicitur) commodè vti
 sumus; supra alutam ducendo ad rotunditatem, & in
 circuitu galbano obducendo, ac vmbilico imponendo.
 Componuntur etiam emplastra ex solo galbano &
 assa foetida, iuxta Rondeletium. Sic etiam Iacchinus:
 Quod si, inquit, non praefocatione, sed conuulsionibus,
 aut torminibus & inflationibus capiatur, prater hac
 optimum est emplastrum è galbano appositum imo
 ventri: nec solum sic iuuat, sed & praeservat à morbo
 inuasuro. Hac inquit idem Iacchinus in accessione: Ea
 si dolorem facit, colicis remediis utemur omnibus: pra-
 cipue verò iuueni expedit semen imperatoria & ra-
 dicem bibere ex mulsa; & pilulas sumere, quae ex assa
 & castorio & ruta componuntur. Terebinthina po-
 tus utilis, & aquarum sulphurearum, & castorij cum
 decocto artemisiae; & infusio chamameli. Et ubi fa-
 cultas detur, infusiones quoque parentur in decoctis Infusiones.
 baccarum, & foliorum lauri, pulegij, calaminthae,
 marrubij, artemisiae, conyzae, sabinae, centaurij, di-
 ctamni, sansuchi, foenugr. althaeae, chamameli, ari-
 stolochiae, iridis & serpilli, ex eiusdem Aetij sententia.
 Verum infusionum tempore cerebri cura non relin-
 quatur; sed rosaceo & aceto caput irrigetur; & in
 aceto etiam spondylium, serpillum, ruta. & interdum
 castorium decoquatur; ac naribus quoque praedicta
 odoramenta assidue adhibeantur; praesertim casto-
 rium cum aceto, ut ipse inquit. Post hac ad castorij
 potionem transibimus: quod assidue potum saepe peni-
 tus ab hoc malo liberat, dandumq; est quotidie ʒj.
 pondere, aliquando cum aqua mulsa, aliquando cum
 artemisiae decocto, Aetio & Paulo testibus. In accessio-
 nibus

198 DE MULIERVM MORBIS,
nibus tamen in seſſionibus diſſiciliter vri poſſumus. Sac-
culi melius applicari poſſunt, quibus nos commodè in
muliere præcedente uſi fuimus. Hæc autem iam dicta
in acceſſione conueniunt: qualia autem præſidia adhi-
beri debent ubi acceſſio conquieuerit, poſtea dicturi
ſumus. nunc ruruſ alind exemplum curationis pro-
feramus.

OBSERVATIO XXXII.

*De uteri ſuffocatione ex ſemine
retento.*

ANNO 1565. menſe Ian. ſamula Henrici
Moermeeſterij pharmacopœi noſtri Del-
pheniſis, in grauiffima ſymptomata præfocatio-
nis incidit, idq. ex ſemine retento: nam quatuor
integris horis perdurabat paroxyſmus admodum
vehemens, idque de nocte. Cornelius Ericiuſ,
collega noſter, Medicuſ doctiſſimuſ, emplaſtrum
contra matricem (quo & nos quoque vri ſole-
bamus, forma rotunda, ad magnitudinem ferè
palmarum manus, ſupra alutam extenſum, & in cir-
cuitu galbano obductum) ſub ſiniſtro hypo-
chondrio ponebat, in quam partem uterus ex-
tollebatur & ſuſum ascendebat. Famula verò
exclamabat, ut altera iuencula aſtans manibus
depelleret uterum ad inferiora, cum ſe ſuffocari
ſentiret. Forte fortuna eadem nocte officinam
ingreſſuſ ſum, ut pro alia etiam eodem malo la-
borante nonnulla remedia præſcriberem, colle-
ga dudum domum reuerſo. Cumque viderem
virginem miſerè torqueri, imperaui ut empla-
ſtrum

Arum dictum à loco illo amouerent, & pudendo muliebri apponerent: quod cùm fecissent, ilico ad miraculum cessauit vteri suffocatio. Vbi ad se rediit, dixi vxori pharmacopœi, vt rogaret num menses tempore debito fluerēt: quod cùm ita se habere dixisset, procul dubio hoc malum ex semine retento esse conieci. Nam appposito emplastro, statim relaxabatur vterus, humiditate quadam seminali ex locis muliebribus excurrente: atque vtero mox relaxato, ægra exurgens bene se habuit. Non diu pòst hæc ipsa marito copulata, bellè deinde ac sanè vixit: erat enim boni habitus, & satis salax, vt videbatur. Hæc est eiusdem emplastri descriptio: & galliæ moschata, aliptæ moschata, styracis calamitæ, ladani purissimi, mastiches, añ. ʒ j. xyloaloës, xylobal-sami, carpobalsami, galangæ, cyperi, añ. ʒ iij. ros. rub. ʒ j. β. ceræ nouæ lib β. puluerisanda pulueriscentur, & cum l. q. terebinthinæ fiat emplastrum, vt artis est. Huius accipio ʒ j. & obduco in circuitu galbano, in forma rotunda, atque appono vmbilico, vt aliàs diximus. & inuenimus sæpe magnam vtilitatem quotidiana experientia. Est & alia descriptio emplastri pro matrice in Methodo miscendorum medicamentorum Ioannis de Boys, pharmacopœi Parisiensis, cap. 22. ita descripta: & rad. bistortæ ʒ iij. ligni aloës, santali moschatelini, nucis moschata, berberis, antheræ, añ ʒ ij. cinnamomi, caryophyllorum, schœnanthi, florum chamæmeli, añ. ʒ j. thuris masculi, seu olibani, mastiches, aliptæ moschata descript. Præpositi, galliæ moschata, styracis calamit. sty-

200 DE MVLIERV M MORBIS,
racis rub. añ. gr. xv. moschi gr. vij. (alij legunt, 3
ij. gr. v.) ceræ citrinæ 3 iiij. β. ladani puri lib. 1.
picis naualis 3 ix. fiat emplastrum. At nos supe-
riori descriptione semper vtiliter vsi sumus. Eo-
dem ferè tempore, mense Februario, alia quo-
que in vico Nosocomij Delphensis grauitè ex
eodem malo decumbebat, postridie à nuptiis,
adeò vehementi, vt per tres horas pro mortua
haberetur. Ad quam vocatus, licet in cubiculo
calido & lucido esset, quod quidem probatur,
statim imperaui vt stramenta altiora fierent ad
caput, vt quasi erecta sederet, & spina recta col-
locaretur, vt ita facilius spiraret; & vt statim la-
quei pectoris & ventris soluerentur: nam vesti-
bus constrictis iacebat: & voce alta vt nomen
eius ad aures inlamareretur, iussi, ac vt pili tem-
porum conuellerentur: (autores quidam, sed
satis impudenter, iubent vt obstetrices pilos pu-
dendorum vellicent) deinde vt pedes primùm
sursum, postea in medio & imo vinculis dolori-
ficis vincirent, & simul pannis asperis fricarent,
& sub volis pedum frequentius ac asperius,
etiam cum sale & aceto acerrimo: alij & plantas
pedum oleo nardino inungunt. hoc enim mo-
do, tum calore valentius reuellebamus. Coxas
igitur super genu strictissimè ligauimus, modò
& tibiis vinculis iniectis. Nodulum verò infra-
scriptum naribus obiecimur: & assæ fœtidæ 3
ij. castorij 3 j. in sindone fiat nodulus. Tum em-
plastra matricis, forma circulari & in circuitu
galbano obducta, vmbilico applicari iussimus.
Quibus & hæc incantamenti instar à paroxys-
mo,

mo, præter omnium mentem statim liberata est. Aliquando tamen, propter odorem, galbanum omittendum; potissimum si pudendo apponendum sit emplastrum. Obseruandum nihilominus ut instar scuti sub umbilico applicetur, & quod antè quoque monuimus, in parte illa acuta quæ tangit vuluam imponenda sunt aliquot grana moschi; ob causas Scholio præcedentis Obseruationis dictas, ex Rondeletio; qui ceroneum emplastrum præfert, ut & ibi videre est.

S C H O L I A.

NON desunt qui emplastrum sequens ponunt inter umbilicum & pectinem: & emplastri ceronei, emplastri pro matrice, añ. ʒj galliæ moschatae, aliptæ moschatae, ladani, añ. ʒj. subigantur cum oleo nardino & fingatur emplastrum rotundum, quod inter umbilicum & pectinem applicetur. Solum emplastrum ex galbano umbilico appositum nobis sæpe suffecit ad excitationem. Aliquando etiam non omnia ista, sed sola linimenta odorata vel alia pesti modo in vuluam imposita profuerunt. Quædam solo odoratu

Mulier in ultimo mense imprægnationis, solo odoratu assæ foetida curata.

assæ foetida per nos excitata sunt: ut Maria Gerardi, Delphis in foro frumentario habitans; quæ cum ultimo mense imprægnationis validè morbo vterino correpta, anno 1561. sub finem Decembris ex præfocatione corruisset, olfacta solummodo assæ foetida sindone obligata, præter spem multorum hoc solo remedio excitata fuit. similiter euenit aliis quamplurimis. Interea tamen, præter communia remedia iam superius dicta, aliquando propria quædam requirunt, quibus à

N 5

paro-

paroxysmo excitentur: nō iuuantibus assa fœtida, castorio, & eiusmodi aliis. Sic contigit in illa virgine quæ Delphis circa aquam fosseam vterino symptomate detinebatur: quæ neque emplastro contra matricem, neque malè olentibus naribus admotis licet aliquando eodem malo ante laborans, iisdem fuisset à paroxysmo liberata, excitari potuit. At Cornelius Ericius collega meus, egoq; simul vocati, cum tandem plumas perdicis vstas naribus admouissemus, mox ad se rediit: deinde postea, eodem malo subinde recurrente, semper iisdem remediis fuit restituta. Idem alteri puellæ cum Noordwici ad curationem cuiusdam Bronchorrhœ vocatus essem, euenit. Tales igitur plumæ à quadam proprietate iuuant, quare cum aliæ plumæ combustæ eidem tam efficaciter non præstent, ideo has semper deinceps paratas habere volumus. Memini nihilominus, matronam nobilem, cui ex vteri præfocatione subito syncope superuenerat, adhibitis fortibus ligaturis & dolorosis in coxis tibiisque, tum pedum plantis fortiter fricatis cum sale & aceto acerrimo, mox plumis caponis combustis ad nares admotis, subito reuixisse. Sed cum postea sentiret tumorem vteri cum dolore, hoc vnguento mox cessauit: R. vng. de ammoniaco ℥j olei lilior. de cappar. añ. ℥ss. misce. Memini & uxorem Theodori Teylingij, adfinis mei, ab vterino malo excitatam (ut antea quoque narrauius) solo pessa subdito ex floribus roris marini cum panno lineo ad digiti formam. Sic aliæ puellæ nobiles, pessa ex thymo eodem modo subdito, à paroxysmis ilico restitutæ sunt: quamuis rursus aliis id vidimus non profuisse. Nouimus alias sola masticatione seminis leuistici, & semen paulatim deglutiendo, à paroxysmo

Plumæ perdicis vstæ excitant à proprietate à paroxysmo.

cyfmo fuisse liberatas. Sed & illud pro mirabili
 secreto & experimento accepimus, valens & ad se-
 cundinam extrahendam, ad menses suppressos, ad
 vteri suffocationem, tam ex semine retento, quàm
 ex mensibus suppressis, ad molam quoque & fœtum
 mortuum extrahendum vel educendum; atque ex-
 pertum dicitur in iis quæ per 14. dies vel plures se-
 cundinam à partu retentam habuere, quæ neque vllis
 modis ab ea exonerari poterant, vt extrema in-
 unctiōe inuncta animam exhalaturæ viderentur,
 donec hoc secreto ab obstetrice, quæ id à Iudeo Me-
 dico, cui pro famula inseruierat, se accepisse refere-
 bat, curarentur. Sumebat folia leuistici viridia,
 contundebat, & succum exprimebat cum vino op-
 timo Rhenensi; eius cyathum vnum propinabat. In
 hyeme verò contundebat semina eiusdem & modicè
 in vino ebulliebat, demum colabat cum expressio-
 ne; vel in aqua artemisiæ bullita atque expressa ex-
 hibebat quàm felicissimè. Ego tamen sæpe observa-
 ui dum eiusmodi, seu pulueres, exhiberentur cum
 vino, quòd vterus magis ascenderet: & ideo potius
 talia exhibeo vel cum aqua artemisiæ, vel cum cere-
 uisia & non cum vino. Noui mulierem admodum
 exigua staturæ, valde prolificam, Delphis habitan-
 tem, in vua pensili in foro, satis obesulam, quæ vel
 leui occasione abortum patiebatur. Huic familiare
 malū erat vteri suffocatio, ad quam etiam sæpe nocte,
 cum quasi pro mortua haberetur, euocati fuimus. Hæc
 autem primo & secundo mense imprægnationis hoc
 malo detinebatur. præsentiens paroxysmum, sola ra-
 dice ostrutij in ore retenta, & parum masticata, à suf-
 focatione liberabatur; nec alio remedio quàm hoc ipso
 solita

Historia
 prægnantis,
 quomodo
 ab vteri suf-
 focatione
 liberata.

solita erat hoc malum à se depellere. Superbibebat tamen vel absorbebat parum aceti vini optimi; vnde ructibus emissis, semper restituebatur; quamuis etiam stomacho imbecilliori esse videretur. Scribunt tamen Medici, acetum neruis, membrisque neruosis, tum vtero, minimè conuenire. Rectè igitur dictum puto à Galeno, cuiusque naturam propriam Medicum nouisse debere. Sed cum vniuscuiusque (vt idem Gal. 3. Meth. med. rectè dicebat) naturæ proprietas infabilis sit, nec vel exactissima scientia comprehensibilis, ac præterea cuiusque hominis propria curatio habeatur; is erit optimus cuiusque particularis ægritudinis Medicus, qui iam etiam methodum comparauit, ex qua & dignoscere naturas possit, & coniectura consequi, quæ sint cuiusque propria remedia. Et licet quidam dicant acetum non conuenire, scilliticum nihilominus ab aliis commendatur; quare non est mirum, hic acetum cum radice ostrati conuenisse. Interea ratio impregnationis habenda, ne subtus aromata supponantur, aut alij pessi, ne abortus subsequatur. Mulierculæ Delphenses sequenti puluere vtuntur ad vteri suffocationem: R. granorū iuniperi, calami arom. rad. gentiana, sem. pastinacæ añ. ʒj. fiat pul. subtiliss. à ʒij. ad ʒj. dabāt cum vino. Sed vinum cum boni sit saporis, vterum per se ascendere facit. Præstat vti cum cereuisia, aut alio liquore conueniente. Idem pul. valet ad ventositates expellendas, & ad ventriculi roborationē, eo quod sæpe vsus sum, & multas restitui, exhibendo cum cereuisia.

OBSER-

OBSERVATIO XXXIII.

*De uteri vehementissima præfocatione
ex semine retento.*

PVELLA annos 20. nata, filia illius qui in Speculo in foro frumentario habitabat, 15. Septemb. die anno 1579. sub vesperam gravissimam præfocationem uteri incurrit, cum tussi valida, ut mox suffocari videretur. Cum globulum ex assa fœtida & castorio pro odoratu naribus admonissemus, & hunc pulverem sequentem sumpsisset cum cerevisia exigua, eodem vesperi accessio illa, licet grauior, cessauit: & rad. gentianæ, sem. dauci, ostrutij, añ. ʒß. fiat pul. subtilissimus. Sequenti die utcumque habebat. Pro tussi tunc pectus inunximus; & capiebat frustū vnum aliquando ex rad. inulæ saccharo conditæ. habebat enim aliquid amaritudinis, ideo minus nocebat præfocationi. dulcia autem planè ferre non poterat. Et quia macilenta erat, tamquā tabida, fusca, citrina, & quasi ictero affecta, continuò sumebat cerevisiam in qua decoctum erat marrubium. 17. die Septemb. melius habuit, ita ut vltiorem curationem relinqueret, ac parentes mihi soluerent. At 18. die sub vesperam reuersa est uteri suffocatio, durans per quatuor horas, adè violenta, ut pro mortua haberetur: anhelitum trahere non poterat, frigidum exudabat, totumque corpus quasi conuellebatur, utero ad superiora retracto; mulieribus tamen non

non sentientibus ascensionem eiusdem, vt alia
quando fieri assolet: sed putridus vapor ascen-
dens guttur & pectus occludebat adeò, vt astan-
tes illam in agone esse existimarent. Dedi ꝓj. pul-
matrialis, qui ita describitur à Leonello: & rad-
dictamini, sem. baucia, añ. ꝓj. cinnamomi electi
cassia lignea, melissa, añ. ꝓij. croci orientalis ꝓ
β. castorij pinguis & recentis ꝓj. misce: fiat pul-
dosus est à ꝓβ. ad ꝓj. cum aqua vrticæ vel cha-
mæmeli. Dedimus ꝓj. cum cœrenisia. Semper
sub noctem redierat quasi febricula adiuncta
fuiſſet. At nunc adeò violenta, vt neque pul-
iuuaret, nec odor assæ foetidæ & castorij, nec
plumæ perdicum vsq̃, quæ omnia tamen sæpe
iuuare solebant. Sororius eodem tempore acces-
sit cum tonfore iactabundo empirico, qui sani-
tatem pollicebatur. At huius consiliam adhibi-
tum non fuit, nec nos admittere voluimus; nec
enim originem ex semine retento cognoscebat.
Adeò autem violentus erat paroxysmus, vt in
vita talem non viderim, duabus horis infestans.
Imperavi vt mater sequens emplastrum vmbili-
co apponeret, & in oleo sequenti digitum intin-
ctum clam in vuluam imponeret: & emplastrum
contra matricem ꝓβ. ducatur supra alutam ro-
rundam paulo ampliorem daleto, & in circuitu
obducatur galbano: & olei lilior. ꝓj. moschi gr. v.
sibetti gr. ij. misce. Vix digito imposito in vuluam
cum confricatione, ad miraculum, ad se rediit, &
ab orci faucibus quasi renocata est. Sed ne am-
plius redirent paroxysmi, imperavi vt empla-
strum per duos dies retineret. Interea dedimus
postea

ostea ʒj. rhab. cum decoct. marrubij; atq. etiam lobulum ex iisdem, nempe rhab. & marrub. xiccato, adiectis croco exiguo & specieb. dia- od. abb. propter icterum, & febriculam quam habere videbatur. Hæc igitur astantium adm- atione euasit. Ceterum ne morbus rediret, quo- iam tales præseruari debent, cum hic morbus periodos habeat, quia ex semine originem tra- nebat, consului ut potius nuberet. Interea, si hoc integrum non esset, consulimus ut iis vteretur quæ nonnihil semen exiccare possunt, idque vi- ctu & medicamentis; ut cannabis semine, aut vi- ticis, & radice nymphææ. Iniunximus autem victum extenuantem, & maximè siccantem, cum exiguo potu, multam exercitationem atque inambulationem. Sed de his latius in Scholio.

SCHOLIA.

QUO MODO accessio curetur, iam diximus. Ve- Vbi accessio
non virgeat,
curatio.
rùm ubi ea conquieuerit, ac si ab eadem præser- uari velit agra, aut diuturnus factus fuerit affectus; videndum nunquid ex semine retento fiat, uti hic erat. Quamobrem singulis medicamentis admiscenda sunt quæ semen minuunt ac abolent; de quibus antea dixi- mus cum de iis ageremus qui in venerem procliuēs essent, & ex seminis profluuiο laborarent. Talia sunt viticis, ruta, cannabis semina. Castorij quoque ʒj. assiduò potent, modico aniso adiecto, ut Aëtiū sua- det ex Philagrii auctoritate. Interim quoque diam- bra, diamoscho, ac antidoto mythridatica uti pote- ris. Celsus castorium, vel gith, vel anethum potui- dandum

Topica.

dandum præcipit. Patet etiam cauendas esse contritiones, fabulas, aspectus, lectiones impudicas, can-
 riones, ceteraq; quæ Venerem excitant: quamuis al-
 ea commendent. Interea quoque suprâ relatæ in se-
 nes ac pessi conducent. postremò verò ad naturalia bal-
 nea, eaq; calida, confugiendum, quæ etiam ab Egi-
 neta commendantur: post quæ vnctiones quoque ap-
 proximantur pectini, inguini, ac lumbis, ex oleo lilia-
 ceo, irino, rutaceo, & nardino, viticis ac rutæ semine
 costo, ac casia, cum pauxillo ceræ paratæ. Interim quo-
 que saluæ, aut calaminthæ contusa, seu seminis can-
 nabis quidpiam admisceto. Multum etiam conferunt
 deambulationes matutinae, gestationes, quæ in curru
 vel naui, vel iamento adhibentur. A motu verò ge-
 stationis, prodest vociferatio, & lectio clara, modu-
 lata, ac concinna. Item vnctio, frictio, & exercitatio,
 per congrua intervalla repetita, vt Aëtius admonet.
 In vniuersum, vbi ex redundante potissimum semine
 generatur hac affectio (vt etiam Donatus ex Aëtio,
 Paulo, Galeno annotauit) tum victus, tum medica-
 menta conferunt, quæ resiccandi vim habent, siue cali-
 da, siue frigida fuerint: similiter & hū vtendum (de
 quibus mox diximus) quæ totis substantiis semen ex-
 tinguunt. Ad vteri strangulatus conuenire inquit Gal.
 9. De compos. medic. sec. locos, agarici ℥ j. in potu ac-
 ceptum ex vino: item plantaginis semen, & succum
 cum vino. nec minus confert onyx ex conchylio pota-
 tus, & acetum scilliticum absorptum, vt ipse inquit.
 At frequens coitus hic magis iuuat. At cum præ-
 gnantibus semper clementer agendum, vt iam antea
 quoque dictum est. Quod ad phlebotomiam attinet,
 suspectum remedium est, nisi cum suppressi sint men-
 ses,

ses, ut exemplo sequenti docebimus: tunc enim conuenit, si ex mensibus retentis malum oriatur.

OBSERVATIO XXXIIII.

De uteri praefocatione ex menstruis retentis.

MATRONA nobilis de Bombergen Antwerpiana, vxor Iacobi Persinij, ad Montem Piscinæ, in Haga Comitatus habitans, ex menstrua purgatione retenta, symptomate vterino cum correpta esset, ad eam vocatus fui, anno 1566. 16. Martij die. Statim pro accessione curanda, naribus obieci globulum ex assa foetida, ut odoraretur. Emplastro contra matricem, circulari forma, & in circuitu galbano obducto, etiam vmbilico imposito, & oleo liliaceo cum granis aliquot zibetti in vuluam per obstetricem digito indito, cum ad se parum rediisset, semen leuistici cum cereuisia exhibui, ex quo bellè habere visa est. Deinde cum à suffocationis accessione libera esset, 18. Martij die ita illam purgaui: & diacatholici ℥β. diaphœnici ℥j. pul. hieræ picræ ℥j. cum decoct. artemis. & melissæ ℥iij fiat haustus. Septies aluum deposuit cum multis ventositatibus. 19. Martij ad menses euocandos: & florum chamæmeli, folior. sabinæ, añ. m. β. sem. dauci ℥j. bulliant in aqua communi, & huius decocti accipe ℥iij. Adde spec. diacalaminthæ, diacumini, añ. ℥j. castorij ℥β. pul. dominarum gr. iij. calidè vnica vice sumebat: & olei rutacci, anethini, chamæmel. añ. ℥β. misce.

O

in un-

inungatur venter inferior. Fiebant etiam frictiones & ligaturæ crurū in principio, ad diuersionem. Redibat adhuc semel paroxysmus, sed leuior. 21. Martij sequens dedi: ℞ decoct. flor. chamæmeli ℥ iij. in cereuisia decocti, pul. cumini ℥ j. sumpsit vnica vice. Bis fuit reiteratum, & profuit. Sacculus quoque paratus ex floribus chamæmeli, absinthij, artemis, cumini, ventri inferiori calidè apponebatur, sed non potuit ferre. rediitque denuo paroxysmus; qui tamen suffitu plumarum perdicum combustarum cessauit. 23. Martij propinaui hanc purgationem: ℞ elect. lenit. ℥ β. elect. de dactylis ℥ ij. elect. hieræ picræ ℥ j. cum ℥ iij. aquæ artemisiæ, addendo syr. de byzantiis sine aceto ℥ j. misce. & ex eo habuit quatuor sedes. Interea & hoc condito utebatur: ℞ conser. absinth. rom. flor. borag. añ. ℥ j. confect. mithridaticæ, theriacæ diatessaron, añ ℥ ij. diacumini ℥ β. misce. capiebat ad magnitudinem parvæ castaneæ, & optimè deinde se habuit. Aperuissem eo tempore libenter venam tali, vt menses melius fluerent: sed noluit admittere. Tamen continuando conditum, bene se habuit. Reliquam curationem commendaui viro; cum Venus hîc valde conueniat. Postea & menses debitè fluxere, & curata permansit. At puellæ illi pituitosæ, valde crassæ, ad quā vocatus fui 21. Nouemb. anno 1588, quæ circa pontē Auenarium Delphis habitabat, emplastro matricis, etiam vmbilico imposito, & oleo liliaceo cum zibetto subtus indito per mulierem, cum ad se rediisset parum, hunc puluerem exhibuimus.

mus: & rad. gentianæ, sem. ostrutij, dauci, añ.
 ʒj. fiat pul. detur cum pauxillo cereuiſiæ, non
 autem cum vino. Memini cū in Hagam Co-
 mitis accitus eſſem ad filiam præfocatam inſi-
 gnis illius Aduocati Coei dicti, quòd alius Me-
 dicus propinaſſet theriacæ ʒj. cum vino, maio-
 rem eam incurriſſe acceſſionem vterinam. at
 cū puluerem ſupradictum dediſſem cum ce-
 reuiſiæ, admotis etiam caſtorio & aſſa foetida ad-
 nates, ſtatim reſtituta fuit à paroxyſmo. Cete-
 rū huic puellæ craſſæ poſtea exhibui hanc
 purgationem: & ſyr. ex inf. roſ. pallid. cum foliis
 ſenæ ʒj. ʒ. elect. hieræ picræ, diaphœnici, añ. ʒ
 ʒ. aquæ cardui benedicti ʒij. ʒ. miſce. Egre-
 gie excreuit. Poſtea, cū aliquo modo febricitaret,
 adhuc ſemel eam hoc modo purgauimus: & ſyr.
 ex infuſ. roſ. pallid. cum foliis ſenæ ʒj. ʒ. elect.
 hieræ picræ ʒj. diacatholici ʒʒ aquæ cichorij ʒ
 ij. ʒ. miſce. Deinde vena tali ſecta fuit; &, men-
 ſibus erumpentibus, hæc fuit curata. Ita etiam
 ſanata fuit filia pulcherrima Valkęſtenię cogna-
 tæ noſtræ, caſtorio & aſſa foetida natibus admo-
 tis, & emplastro matricis vmbilico impoſito, &
 puluere ſupraſcripto exhibito, ac ſubtus impo-
 ſito olei amygd. dul. ʒʒ. cum moſchi optimi gr.
 iiij. & zibetti gran. ij. &c.

S C H O L I A.

DICTVM eſt paulo antè, vbi acceſſio conquie-
 uerit, & non amplius virgeat, ne agra rursus in
 eandem incidat præſeruari debere; & tunc curationē

aggredimur pro ratione causa. Nam si ex mensu sup-
pressionem, ij ducendi sunt modis quos supra diximus.

Vena sectio. & sic plerique initium sumunt à vena sectione: ex ta-
lo enim venam secant; quæ tamen minus conuenit,

ex semine retento, vt paulo antè retulimus. Deinde a-
lui purgationem seu euacuationem progredimur.

Purgatio.

Sic etiam Aëtius in eo affectu, qui iam chronicus eua-
sit, à sanguinis missione inchoat, præcipue si menstru-

purgationes detenta fuerint. Secatur autem, vt dixi-
tali vena. Purgatio verò fit ex hiera, ex aloë confe-

cta, picra dicta, quam & Aëtius valde commendat.

Si cum men-
sium sup-
pressionem
etiam succi
crassi abun-
dant, quid
faciendum.

Verum si cum mensium suppressione crassi etiam a-
frigidi succi redundabunt, iidem prius concoqui a-

preparari debent, & deinde purgari ex eadem hiera
cum agarico; seu pilulis foetidis, aut sagapeno cum ea.

dem hiera & agarico & (vt summarim dicamus) eisdem
medicamentis vtetur, quæ antea ad menses suppressos

conscripsimus: à quibus diaspolitico pharmaco assidui
vti debent, & eo quod ex tribus piperis generibus con-

A purgatio-
ne quæ tri-
buenda.

stat, ac etiam eo quod ex calamintha appellationem
habet. Si autem humores corrupti in vtero sunt, eua-

cuentur, minorando, deinde digerendo, post eradican-
do, postremo roborando matricem. vt: R. pilul. hiera

zß. foetid. ʒj. fiant pilula v. R. syr. de artemis. ʒj. ß.
decoct. matricaria, melissa, artemisia, añ. ʒj. misce, &

in ʒij. decoct. eiusdem diss. diacath. ʒv. elect. indi maior.
ʒij. diaphœnici ʒiij. misce. detur deinde lauatiuum

ex iure pulli cum saccharo rub. roboretur cum arom.
ros. & diamos. in tabulis. Iungitur aliquando suffo-

catio vteri cum epilepsia per consensum: vti euenit
Barbaræ Brunonis Delphensi, annos 24. nata, anno

1568. 27. Nouemb. Erat leuis cum palpitatione in
malis

Histeria
epilepsia
cum suffo-
catione
vteri.

malis ac facie; postea concidebat ferè, sed non semper. Hoc decocto epoto, per integrum annum, malum deinde non rediit: & maiorana, artemisia, pulegi, salvia, melissa, añ. m. j. betonica m. ss. flor. stœchad. p. j. folior. senæ ꝓ. agarici feminini ꝓ. ss. sem. anisi ꝓ. ij. rhab. selecti ꝓ. j. schœnanthi, zinzib. añ. ꝓ. ss. vuar. pass. abarill. repurg. ꝓ. ss. glycyrr. ras. ꝓ. ij. coquantur in aqua communi pro ꝓ. vij. fortiss. express. adde syr. de artemis. è stœchade, añ ꝓ. j. misce pro duabus dosibus matutinis. Aluum egregiè deposuit, cum multis ventositatibus: & intra annum postea non rediit malum, nisi anno 1569. die 16. Septemb. tunc iterum exhibitæ fuit eadem portio, adiectis aliquot seminibus pœoniæ: & malum non reuertebatur. Sed, quod ferè omiseram, menses consuetos semper habebat. at ex vtero videbatur vapor ascendere ad superiora, tandem in genis & facie palpitationem inferendo, mox casum, sed non semper. Plura de vteri strangulatu vide apud Alexandrum Benedictum Veronensem, lib. 26. à cap. 16. vsque ad caput 23.

OBSERVATIO XXXV.

De vteri procidentia, per modum consultationis.

PROCIDERE vterum dixit Aëtius lib. 16. cap. 78. quando ita euertitur, vt exterius emineat: neque enim vterus, vt imperiti suspicantur, à suis solutus propaginibus totus decumbit: nam si ita procideret, restaurari minimè posset. Ita & Paulus lib. 3. 72. Quidam, inquit, & totam vuluam prolabi memoriæ produnt:

O 3

quod

quod à vero longè abest. Vterus enim ligatur parte inferiore duobus fortissimis ligamentis, quæ illum retinent, ne superiores partes comprimatur, & neque in dextram aut sinistram contorqueatur, & meatum vel cornu, vel os interius dilatans. Quòd si alterum ligamentorum relaxetur, aut contrahatur, trahitur ad partem dextram vel sinistram. Parte superiore uterus firmatur, & ligatur vasis spermaticis, & venis in superiore vteri partem peruenientibus. Et quia venæ & arteriæ facillè rumperentur, nisi firmarentur firmissimo aliquo vinculo, natura peritoneo munivit & venas, & arterias, & totum uterum. Si peritoneum relaxetur, deuoluitur & decidit in partem inferiorem, aliquibus magis, aliquibus minus. Nam quibusdam extra apparet, aliis in collo sentitur. Alij verò (vt Fernellius) distinguunt descensum vteri à prolapsu. Descensus vteri apud eos appellatur, quum in inferas partes prouoluitur. Percipit obstetrix hunc pudendo obuium; laborans verò ipsa, si erecta steterit, grauitatis pondus in pudendum incumbere; sin autem vel sedeat, vel supina iaceat, vel aluum exoneret, quasi onere rectum intestinum premi; sin prona iaceat, vrinæ difficultatem nasci, vt etiam viri congressum pertimescat. Prolapsus verò descensu grauior est, quòd euersus uterus procidat eiusque fundus promineat, & manu attrahatur, anserini saltem oui magnitudine. Hinc Aëlius loco citato: Quod verò procidit, ouo struthiocameli simile est, maioris tantum, aut minoris ratione differens, prouoluitur euersio.

euerfionis violentia coëgerit. Fernelius ad huius
 differentiam addit etiam conuulfionem. Con-
 uulfio, inquit, est, cum vterus in alterutrum in-
 guen contorquetur. Linguihis, ac saepe coxendi-
 cis, vehemens tum dolor exercet; qui si atrocius
 excandescat, vterifutor appellatur; de quo ante
 egimus ex Aëtio; crustotum maximeq. semper
 torpescit ac friget. Tam varij, inquit, motus &
 errores is duntaxat obtingunt, quibus vteri ap-
 pendices laxiores, idque ex graui vteri gestatio-
 ne, vel ex casu, atque contusione, vel ex copiosi
 humoris perfusione, euasunt. At prolapsus
 non ex leuioribus hifce causis, sed ex vehemen-
 tiore solum pariendi conatu, quo vterus foetum
 secundasve cum impetu excludit, seque inuer-
 tens præcipitat, consequitur. Interdum & im-
 prudentis obstetricis temeritas vterum cum fo-
 tu aut cum secundis inuertit detrahitque, vt nos
 aliquando fieri cognouimus. Sunt & alia causæ
 vehementiores, iuxta Aëtium & Paulum locis
 citatis. Ab alto enim mulier si in coxarum ver-
 tebras deciderit, disruptis membranis quibus-
 dam, quæ vuluam cum vicinis membris con-
 nectunt, eo morbo corripitur. Nec minus cor-
 ripietur ob violentam loculi expulsionem, quod
 præcipuè in abortibus accidit. Nimia præterea
 spiritus detentio, aut immensi pōderis eleuatio,
 aut percussio vteri procidentiam inferre solent.
 Sæpe & ob humoris plurimi ac tenacis deflu-
 xum, partiumque frequentias, laxantur soluun-
 turque appendices profundo vtero superius in-
 hærentes. Ob vehementes etiam animi affectus,

vt si filiorum interitus, vel hostium incursus nuncietur, vel in maximam pelagi tempestatem inciderint; toto corpore mulieres exolui solent; ita vt vulua quoque elabatur & procidat. Nonnunquam & sine vlla istarum causarum debilitantur corpora, vt, membranis musculisque vuluam sustentibus exolutis, affectus contingat, quod decedente ætate fieri solet. Hæc Aëcius. Easdem ferè causas ponit & Paulus. Ideò querendæ sunt causæ antequam ad curationem veniamus. Sic rustica mulier, cui uterus relaxatus propendebat, cum Alomariæ adhuc praxin exercerem, me consultandi causa accessit. Cum autem hæc mulier valde alba & pituitosa esset, perpetuò circa aquam versari solita, (nam ex Waterlandia ad nos venerat; & nudis pedibus in campis versabatur frequenter dum vacas emulgeret, & aliquando per aquam ad illas cogebatur accedere) cumque adeò uterus sæpe procidat ob relaxationem factam ex frequenti & diuturna mora in aquis: sanè quòd ex humiditatibus mucaginosis laxantibus appendices matricis, hoc malum ortum suum haberet, illico cognoui; testante & id mulieris habitu, tum copioso humoris fluore. Nam similiter confitebatur se quoque longo muliebri profluuiò laborasse; & tota constitutio eius erat pituitosa: ideo & resiccantibus & restringentibus curanda erat. Licet igitur hîc materia pituitosa prius concoqui deberet, & deinde euacuari, atque id multis remediis, vt nos antea longiore sermone docuimus; tamen cum apud me manere non veller,

ne

ne sine præfidiis à me discederet, (etiam præhabita prædictione quod non tam facile curaretur, nec vnico remedio) imperaui vt septimo quoque die tres pilulas hora vna ante cœnam caperet: & pilul. de hiera simplici, agarici trochis. añ. ʒj. β. corticum myrobal. chebul. ʒj. cum melle ros. fiant pilulæ vj. è ʒj. Postero die vt caperet ʒj. theriacæ optimæ cum vino ad minus quinque horis ante cibum; idque semel in hebdomada, post pilulas assumptas. Cum bene esset repurgata, iussi vt ʒij. vel iij. aliquot diebus caperet ex rotulis spec. diamoschi dulcis, idque ter quaterve in hebdomada. deinde partem vteri exterius eminentem lauaret simili decocto: & foliorum lauri, & baccarum, menthastri, menthæ, artemisiæ, sampsuchi, rorismarini, añ. m. j. coquantur in vino adstringente. Vngatur post lotionem mucagine sem. cotoneorum & inspergatur pul. sequens: & acaciæ ʒij. baccar. myrti, ros. rub. añ. ʒij. cornu cerui vsti ʒij. β. redigantur in tenuem puluerem, quo post fotum & vnctionem inspergatur vterus per obstertricem, vt dictum est. Interea, priusquam in suum locum vterus per obstertricem imponatur, si in recto intestino durum stercus fuerit, illud educendum erit. Aërius clysteri vtitur: nos poterimus in hac rustica vti balano, nam clysterem non admitteret. Hoc autem tempore, vt etiam admonet Rondeletius, abstinendum erit à iusculis, nisi cum aluus proritanda erit, quæ sæpe & propter decubitum, & vsum astringentium constringitur. Quare huic symptomati

occurrendum erit cassia vel prunis, vel clystere detergente, & proritante leuiter facultatem. Neque imponendæ malnæ, aut aliæ emollientes herbæ, ne pars relaxetur. Sufficit herbam mercurialem & ciclam in decoctione ponere, betonicam, artemisiam, vel absinthium. Neque oleum ponendum est. Nam si adstringar, actionem clysteris impediet: si emolliat, partem lædet. Quamobrem satius erit citra oleum parare. Dum hæc quoque peraguntur, decumbendum est, & sobriè edendum. Simili modo si in vesica lotium collectum fuerit, studebendum vt prius reiiciatur: sin minus, fistula vesicaria euocandum, iuxta Aërium. Euenit enim plerumque, vt idem testatur, vt eorum detentione vterus, qui inter ytrumque, rectum, inquam, intestinum & vesicam medius statuitur, compressus, & intra locorum angustias coactus, in prolapsu suo impediatur ne repelli & in proprium situm reduci queat. His autem rite peractis, agram supinam obstetrix collocabit, coxis accliuibus seu altioribus, reflexis poplitibus, & cruribus disparatis seu inuicem dilatatis: deinde prolapsam vteri partem, oleo tepido, vel butyro, vel betæ, maluæ, althææ, fœnugræci, seminum lini, aut similium decocto affatim fouebit; hastulamque laneam præparabit, vel lanam conuolutam, crassitudine & figura muliebri pudendo conformem, cui tenuissimū purissimūque lintecolum exterius circumuoluet, ac deinceps acacia aut hypocisthide vino dilutis intinget; tum vteri partem sensim repri-

mens

mens, in proprium locum statuet, postea hastulam laneam in fissum pudoris subiciet, atque inde lanam vino adstringenti madefactam superponet, & totum pedinem lana aut spongiis è posca expressis operiet, & alligabit; cruraque mulieris extensa insertim collocabit, ut alterum alteri inequiter aut incumbat: tutius tamen erit pedes simul vinciri, fasciam usque ad genua deducendo. Nonnulli uterum qui nuper deciderit, cucurbitæ domesticæ & betæ decocto cum urina foetida, aut aceto acri, vel aliqua re foetenti collaunt. At si prolapsus uterus temporis diuturnitate intumuerit, plurimoque humore infarctus fuerit, ita ut tumor reductionem impediat, betarum decocto ipsum irrigamus; deinde acetum circumfundimus, salque tenuissimum inspergimus: postea, ubi detumuerit, eodem decocto collaentes, sicut prædiximus, repellimus; deinde cucurbitulas umbilico & utrisque ilibus cum plurima flamma affigemus, & odorata naris iugiter admovebimus. Tertia verò die, lana adhuc in pudendo persistente, mulier in vino nigro austero quadantenus tepesfacto; aut in myrti, lentisci, rubi, malicorij decocto infidebit. Ac peracta infusione, rursus supina accliuibus coxis locabitur, sublataque è pudendo priori lana, noua iterum eodem medicamento madefacta imponetur. Suminiq; imponantur, cataplasmatibus modo palmulæ, polenta, malicorium, lenticula cum oxymelite; & alternis diebus, usque ad exactam

curatio-

curationem, permutetur. Atque hæc, tribus diebus interpositis, rursus fient, quoad perfectè vitium discusseris: enimvero vbi vteri crebrò prolabantur, posca abluantur, in eademq. mulier diutius infideat, & deinceps omnia relata fiant. Hæc autem, vt per obstetricè fierent mandauī, Vbi iam in locum vterus reductus esset modo dicto, cucurbitulas duas iam dictas in ilibus figeret, & vnā magnā supra vmbilicum, suā; & vt sequens emplastrum inter vmbilicum & pectinem applicaret: & emplastri ceronei (confert frigiditati matricis.) emplastri pro matrice, añ. ℥j. galbani, ammoniaci, añ. ℥j. gummi dissoluantur in vino, fingaturque emplastrū rotundum, quod ventri inter vmbilicum & pectinem admoveatur. Interea odorifera iugiter naribus admoveantur, fœtida verò inferius. Obstetrix quoq. vti poterit tali pello: & assæ fœtidæ ℥j. picis colophonix, mastiches, añ. ℥ij. inuoluatur linteo raro, fingaturque pessus, qui filo coxæ alligatus in vterum dimittatur. Cunnus deinde decocto sequenti foueatur: & balaust. gallar. rhois opsoniorum, rosar. rub. añ. q. v. decoquantur in aqua chalybeata vel cisternæ, & in vino astringente: fiatque vt dictum est. Ei quoq. puluis paulo antè dictus inspergatur, quo vterus exterius eminens inspergendus dicebatur. Interea oportet vt ipsa à vociferationibus, sternutationem mouentibus ac tussim, aliisque immodicis motibus abstineat, ita vt quietè ac tranquillè viuat; & vtatur tenui victu, ne multa recrementa in intestinis colligantur: vtatur itaque cibus boni succi,

succi, & odorato vino ac tenui, sed quia rustica, etiam cereuisia absinthite. Post curationem abstineat à coitu nimio, saltatione, ira, clamore. Quòd si his remediis non curabitur, erit incurabilis. Plura vide Consultatione 222. apud Montagnanam, De exitu matricis.

SCHOLIA.

QUICQUID sit, siue uterus decidat, prolabitur, exeat, aut in partem aliam moueatur, semper uterus afficitur & laborat morbo in situ. Et sic affectus præter naturam pertinet ad morbum in situ. Causas autem multas etiam in Obser. præcedente esse diximus. Externæ videlicet sunt, si ab alto delapsa sit mulier, vel ex violenta secunda extractione, ex abortu, vel fœtus inartificiosa extractione, ex spiritu depresso, oneris leuatione, vel uteri plaga, offensione, vulnere, ob vehementes animi affectus, liberorū amissionem, hostium incursum, periculosam nauigationem; ex frigore, mora in aqua, & similes. Internæ, humoris plurimi ac leni defluxus, partuum frequentia, membranis aut musculis uterum sustentibus resolutis. Signa demonstratiua satis patent, quia uterus extra propendet, vel à loco suo motus est; ut in Obser. præcedente ostendimus. nam & illud quod procidit struthiocameli ouo simile est, iuxta maioris aut minoris differentiam, prout violenta euersio contingit. Iuxta Aëtium, in principio plurimus sanguis erumpit; deinde consequitur dolor præcordiorum, lumborum, imi ventris, ac pudendorum; & periculum est, ne, perfrigeratis locis, conuulsio inferatur: quamuis progressu

Pars affecta.

Causæ externæ.

Internæ.

Signa.

Causarum
diagnosio.

Prognostica

Historia
Gradi de
muliere sine
matrice vi-
uente.

Beniuenius
cap. 11. De
abditis cau-
sis morbo-
rum.

progressu temporis, ubi affectio inualefcit, & loci cal-
losi facti sunt, neque conuulsionis periculū imminet;
neque dolor infestat, eodem Aëtio teste. At causarum
diagnosio haud agrè quoq; haberi poterit, partim ex re
ipso, partim ex agræ vel astantium sermone; praesertim
causa externa. Interna quoque, ut si ex humore putri
vbertim ex locellis defluit humor. Iam quoque mulier
pituitosa est, desidiōsa; prius quoq; saepe vsa fructibus,
piscibus. Verū ex quacūq; causa fiat, cū adhuc re-
cens est affectio, conari oportet v̄t vterus ipse cōtrahā-
tur: in principio enim facillē dirigitur, & rectē locatus
permanet, praecipuē in vigore etatis. In etate proue-
ctioribus contrahitur quidē, sed ex leui occasione rur-
sus prolabitur; ex eiusdem Aëtij testimonio. Si ad latera
tendat, facillē curatur. Si extra os vuluæ exit, vix cu-
ratur, secundū quosdam. Si longo tempore procide-
rit, nunquā. Si ex succis corruptis, putrefactis, & pra-
cipuē ipsa matrice putrefacta, vel ligamentis putrefa-
ctis, frustra curatur. At si processu tēporis id quod pro-
lapsum est, computruerit, id ipsum auferetur nullius
metu pericali. Etenim vniuerso vtero ablato, ubi pu-
trefactus fuisset, mulierem nihilominus superuixisse,
narrāt Aëtius & Paulus, quorundā auctoritate. Refert
Gradius, se mulierem Papiae ex nobili prosapia, à qua
tota matrix putrefacta frustatim deciderat diuersis
temporibus, cognouisse, & eandem aliquot annis su-
peruixisse. Idem refert Beniuenius de muliere perni-
cioso vlcere vexata ipsius vuluæ, ita vt corrupta vul-
ua, & frustulis comminuta descendens, non ante
fluere destiterit, quā tota putrescens deciderit, & ta-
men ipsam 10. annos sine vulua superuixisse. At ob
causam externam, vt occursum aëris frigidi, vel aquae
frigidae,

rigida, si in varium pellatur situm vterus in corpore
 ano, remediis calfacientibus vtero admotis, & vento-
 itates carminantibus, facile in locum reducetur: ita
 quoque ab humiditate curari poterit. At ex difficili
 artu, aut foetu extracto, vel secundina ab obstetrice
 gnata, aut quacunque ex causa violenta ruptis liga-
 mentis, non speratur curatio. Si cancro similiter, cum
 non speretur remissio causa. Quomodo curetur, iam
 ex parte diximus ex Aëtio, quibus videlicet modis im-
 pellatur, facibus prius eductis, & vrina euacuata. At- Curatio.
 tamen causa prius inquirenda. nam vbi ob relaxationē
 quæ ab humiditate fit, curatur resiccantibus & astrin-
 gentibus: ita quoque si ex diuturna mora in aquis tales
 ob humiditatem non concipiunt. Nouit tamen Ronde-
 letius pagum in Provincia, in quo omnes ferè mulieres
 vteri procidentia laborant, & tamen cōcipiunt. Erunt
 igitur curanda eo ferè modo, quo & ani procidentia.
 Si ob humiditatē, inquam, nimiam relaxatio fiat, exsic-
 candus est habitus corporis pilulis & medicamentis quæ
 facile alui deiciunt & sine nixu. Nam dum magna
 intentione reddūt alui excrementa, procidit etiam vte-
 rus. Quare vomitio frequens multo esset utilior, quia
 non solum pituitā euacuaret, sed & vterū sursum at-
 traheret: nam siccat. Quemadmodum vterus in coitu
 deorsum mouetur, vt semen tanquam manu recipiat:
 sic pars ventriculi inferior ad superiorē contrahitur, &
 mouetur, vt id, quod in fundo est, expellat. & dum vē-
 triculus sese contrahit, & peritoneū distenditur, vte-
 rus, & quæcunq. illi alligata sunt, quadam cōsecutione
 retrahuntur sed antè quām retrahatur, oportet intesti-
 na vacua esse excrementis, vt diximus, itē vesicā; dein-
 de partem extra propendentē hac vel simili decoctione
 fouere:

fouere: ꝛ corticū pini ꝑ.ij. cort. thur. ꝑ.ij. cort. querc.
 ꝑ.ij. betæ, hedera, absinth. añ. m. j. ros. rub. balauſi
 flor. stæchad. añ. p. j. fiat decoctio in aqua ferrata, &
 vino adstringente. Cum decoctione foueatur pars, j
 appareat: vel immittatur syringa, vel alio instrumēt
 in partem interiorem vteri. Deinde pessario vel bacul
 pannis innoluto leuiter & suauiter suo loco repona
 natur. Quod si odores foetidos in summitate peſi au
 baculi innoluti posueris, & odorata naribus exhibue
 ris, mouebitur facilius, & retrahetur in partem inte
 riorem. Retractione facta, vtendum est fumigio, quo
 partem resiccat & ad superiora eleuabit, sic: ꝛ musc
 arbor. siue vsnea in clibano exiccata, & collecta in
 quercu vel ilice, m. ij. absinthij ꝑ.ij. ros. rub. ꝑ. j. corti
 cum thuris, pini, añ. ꝑ. j. ꝑ. caryoph. ladanij puri, &
 hypocist. añ. ꝑ. j. auripigmenti rub. & galbani, assa
 foetida, añ ꝑ. ij. excipiantur terebinthina, & fiant tro
 chisci magni, & per embotum magnum, fumum re
 cipiat, vel canali in vterum deducatur, ipsa in lectum
 decumbente. Nam postquam vterus repositus est suo
 loco, quiescendum est, in dorsumq; recumbendum,
 partibus pudendi alius collocatis. Emplastra cata
 plasmatag; constringentia & resiccantia multum
 supra regionem vteri & renes ponenda; vt: ꝛ vsnea
 m. ij. folior. myrti, vel lentisci, vel summitatum rubi,
 vel quercus, vel piri agrestis, m. j. cortic. querc. mali
 granati, añ. ꝑ. ij. gallarum. spongie bedegaris, bi
 storta, & quinquesolij, añ. ꝑ. ij. centaurij minoris,
 ros. rub. flor. anth. stæchad. saluie, añ. p. j. fiat decoctio
 in aqua cisternæ & aceto: qua foueatur pars cum
 spongiis nouis sero & mane, addendo die quinto vel
 sexto fomentationis salis aluminis, & vitrioli, añ.

℞. j. Cum cessabis à fotu, accipe residentiam decoct. & pone in sacco, & applica supra renes & ventrem: quibus addere oportet polygoni & herniariae, añ. m. ij. Hunc fotum, iuxta Rondeletium, continuare oportet ad quadraginta dies: postea emplastra adstringentia continuè gestare; qualia sunt, pro matrice, de pelle arietina, & de mastiche, addendo spongie bedegaris, & rad. bistortæ, & pul. herniariae, añ. ℞. j. in ℞. ij. emplastri. Et frequenter pars est fouenda vteri interior fotu prædicto. Aliquando pars vna vteri relaxatur, quæ dicitur mitra vulgò, apud Gallos la landie, & extra vterum procidit; quod semel vidit idem Rondeletius; & sic curatum fuit malum: ℞. rad. bistortæ & narcisci, añ. lib. j. solior. hederæ m. iij. summitatum myrti, consolid. absinth. plantag. costi, ladani, polygoni, herniariae, añ. m. ij. ros. siccarum, flor. anthos & stœchad. añ. p. ij. matric. & artemis. añ. m. j. fiat decoct. pro balneo. in ultimo adde aluminis lib. i. salis communis lib. ℞. Radices contundantur; postea ad formam cataplasmati reducantur; & applicetur parti affectæ. Quod si ob tensionem ligamentorum inferiorum decidat vterus, non erit inutile, inguinibus apponere vnguenta relaxantia, quale est vnguentum de adipibus, vel resumpt. vel dialth. dissoluta portunculæ galbani in his & assæ foetida, ut partes relaxentur, & foetore vnguenti vterus (ut dicebat idem quem suprâ citavi Rondeletius) sursum retineatur, neque ultra procidat.

P

OBSER-

OBSERVATIO XXXVI.

*De quibusdam uteri praecipitatione
laborantibus.*

PAUPERCVLÆ mulieri, cui uterus proci-
debat, vt galbani cerato vteretur, mandavi.
Quibusdam enim, inquit Benedictus Veronen-
sis, multos per annos vulua procidit, ac per vr-
bein, vt nouimus, ambulant, nec alio vtuntur re-
medio, quàm galbani cerotario. Sed & alteri cui
aduersa vulua erat, iussi vt digito obstetricis cor-
rigeretur: facile enim cognoscitur: nam nec ori-
nec ceruici locorum situs respondet, dolorque
ac grauitas in altero sentitur latere; quam cu-
curbitula contrario latere corrigit, imposita à
balneis duntaxat. & ita iussi vt cucurbitulam in
contrario latere poneret: hoc enim modo redu-
cebatur ad suum situm. Verùm mulieri, cui ute-
rus deorsum tendebat, quamuis nondum exi-
tum manifestum fecerat, consului vt malè olen-
tibus subtus suffumigaretur, quo sic sursum tra-
heretur; & vt superius ad olfaciendum odori-
fera naribus obiiicerentur: & iubebam fieri li-
gaturas dolorosas in brachiis; & supra umbili-
cum ponebam ventosam sine scarificatione.
Guainerius verò in mammillarum radicibus
ponere iubet, & versus quodlibet latus alteram,
& in medio aliam, ita vt supra ventrem tres ven-
tosæ simul sint: & tam diu ista fieri iubet, donec
uterus in proprium locum reducatur; quod ex
accidentium remissione cognoscitur. At alteri
mulieri

mulieri vterus magis solutus, ex materia muco-
sa, plus extra pendeat: quod cum plurimum
accidit, ut antea quoque dictum est. quare ut
humor pituitosus hoc modo digereretur, præ-
cepi: & syr. è stœchade, de matricaria, oxymeli-
tis simpl. añ. ʒ j. β decoct. saluix, maioranæ, cha-
mæpit. artemisiæ, melissæ, calaminthæ, mentha-
stri, añ. ʒ vj. fiat syr. pro ij. dosibus. adhuc semel
reiteretur: deinde ita venter solvatur: & pil. scœ-
tid. cochiar. añ. ʒ β. fiant pilulæ vij. vel si portio-
ne delectetur, & florum stœchados, borag. an-
thos, matricariæ, melissæ, añ. m. β. passul. enu-
cleat. ʒ β. sem. anisi ʒ ij. fiat decoct. in aqua com-
muni, & in ʒ iij. dissolue diacath. ʒ β. electuarij
indi maior. ʒ ij. diaphœnici ʒ j. elect. eleſcoph. ʒ
β. mellis ros. colati ʒ β. misce. fiat potus. Postea
exhibeatur theriacæ vel mithridatij ʒ j. Deinde
abluatur vterus cum decocto puleg. calaminthæ,
origani, matricar. meliss. nucû cupressi, & folior.
rhois opson. malicorij. Potest etiã postea venter
spongia immersa super regionem vteri fomen-
tari. Inde, prius cum oleo mastichino & ros.
inunctus, in locum naturalem reponatur. Si in-
ditus fuerit, subdatur pessus ligneus, aut cande-
la molli vellere inuoluta, oleo liliorum, irino, vel
cyprino, intincta, quatuor digitorum mensura,
pro longitudine ceruicis. Alij hunc puluerem in-
spargunt: & thuris, mastich. bol. arm. myrtill.
sumach, gallar. omphacitid. cupulorum ros. aca-
ciæ, añ. ʒ β. fiat pul. subtilissimus, quo vterus
aspergatur. Deinde obstetrix ihungat manum
suam, & suauiter impellat eundem, muliere ita

P 2

situata

situata vt prius dictum est ex Aëtio. Postea ventro-
tosa magna sumini apponatur per quartam par-
tem horæ. qua remota, ceratum sequens appo-
natur, pilis tamen pubetenus prius derasis ac-
tonsis: & boli arm. sang. dracon. hypocist. su-
mach, añ. 3ß. corall. rub. glandium ros. rub. myr-
till. añ. 3ß. pulueriscentur, & cum pice & resina
pini q. s. fiat ceratum in forma quadrata in corio
vel aluta, & vteri regioni applicetur. Moretur in
lecto; & cum non amplius prosilierit vulua, fe-
mora arctius ligaturis contineantur. & si alius
constringatur, vtatur clysteri vel balano. Et vbi
iam curata fuerit, vitabit deambulationes, equo
aut curru vehi, aut iactari: hæc enim plurimum
obsunt; vri & balnearum vsus, ac coitus. quidam
tamen balnea sulphurea commendant, vel fer-
rosa, qualia nunc celebrantur in agro Veronensi
Caldariana dicta. Abstineat à cibariis frigidis &
humectis, ventosis, quales pisces sunt, olera, ra-
pæ, & similia. Vinum nigrum seu rubrum bibat
ex pluuiæ aqua. Et sicuti Venus illis importuna
est; ita & sternutamenta, vociferationes, tusses,
ac magno conatu aluum comprimere obest. At-
que his optimè habuit: tum aliæ plures.

SCHOLIA.

Curatio, si
in latus de-
scendat.

DICTVM est prius quod descensus vteri sit vel
cum exitu, vel sine. Si igitur in latus declinet,
cognoscitur ex dolore: id etiam ob causam in suffo-
catione ab vtero dictam contingit interdum; nonnun-
quam verò ob flatibus impellentes. Si à flatibus fiat, cu-
curbitula

curbitula magna primū lateri opposito affigatur, in
ipsumq; laborans mulier cubet. sequens deinde cly-
ster iniiciatur: & parietaria, althæa, mercurial. añ. m. j.
origani, calaminthæ, añ. m. β. sem. dauci, carui, anisi,
fœniculi, añ. 3 ij. sem. lini, fœnug. añ. 3 ij. flor. chama-
meli, rorism. meliloti, añ. p. j. coquantur in s. q. aquæ
ad tertias: eius accipe lib. j. cass. sacch. rub. añ. 3 j. bene-
dict. 3 β. mellis anthosati 3 j. β. olei chamamel. 3 ij.
fiat clyster ante pastum. Deinde vtatur rhombis se-
quentibus: & pul. diacumini, diacalaminthæ, añ. 3 j.
β. sacch. soluti in aqua melissæ q. s. fiat elect. solidum,
in rhombis ponderantibus 3 ij. detur vnus manè ante
pastum, quater in hebdomada. Vbi nondum extra de-
scendat, naribus quoque, vt dixi, apponūt aromatica,
vt moschum, ambram, spicam, styracem, & similia:
inferius fumigia è rebus malè olentibus. Ilibus verò cu-
curbitulas imponunt, etiam si excidat, aut vmbilico.

Ex ventosi-
tate.

Experimento constat gallinaceum ouum vetustum
mirè conferre, quo nihil grauius olet. rupto cortice la-
na colligitur molli, & ita vuluæ apposita mirè corrigit
procidentem vuluā, vel in veteri vitio: sed cauendum
est ne odor ille grauiissimus corripit nares mulieris.

Malè olen-
tia.

Id tamen alij cum cautione faciendum esse volunt in
mulieribus delicatis, & in quibus viæ ac meatus sunt
satis ampli, & quorum virtus sensitiua matricis est
multum acuta & sensibilis. quibus & ob eam causam
subitò concidunt vires, & syncopen incurrunt, vel
dolores tales incurrunt; in talibus ab iisdem abstine-
bimus, & semper incipiemus à foetidis debilibus paula-
rim ad fortiora; & primò potius imponendo, quàm
suffumigando. Sed vbi contenta est materia in locis
angustis & intra panniculos, tunc præstat vti suffu-
migis

Cautio de
malè olen-
tibus.

Ab partu.

Ab alia
causa.

migiis quæ magis penetrant : primò ex terebinthina
iniecta, vel plumis perdiciis combustis. Fortius est assa
foetida; & fortissimum omnium iam dictum de oua.
Postea tale, vel simile, ceratum optimum & exper-
tum à Bayro apponatur super umbilicū, diu tenendo:
℞ mastiches, ladani, añ. ℥iij. galbani ℥j. gummi styra-
cis ℥ij. confice in mortario cum pistillo calido, extende
super coriū subtile & rotundum. Si matrix descēdat,
& foras exeat, idem Bayrus applicat auenam calefa-
ctam in sacculo. Deinde iubet fieri pessarium ex tere-
binthina abietis, medulla cruris vituli recens liquefa-
cta & colata, opij, croci, ros. añ. pauxillo; imponen-
dum discretè ab obstetrice. Si non propter partum, sed
ex alia causa, spongiam in aceto infusam applica, &
statim restringet egressam. Folia viticæ viridia loco
emplastri apposita, matricē exeuntem cohibent. ita &
suffumigiū ex foliis & ramis buxi per inferius valet.
Sed & bubulum finum appositum laudant, ac aiunt
etiam esse procidentia si à casu, aut saltu, aut percussione,
aut ob difficilem partum fuerit, prædicta omnia fiant,
quæ antea Obser. 35. ex Aëtio tum aliis diximus, pur-
gatione excepta. Id vitium tamen, ut dictum est antea,
in senectute nunquam ferè restituitur, si malū præser-
tim vetus est: in iuuenibus restituitur, si recens fuerit.
Sic cum Maria Theodori, vxor cuiusdam cereuisiarij
Brasserij dicti, valde annosa, & quæ iam multas proles
ex marito susceperat, quæq; difficulter parere solebat,
plurimis annis vteri prolapsu laborasset, cumq; ex me
consilium peteret, hanc ego curationem in vetula, ut
impossibilem aggredi non ausus fui. nonnulla tamen
præsidia proposuimus, ut saltem mitius malum ferret,
si non

si non integrè restitui. Quod si in principio accitus
fuissem, eadem tentassem, quibus Amatus in vteri
procidentia ex pondere leuato aliquando vsus fuit, quæ
hic pro egregio exemplo adferre libet. Pudicissima (in-
quit) & honesta vxor vicini, nata annos viginti qua-
tuor magnū imprudenter attollēs pondus, in vteri pro-
cidentiam incidit, dolor lumbos inuadit, grauamē circa
ūterov, id est, pubem vel pectinem, magnū persentiebat,
adeo vt deambulare non posset, lotiū continuò mitte-
bat: sed primo die multo sanguine mixtū, secūdo minus
sanguinolentum; tertio verò à sanguine alienum, tan-
quam pus in eo misceretur, in quo tunc eam febris
corripere cepit: quarto in eo multum puris apparuit.
Semper sitiuit, multum fuit anxia, & grauiter om-
nia ferebat, vt vix in cubili perquiescere posset. Ad
quam quum primū perueni, obstetricem accersen-
dam curauī; quam doceo, vt leuiter matricem, quoad
fieri posset, ad locum reducat, deinde illico locellos hoc
dicendo lauacro proluat, quod habet: ꝛ ros. rub. fo-
lior. plant. corrigiolæ sanguinaria dictæ, añ. m. j. in
aqua fiat decoct. quousque aqua subrubea fiat. facta
colatura, adde mell. ros. colati parum, misce, & fiat
lauacrum, quod calidum per insectarium eiaculaba-
tur. non minus, caput declinē, & crura maximè ele-
uata habeat semper, suadeo. Sed & moschū & Ziber-
tum galliāve moschatam, ac res bene olentes nari-
bus, veluti graeolentes pudendo admonendas mando.
Graeolentia siue fœtida medicamenta sunt galbanū,
pennarum vstarum fumus. Is tantū duobus primis
diebus per actis, & fœcibus per clysterem depositis, ter-
tio die sequenti mel rosaceum colatitium prædicto de-
cocto in maiori quantitate addo: nec enim potentio-

Cent. 1. Cu-
rat. 14.
Historia
procidentie
vteri ex
pondere
eleuato.

ribus medicamentis astrictorius opus erat, ob apparen-
 pus: timor enim erat ne obclusum vlcus malignius
 inde redderetur, ob incarceratam materiam. Quarto
 verò die multum puris in vrina exiuit: sed quinto mi-
 nuui capit. proinde tunc fomentum ex balaustis, myr-
 to, hypocist. ros. rub. & sem. sumach, in vino rubro
 austero parare feci, quo uterus optimè lauabatur, &
 spongia eo imbuta pecten & pudendum fouebantur.
 & intus quoque in sinu lana vino illo imbuta adapta-
 batur. Octauo verò cucurbitulas magnas duas vmbi-
 lico multa flamma ignitas affigendas iussi: post quas
 illico ceratum hoc descriptum subuentri, id est, pubi,
 apponendum curavi, quod habet: R. mastiches, thuris,
 ladani, sang. dracon. añ. ʒ ij. gallia moschata ʒ j. tere-
 binth. cera, resina, añ. parum, & ad ignem fiat cera-
 tum, & super corium alutam dictum extendatur,
 vel melius super pannum cocco intinctum, & calidum
 admoueat. quibus rectè habuit. Ceterum à motu,
 & rebus sternutamentum irritantibus, illi per quin-
 decim dies interdiximus: veluti à vino, & rebus calidis:
 nam victus rationem subtilem prescripsimus. porro ab
 aqua potu, quantum possibile erat, Hippoc. consilio,
 eam arcebamur: sed primis diebus halycacabi (alke-
 kengi, Officina Mauritanica voce appellant) aquam
 bibendam propinauimus.

OBSERVATIO XXXVII.

*De uteri stillicidio, cum imbecillitate ac in-
 temperie frigida & humida eiusdem.*

MULIER Alcmariana, extra portam qua
 Harlemum itur habitans, valde pallida
 &

& cachectica, multo tempore vteri stillicidio laborabat, cum eiusdem imbecillitate & intemperie frigida atque humida. cui cum vtilissima remedia præscriberem, & non statim ab eo malo liberaretur, ad varia etiam tonsorum remedia confugit, & illius itidem Iudæi Empirici, qui ob facinora deinde Leydis flagellatus fuit. Ceterum hæc tandem, remediis ad malum non facientibus, ad vteri ulcerationem deuenit, qua multis annis adhærente, tandem miserè vitam finiit.

S C H O L I A.

SANGVIS in hac muliere stiriati excernebatur: Menstruorum stillicidium.
 Sab Aëtio id dicitur etiam menstruorum stillicidium; quando videlicet cum grauissimo dolore intimas partes opprimente, sanguis ita stiriati excernitur. Pubi apponit lanam vino & rosaceo madefactam, vel vesicam oleo calido plenam, sæpe & fomenta ex lentibus confecta; & in principio, si dolor perstiterit, & vires ferant, cubiti venam secat: cataplasma, si perseuerat, è sem. lini, pane, & aqua mulsâ paratum applicat. in seßiones ex alth. sem. lini, scænuigr. anethi, ruta, artemis. adhibet. si inueterauerit, pectini atque inguinibus cucurbitulas cum scaris. imponit, & balneis naturalibus utitur, vt apud eum videre licet, lib. 16. cap. 65. Habet enim aliquam similitudinem cum stranguria & dysuria. Iam quoque vt alie partes, ita & vterus debilitatur, vt ex eodem constat, lib. citato cap. 75. Accidunt iis, Sorano attestante, Veneris fastidium, flatuosi spiritus excretio, menses exuberantes, bis aut ter singulis mensibus inordinatè delati,

P 5

nigri,

Vteri imbecillitas.

Vteri reso-
lutio.

nigri, & aquosi; neque semen viri injectum diutius
detinetur, sed à concubitu defluit, aliis confestim
aliis post aliquot dies; quadam trimestrem foetum
abortiuntur: quæ verò non abortiuntur, gracilem im-
becillumq; foetum generant. Hac ipsa certè cum & hu-
midam & frigidam intemperiem haberet, nunquam
concepit: quod etiam contingit illis quæ uterum reso-
lutum habent; quamvis ob multas causas; sed præci-
pue, ut idem Aëtius refert cap. 77. ob frequentius re-
petitos abortus: cuius curationem similem etiam ait
cum menstruorum stillicidij; & præcipue confert ca-
storij assidua potatio. At de intemperie frigida & hu-
mida postea agemus, cum de conceptione dicturi su-
mus. Sed cum hæc nacta esset Medicos imperitos, vteri
subsequente ulceratione, ex remediis minus aptis, ut ar-
bitror, tandem miserè perit. non mirum, cum graua es-
sent accidentia, quæ Medicum peritum, ut rectè curari pos-
set, exigebant. De vteri ulceribus postea dicturi sumus.

OBSERVATIO XXXVIII.

*De spiritu in utero collecto cum gra-
uissimo dolore.*

VXOR mea charissima, Eua Teylingia, post
consuetam mensium purgationem, cum se
non bene tueretur, vterus eidem spiritu imple-
tus est cum intolerabili cruciatu & dolore; qui à
pectine, ob vteri inflationem, imoque ventre ad
septum transversum & inguina excurrebat, ut
penè dolore enecaretur, nec posset vel crus, vel
se ipsam in ullam partem mouere. Eo dolore
mense Iunio, anno 1560. suborto, & adeò incre-
cente ut ferè pro mortua haberetur, sanguinem,
licet Paulus & Aëtius hoc suadeant, ausus non
fui

ui detrahere, ob debilitatem. Depositis verò ex-
crementis per glandem, quod agrè admisit, de-
coctum florum chamæmeli, pulegij, & sem. dau-
ci, anisi, carui, fœniculi, artemisiæ, pauco inie-
cto oxymell. propinaui, & sacculum ventri ap-
posui concinnatum ex floribus chamæmeli, me-
liloti, furs. cumino, ruta, paratum. Clysterem
iniicere non potui: nam si leuiter se moueret, in
syncopen cadebat: à qua cùm excitata esset, ac
proba matrona Heutera, eius cognata, de nocte
ad eam venisset, chirothecas habens perfuma-
tas mœscho, mox præfocata pro mortua habeba-
tur. Sed illico remotis chirothecis (matrona enim
me hercle proba statim eas reiecit) plumisq. cō-
bustis ad nares appositis, & cerato ex galbano
vmbilico appposito reuixit. Dolor tamen in imo
ventre, neque vng. emplast. ex baccis lauri, nec
fomentis sedari potuit. At quia aluū non depo-
nebat, dedi ꝑ j. β. mannæ selectiss. cum iure pulli,
& optimè excreuit; & quod mirabile erat, vti &
in aliis animaduerti, ex pudendo spiritus erum-
pebat. tandē, miraculi instar, sacculis denuo ad-
motis, & sæpius diacumino ac diacalamintha
deuoratis, præter omnium opinionem vxor mea
dulcissima sanitati restituta fuit.

SCHOLIA.

VVLVA, inquit Aëtius lib. 16. cap. 80. interdum Causæ infla-
tionis vteri.
à partu refrigerata, spiritu impleri solet, siue os
eius claudatur, siue grumescente sanguine obstruatur.
Idem & Paulus refert lib. 3. cap. 70. Alij addunt, &
post vsum balnei aut stuphæ, aut mensium purgatio-
nem, posse fieri; vt vxori mea corrigi; aut quia flatus
in

Signa.

in toto corpore collecti sunt ob calorem imbecillem. Post partum verò, si emissio partu, ventrem non comprimant, nec ab aëre se tueantur: ita & post purgationem. Ob id mulieres nostræ fasciis se constringunt ut uterus in sese concidat, nec recipiat aërem. Post balneum, si sese aëri exponant: ita & post stupham. Aliàs spiritibus, inquit Paulus, in concavo ipsius spatio conceptis, aliàs vteri corpore rarefacto, tumor pubis & imi ventris comitatur, cum dolore pulsatili, qui ad septum transversum vsque & stomachum inguinaq; pertingit, ac sonitus digitorum impulsu tympani modo redditur. Idem ferè habet Aëtius. Spiritus, inquit, saepe in vteri cavitate colligitur; saepe in sinu, qui sensui patet, nec raro inter cacos meatus coërcetur. Affectum sequitur pectinis tetiusq; suminis tamquam tympanita hydropis, tumefactio sequitur; doloresq; punctiois sensum inferentes, qui vsque ad stomachum & septum transversum perueniunt, ac nihilominus utrimque in lateribus extenduntur: saepeq; alteri inguini, interdum utrique, interdum & umbilico, lumbisq; ac pectini dolor communicatur, cui caput quoque assentitur: nonnunquam spiritus efflatio per muliebrem pudendum erumpit, ut ab agris percipitur. Si ergo spiritus in vteri cavitate collectus fuerit, gurgulationes ac sonitus quidam in corporis flexu audiuntur; quales intestinis accidunt, quæ torminibus vexantur; impulsuq; digitorum sonus tympaniticus redditur. At ubi flatus intra cacos totius vteri meatus aggregabitur, dolores vehementiores, ac curatu difficiliores infestant. Flatus enim in cavo locellorum sinu contentus facilius discuti digeriq; potest, quam ille qui in angulis ipsorum consistit. At qui locellorum villis

Prognostica

illis & substantia haeret, difficillimè curatur. Quod à partu fit, & citò succurratur, facile sanatur. Alioqui si non statim succurratur, difficulter. Scribit Aesculapius, multas se vidisse mulieres, quæ adeò magnos ventres ob flatum in vtero collectos habebant, ut hydroica viderentur. Auxiliatur ergo primum, iuxta Pauli Curatio. um, sanguis demissus, si nihil obstat, ac nisi atas & anni tempus, secundum Aëtium, obstiterint. mox in accessionibus inedia vteris, & olei dulcis calidi irrigatione, in quo rutam & anethum decoxeris; vel oleo rutaceo, in sessione quæ ex ruta, pulegij, artemisia, cassia decocto, vel calamintha, prassij, thymi, artemisia, althææ, & carycarum, iuxta Aëtium. luvant & cataplasmata ex sem. apij, cumini, fœniculi, anisi, ammeos, farina lolij. Ad hæc curbitula tum leues, tum cute incisa affixæ. Ac si diutius vitium se prorogauerit, purgatio ex hiera picra utilis est, vel Ruffi, Archigenis; etiam ex Aëtio: dropaces, synapismi, & aquæ naturales. Obstetrix autem prius digito peruncto inserto grumum incumbentem, si contingat, auferet, leuiter ipsum dissipans; rursus quæ admouebit cataplasma ex ficu, nitro, & absinthio. Reliqua vide apud Aëtium & Paulum locis citatis, & quales pessi sint adhibendi. Interea & alimenta attenuantia & flatuum discutientia exhibebimus, & diospoliticon, & diacalaminthum. Sed clarius ex exemplo sequenti innotescunt.

OBSER-

*De uteri inflatione cum insigni dolore post
abortum oborta.*

MVLIERI Alcmarianæ, cū abortum
passa esset, purgatione subito restricta
cū se citius vento exposuisset, venter inferior
ita in tumorem eleuatus est, vt de hydropo aut
tympanite metus esset, cum tanta torsione &
dolore acerbissimo, qui inguina & totum ven-
trem occupabat, vt ipsa colicū dolorem esse pu-
raret. Sed ego omnibus animaduersis, spiritū fla-
tulentū in vtero existentem, horū symptomati-
causam esse percepi. Quare cū alius etiā restri-
cta esset, clysterem statim iniicere iubeo: & florū
chamæmeli, meliloti, summitatū anethi, artemi-
siæ, parietariæ, añ. m. j. maluæ, m j. ß. sem. fœnugræ,
anethi, anisi, añ. ʒ ij. sem. dauci, cari, añ. ʒ j. ß. rad.
althææ ʒ j. fiat decoct. in aqua communi pro lib.
j. col^æ adde benedictæ laxat. hieræ picræ, añ. ʒ ß.
olei anethini, chamæmel. rutacei, añ. ʒ j. salis ʒ j. ß.
fiat clyster. quo egregiè cum vëtositatibus emis-
sis aluum deposuit. Cum residuo decoct. forus
cum spongia fiebat circa pectinem & inguina;
etiam loco inuncto oleo rutaceo, liliaceo, & ane-
thino, postea etiam cheyrino: deinde exhibui
diacuminum. Etiam purgata ex hiera, adhibui
quæ menses euocarent, & simul flatus discute-
rent. sacculis quoque ventri imo apposis ex pu-
legio, artemisia, matricaria, meliloto, & floribus
chamæmeli. Etiam per os accepit diacurcuma:
& tandem bene habuit. Alioqui dedissem, vt
præceptor

præceptor meus Elideus mulieri exhibuit, try-
phera magnæ ℥ β. aquæ matricariæ ℥ viij. dedit
utem duabus vicibus, & dolor ac inflatio cessa-
uit, quæ eidem euenerant post quartū mensem à
partu mortuo, cum non esset bene purgata. Ve-
nam tamen tali incidit: primò tamē duabus cu-
curbitulis in tibiis positis cum scarificatione,
quod cum nō satis efficax esset præsidium, saphenā
aperuit; & dolor cessauit, mox fluētibus mēstruis.

SCHOLIA.

PRO causâ quæ hanc inflationem vteri gignat, præ-
sidia adhibenda. Quibus enim flatus ob cruditatem
sensim in vtero generantur, vel in toto corpore, licet i-
minus molestare solent, tamen statim expedit in hac
specie pituitam euacuare, aut crudos succos frigidos, à
quibus eleuantur flatus, & corroborando calorem na-
turalem ventriculi, & omnium partium naturalium;
discutiendo deinde flatus genitos & collectos in hunc
modum: R mellis ros. colati, syr. è stæchad. añ. ℥ j. syr.
de artemisia ℥ iij. aquæ absinthij, artemis. apij, petrosf.
añ. q. j. fiat syr. arom. cum ℥ j. diagalagæ. His pilulis vel
similibus purgetur: R pilul. aggreg. cochiar. añ. ℥ j. agar.
trochis. ℥ β. fiant pilule cum syr. de byzantiis. dentur
post mediam noctem cum custodia. Altero die capiat
℥ j. theriaca vel mithridati; & inungat ventrem &
inguina cum oleo nard. rutaceo, anethino, & appona-
tur emplastr. de baccis lauri, quo Galenus utebatur: &
fiant sacculi ex milio & sale torrefacto. flatus absument
& discutiunt, adiect. sem. calidis maioribus & mino-
ribus. Si autem à partu fiat, non opus est purgatio-
ne per pilulas, aut alia medicamenta; quia sufficit

Si ex crudi-
tate sensim
in vtero
fiant flatus,
quomodo
curentur.

Si à partu
fiat.

illa

illa purgatio naturalis, quæ fit per vterum: quæ non fuerit, est prouocanda, & iuuanda pessariis attrahentibus, & cucurbitulis apposis in coxis, aut aliis remediis præscriptis ad menses retentos. Et si venia ex retentione menstruorū, etiam ij prouocandi erunt. Pessaria ex benedicta & aliis flatus discutientibus sunt valde ex vsu, & constrictio ventris per fascias. Cataplasmata conducunt ex stercore ouis vel vaccæ, vel capræ, additis quibusdam flatus discutientibus. Sic R. stercoreis vaccæ lib. i. cumini ℥ ij. seminis apij, petroselin. ℥ ij. mellis cocti parum, vini maluatici q. s. misce. fiat cataplasma. Iam si post balneum aut stupham fiat ex aëre frigidus, aliquando motus adest, aliquando quies. Et cum mouetur hic & illuc, potissimum sursum, suffocationem vteri facit: tunc succurrendum erit remediis præscriptis ad suffocationem, vt in vxore mea fecimus. Aliquando quoque si à balneo vel stupha id accadat, sterilitatem adfert, propterea quod partes relaxatas (vt Rondeletius dicebat) aër frigidus condensat, & internam vteri regionem, & ora claudit, per quæ semen à testiculis descendit in vterum, per eius cornua. Etiam à partu, absoluta mensium purgatione, optimum erit iniicere clysteres, quæ fiebant ad sedationem doloris colici, & ex oleis discutientibus flatus, & ex decoct. sem. calid. maior. & erit vtilissimum parum exhibere ex confect. arom. ros. & tabul. vnam diagalangæ; & decoquere piper in eius insculis, & alia quæ dicta sunt loco De colico dolore & flatibus. Si fiat à balneo, eodem modo curare oportet, discutiendo flatus topicis remediis descriptis. Quod si opus esset aliqua euacuatione, ob cacochymiam, vel cruditatem ventriculi, dentur pilul. de arom. vel hieræ simpl.

Si suffocatio accedat.

Si fiat à balneo.

*simpl. In omnibus his causis maximè conferunt pul- In omnibus
ueres flatus discutientes & resiccantes, si post eorum causis.
assumptionem, parum vini maluarici bibatur. Su-
mendendi autem ante pastum potius, quàm post. Item
cucurbitula magna cum multo igne (facta prius eua-
cuatione recrementorum alui per clysterem aut pilul.
aut aliter) si non adsit suffocatio vteri, supra umbili-
cum adhibita, plurimum prodest. Quòd si suffocatio
adesset, admoueatur inguinibus cum multo igne, vt &
reuocetur, & flatus absumentur.*

OBSERVATIO XL.

De intenso vteri dolore.

CV M intenso vteri dolore ex frigore contra-
cto mulier laboraret, nihil quicquam huic
magis profuit, quàm castorij \mathfrak{z} ij. cum vini Rhe-
nani exiguo sumpti. sed & alteri puellæ, cui cum
dolore ventositas admixta erat, pulueris rad.
gentianæ ad \mathfrak{z} j. cum vino generoso. Nihil enim
æquè dolori subuenit, vt rectè dixit Benedictus
Veronensis lib. 27. cap. 2. quàm castorium, si ex
frigida fuerit causa, siue potum, siue illitum: ita
& gentiana trita mirè prodest ex vino calefacto
pota, si ex vento fuerit: nam & imminentem ar-
cet dolorem. Præceptor meus Benedictus Fa-
uentinus in sua Empirica, vbi dolor vehemen-
tior infestaret mulierem, & timor esset de de-
bilitate virtutis futura, sequens remedium seda-
re dicebat dolorem matricis: & philonij Roma-
ni \mathfrak{z} j. diacumini, diagalangæ, añ. \mathfrak{z} β . misce. &
Q fiat

fiat bolus, qui detur patienti, qualibet hora doloris. sed oportet habere rationem causæ, vt in Scholio latius. Plura vide apud eundem loco citato.

SCHOLIA.

Variis vteri
dolor.

DOLET feminarum vterus aut ex mala habitudine, aut vento, vel inflatione maximè, (vt iam dictum est) vel spiritu incluso, aut humore extendente, aut erodente, vel si ex eo vapor intus generetur, eo modo quo in colicis fieri solet. Id vitium vetulis, ac præpinguibus sæpe euenit; vel contrà ad maciem nimiam tendentibus. tum inguina, & ilia, & crura, cum spina dolent, & præcordia, imò quoque venter, malè habent, ac sinciput ipsum dolet. Vidit aliquando in eo affectu Benedictus Veronensis nigredine dimidiã linguam tinctam diu per seuerasse: ischiadicos item dolores haud dubiè excuisse affirmat. Curabitur hic dolor iuxta causam: si cum ventositate, vti inflatio. Si adsunt humores, illi quoque parandi & educendi: si erodentes, contemperandi, & mox leuibus educendi, iam quoque ex vtero per decocta infusa conuenientia iucundè extrahendi, prout frigidi vel calidi sint. Id quidam cum tripolij, zinz. casia, cinnamomi, añ. ʒj. cum artemisia decocto epota faciunt. vel lana apposita illo decocto inuncta, vel elleboro (sed forte est) aquas inde trahunt. Si ex caliditate procedat, muliebri lacte ex lana imponunt & mitigant. Vel, si opus est fortiori medicamine, cum hyoscyami decocto, vel succo, iniecto sedatur; vel papauerino, vel malua decocto. Iuuant & infusiones. Utiliter supponitur ouum

uum ex lacte equino, exiguo croco addito. Ladanum quoque Galeni emollit & dissoluit, & suauiter adstringit. Oleum lentiscinum, lilinum, violaceum, luteum, probantur. In frigidis castorium, ut dictum est, & bacca iuniperi matura in potu. cinnamomi, galangæ, zedoaria ex vino 3 j. Salutares in sefiones fiunt ad locorum cruciatu, quæ habent maiorana, ocymi, artemisia, abrotani, fœnug. brassica, sem. lini, meliloti, chamameli, omnium pares portiones: eas ex aqua feruefacito. Sed & nepita, pulegium, lauri bacca & folia, maiorana, artemis. fœnug. semen vel herba, lini semen, sed lauri folia per se imbrice calefacta sacculo subdita valent. Aliqui prioribus fomentis addunt anethum & althæam, sesami semen. Dolores verò à partu sedantur schœnantho ex aqua decocto, donec dimidium supersit, ita ut loci foueantur, & decoctum bibatur ternis cyathis. Addi iubet Dios. ficus præpingues, vel carycas cum fœnug. nam & alia vulnæ vitia sanant. Dolores ex vento discutit semen cumini aceto maceratum, deinde torrefactum cum ammeos sem. ac Zinz. & castorio. sumuntur singulis diebus obolorum duum pondere. Reliqua vide apud præceptorem meum Benedictum Fauentinum in sua Empirica cap. proprio. quibus addas supradicta de vteri inflatione. At vteri vulnera quæ etiam dolorem inferunt, ad Chirurgiam pertinent. de his vide harmoniam Gynæciorum cap. 31. quæ ex Moschione & Cleopatra decerpta sunt.

OBSERVATIO XLI.

De vteri inflammatione.

MVLIER quædam ex infima plebe, cum à viro calcitrone supra anum ventrem circa vteri regionem egregiè percussa esset, paulo post valde doluit, ita vt lotium difficulter redderet, febrisque ingens mox suborta est. Sanguinem tamen per vuluam non demittebat: dolebat autem capite, ceruicis nerui, digiti, collumque pariter distendebantur; & dolor ad ventriculum vsque eleuabatur, pulsusque parvus ac frequens aderat, & plurimum vniuersus vterus dolebat. Ad quam aduocatus, hæc animaduertens, dum excrementa alui etiam detinerentur, inflammationem vteri esse percepi: ideo illico venam axillarem in cubito incidere iussi, iuxta Arabum & etiam Græcorum decreta, (de qua re latius suo loco) cum ægra satis robusta & sanguine repleta foret. Cumque aluum non depoleret, mox clysterem mollem præscripsi ex decoct. maluæ, viol. lactuæ, prunis, cum cassia & oleo violaceo. Interea vterum & locum dolentem & pubem cum oleo ros. myrteo, & modico aceti fouebam. Altero die, cum difficulter meiceret, & lotium tinctum esset, dolore crescente, sanguinem quoque ex saphena vt chirurgus me præsentem detraheret imperaui. Interim tenuissimo victu contenti, solo hordeato, & potu ptisanæ vulgaris, iulebo sequenti utebamur: & syr.
de

de end. ex infus. ros. rub. añ. ʒ j. β. syr. viol. nym-
phæa, añ. ʒ β. aquar. borag. cichor. end. lupul. añ.
ʒ iij. misce pro quatuor dosibus. Interea primis
diebus, dum in principio essemus, ad repellentia
accedebamus; etiam ad iniectiones quæ citius
parantur quàm cataplasmata, ex oleo ros. myr-
teo, (vt diximus) cum aceto, adiecto pauco suc-
co plantaginis. Postea & cataplasma tale impo-
nendum duximus, quo & Gal. utebatur 2. Ad
Glauc. ex succo semperuiui, sapa, vino austero,
farina hordei, & balauistiis, vel ex cortice mali
granati. Et ita in partem internam iniicimus,
præter iam dicta, etiam aquam plantaginis, vel
solatri. Deinde quia aliquid resudat à parte in-
flammata, his admiscuimus decoctum hordei,
vel parum sacchari ros. & infundere iussimus
per metrenchytram per obstetricem. Sic & se-
rum lactis ad deterfionem, & lac recens mul-
sum ad doloris sedationem facit. Cùm in au-
gmento essemus, cataplasma digerens & repel-
lens & dolorem sedans apposuiimus, prius qui-
dem ex mica panis cum lacte cocti & oleo cha-
mæmel. paratum; deinde sequens quod dolo-
rem sedaret & digereret: rad. althæa, folior.
maluæ, viol. añ. m. j. flor. viol. chamæmel. melilo-
ti, añ. p. j. fiat decoctio. contendantur herba &
rad. & per cribrum transmittantur, his aliquid
decoctionis addendo, & farinæ hordei q̄r. j. sem.
lini q̄r. β. olei ros. q̄r. j. Misce. fiat cataplasma.
Postquam constitisset defluxio, & dolor utcun-
que remissus esset, quæ potentius digererent su-
pra partem apposui, cataplasmati suprascripto

Q 3

addendo

addendo farinā fabarū, vel has herbas vtero de-
 stinatas: & rad. lilior. & bis maluæ añ. qr. j. maluæ
 m. j. artemisiæ vel matricariæ m. ß. flor. meliloti,
 anethi añ. p. j. fiat decoctio vt suprà dictū est; cō-
 tundantur; quibus postea adde farinæ fabarū &
 hordei, añ. qr. j. pingued. porci ꝑ iij. butyri recen-
 tis ꝑ ij. olei chamæmel. & lilior. añ. ꝑ j. ß. miscean-
 tur; & fiat cataplasma. Tunc enim magis deter-
 gentia admiscemus; quia id quod resudat à par-
 te affecta, si retineatur, maiorem inflammatio-
 nem excitat. Et quia hæc pars facile scirrhu pa-
 titur (quod caro eius densa sit, & defluxiones
 acceptas pertinacissimè seruet) diutius non est
 vtendum (vt Rondeletius quoque rectè admo-
 nebat) repellentibus, ne ob congelationem scir-
 rhus fiat. Proinde in declinatione malactica ad-
 denda sunt; vt emolliatur, & crassum discuti-
 tur & euacuetur. supradictis igitur adiecimus
 farinam seminis lini & fœnugræci. Aëtius fari-
 nam hordeaceam cum fœnug. & lini semine in
 aqua mulsa coctam imponit, aut carycarum de-
 coctum adhibet, ac pessos subdit, si calorem fer-
 re possint, ex æsypo, butyro, medulla ceruina,
 adipe anserino, oleo anethino, chamæmelino,
 seu irino, & cera, compositos. Ceterum butyrum,
 medulla & adeps, omnia recentia ad pessos de-
 ligenda: etenim antiqua dum liquantur, nidoro-
 sa sunt, ac calidiora euadunt, & inflammationes
 exacuunt, vt liquet ex eodem Aëtio. Post hæc
 remedia, emplastra digerētia ex lachrymis mul-
 rum laudantur, vt quicquid est in parte discuti-
 tiant & euacuent. Nos emplastra de meliloto,
 de

mucilag. & ammoniaci in fine apposuiimus; & facta est resolutio, nulla duritie permanente. Sed, quod ferè omiseram, post quartum diem cum febris atque dolores mitigarentur, pro purgatione dedi ℥ j. cassiæ recens extractæ dissolutæ in aqua viol. borag. artemisiæ, añ. ℥ j. syr. viol. ex multipl. infus. ros. añ. ℥ β. quibus probè alius reddebatur. Nam hîc nullo modo medicamenta laxantia quæ attrahunt danda sunt, ut quæ ad partem affectâ magis trahant. Sufficit enim his (non tamen in principio, sed postquam dolor aliquo modo mitigetur) syr. viol. ex multis infus. ros. cassia, vel manna, & lenientia tantùm sine attractione. Atque his sanitatem recuperavit.

SCHOLIA.

VEL UT reliqua corporis partes, ita quoq. uterus inflammatione laborat; idq. pluribus ex causis, ut referunt, Paul. Ægineta lib. 3. cap. 64. & Aëtius lib. 16. 85 De uteri inflammatione ex Philumeno: nempe ex ictu seu percussione, mensium retentione, frigore, & inflatione; adeoq. ex abortu; item ex foetu sinistro edito; ulceratione, concubitu metas rationis excedenti, sella nimis dura in sessione, longissima intensissimaq. deambulatione; sæpe & transpiratione ob frigus prohibita, uteri inflammatio contingit. Est enim multum uterus inflammationibus obnoxius, cum eò multus sanguis fluat ad mensium purgationes, vel post partum, qui retentus parit inflammationem. Retinetur autem propter aeris circumstantis frigus, aut propter frequentem cucurbitularum appositionem supra uterum. Fernellius phlegmonem fieri ait tenui feruidoq. sanguine è vena cava per tenues venas, non in uteri capacita-

Causæ inflammationis uteri.

Q 4.

tem,

Externæ
causæ.

Internæ.

Signa.

rem, sed in illius substantiam effuso: qui collectus accensus ac putrescens phlegmonem parit. Causæ itaque sunt vel externæ vel internæ. Externæ, velut ictus, siue percussio, multitudo coitus, vel laboriosus, ex membro inepto, pessus acutus, abortus, partus violentus, aut innaturalis, vel sinistrè editus foetus, obstetrix inepta, ventosa posita supra inguina vel regionem vteri, corpore impuro existente, nullaq; diuersione prægessa, durioris sella in sessus, longa intentaq; ambulatio, flatus frigiditasq; astringens. Internæ verò, ut mensiū suppressio, totiusq; corporis plenitudo, ut dictū est, & vteri exulceratio. Neoterici volunt, ex omnibus humoribus fieri posse, modò per collectionem, modò per defluxionem ad vterum. Verum ad partis affecte dignotionem ut accedamus; comes huius inflammationis est, iuxta Paulum loco citato, febris acuta, dolor capitis, tendinum, basis oculorum, brachialis, digitorum, & colli conuulsio, inclinatio in aduersum, stomachi ex consortio dolor, oris vuluæ coniuuentia, pulsus exigui crebriq;. Febris autem hanc inflammationem sequitur, ut in aliis inflammationibus internis, propter maximum consensum cum corde per arterias. Hanc etiam indicabunt, inquit Aëtius, muliebrium locorum, pubis, suminis, lumborumq; arduentes dolores; & si digitus in os vteri imponatur, occurrat tangenti durum, clausum, feruidum, retractum; præsertim si in ipso aut in collo fuerit inflammatio. Nam licet oris vteri compressio commune signum conceptionis, & tumoris præter naturam sit; id tamen ex duritie distinguitur, ut patet apud Hippoc. & Gal. aph. 51. & 54. 5. lib. Molle siquidem est grauidis & secundum naturam, durum verò in quibus præter naturam

aturam est tumor. Cum itaque os vteri inflamma-
 tio affligit, in abdomine dolor est, digitoq; immisso, os
 occurrit durum ac rigidum. Plerumq; etiam vterus
 in eam partem declinat ac retrahitur, quae inflamma-
 tus est, & ob eam causam os & collum eius auerti-
 tur. Et ubi cavititas, seu fundum vteri fuerit inflam-
 matum, in umbilico potissimum dolor cum tumore
 infestabit, ut ne contactum quidem foris admittat.
 Differt autem ab ea quam superius vteri retractionem
 proprie appellari diximus, quoniam cum inflamma-
 tione vehemens est febris, & ardor intensus. At si non
 vniuersus vterus, sed pars eiusdem aliqua inflamma-
 tione fuerit obfessa, in ea magis dolor intenditur &
 sentitur. Nam si posteriora eius, iuxta eundem Aë-
 tium, inflammatione laborant, dolor lumbos affligit, ac
 spinam magis; & sterqus recto intestino (compresso
 eo) retinebitur. Anteriore autem parte inflammata,
 dolor pubem occupabit, & stillicidium, aut vrinae diffi-
 cultas (pressa vesica) excitabitur. Lateribus verò vteri
 inflammationem expertis, inguina tenduntur, & cru-
 ra grauantur, ac aegrè mouentur, & quibusdam crus
 ipsum, quod è regione est, per incessum claudicat: quin
 etiam in coxam dolor transit; eiusdem quoque partis
 dolor cum grauitate nonnihil significare potest. Gal.
 teste De loc. affect. Comitantur autem vteri inflam-
 mationem, prater iam dicta, tumor ac dolor eiusdem
 haud validus, si languida fuerit inflammatio; vehe-
 mens verò, ubi valida fuerit; eritq; is dolor, ut dixi-
 mus, quem percipiunt egrotantes, pulsabilis, Paulo
 teste; secundum vniuersum, ubi vterus totus fuerit
 inflammatus; aut secundum partem, si pars ipsa fue-
 rit affecta; tum illa quae paulo antè diximus. Iam ubi

Signa si os
 vteri in-
 flammeretur.

Si vteri ca-
 uitas fuerit
 inflamma-
 ta, signa.

Posterioris
 vteri partis
 inflammatae
 signa.

Anterioris
 signa.

Signa si la-
 tera fuerint
 inflammata.

Signa in
 languida vel
 valida in-
 flammatio-
 ne.

Q 5

magis

Augescentis
inflammationis
signa.

Cur febres
vehementes
hic fiant, &
dolor capitis
in sincipite.

Causa quo-
modo di-
gnoscantur.

magis augeatur, consequuntur, animi deliquium, ex-
lucio, singultus, pedum torpor, genuum perfrigeratio,
& extremarum partium exudatio, vrinaq; ac stercor-
um recrementa supprimuntur, & dentibus frendent
agrotantes, & febres magis augentur, praesertim sincipi-
tis dolor, vt ab Hippoc. & Gal. 6. De morb. vulgari-
bus scriptum est. Eadem quoque habet & Aëtius. Cum
nimirum inter omnes corporis partes, plurimas gran-
dissimasq; venas vteri habeant, phlegmone vtunque
ipsis orta, calidas vehementesq; febres accendi opus
est; adeò vt inter synochorum species connumeranda
sint; cum ex putrido sanguine excitentur, ex quibus
calentium vaporum copia ad caput subuolat (vt rectè
etiam Donatus censebat) quo dictorum vaporum ple-
no, grauitates, & maximè in sincipite, agram vexant,
tum quoniam recta in sinciput per infundibulum ar-
teriae deducuntur, per quas calidi illi vapores ascen-
dunt; tum quòd etiam sanitatis tempore tenuia, &
halitiosa excrementa cerebri maximè per sinciput
diffuari solent, cum in ipso sutura laxissima sint, calua-
ria subtilissima, plurimisq; meatibus peruia. Ad hæc &
multa sensibilia corpora per suturas euadunt, tum
membranula, qua crassum inuolucrum pericranio
connectunt, tum etiam multitudo tenuium concepta-
culorum per suturas exiliunt: & propterea cum sen-
sibilior sit locus, hinc ab inferentibus dolorem causis
magis cruciatur. His itaque de causis in sincipite ma-
gis dolores sunt, ex Gal. sententia eodem 6. De morb.
vulg. Causa autem externa facile ex sermonibus agra
dignoscuntur, aut astantiū. Interna verò ex prægres-
sis causis, ex corporis plenitudine, vel si menses sup-
pressi fuerint. Signa quoq; predominantis humoris, vt

am saepe diximus, eam ostendent; vel si ulceratio ad-
sit, vel praecesserit, vel abortus, aut partus difficilis, &
similia. Verum exemplis subsequentibus haec iam di-
cta manifestius apparebunt.

OBSERVATIO XLII.

De inflammatione seu apostemate uteri calido.

MULIERI Delphensi plenitudine labo-
rati ex praedominio sanguinis inflamma-
tio uteri oborta fuit, quod istis signis percepimus
apostema calidum esse: nam oculorum subsequen-
batur dolor, & matrix intus palpitabat, & in
ventre sub umbilico sentiebatur calor, tumor
quoque ac grauitas, eratque dolor magis acutus
arguens materiam calidam, occupans spinam,
inguina, & ad praecordia ascendens, modò etiam
in utroque coxendice dolebat. Cum enim san-
guinea esset, magis ex sanguine quam bile ad
uterum defluxo, hoc malum originem cepisse a-
maduertimus. Cum scilicet rubedo faciem &
oculos occuparet, lotium quoque rubrum & cras-
sum esset, non erat ex mensibus suppressis, neque
ob partum, aut abortum atque ictum, sed ex humo-
re calido sanguineo ad uterum defluxo. Ideo cum
plethora adesset, uti in praecedente muliere, venam
in brachio dextro ex basilica secari iussimus: nam
& in uteri parte magis dextra dolebat. Emol-
liente quoque clystere humectante & refrigerante
prius iniecto, cum aluum non deponeret, &
hunc syr. propinavi: R. syr. ex infus. ros. rub. de
end. acetos. simpl. añ. ʒ. j. aquae acetos. portulacae,
end.

252 DE MULIERVM MORBIS,
end. añ. ʒij. misce: fiat syr. pro duabus dosibus.
Interea cum in principio essemus, hoc vnguento
locum dolentem inunximus: & ros. rubear. myr-
till. sumach, hypocisth. boli armenæ, añ. ʒj. olei
ros. myrtei, añ. ʒvj. ceræ parum, fiat vng. Fiebat
& hic vel similis fodus: & ros. rub. balaust. su-
mach, hypocisthid. chamæmeli, añ. m. j. contun-
dantur crasso modo, bulliant in lib. iij. aquæ ad
consumt. mediet. deinde spongiam infunde in
dicta decoct. & expressam pectini superpone; &
ubi ceperit tepesceri vel calfieri, inde remouea-
tur. Postea in augmento percussiva cum reso-
lutiuis apposuius, percussiuus tamen vin-
centibus. Nempe in principio augmenti hoc se-
quenti vel huic simili utebatur: & flor. chamæ-
mel. meliloti, summitatum anethi, ros. rub. ba-
laust. sumach, añ. m. j. conquassentur crassiuscu-
lè, & bulliant in s. q. aquæ secundum artem, &
fiat fomentum. deinde inungatur cum oleo ros.
& oleo chamæmel. In statu apposuius reso-
lutiua temperata. vt: & florum chamæmeli,
summitatum anethi, meliloti, sem. lini, fœnu-
græci, artemisiæ, matricariæ, melissæ, añ.
m. j. bulliant in aqua, vt suprâ, & fiat fodus; mox
vtero quoque inuncto, vnguento hoc vel simili
resolutiuo: & olei liliacei, chamæmel. añ. ʒß. pul-
ueris matricariæ ʒj. adipis anserini, medullæ cer-
uinæ, añ. ʒij. ceræ exiguum, fiat vnguentum:
postea etiam adiecto oleo cheyrino; quibus ma-
teria resoluta fuit. Interim post duos dies à se-
ctione venæ basilicæ exhibui hanc potionem
minoratiuam & lenientem: & cassiæ recens ex-
tractæ

tractæ 3 vj. elect. lenitini 3 ij. dissolue cum 3 iij.
 quæ artemisiæ, syr. viol. 3 ß. misce. Deinde ad-
 huc iuleb fuit reiteratum. Post quartum diem,
 dolore utcumque sedato, ita eandem purgavi:
 & diacatholici, cassiæ recens extractæ, electuarij
 lenitini, añ. 3 ij. electuarij de succo ros. 3 j. ß.
 cum 3 iij. decoct. flor. & fruct. cord. addendo
 syr. viol. 3 ß. misce. fiat potio. Quibus egregiè
 excreuit. Capiebat deinde ad roborationem,
 diamarg. frig. & triumfant. in tabulis. Quibus
 materia resoluta, ut iam diximus, sanitatem
 consequuta est.

SCHOLIA.

SIGNA prædominantis humoris diligenter per-
 scrutanda in vteri apostemate vel inflammatione,
 antequam curationem ineamus, ut hoc exemplum
 calidi apostematis ostendit: nam hic febris acuta &
 continua aderat vehementior, capitis dolor, tremor,
 ac spasmus quasi membrorum digitorumq; & cerui-
 cis; oculorum radices dolebant & interior vulua, vnde
 & vniuersum corpus languescebat. Refert Benedictus
 Veronensis lib. 27. cap. 5. se Iudæam quandam in eo
 affectu secasse. Supra enim inguinem, inquit, pluri-
 mum intumuit, imo ventre: nam diu locorum vitio
 laborauerat. Miro modo tumor ille dimota vulua in-
 terdum latefcebat, interdum in mucronem conspicuus
 cernebatur, iam iam me & chirurgum sæpe delusit
 ferramentum & medicamina apparantem. Ad ma-
 turitatem emplastris perduximus, mox manum deni-
 que non effugit: & sanata est, ac exinde concepit.

Signa præ-
 dominantis
 humoris.

Historia Be-
 nedicti Ve-
 ronensis.

Altera

Altera pariter Iudaea (addit idem Veronensis) ex eodem vitio sanata est, quam secari ex improviso iussimus, tanta odoris grauissimi foeditate, vt Medicos & necessarios omnes domo propelleret: is tumor immobilis erat, annexo peritonco. Sicuti & Permarena nobili filia. Si à sanguine sit, iam diximus Obser. precedente. Si à bile, febris est magis acuta, dolorq; acrior, sitis, lingua sicca, vigilia, tum alia omnia intensiora. In frigida apostemate genua torpere sentiuntur, tum pulsus tenuis est ac exilis. in vniuersum stomachus languet, ac singultum patitur: tum & sub occipitio dolor insidet: in maxillis & supra frontem dolent. sine dolore aliquando tumor est, qui grauis est, & extenditur iam & extrema molliora redduntur ac tumescunt, & agra minus insomniculosa est, ac minus sitis, sine lingua nigredine, pulsuq; minus frequenti, & vrina minus rubens, genae tument. A pituita etenim febris est mitior, dolorq; magis grauans, non tamè multum intensus, vrina minus colorata, pulsus mollis, inordinatus. Melancholici verò apostematis nota sunt, tumoris durities; nec dolet durities, inquit Gal. nisi in carcinoma mutatum fuerit. At cum venter supra modum turget, hydropis similitudinem gerit, tum pedes tument, crura extenuantur cōmunicatione iecoris vitiati; sic aluus sistitur, ac vrina importunè supprimitur, ac menses cessant. Ita à melancholia, secundum alios, febris lenta, dolor mitis, pondus in vtero grande, liaescētes venae omnes, maximè autem saphenae, vrina interdum subtilis, ad plumbeitatem declinans, nonnunquam tamen tenuis atque alba; pulsus inordinatus, durus, paruus, & tardus. Ex atra bile id vitium saepe oritur, aut phlegmone cum induruit, subito mate-

A bile.

Nota apostematis frigidi.

A pituita.

Signa melancholici apostematis

Ex atra bile.

euanescente: id communi vocabulo Sephyros vocatur, & cum plurimum in orificio contingit; atque cancer lapideum inuenitur sine vlllo dolore. Si calidi apostematis dolor paucis diebus non quieverit, sed grauas ac magnitudo perseuerat, tum inuicta sequitur crities, quæ medicaminibus vinci nequit: facile enim, vincere conamur, in exulcerationem interdum mutatur. Et sic, in summa, inflammatio aut apostema vel ipsum aut ex toto dissoluitur, aut maturatur, aut in- crescit carcinomatis modo. Si maturetur, inflammatio in abscessum transeunte, dictæ quidem notæ inflammationis superius descriptæ intensiores erunt; do- res etiam circa puris generationem ipsis augentur, ac febres quæ cum humore, plerumque ad vesperam in- ueniunt, ac inordinatæ acceffiones ipsis obueniunt, pri- us quidem temporibus intensa, cum doloribus ad vl- timum: ubi suppurauerit, aliquantulum remittunt, inquit Paulus cap. 65. lib. 3. tumor attollitur, dolor unctorius adest, aliquando vrina, aliquando sterco- ris recrementa supprimuntur, aut vtræq; simul, Aë- tio teste: aliàs tumor in pube eminet, & vetuti ex- citationis sensus, cum abscessus maior fuerit, vt liquet ex eodẽ Paulo. Dum verò neque ipsa inflammatio se- mutata est, neq; in abscessum transmutata, adhuc perse- verant, in scirrhi naturam transmutabitur, idq; inde percipies. Febris, ac dolor, & reliqua leuiora sympto- mata remittuntur, tumore tamen & renitentia per- manentibus cum grauitate, & egro motu non solum cururum, sed totius corporis, ac segnitie ad omnes vitæ fuctiones; vt liquet ex eisdem Aëtio & Paulo. Signa etiam temporum, propter curationem dignoscenda. Sic principium est ubi incipit. malo augescente, augmen-

Sephyros.

Signa in-
 flammatio-
 nis in ab-
 scessum
 transeuntis.

Si in scirr-
 hum per-
 mutetur,
 signa.

Signa tem-
 porum.

Imperito-
rum Medi-
corū error.

Signa præ-
sagientia.

Prognostica

augmentum . in vigore existente , status . dum incipit malum , declinatio . Differt quoque à pleuritide quod imperiti Medici agrè distinguunt , ob septi transuersi compressionem . Si enim magna est inflammatio sequitur vteri suffocatio : si minor , magna difficultas spirandi , & ad latera & costas protenditur dolor . hinc existimant pleuritidem esse , ignorantes consensum vteri cum septo transuerso , & cum clauicula . Integitur enim peritoneo , & eo solo firmatur , ac retinetur à parte superiore . Quare si distendatur affertur , & in maiorem molem accrescat , distenditur peritoneum , & hypoficota , ob illam unionem , quæ in septo transuerso , ex peritoneo & hypoficota . Restant adhuc signa præsagientia , tum merè prognostica . Si causæ externæ plures in muliere fuerint & effectus digni , inflammationem vel apostema in vtero expectare possumus . At merè hæc subsequenter signa prognostica sunt : scilicet quod deterior inflammatio ea est , quæ plures vteri partes occupat , quàm quæ pauciores : similiter quæ os , aut cervicem fatigat , minus periculosa existit , quàm ea , quæ fundum , seu cavitatem , quoniam promptius curationem admittit . Si verò vterum gerenti erysipelas in vtero fiat , lethale est , inquit Hippoc. aph. 43. §. lib. quanquam de veritate inflammatione propriè dicta dubitet Gal. num foetus possit aliquando viuere : id quod negari haudquam debet , eadem exigua existente , ex qua nedum maligna , verum etiam nec acuta febris gignitur : necesse est etiam si in iocinore , ventriculo aut septo transuerso orta sit , ut liquet ex Gal. 2. Prophet. Ex erysipelate autem semper acuta febris generatur , & sæpe numero maligna . In hoc vitio vrina alba & tenui

malum

salum minatur. Et quum reliqua accidentia inua-
 scunt, & sudor affuerit malignus, cum ventris in-
 atione ac animi defectu frequēti, ita ut non loquan-
 tur, spei locus nullus est. Inflammatio, apostema, ab-
 cessus, vel suppuratio in utero, iuxta Auic. & Ara-
 es, si in ore uteri, inquit, possibile est ut sanentur;
 et si in profundo, minimē; Gradus addit, valde diffi-
 ile. Si induretur, lethale: si in pus mutetur, difficile.
 Id tamen cum fluit, sine odoris grauitate nimia erum-
 it: nam & in colore album est vniuersum pus, & sa-
 uis pronunciat: uti in muliere illa quae Delphis ha-
 bitabat in insigni capitis aurei, vxore pistoris, cui su-
 bito ruptum est intus apostema, & copiose effluxit
 sanies alba, & minimē foetida: ac nostra industria hac
 euasit, Dei benignitate. Eius historiam Obser. 44. po-
 nemus. Quod si illud pus quod effluit, teterrimi sit odo-
 ris ac virulentum, perniciem minatur. Si extremen-
 ta in uteri inflammatione, seu apostemate, & vrina
 retineantur, atque dolor ad vltimum extendatur, ne-
 que per se, neque per artem subito minoretur, lethale:
 quemadmodum fuit in Adriana Gerardi Alcmariana
 vicina nostra, muliere quidem pulcherrima. cui cum
 secundō difficillimē pareret, & foetum mortuum cum
 violentia quadam peperisset, neque bene tractaretur
 post partum, nec diligenter custodiretur, ingens dein-
 de in utero abortus est dolor, febre continua acceden-
 te, cum uteri inflammatione ac apostemate calido; ita
 ut lorium primō difficulter redderet, postea & in toto
 suppressum fuerit, ut in grauiore inflammatione fieri
 assolet. Hic obstetrix planē imperita, & muliercula
 astantes masuta, ut huic pessimo symptomati occurre-
 rent, multa calida pectini adnouere; etiam filum co-

R

ctum

tum in lixiuo, vt lotium prouocarent: & ita aposte-
 ma augentes, tum febrem ipsam, aptu non adhibiti
 remedijs, nec me quidem licet vicinum vocarunt, au-
 consilium petierunt, & agram in mortem precipita-
 runt. In fine quidem Gallum Medicum Harlema-
 sem vocarunt: sed & is nihil profecit, ac ipsa pauci-
 deinde horis extincta est. Recte dixit Bertrutius in su-
 Collectorio tract. 9. sect. 3. cap. 10. De apost. & cancr-
 matricis, Consuevit hic, inquiens, superuenire acci-
 dens timorofum, scilicet retentio stercoris & vrina
 cui succurrimus agram ponendo in balneo aqua dul-
 cis, vel in aqua decoct. viol. althææ, chamameli, sœnug-
 sem. lini; cum ventrem leniat, vias elarget, & dolor
 sedet. Difficiliter quidem talia in puerpera adhiberi
 poterant: fortius tamen vel cataplasma ex iisdem parari
 potuisset, vt aliquando in puerperis quibus vrina detri-
 nebatur, commodè fecimus. hæc enim inflammation
 aut apostema non augent. Iam quoque frigiditas ex-
 tremorum, vel sudor frigidus circa frontem & tem-
 pora, lethale: arguit enim magnitudinem apostemati-
 seu inflammationis, & virtutis naturalis angustiam.
 Alienatio quoque fortis & instantia vigiliarum, quæ
 per artem remoueri non possunt, infra diem quartum
 vt quidam volunt, lethale. Apostema tempore im-
 prægnationis eueniens in vtero, interficit matrem, ve-
 fœtum, vel vtrumque; & propriè si fuerit confirma-
 tum, vti euenit cuidam mulieri iuencula, ad quam
 accitus sum, iam per sex septimanas quasi hectica fe-
 bre consumptam. Dolore in regione vteri semper tor-
 quebatur, & agrè lotium reddebat, cum stranguri-
 videlicet, ob crassam residentiã quasi purulentam
 ita vt ab vlcere vteri ac renum: nam in renibus etiam
 dolebat

dolebat. Sed præcipuè ex apostemate præcedente videbatur abscessus esse in vtero. Erat iam in septimo mense prægnans, vel in principio octauæ mensis (si bene meminimus) cum ad ipsam accersitus fui. Ante meum aduentum hæcenus alij Medici præsentibus illam tractauerant, licet agrè remedia admitteret. Cum ad illam venissem, accersita obstetrice, cum conamina partus adessent & insignes dolores, de abortu metuebam; & animaduerti ex certis signis infantem per tres dies ad minus mortuum fuisse; nam ab illo tempore fœtum non sentiebat. Et cum valde angeretur, neq; aluum deponeret, ut à fœtæ mortuo liberari posset, cum leniens clyster & emolliens iniectus esset, multis precibus agra inducitur, mox peperit filiū omnibus membris perfectū, & satis magnum, sed mortuū, qui etiam ante tres dies saltem mortuus fuisse videbatur. Post tres dies cum rursus in regione vteri valde doleret, & purgatio non bene subsequeretur, exhibito puluere ad illam promouendam apto, peperit molam carneam. Et postea melius habere videbatur. Post duos vel tres menses dolore iterum ingrauescente, cum dysuria & vrina crassa, ex eodem apostemate in vlcus transmutato, mortua est. Apostema igitur vteri in prægnantibus semper est periculosum. Et quaecunque etiam illud fuerit in alijs mulieribus etsi non sint græuidæ. Quemadmodum hoc anno 1596. contigit in muliere Alcmariana pulcherissima, quæ per annum prius apostemate vteri laborans, postea eo in vlcus malignum transeunte, mortua est magna cum miseria. Alij eam calculo laborare putabant: ego autem vlcus esse in vtero semper iudicaui. & facta incisione post mortem, marito iubente, vlcus, uti prædixeramus, in vtero repertum est. Quaecun-

que igitur apostema sit in utero, non est contemnendum; imò diligenter curandum; cum ex eo facile abscessus fiant, saepe & scirrhus, cancer, rima uteri & rhagades ac condylomata. De quibus etiam suo loco dicturi sumus. Atque hac de signis dicta sufficiunt. Curationis erit ex subsequentibus exemplis magis luculenta.

OBSERVATIO XLIII.

De oris uteri inflammatione.

MULIER cum in abdomine valde doleret, atque etiam febricitaret, os uteri inflammatum iudicabam: quamobrem Adrianam Biezelingiam, quæ mulieres curabat, vocari iussi, ut immisso digito experiretur num os occurreret durum ac rigidum; quod & clausum dicebat, ac feruens, ac retractum. Id signum erat (ut antea quoque diximus) in ipso ore uteri & collo inflammationem esse. Quare ut rectè curationem aggredieremur, ægram in domicilio obscuro collocauimus & moderatè tepido, & fomnum moderatum præcepimus, cum vigiliæ etiam conferant in principio magis quàm somnus: prohibent enim phlegmonem augeri, cum in visceribus generatur; ut pater 6. De morb. vulg. & Comment. aph. i. lib. 2. Interea imperauimus ut quietem amplecteretur, etiam omnem crurum motum interdicentes. Cum autem ægrè aluum deponeret, molli clystere infuso excrementa euacuauimus. Et sic, clysteri iniecto, mox venam secari iussimus ex vena basilica in brachio dextro; quod fortis esset, ac in morbi principi-

principio adhuc essemus. Iussimus quoque ut immodicos animi motus vitaret. In principio parum cibi dedimus, nisi hordeatum, aut hordei cremorem. Paulus iubet lib. 3. cap. 64. per triduum cibo abstinere, & curationem, post venæ sectionem, absoluit chondro ex aqua mulsâ, vel pane, vel ouis sorbilibus, vno die interposito. Sic & Aëtius lib. 16. cap. 85. Chondro è mulsâ, aut pane abluto, aut ouis sorbilibus patiens alenda; esseque oportebit, quicquid cibo exhibetur, quantitate moderatum. Et sic nostram alebamus pane loto, aut ptisana, seu eius cremore, aut etiam alternis diebus ouis sorbilibus. Pro potu aquam hordei dabamus, siue in qua & hordeum mundatum & glycyrr. incocta erant. Alij sem. coriandrorum præparatorum decoctum, seu ipsammet aquam modicè calidam dant. nos & cereuisiam tenuem concessimus, à vino abstinentes. & iussimus, ut artus & extremæ corporis partes, manuum præsertim, auersionis gratia, perfricarentur. Quod ad medicamenta attinet, fotum ex œnelæo vel vino rosaceo, iuxta Paulum, super pubem adhiberi iussi, hapsis ex lana puriore atra deligaturam. Interea exhibui quoq. iulebos ex syr. viol. nymphææ, cum aquis laetucæ, end. cichor. acetosæ, & similibus. Tertio die purgaui cum manna & cassia, quia delicata erat. Interea quoque cataplasma apposui ex farina hordei, sem. lini, fœnug. vitellis onorum assatis cum rosaceo & decocto capitum papanecris & meliloti, ac exiguo vino seu aceto, composita. Sic & Aëtius feruescente inflammatione,

R 3

lanam

lanaam succidam vino & oleo, aut oxyrhodino
madefactam, sumini ac pubi applicat, aut pal-
mulas in vino decoctas, aut mala cydonia simili
modo in vino decocta. Post quintum diem ap-
plicui id quod à Paulo etiam commendatur;
nempe cataplasma ex polline farinaceo, semine
lini, fœnug. ex mulsa, in qua papauerum capita
decocta proiciantur, & ex oleo, paratum. Et
quia calor erat magnus, aquam rosaceam, cum
succo plantag. & portulacæ per modica inter-
ualla pudendo affundi iussimus. Vbi dolor ma-
gis excrucialet, iuxta Paulum, lachrymarum
papaueris valde exiguum, (tria videlicet aut
quinque grana) cum lacte muliebri & succo
fœnug. apponendum consulebam. Et si dolor
non cessasset, inessus adhibuissem, quos &
Paulus per totum morbi decursum utiles esse di-
xit, ex decocto fœnugræci, seminum lini, maluar.
artemisiæ, & olei, præcipue post principium.
In iis autem, quæ calorem non sustinent, & ma-
ximè circa initia, ex aqua modicè calida rosa-
ceo superfuso inessus fiant. At mitigata inflam-
matione lana oleo calido & ros. chamæmelino
& irino imbuta pubem fouimus: & magis de-
clinante, cataplasma sumini & pubi apposui-
mus ex farina hordeacea confectum, fœnug. &
lini semine, cum decocto althææ, carycis etiam
adiectis. Aëtius ægrotam in fœnug. althææ, sem.
lini, interdum pulegij, marrubij, saluiæ, artemi-
siæ decoctis sedere iubebat: & cataplasma simile
iam dictum in aqua mulsa coctum apponebat.
sed, si grauitatem cataplasmatum & calorem

ferre

ferre non possent, in aqua tepida sedere iube-
bat, & loca rosaceo inungebat, pessosque im-
ponebat qui moderatè refrigerarent, ex adipe
gallinae, rosaceo & vino confectos. his quæ calo-
rem ferunt, ceratum nardinum illinetur, collu-
tionesque & pessi adhibebuntur, ex æsypo, bu-
tyro, medulla ceruina, adipe anseris, vnguento
susino, & cera. Sed, quod penè omiseram,
quarto die, cum nondum dolor cessaret, iussi-
mus quoque, ut in muliere robusta, ut vena tali
secaretur, sed in exigua quantitate, quia prius
vena secta fuerat ex basilica. huius rationem ex-
plicabimus Scholio sequenti. Deinde utebatur
topicis iam supradictis. Verum, dolore iam mi-
tigato, & curatione procedente, tunc, iuxta eius-
dem Aëtij sententiam, tenuè viuendi rationem,
tum cibi paucitatem auferebamus. & cum iam
manifesta declinatio facta esset, vinum conces-
simus, & cibos reficientes. Atque his remediis
iam dictis inflammatio probè resoluta fuit.

SCHOLIA.

QUOD venam hinc ex basilica primò secari iussi-
mus, id auctoritate tum Pauli tum Aëtij egi-
mus. Vbi enim, inquiunt, vehementior inflammatio
insestauerit; si neque aetas, neque habitus, neque anni
tempus obstiterit, neque inflammatio post abortum,
aut immensam sanguinis euacuationem superuenerit,
cubiti vena secanda est, ac sanguis pro virium ratione
educendus; licebit quæ in secunda quidè venam incidere,
in tertia verò sanguinis missionem repetere. Sed hinc

De venæ
sectione.

R 4

dubita-

Dubium de
venæ sectio-
ne.

Solutio.

Aliorum
medicamen-
torū ratio.

Purgatio.

dubitat (ut etiam Donatus longiori sermone refert) cum Gal. De venæ sectione lib. poplitæ & malleoli venam secare iubeat, vterque, renibus vel vesica affectis, etiam 13. Meth. med. Sed hoc facit summa indicatione à parte affecta, pro euacuatione cum deriuatione eius quod in parte inflammata continetur, & non pro auersione eius quod influit. Si enim in generatione est, per contrarias partes & longissimas facit, 13. Meth. & sic initio venas superiores etiam Arabes mittunt. deinde, ubi opus est, pro deriuatione & euacuatione, à talo. Exigua verò existente inflammatione, valentibus viribus, potissimum ubi corpus totum plenum non fuerit, & inflammatio iam facta sit, tali vena incidatur, & si opus est, eadem iteretur, rectitudinem perpetuo seruantes. A venæ sectione, si eadem inflammatio cum erysipelate præsertim participet, ubi quodam modo mitior fuerit reddita (non autem circa initia) leui quadam purgatione vti conuenit, etiam pro deriuatione faciendâ, ut cassia fistula, manna, saccharo viol. syr. ex infus. ros. pallid. diacatholico. Deinde imo ventri ac pubi & lumbis foci, irrigationes, seu epithemata, ex iam dictis in Obs. adhibebimus. Et si erysipelatis naturam participauerit (quod ex igneo calore percipies) intubum, & umbilicum Veneris, sedum, polygonum, portulacam, plantaginem, ac vitis pampinos cataplasmaticum polenta apponito: vel quopiam earundem herbarum succo cum rosaceo aut melino oleo lana madefacta in sinum pudoris, iuxta Aërium, mittenda est. Pessi quoque ex succis herbarum dictarum subdendi. Quod si cataplasma à locis non toleretur, aquam rosaceo admixtam ex modicis interuallis iugiter infundimus. In exacerbationis de-

clina-

clinatione agra in aqua tepida vsque ad lumbos insi-
deat. Deinde pessi imponendi ex aliquo vnguento le-
uiter astringente; sicut rosaceo, melino, lentiscino, ce-
nanthino, adiectis ouorum vitellis crudis aut assatis,
& croco; interdum ex memoratis succis addendo.
Mitigata inflammatione, prater pessos in Obser. di-
ctos, cucurbitulas idem Aërius affigit in lūbis; magno-
q; existente tumore, etiam cum scarificatione. Idem
componit & pessos ad sedandos dolores inflammatio-
num vteri, fœnug. madefaciens, primam ac secundam
aquam abiciens, deinde vbi in tertia, quæ dulcis pu-
taq; sit decoct. per colum traiecit & decocto admiscet
adipem anserinum recentem, vel gallinaceum, ac per-
mittit simul super ignitis carbonibus colliquari: postea,
vbi refrigerit, concretum adipem aufert, & seruat;
quem vsus tempore spatula specilli in manu subactū,
pesso excipit, & supponit. Alius dolorem sedans: Pa-
paueris capitula in passo decoquito, donec flaccescant,
deinde exprimito, & decocto transcolato medullam
ceruinam liquatam admisceto; & vtere: & si me-
dulla ceruina defuerit, vitulinam sumito. Habes apud
eundem innumeros pessos valde convenientes. Sed hic Cautio.
cauendum ne in extensionibus & inflammationibus
vteri menses eliciamus: magis enim loca extendun-
tur, & cum ob inflammationem oculusa sint, sangui-
nis transitum intercipiunt. Sed & tetrapharmacum
ad inflammationes vtiliter imponitur, aut infundi-
tur. Quod si inflammationi vlcus adiunctum fuerit,
cerato rosaceo, ex cera alba, cum tertia anserini adi-
pis parte confecto, albumen oui, quantum capere po-
terit, instillato; & vtere. Idem & in declinatione
balneum admittit. Neoterici hæc addunt, vbi calidum

Calidi apo-
stematis
curatio

R 5 apostema

Astringen-
tia topica.

In sangui-
neo.

Bilioso apo-
stematis re-
media.

Phlegmatici
cura.

apostema est: Agrotam in cubiculo frigidiusculo collocant, quietem imperant, & ut famem sustineant, parum bibat hordeaceam aquam pro siti. Inclinate morbo, vires recolligunt sensim, pullus detur in cibo, ouum sorbile, atriplex, spinachium, malua. Prisana iuuat, nam totam curationem complet. Imbecillioribus far hordei, aut alica dari potest, ut diximus; panis aqua elotus, aut subinde coctus. Interdum auicula conceduntur, aut pulli lactuca preparati, vel perdicee cum cucurbita, vel cum seminibus frigidis, vinum cauendo; singulis diebus aluum emolliendo clystere, vel manna, vel castia, vel saccharo viol. si opus est purgatione. Initio quidem calidi apostematis, discutiencia & refrigerantia apponuntur; etiam leuiter astringentia: talia sunt, rosa, leus dempto cortice, balauitia, plantago, vitis pampini vel folia, strychnum, seris satina, portulaca, virga pastoralis, semperuiuum, cucurbita ramenta, ac hordei farina. Insidere in aqua cum oleo ros. plurimum iuuat, & hoc emplastrum, in materia sanguinea: Farina lentis excorticata, hordeacea, añ. ℥ij. succi plantag. semperuiui, strychni, virga pastoralis, olei ros. vel omphacini q. s. linteolis tam imo ventri, quam in spina imponatur. Bilioso apostemati magis frigida conueniunt; syr. viol. de end. acetos. simpl. cum aqua end. solatri, acetos. & leuis purgatio ex castia, pauco adiecto elect. de succo ros. Roborentur cum diamarg. frig. sacch. viol. diatrium sant. Topica sunt qualia superius diximus conuenire erysipelati. Probatum & hoc in bilioso: Farina hord. ℥iij. rament. cucurb. succu lactuca, nymphae, hyoscyami, pap. albi plantaginis q3, rosaceo infuso, feruescito, & apponito. Vbi vero phlegmaticum fuerit

uerit apostema, cubile calidiori loco constituendum
 est, priori contrario, & vigilandum est; calidiuscula
 & exiccantia offeruntur. materia digerenda cum syr.
 matricariae, de duabus rad. oxymel. simpl. & aquis ar-
 temis. scenituli, & similibus, vel decoct. artemis. puleg.
 melisse, alijsq; prius quoque minorata materia, se-
 cundum aliquos, cum ꝑ ij. pilul. scetid. deinde leuiter
 purganda cum elect. indo, agar. & diacathol. Et cum
 primum ortum fuerit, componatur cataplasma; vt,
 farinae lentium, & fabaceae, ac ciceris, añ. ꝑ ij. ma-
 stich. aloës, mannae thuris, farinae, scenugr. flor. cha-
 mameli, añ. ꝑ ss. cum oleo chamamel. absinthino,
 ros. componantur. Si sit melancholicum, durum, in
 humecto loco locanda est agra: somnus hic iuuare
 creditur. humor melancholicus & attrabilis digeren-
 da cum borag. meliss. chamæd. chamæpit. & buglos.
 decocto, & syr. de epith. borag. viol. & purganda
 cum sena, epithymo, & diacath. Cui & emollientia
 ac pariter dissoluentia quam citò sit possibile impo-
 nenda sunt, nec differenda: vt ex farina hordeacea,
 lini, ex meliloti decocto, addita sapa, & oui luteo
 tosto, & per interualla iuuant infusiones in meli-
 loti decocto cum lini semine, ac althæae vel maluae
 floribus vel semine. Prodest & per se cespum sub-
 dere, vel cum anatino adipe cum croco & meliloti
 seminis farina. At cum sanguineum increscit apo-
 stema, superiori emplastro, quod initio apponitur,
 scenugracum, melilotum & chamamelum aduicito:
 ac frequenter in eo decocto insidere iuuat, in quo
 plantago, lens dempto cortice, ac rosa cum malua,
 & althæa decocta sint. In bilioso verò eadem malua,
 & althæa, semperuiuum, lactuca, nymphaea, viola,
 cum

Melancho-
 lico apotte-
 mati quæ
 conueniunt.

In augmen-
 to quæ con-
 ueniunt in
 apostemate
 sanguineo.

In augmen-
to aposte-
matis bilio-
si, phlegma-
tici, & attra-
bilarij.
In statu.

In declina-
tione.
In sangui-
neo.

Biliofo.

Phlegmati-
co.

Melancho-
lico.

cum meliloto imponi debent. Infunditur subinde vio-
laceum, ac gallinaceus adeps. In phlegmatico item
calamum arom. adiici opus est, ac myrrham. Ex atra-
bile, galbanum addi potest. In statu pariter sanguinei
abscessus, artemisia ac calamus arom. admiscetur: in
bilioso, lini semen: in phlegmatico, palmula meden-
tur, caryca, menthastrum, ac calamintha. In me-
lancholico demum, quæ valde emolliunt ac dissoluunt
imponenda sunt. Inclinate apostemate, & mitiga-
to dolore, è chamemelo, meliloto, althæa, & semine
lini cum oleo violaceo ac cera cataplasmata conficies,
& in vterum violaceū luteum infundito, ac liliū:
tum enim quæ maximè dissoluunt imponi debent; si-
cuti sisymbrij succus, ac maiorana, & foliorum tener-
rimorum lauri. Aliqui ea damnauere, veluti nimium
excalfacientia, sed butyrū, adipem anatinum, cerui-
namq; medullam commisceri volunt, ne qua aposte-
matis pars lapidescat. Inclinate bilioso, althæam,
maluam, melilotum, lini semen ac chamamelum ad-
iiciunt. In phlegmatico, decocto menthastrī & cala-
minthæ infidere iuuat, addita ruta, roremarino, maio-
rana, & lauri folijs. Sed & lixiuum per se valere
creditur. Imponitur & emplastrum ex erui, lupino-
rumq; farina, cum oleo nardino, rutaceo: imponunt
aliqui linteolum aqua ardenti madens. At illud cum
cautione faciendum puto. Inclinate melancholico,
oportet magis emollire, quàm dissoluere, donec ex toto
tumor discutiat. Ego commodè in iis vtor emplastro
de mucilaginitibus, & nostro de ammoniaco dicto.

OBSER-

OBSERVATIO XLIIII.

*De apostemate uteri frigido in abscessum
transmutato.*

AGATHA Petri, filia illius Petri Aroma-
tarij Hagani, istis diebus nuper nupta
pistori cuidam Delphis in insigni capitis aurei
commoranti, anno 1569. 26. die Octobris in-
cidit primò in uteri suffocationem grauem, cum
conuulsione & motu epileptico, ut & caput si-
mul conuelleretur adeò vehementer uti ad sel-
lam in qua sedebat idipsum illideret. Erat enim
adeò fortis paroxysmus, ut vir humerum & sa-
put magna violentia continere cogeretur. Ade-
rant & duæ mulieres, quæ manus detinebant:
nam & digitos atque pollicem in manum con-
trahebat, ut vix in rectum deduci possent. Ter-
tia quoq. mulier astabat, quæ ventrem vi com-
primebat: adeò enim uterus sursum rapiebatur,
ut penè suffocaretur. Durabat autem hic paro-
xysmus adeò atrox circiter quinque aut plures
horas, quibus per remedia ab astantibus & mu-
lieribus adhibita à paroxysmo excitari aut sub-
leuari non potuit. Tandem sub noctem ad eam
accitus sum. Eo tempore, ad diuersionem, crura
fricabam fortiter, & ligaturas adhibui circa co-
xas vehementiores, & simul emplastrum sequens
vmbilico apponi iussi: & emplastri contra ma-
tricem ℥ β. ducatur supra alutam rotundam
paulo ampliorem daleto, & in circuitu obdu-
catur

270 DE MULIERVM MORBIS,
catur galbano. nodulum in se complectentem
assam foetidam naribus pro odoratu obiicie-
bam. Sed nondum in toto à paroxysmo excita-
batur, quamuis leuius ferebat, subinde scilicet
per interualla redeunte, non tamen ita acriter
vt prius. Tandem rutam manibus confricatam
naribus, vt continuò olfaceret, obieci, & à pa-
roxysmo planè liberata est. Verùm altero die
cùm tempus ventosum esset, nimium citò sese
aëri committens domo exeundo, in maximum
dolorem vteri incidit; atque 28. die me rursus
reuocarunt. Mulieres astantes incisabant, em-
plastrum nimis diu fuisse retentum supra vm-
bilicum; cùm potius ex aëre frigido spiritum
flatulentum concepisset. Doloze magis incref-
cente per totum ventrem inferiorem, & po-
tissimùm circa pectinem & pubem, cum tu-
more apparente, cepi ego metuere de aposte-
mate vëroso, vel potius phlegmatico & frigido,
in muliere admodum pituitosa, alba, & pingui.
Sed cùm aluū non deponeret, vt glans sequens
subderetur, mando: ꝛ pul. hieræ picræ ʒj. salis
parum, pul. cumini ʒ β. mellis q. s. fiat glans seu
suppositorium. Antequam imponeretur, em-
plastrum ab vmbilico detraximus: nihilominus
dolor, quem ex emplastro malè originem ha-
buisse dixerant, æquè persistebat, neque vllò
modo mitigabatur; nec imò ventre etiam in-
uncto hoc oleo: ꝛ olei lilini, de meliloto, cha-
mæmel. anethini, añ. ʒ β. misce. Ex supposito-
rio squibalas tantùm duras reiecit. Clysterem
libenter iniecissem (quod melius fuisset) sed
non

non admittens potionem sequentem ebibit: & artemisiæ, flor. chamæmeli, añ. p. j. sem. fœniculi, carui, añ. 3 j. ß. folior. senæ à stipitibus repurg. 3 iij. vuar. passul. ab acinis repurgatarum 3 ß. fiat decoct. in aqua communi q. s. cuius expressionis accipe 3 iij. in qua dissolue elect. lenitiui 3 vj. diacathol. 3 ij. misce. qua ter aluum deposuit, nec dolor tamen sedatus est. Adhibui hunc sacculum: & herbar. sicc. matricariæ, artemisiæ, añ. m. j. pulegij sicci, absinthij, calamint. rutæ, melissæ, omnium herbarum exiccat. añ. m. ß. sem. anisi, carui, añ. 3 j. flor. chamæmeli, meliloti, añ. m. j. incidenda incidantur, & contundenda contundantur, & misceantur in linteolo puro quadrato, & fiat sacculus insertus secundum artem; & calidè ventri apponebatur. Dicebat, simili sacculo se aliquando curatam fuisse, cùm similem dolorem passa esset. Sed dolor ex sacculo mitior factus non est. Die sequenti, quæ erat 29. Octobris, Haganus Medicus, me iunior accitus fuit, qui eandem aliàs præ manibus habuerat: is solam inflationem vteri esse putabat ex præfo-catione præcedente. Ego tamen verebar, simul cum ventositate apostema adesse ex frigida materia pituitosa, & quòd facilè abscessus fieret, cùm tumor appareret cum quadam durtie circa vnam partem vteri magis, & è regione illius partis etiam coxa doleret, præcipuè cùm illa non iuuissent, quæ ad vteri inflationem valent, magis de abscessu timebam: & ideo potius ad maiora emollientia, (cùm durties

ties cum tumore magis adesset, non sine febre, licet exigua & lenta) deueniendum esse proposui. Ille verò vrgebat vt emplastrum de baccis lauri toto ventri apponeretur, ad flatus discutiendos: ego autem eius caliditatem metuebam, ob febrem, licet lentam. Verùm ægra illud emplastrum esse apponendum annuebat, cùm & ipsa ventositates esse diceret. Hæc igitur præscripta sunt: & pul. Leonelli contra matricem, descripti Obser. 33. huius libri, ꝑ iij. pul. rad. pæoniæ (ob motus epilepticos, qui præcesserant) & sem. pæoniæ, añ. ꝑ ß. misce, fiat pul. pro ij. dosibus; & vnâ statim fuit exhibitus cum aquæ flor. chamæmeli & artemisiæ añ. ʒ j. ß. & emplastrum de baccis lauri supra alutam toto ventri appositum fuit. Trigesimo Octobris, cùm hic Medicus non amplius rediret, ac dolor semper in peius vergeret, magis timebani adhuc abscessum, cùm perfectè sentirem duritiem quandam vteri, eoque magis cùm difficulter tandem Ioriũ redderet: & cùm suffocatione vteri prius laborasset, matri clam consilium dederam, vt marito diceret, vt cum illa concumberet, ne vteri suffocatio rediret. Verùm cùm ipsa coitum ferre non posset, vt mater postea mihi narravit, maiorem suspicionem habui de vteri apostemate frigido; at, dolore ita perseuerante, quod facile ad abscessum tenderet. Quare, emplastro de baccis lauri amoto, vt talis inunctio fieret, præcepi: & mucilag. althææ extractæ cum aqua maluæ ʒ j. pingued. anatis, gallinæ, vituli, añ. ʒ ß. ammoniaci in aceto dissoluti ʒ iij. adie-

Etis

Etis oleis superscriptis, adiectaque cera exigua,
fiat linimentum. & post inunctionem, hoc se-
quens cataplasma infimo ventri applicetur: R
rad. althææ mundatæ ℥ iij folior. maluæ, parie-
tariæ, florum chamæmeli, meliloti, artemisiæ,
añ. m. ij. cerefolij (vt & melius lotium redde-
ret) m. j. coquantur in aqua ad mollitudinem,
pistentur; adde farinæ seminis lini, fabarum,
añ. ℥ β. furfuris subtilissimè triti & cribrati ℥ β.
cum butyro recenti, oleo amygd. dul. liliaceo,
chamæmel. añ. q. s. fiat cataplasma; quo & do-
lor nonnihil mitigabatur. Interea cùm ventrem
non deponeret, hoc decocto utebatur: R arte-
misiæ, matricariæ, melissæ, añ. m. j. flor. hype-
ric. chamæmeli, añ. m. β. parietar. maluæ, viol.
añ. m. j. sem. dauci, carui, cumini, añ. ℥ j. β. sem.
pastinacæ, agni casti, (quia aderant simul ven-
tositates) añ. ℥ β. folior. senæ ℥ vij. agarici femi-
nini albi leuis ℥ ij. zinz. albi ℥ j. coquantur in
aqua artemisiæ, chamæmeli, q. s. pro ℥ xij. for-
tiss. express. adde syr. de artemis. ℥ ij. syr. de ca-
lamintha ℥ j. Misce pro iij. dosibus matutinis.
quo decocto modò quinquies, modò sexies al-
uum deiciebat. Hoc tamen apozema non con-
uenit in apostemate calido, nec in principio in-
frigido: sed quia minus dolebat, & venter val-
de strictus esset cum ventositate, & cùm clyste-
res non admitteret, id præscripsi. Multas inde
ventositates simul cum stercore reiciebat: &
quia iam malum processerat, minus hæc pur-
gatio nocumenti inferebat. imò ex ea se leuari
quoque dicebat. Cataplasma autem continuò

S

appo-

apponebatur: & quia tumor mollior fiebat, paulatim fiebat maturatio apostematis, adiectis adhuc ficibus, & vno atq. altero capite liliorum cum oleo liliaceo. id verò percepimus ex sedatione doloris. Tandem itaq. nono die abscessus intus ruptus est, & effluxit sanies copiosa alba, & ab omni dolore liberata est. Eo tempore, emplastro amoto, oleo amygd. dul. inunximus; & antequam rumperetur, lanam succidam cum medulla cernina & butyro recenti vt in vuluam imponent, iussimus. Verum post eruptionem, sanie copiosè effluente, iussimus, vt decoctum hordei communis & cicerum rub. & glycyrbiberet, ad vlceris repurgationem, etiam adiecto melle ros. collumque vteri vt eo lauaret. Mox vlceri per se consolidato, conualuit.

SCHOLIA.

Quomodo
apostemata
vulvæ ma-
turantur.

PRÆTER veterū remedia ad emolliendā vteri di-
ritiē facientia, Recentiores emplastrū laudant, quo
abscessus maturantur: habet farina tritici, aristal-
thæe, añ. ʒiij. farina scēnug. sem. lini, añ ʒ. j. palmula-
rū, carycarum, rad. liliorū ac passularū q. s. decocto fer-
uescat: addatur item oleum lilinum, carthaminū cum
gallinaceo ac anatis adipe. Decoctū althæe ac malvæ,
meliloti, scēnug. cum acantho, insidentibus medetur.
Vbi igitur inflammatio non potest discuti, sed ad sup-
purationē vergat, suppurationi auxiliū prædictis em-
plastris ac in sektionibus ferendū est; cataplasmatū imò
ventri ac lūbis impositis ex lini semine, scēnugr. farina
hordei, carycis decoctis, althæa rad. ac terebinthina:
quo etiam tempore pudendi sinus per spongiam as-
siduè foueatur, & vapores per arundinem operculo
olla

alla perforato insertam intra pudendum recipiantur. Demum insectiones frequentes fiant decoctis in aqua his, quæ vim attractoriam habet; velut est pulegium, marrubium, laurus, salvia, artemisia, dictamnium, centaureum. Maturant caryea, lily radix cum simo columbino. Item pessuli indantur ex terebinthina, myrrha, æsypo, anseris pinguedine & butyro compositi: aliquando etiam columbinū stercus cum oleo & melle, pro cataplasmate, adhibebimus, ut ruptio fiat. Interea ad ruptionem facit gressus aduersus scalas, aut rheda vehi, vel equo, vel saltus, vel manu comprimere: eo enim modo saepe pus erumpit. Si verò abscessus in conspectu fuerit, ficu, sinapi, ac columbino simo facile rumpitur, nec ferramento opus est: si versus vesicam vulua suppurare videtur, quæ modicè urinam cient danda sunt; ut est semen melopeponis, cucurbita & cucumeris. Disrupto autem abscessu, quibus medicamentis deinceps utendū sit, mox de vlceribus vteri curandis dicemus. Si versus vesicam erumpit, laudant decocta melopepon. & psillij cum tragac. & sacch. & succum glycyrrhizæ. Si versus aluum, ius lentis decorticata decocta cum ros. ac balaustris, oryza, & similibus infusum. Si sanies exeat carnis recentis lotura similis, & grauis odoris, infundunt decocta astringentia. Quidam protinus rupto pure, mulsa colluunt frequenter. Mox vomica persanamus trochis. qui ex succino fiunt, si in potu sumantur. Colluere iauat sero caprino ac melle despumato. Repurgato vomica sinu, insudenda sunt quæ vlceræ persanant, de quibus mox dicemus. At si non in abscessum ac suppurationē inflammatio aut apostema trāseat, sed ad duritiem vergat, emollientibus pugnandū

Quæ ad ruptionem iuuant.

276 DE MULIERVM MORBIS,
*medicamentis, tum intus tum extra adhibitis; quo-
rum siluam reperies locis de scirrho cum lienis, tum
iocrinis, & qua nunc adferemus de vteri scirrho.*

OBSERVATIO XLV.

De vteri scirrho.

VTERVS, inquit Aëtius lib. 16. cap. 86. ex
Sorano, interdum quidem nullo prius in-
dicante signo, repente induratur. Ita & Paul.
lib. 3. cap. 68. Scirrhum contrahit vulua, aliàs re-
pentè, vt nulla causa euident præcesserit. Id eue-
nit mulieri Delphensi, de qua nunc agemus.
Plerumque tamen, iuxta eosdem, præcedente
inflammatione, quæ neq. discussa fuerit, nec in
abscessum mutata. Ita aliquando & malè cura-
tas inflammationes sequitur, vel intempestiuū
repellentium vsum, vel constringentiū in prin-
cipio, vel in fine fortioribus remediis discutien-
do quod tenue est, & quod crassum siccando.
In hac itaque muliere durus tumor aderat sine
febre, & tactui renitebatur; nullus, aut obscu-
rus, aderat dolor; si staret, graue pondus (quod
in aliis tumoribus obtingit) quasi prolapsu-
rum incumbibat in pudenda: vbi verò sede-
ret, aut decumberet, sua grauitate intestinum
rectum premebat: incessus aliquo modo diffi-
cilis erat, & segnities totius corporis aderat, non
tamen eius magnitudinis deuenerat, vt totum
uterum apprehenderet. Erat hæc mulier me-
lancholica & subfusca; ita vt ex humore crasso
& terreno, paulatim vteri substantiam occu-
pante,

pante, sine inflammatione præcedente initium
umpferat. Cum hæc robusta esset, & subni-
giuscula, & venas satis latas haberet, cumque
non ita diu hoc malo laborasset, ex vena lienari
(nam in sinistra parte vteri tumor durior erat)
sanguis vt extraheretur mandavi; iuxta Aëtium,
qui in principio, si nihil prohibeat, neque ætas
aut vires repugnauerint, mediocrem sanguinis
copiam à cubiti vena auferre iubet. Idem &
Paulus facit: atque vterque purgat materiam
crassiorem cum hiera Archigenis. Ego prius ex-
hibui syr. ex infus. ros. pallid. cum foliis senæ,
adiecto pauxillo elect. de hiera. Deinde appo-
si emplastrum de mucilaginibus, & de meli-
loto: postea & emplastrum nostrum de ammo-
niaco, prius inuncto hoc vel simili linimento:
℞ mucilag. sem. lini, scænug. althææ, maluæ, añ.
℥v. succi ireos ℥iij. pingued. anatis, gallinæ, an-
teris, añ. ℥vj. olei cheirini ℥j β. bulliant ad con-
sumptionem succorum; deinde adde croci ℥β.
cum cera fiat vnguentum. commendatur à Ni-
colo. lis remediis hæc optimè habuit. Hoc quo-
que emplastrum sequens pro Nobili Abbatis-
sa de Toorn, pro vteri duritie descriptum est: ℞
galbani electi in aceto dissoluti ℥j. bdellij mollis
& subalbi ℥ij. pul. matricariæ ℥j β. myrthæ ℥β.
Vbi dissoluendum dissolutum fuerit & cola-
tum, addantur reliqua puluerisata, & fiat em-
plastrum, seu ceratum, formæ sphericæ latitu-
dine sex digitorum. Valet & infessus ex scænug.
ficubus coctis in aqua hordei: deinde eadem
quoque apposita profunt.

S 3

SCHO-

SCHOLIA.

Callus dif-
fert à scir-
rho.

Lib. 14. De
morb. cur. &
2. Ad Glau-
conem.

Tumores
diuersi quo-
modo à
scirrho vteri
distinguan-
tur.

Inflatio
vteri.

Vteri hy-
drops.

QVAMVIS Benedictus Veronensis, Medicus
doctissimus, de callo & duritie vuluæ ex *E-*
*g*ineta sub vno nomine tractet; callus tamen à du-
ritie, seu scirrho, differt, ex Moschione, quod callus
in totum nihil sentiat; in duritie exiguus est sensus:
& ita scirrhus vix sentiens est durities. Scirrhum
enim ex Galeno nominamus tumorem durum, qui
sine dolore est, non tamen omnino sine sensu. Scir-
rhus exquisitus est tumor præter naturam sensu pri-
uatus durusq;: non exquisitus, qui non sit omnino
insensilis, quamuis valde difficulter sentiat. At callus
maiorē duritiem habet, quā scirrhus. Fiunt cer-
tē diuersi tumores in vtero. Tumet quidem infla-
tione, de qua antè dictum est: sed impulsu digito-
rum sonitus tympani modo redditur, tumorq; pubis
& imi ventris comitatur cum dolore pulsati; ali-
ter quoque hic tumor curatur, quā scirrhus. Tumet
etiam vterus hydropē laborans, vt cap. 81. lib. 16.
apud Aëtium constat: quem affectum sequuntur,
tumor amplius, laxis, flatuosus, gurgulationes tan-
quam intestinorū, in ambulando grauitas, & anbeli-
tus difficultas, alui foetida excretio, menstruorum &
conceptuum detentio, & quæ deferuntur, nullo ser-
uato ordine excreta: vbi verò violenter excernuntur,
fractis interdum paruis corpusculis quæ vesicæ assim-
lantur, viscida quedam aquosaq; erumpunt. Ita &
Fernelius: Tumet & nonnumquam vterus aquarum
copia; qui certē hydrops est vterinus. Inflationis signa
adsunt; sed grauitas maior, & sonus quasi fluctuantis
aquæ. Huius, quemadmodum & ascitæ, efficiens causa
est

si iecoris aut lienis vitium: aqua tamen ex abdominis
 capacitate cecam & inusitatam viam sibi parat in vte-
 rum. Interdum etiam vena cava solum sanguinis seruum
 eodem instillat. Mulier quaedam hoc hydropē correpta,
 quoties appetebat mēstrua purgatio, omnem aquarum
 colluviem ex utero per cervicē profundebat, peluesque
 sex aut octo implebat aqua citrina ferventissima, dum
 venter totus subsideret. Mox deinde menses insequē-
 bantur ex natura praescripto. Collecta proximo mense
 par colluvies, statō dein tempore profluebat. Hæc tan-
 dem per sanata uterum gestavit, peperitque bene vitalem
 foetum. Tales autem Aëtius curat, decubitu, quiete, vo-
 mitu, & validis collutionibus ac pēsu; ut apud eundem
 ad longum videre licet. Post aquarum eductionē, exercitiis,
 sudoris prouocationibus, validisque frictionibus totius cor-
 poris, sed præcipuē suminis utendū iubet. Sed & uteri
 oedema tumor quoque, consequitur in pallido candidus,
 sublaxus, tactu mollis, digitorum pressioni cedens, se-
 que rursus paulatim attollens, cuiusque alui manu appre-
 hensa facili attrahitur. Loca igitur oleo communi ca-
 lido, aut iuno, aut ligustrino irriganda Aëtius iubet;
 pēsuque utendum ait, ac reliquis praesidiis quæ superius
 diximus de spiritu in utero collecto, seu uteri infla-
 tione. Huius curationem etiam vide apud Fonta-
 nonum De morb. interioribus cap. 27. De oedematis
 uteri curatione. Ab omnibus his tumoribus iam dictis
 differt scirrhus. At scirrhorum genere comprehenditur, iux-
 ta Paulum, etiā durities, quam σκληρώμα Græci vocant,
 circa vulva cervicē, potissimum obueniens. Aëtius ap-
 pellat scirrhomā. Habet autem similem tumorem,
 sed tactui renitentem, & moderatē affligentem:
 Plurimumque, inquit, in uteri cervice scirrhomata

Historia
 apud Ferne-
 lium de mu-
 liere uteri
 hydropē la-
 borante.

Oedema
 uteri.

Scleroma.

Scirrhus.

Notæ,

S 4

enerant,

Causa.

eueniunt, quæ immixtis digitis percipi possunt, ac plerumque vuluæ collum versus scirrhomia auertitur. Vbi verò scirrhus vteri fundum inuasit, tumor vehemens & taclui renitens occurrit, grauitatem morionesq; difficiles non tantum crurum (vt diximus) sed totius corporis, & segnitiam ad omnes vitæ functiones afferens. Causas iam diximus. Fit enim ex humore lento crasso vteris infixo, & statim in principio congregatus paulatim & augebitur: crebrius verò Medicorum imperitia paratur quum vehementer erysipelata & inflammationes adstringunt, & infrigidant, & si quis medicamenta vehementer dissolutiua adhibeat: in summa, in vtero repente fit ex humoribus iam dictis, vel inflammatione precedente & malè curata.

Prognostica

Cum autem duplicem esse diximus scirrhum, verus & exquisitus, sine sensu, incurabilis est: at alter, cum aliquo sensu, curari potest, sed agrè. In vtero verò diutius si perseueret, deprauatus corporis habitus, & decoloratio subsequantur, interdum & moles aquosa. Iuxta Auic. in interiore spatio vteri, incurabilis est; in vteri ore, aut ceruice, nec omnino sensus expers, curari potest. Ita & Aëtius: Quæcunque scirrhomata circa os & collum vuluæ constiterint, facile curantur: quæ verò circa fundum, difficulter. Accidit insuper & non rectè tractatis habitus aquosus. Nam Rhaf. 9. Cōtinent. Apostema durū & non cancrōsum (hoc dixit, quia facile scirrhus in cancrum transit) si diutius prolongetur, inflantur pedes, & extenuantur tibiæ, & cessabunt menstrua. & Add. Auic. Magnificatur venter, & subsequitur aliquando verus hydrops: ideo scirrhus vteri eam magna diligentia curandus est. Curatur autem in principio, si vires ad-

Curatio.

mittunt,

mittunt, iuxta Paulam & Aëcium, vena secta, ut diximus Obs. precedenti, & purgatione ex hiera Archig. Valent ea quæ de apostemate melancholico diximus; purgatio ex epithymo, sena, confect. hamech. Habes apud Aëcium infessus plurimos, pessos varios emollientes, & cerata, forus, emplastra. Utitur infusionibus è sænug. sem. lini, pulegi, artemis. rad. & solior. cucumeris agrestis, decoctis. Vterum colluit susino oleo, narcisino, irino, gleucino, adipe anserino, gallinaceo, porcino recenti, alicui vnguento admixto, lacte bubulo aut caprino cum anserino adipe. Cataplasma sumini illinit è carycis, hyssopo, nitro, absinthio; cucurbitulasq; cum scarificatione affigit; & postea vritur medicamento polyarchio, emplastro diachylo, cum oleo susino, pessusq; mollitoris. Atque horum copiam apud eundem inuenies lib. 16. cap. 86. De scirrhomate, ex Sorano. Verum licet scirrhos etiam præscriptis medicamentis pro declinatione inflammationis curari possit; tamen cum sine febre sit, possumus & vii fortioribus ad partem emolliendam; quale illud est à Rondeletio descriptum: R. rad. lilior. bis mal. cucum. agrestis, añ. qv. j. artemisia, vel nepitæ tertiam partem m. j. ficum paria xx. sem. lini, sænug. añ. ℥ ij. flor. chamameli, viol. meliloti, añ. p. j. fiat decoct. in aqua & oleo dulci. Ex decocto foueatur regio vteri. Ex residentia pistla & transmissa fiat cataplasma, quod applicetur supra partem post sotum. Deinde utatur sequenti vnguento: R. butyri recentis, axung. porc. añ. ℥ ij. ping. gallinæ, anati, anseris, añ. ℥ j. β. olei amygd. dul. & olei lilior. añ. ℥ ij. mucilag. sem. sænug. extract. cum vino albo ℥ j. terebinth. ceræ q. s. quo utatur post vsum fotus. Et post vsum istius vng. rur-

sum redeat ad fotum, & iterum ad vnguentum. Similibus praesidiis aliquando vsus sum commodè in vidua quadam Alcmariana, in qua durities maior erat quàm in muliere praecedenti, ita quòd totum fere vterum occupauerat. Sequens quoque valde vtile est: R. oppopan. bdellij, ammon. añ. ʒj. styracis, myrrha, añ. ʒß. propoleos vera ʒj. rad. iridis ʒj. croci ʒß. dissoluantur lachryma in oleo lilior. & amygd. & vino maluatico & depurentur; quibus adde parum terebinth. & cera; fiat vnguentum. Emplastrum, diachylon, vt diximus, ex gummis & ireatum partem illam induratum emolliunt. Huius partis emolliuonem plurimum iuuat fotus ex eadem decoct. vel oleorum de lilio, amygd. de myrrha, de styrace. Hac enim partem contingunt. Vtilissimum etiam est illis encathisinate vii ex decocto fotus praescripti, & diutius in illo sedere. Iniectio etiam clysterum emollientium, & relaxantium ex ol. plurimum conferet. In declinatione herba digerentes poni debent in encathisinate maiore quantitate; quales sunt, nepeta, pulegium vtrumq;, artemis. calaminth. flor. anthos, stæchad. sambuci: quia haec herba decocta in multa aqua minus ficcant, & digerunt sufficienter. Radices cucumeris agreß. & brion. in eodem encathis. addi possunt. scirrhus enim fit à materia congelata; quam ob causam medicamenta calida, & dissoluentia sunt ex vsu, permixtis quibusdam humidis, malacticiis, ne id quod tenue est, discutiatur, & crassum remaneat. Radix mandragoræ in vino & oleo amygd. & axung. porci decocta & contusa partes induratas emollit, maxime si pauca quantitas oppopan. cum ea misceatur.

OBSER-

OBSERVATIO XLVI.

De uteri cancro ulcerato & lethali.

MVLIER Alcmariana vuluam carcino-
mate adeò corrosam habebat, vt particu-
latim excideret: quam cùm Chirurgus tracta-
ret, & nos ad eam acciti essemus, licet longo
tempore palliatione vsa fuisset, malum lethale
esse pronuntiauius: quæ quidem cum magna
fœditate & dolore aliquandiu vitam protra-
hens, tandem miserè obiit. Venit mihi tunc in
mentem casus ille quem aliquando, Bononiæ in
Italia existens, vnà cum præceptoribus ægrotan-
tes inuisendo, vidi in muliere quæ cancerum in
vtero habebat etiam vlceratam. Conuocatis
Medicis eo tempore illustribus, vt Elideo præ-
ceptore meo & Luca Chini, & Passino, facta est
consultatio: concluderūt, mulierem morituram,
ad tēpus tamen vtentes palliatione. & illa cum
magna miseria, vt hæc nostra ægra, tandē obiit.
Longo tēpore his duabus præcesserat scirrhus,
qui facilè in cancerum vertitur. Causam adfert
Rondeletius: Nam in partibus, quæ scirrhum
patiuntur, si materia vratur, in cancerum verti-
tur scirrhus, ob materiæ similitudinem. Fiunt
enim isti duo affectus à materia melancholica,
cancer ab adusta, scirrhus à crassa frigida non-
dum adusta, & à pituita crassa. Cognoscimus
scirrhum mutatum in cancerum, si cùm prius
esset sine dolore, ob materiæ frigiditatem
siccita-

284 DE MULIERVM MORBIS,
 siccitatemque; dolorem iam sentiat, ob calidi-
 tatem & humoris acrimoniam facientis can-
 crum. Sentitur durities in vtero, qualis erat
 in scirrho, & citra magnam vteri molem. Est
 autem cancer duplex; vlceratus, & non vlcera-
 tus. Vterque incurabilis est, quia abscindi non
 potest. Cum incipit negligitur, quia magnam
 molestiam non adfert, quo tempore posset pro-
 hiberi incrementum medicamentis, & optima
 victus ratione. Satis à nobis fit, si prohibeamus
 non vlcerat, vlcerationem, & vlcerati incre-
 mentum. Verum cum istæ duæ mulieres pri-
 mum neglexissent curationem, non magni fa-
 cientes malum, nec Medicos in principio vo-
 cantes, vbi eò malignitas progressa est vt cancer
 vlceratus accesserit, etiam ipsa palleatio non ad-
 modum diu vitam conseruare potuit, quanquam
 ad menses aliquot protraxerit. Vera enim cura-
 tio hîc locum non habebat (vt in Scholio latius
 dicturi sumus) & si blandiendo caueatur ne vl-
 terius procedat vlceratio, & vita prolongetur,
 tamen moriuntur: cum vera curatio consistat
 in vrendo & abscindendo, quod hîc fieri non
 potest.

SCHOLIA.

Cancer
 vteri.

CANCROVVM vuluæ alij, inquit Paulus lib.
 3. cap. 67. cum exulceratione, alij citra vlcus
 inuadunt. Sic & Aëtius lib. 16. cap. 96. De canceris
 vteri, ex Archigene: Quidam cancroforum tumorum
 vlcerati, quidam non vlcerati sunt; quemadmodum

In loco de mammillis prædiximus. Non vlcera-
 ta ex parte, vt Rondeletius censet, fit in corpore
 vteri; vlcera-
 tus in collo vel in orificio interiori.
 Causas iam diximus; cum fiant ex humore atrabi-
 ario, qui intus vi caloris effertur & excan-
 descit. Et ita ex atra bile oritur, vt Gal. lib. De diff.
 morb. ex se etiam, vt dictum est, vel à scirrho. Hoc si
 non vlcera-
 tum est, moles pondere grauis percipitur,
 tumor q̄ durus colore subliuido. Cancrigo non vl-
 cerati (inquit Aëtius) huiusmodi notis indicantur:
 tumor induratus circa os vteri inuenitur tactui re-
 sistens inæqualis, crepidinosus, colore fæculentus, ru-
 ber, subliuidus, vehementes dolores inferens, vsque
 ad inguina, sumen, pectinem, & lumbos, progredien-
 tes, manuumq̄ attrectatione, & medicamentorum
 varietate excitatur. Eadem habet & Paulus. Exul-
 ceratum verò carcinoma, vt nomen, malignum est,
 ita præter ceteras notas, labra habet prætumida ac
 dura, atque ex concreta illuue sordida, & liuida: sa-
 nie quoque id manat graueolente, tenui, & nigra,
 vel etiam fulua. In exulcerato, inquit Paulus, præter
 dolores, durities tumoremq̄, vlcera erosa ac inæqua-
 lia conspiciuntur, plurima ex parte sordida, labris
 prætumidis, albicantia, concreta, colluue humorum
 ingrata. Eadem ferè habet & Aëtius. Erosa enim
 sunt aut defossa inæqualesq̄ vlcera partes: per spe-
 culi artificium percipiuntur, quarum pleraq̄ sordida
 sunt, crepidinosa, albescentes, præter vehementiam
 doloris, tumorem & duritiem: quibus si medicamen-
 ta repurgando idonea applicentur, antiqua quædam
 faculenta, rubra, sanguinolenta, deferuntur. Ab vl-
 cere autem sanies tenuis aquosa, nigra, ignea & fæ-
 tida

Non vlcera-
tus.

Causæ.

Notæ non
vicerati.Signa vlcera-
ti.

Differentia
ab inflam-
matione &
scirrho.

Curatio, seu
potius pal-
liatio.

rida iugiter excernitur. Loca enim muliebria ad de-
fluxum nata sunt peculiariter. Reliquas notas quæ
vterum affectum sequi solent, paulo supra de inflam-
matione recensuimus. eadem & Paulus adiungit. Ab
inflammatione tamen hic affectus seiungitur, quod
diuturnus sit, dolorq; minus lancinans, & febris non
perinde ardens. à scirrho, quod calore doloreq; fati-
get. Malum id, ut Aëtius simul ac Paulus referunt,
teste Hippocrate, insanabile est; abscindi enim non
potest. Cancros enim occultos, at potissimum confir-
matos, aut ulceratos, melius est non curare: quia in
quibus non curantur, diutius viuunt; ut Gal. in Com-
ment. 38. lib. 6. aph. Lenire tamen possemus, iuxta
Paulum & Aëtium, in seſſibus ex ſœnug. malua, ac ca-
taplasmatis ſimilibus, quæ & leniunt ſolantq; in
acceſſionibus, ex malua aut althæa in mulſa liqueſa-
cta, & roſaceo paulum leuigata illitaq;: vel ex carycis
ſeu ficis ſiccis, meliloto, ruta, thure, buniade herba di-
ligenter cum oleo contuſa: vel ex palmulis in paſſo co-
ctis, quibus adiecta ſint ouorū lutea, polentaq;. Idem
poſſunt pap. capitula trita & cribrata cum polygoni,
vel ſeridis, vel coriandri ſucco: vel ſolani tenera folia
cum lacte muliebri appoſita: vel ſolanum in roſaceo
cerato exceptum. Hac in doloribus uſui ſunt. Deinde
ceratū iniiciatur cum roſaceo aut myrteo, cum pal-
mulis in paſſo decoctis. Priuatim maleficiis ulceribus cō-
uenit (teſte Aëtio) quod è ſæce in cortinis abenis bal-
neorum calidam continentibus inuenta conficitur. ea
enim ſæx ſub prunis, quouſq; igneſcat occultitur, dein-
de teritur & in roſaceū ceratū aſſumitur. Hac igitur
extra ſinum ad vteri oriſiciū apponitur; in ipſum verò
ſinum muliebri aut aſinini lac, aut plantag. ſuccus le-

uit et

inter tepefactus, præcipuè si ab ulcere sanguis erūpat,
vel polygoni succus cum modico thure insūdatur. Me-
dicamentū ex cancris tribus vel quinq. (impares enim
esse voluit) sub prunis vstis cum oleo ligustrino tritis,
cum penna illinitis. Reliqua vide apud Aët. & Paulum.

OBSERVATIO XLVII.

De Cancro uteri.

ADRIANA Nicolai, mulier annorū 50. pro-
les octo numero habens, multis mensibus
Delphis decumbibat. Primò inciderat in longū
& diuturnā menstruorū profluviū rubrum;
deinde etiam in album, seu muliebrē fluorem:
quibus tandem & hæc symptomata accesserūt:
Dolores circa inguina & coxam adeò atroces, ut
multis deinde diebus neque dormire neque in-
ambulare potuerit. Hæc autem quatuor mensi-
bus continuis alterius Medici opera v̄sa fuerat,
qui omnibus modis menstrua constringere &
compescere, ac omnino stupefacientibus dolo-
rem intensum sedare studuit. Exhibuerat aquā
nenupharis & plantag. cum syr. nenuph. ac pap.
adiecto ꝑ. opij. Vnde sensu obstupefacto ad
tempus, per vnum diem dolor quidē conspie-
batur, sed paulo pōst multo vehemētiore redibat.
V̄sus certē opij mihi semper fuit suspectus. nam
cū & alteri in Nosocomio decūbenti opium
exhibitū fuisset, altera die mortua inuenta est. In
hac autē muliere dolorē quidē sedabat, sed cau-
sam morbi augebat. Vnde & Gal. l. 2. De com-
pos. medicamentorū sec. loc. disputans contra
Apolloniū, dixit, non debere exhiberi opium ni-
si in doloribus, in quibus vel mortē vel syncopē
expectan-

288 DE MULIERVM MORBIS,
expectamus, ad quam syncopen sequitur mors.
Ergo vidi quendam, inquit Montanus cap. de
De doloribus cap. supra Rhaf. lect. 5. ex opio ex-
hibito interiisse. Periculosa, ait, sunt ista stupe-
facientia, præsertim per os exhibita: quoniam
nihil aliud faciunt, nisi mortificare. Vnde nun-
quam ad philonium accedit Galenus, nisi cum
timet mortem; sed ad theriacam nouam & dia-
spermaton, neque vnquam vsus est opio. Ab
eo mortuus est ille infelicissimus Cassius Gym-
nasij Patauini splendor & decus. Ita & Auicen-
na prouocaturus somnum, non transibat papa-
uer album. Rhases proponit opium: at præstat
eum non sequi. Sed in hoc potius imitemur
Galenum, qui in inflammatione aurium, acci-
pit opium correctum cum duplo castorij; &
nunquam administravit opium, nisi cum me-
dicina calida. Hæc ferè Montanus. Ceterùm
ad mulierem vt reuertamur, cum dolor rediret,
& perpetuè eidem adhæreret, tandem mense
Octobri anno 1563. Medicus prior incidit in
morbum articulare, & amplius eam inuisere
non potuit; & sic ego ad ægram vocatus fui.
Eam inueni tunc laborare ex prægessis aliis
causis, his symptomatibus præsentibus; tumore
præter naturam; & in vtero perfectè cancerum
vulneratum habere, ex dolore continuo in pube,
& duritie manifesta; quam exterius percipie-
bam magis in inguine sinistro, cum intenso
dolore coxæ. febricitabat quoque nonnihil sub
noctem: nam & vigilæ immoderatæ aderant,
& aphthæ subsequutæ sunt, & profluuium illud
aquosum,

aquosum, seu muliebris fluor, retentum erat; sed manifestè emanabat sordities & colluties ingrata, pessimè olens, etiam nigra, acrimoniā & dolorem exedendo adferens. Quatuor, inquam, mensibus ante me vocatum decubuerat. Erat igitur hic cancer ulceratus ex melancholia adusta: quod & sanies nitrosa acris effluens ostendebat. Et ita huius mali procatarteticam causam hanc esse putabam; præterque cibum & potum, ac alias res non naturales procreantes melancholiam adustam, ignem calidum etiam ad hoc iuuisse: perpetuè enim exercebat artem culinariam, ita ut iugiter foco ac igni adhereret, etiam dum sana existeret: in ea enim domo habitabat, ad quam carnes assandæ deferrebantur: vnde & præ ædibus inter signum artis culinariæ, seu assatoriæ propendebat. Ex illa caliditate puto in principio purgationem menstruam fuisse concitatiores; tum ob continuos labores, & continuū motum apud ignem. Et quia fluxus ille fuit diuturnus, tandem hepar fortè refrigeratum fuit ex longo fluxu, & ventriculus affectus: hinc & succi aquosi generati sunt; atque huiusconsequio fluxus quoque muliebris aquosus ebortus etiam diuturnus. tandem eo constricto, materia fuit inculcata & incinerata, ex atra bile fortè post tumorem scirrhusum: vel sanè ex se ipso cancer ulceratus tandem ebortus est. quem quoque incurabilem esse pronunciauimus, ut calumniam declinarem. Interea palliatione tantum utendum esse diximus. Quare ne vlcus magis procederet, &

T

ut

290 DE MVLIERV MÖRBIS,
vt dolor, quantum possibile esset, magis miti-
garetur, inhibuimus omnem cibum melanchol-
licum sanguinem gignentem. sanguinem non
detraximus, quia ipsa debilis, & principium
iam diu progressum erat. Verum materiam
melancholicam leuiter & frequenter primò
minuendo, inde eam concoquendo & va-
cuando, in hunc vel similem modum pallia-
tionem instituimus: & elect. lenitiui, diacatho-
lici, añ. ʒ ij. confect. hamech ʒ j. ʒ. cum sero
lactis fiat potio breuis. deinde concoquatur
hoc modo: & syr. de bugloss. de fumaria, de
epithymo, syr. viol. añ. ʒ j. aquarum borag. lu-
pulorum, solani, intybi, añ. ʒ iij. fiat iuleb pro
quatuor dosibus. Commendatur à quibusdam
hoc sequens: & quinque herbarum capilla-
rium, herbæ Roberti, chelidonij minoris, ver-
basci, buglossi cum rad. summitatum lup. sa-
lictarij, fumariz, añ. m. j. foliorum solani,
(proprietas occulta discutit humorem cancri)
intybi satiui latioris non loti añ. m. j. ʒ. vuar. pas-
sul. mund. ʒ j. trium flor. commun. añ. p. j. ʒ. po-
lypodij quercini ʒ j. folior. senæ oriental. ʒ vj.
epithymi ʒ iij. (hæc humores vstos mūdificant)
decoquantur in s. q. aquæ ad usq. dimidij con-
sumptionem; accipiatur iuris decocti lib j. ʒ.
saccharo dulcedo inducatur, fiat que syr. medio-
criter coctus; depuretur, & adiectis ʒ ij. santali
citrini, & ʒ j. pul. diarod. abbat. suauioris & sapo-
ris & odoris reddatur. Eo vtetur ieiuna manè
diebus quinque. Est autem hoc apozema ad
humores accommodum. Cùm autem sæpius
pur-

purgata esset à Medico præcedente, cum quo
hoc tempore dulcia non ferret, infundi iussi-
us folior. coluthæ ʒß. epithymi ʒij. seminis
nethi ʒß. in aquis fumarie, buglossæ aut bo-
rag. & solatri: cuius medietatem cum accepis-
set, dictu mirum, cum facilis solutionis esset &
debilis, octo secessus habuit. Et capiens omni
mane cyathum vnum feri lactis, satisfaciebat
etiam ad acrimoniam humoris contempera-
dam. Si ita debilis non fuisset, iterum purgassem
cum diacatholico exiguo, adiecit. confect. ha-
mæch, vel pilulis indis. sed quia nonnihil fe-
bricitabat, serum lactis, etiam exiguo subinde
epithymo iniecto vel infuso, satis ad rem facie-
bat. Interim pro aphthis os abluere decoct.
hord. plantaginis, mal. & sem. cotton. & facile
curabantur. Sed, quod præcipuum erat, ad
mitigationem doloris, foris fiebat per chirur-
gum Petrum Fredericum, compatriam meum,
& cognatum ipsius ægræ, cum spongia ma-
defacta ex malua, fœnugræco, althæa, foliis so-
lani in lacte decoctis, etiam adiecto subinde
lacte muliebri: nam cum perpetuo decum-
beret, in sessu uti non poterat. Subinde & suc-
co solatri in mortario plumbeo, cum pistello
plumbeo ad consistentiam linamenti humi-
dioris, intus mulier ipsa muliebria illinebat,
& cum lacte muliebri mixtum subinde in-
fundebat. Ad duritiem & dolorem exterius
imponebatur pectini cataplasma ex rad. al-
thæa, foliorum malua, floribus & foliis me-
liloti, & foliis solani, cum farina hordei,

292 DE MULIERVM MORBIS,
& sem. lini, & oleo viol. ac rosi ad flacciditatem
prius decoctis. Chirurgus per speculum ma-
tricis conspexit in orificio vteri adesse magnam
duritiem, & intus rimas quasdam corruptas, ex
quibus modò materia alba, modò nigra fœcu-
lenta copiosè cum pessimo odore emanabat.
Tandem tota matrix effecta est dura, cum tanto
dolore, vt similem nunquam viderim. Ex mu-
cagine sem. fœnug. malua, & cremore hordei,
adiecta axungia recenti caponis, gallinae, anatis,
anseris, butyri recentis, cum oleo cheyrino,
amygd. dul. & cera alba fiebat linimentũ molle,
ad duritiem ac dolorem, & cum bombace im-
ponebatur subinde. Modò & hoc vnguento
molliori utebatur: ꝛ plumbi vsti, thutiae præ-
paratae añ. ʒ j. ꝛ. cerusae abluta ʒ ij. succi solatri
ʒ iiij. succi granat. ʒ j. camphorae ʒ j. olei rosi &
ceræ albæ q. s. ducantur in mortario plumbeo
cum pistillo plumbeo ad modũ vnguenti mol-
lioris. Sed cùm omnibus parũ proficeremus, &
vito dixissemus quòd tandem moreretur, licet
dolor iisdem remediis subinde mitigaretur,
posthabito nostro consilio, me reliquit, & totam
curationem Empirico cuidam glorioso, sanita-
tem promittenti, commisit, qui, prius extortis
aliquot nummis, pactum cum ipso inierat,
uxorem breui ad sanitatem se deducturum:
quamuis vix paucis postea diebus, hæc ipsa mi-
serè cum intensissimo dolore, vt prædixeramus,
mortem obierit. Idem contigit calcearij uxori,
prope templum antiquum habitanti, quæ &
cancrum vlceratum in vtero habebat: quæ cùm
infusio-

infusionibus aptis ad palliationem uti non vellet, ex nostro consilio, etiam morbum incurabilem prædicenti, cum fidem mihi non haberet, me reliquit. Ei Empiricus lithotomus postea sanitatem promittens, ab ea extorsit 12. florenos; quamvis non diu post etiam moreretur. Quemadmodum & vidua illa Leonina, Francōis dicta, quæ multo tempore aliis Medicis usa fuerat antequam me vocaret: & hæc quoque misere obiit, multo antè tempore hoc malo afflicta; & omnino macie confecta ac doloribus fatigata. neque hæc iniectiones admittere voluerat, uti præcedens.

SCHOLIA.

VTERQUE cancer (ut diximus) siue non ulceratus, siue ulceratus, in fundo vel imo vtero existens, incurabilis est, quia abscindi non potest. Cum incipit, ut antè quoque recensuimus, negligitur; quia in principio subinde magnam molestiam non adfert, quo tempore posset prohiberi incrementum, medicamentis & optima victus ratione. Satis à nobis sit (inquit Rondelerius) si prohibeamus non ulcerati exulcerationem, & ulcerati incrementum. Prohibemus autem canceri generationem sanguinis missione è brachio, vel ex poplite, apertione hæmorrhoidarum, ut auertamus in partem proximiorē melancholicum sanguinem: frequenti insuper purgatione, quæ non multum calefaciat, & euacuet atram bilem, aut crassam pituitam: medicamenta denique quæ cap. De fluore muliebri à melancholia dicta sunt, erunt

Quibus modis prohibetur canceri generatio & incrementum.

T 3

valde

valde oportuna. Extrinsicis & intrinsicis frigidia
 medicamentis & adstringentibus eius incrementum
 prohiberi potest, ut oleo ros. omphac. myrr. vel succis
 solarii, plantaginis, cum paucis aceto. Permiscuntur
 succi cum oleis, & fiunt embrochationes, vel vnguen-
 ta; vel excipiuntur farina, & applicantur supra par-
 tem, vnguenti modo. Aquæ vel succi herbarum ini-
 ciuntur. Si autem exulceratio fuerit, metallicis est
 utendum, & vng. diapompholigos, emplastro de ce-
 rusa, emplastro nigro, & quaecunque parata sunt
 ex antimonio, plumbo, cerusa, thutia, vel pompho-
 lyge: & ut breuiter dicam, quaecunque circa mor-
 sum refrigerant & exsiccant. Quare neque lachry-
 ma, neque alia medicamenta aut attrahentia, aut di-
 gerentia admiscenda sunt; ut ihus, myrrha, galba-
 num, assa fœtida, cinnamomum, spica, & huiusmodi.
 Sunt diligenter leuiganda, ut collyria, deinde abluen-
 da diligentissime, & ex illis vnguenta paranda cum
 succis, oleo, & cera alba, vel seuo hirci. Nam aliæ
 axungia putrefaciunt. Attamen Aëtius videtur adipe
 porcino in hunc modum: R. spuma argenti lota ℥vj.
 iheris masculi, œsypi, adipis porcini recentis, butyri
 noui, añ. ℥ij. rosacei ℥iij. seruatur medicamentum
 in plumbea pyxide: quod si exaruerit, rosaceo dilui-
 tur. Sequens autem injectio vlcera cancro maxime
 conuenit: R. herba Roberti, verbasci, scabiosæ, chelido-
 ni minoris, anethi, stercoris humani, añ q.v. combu-
 rantur: de cinere autem accipiantur ℥ij. aqua sola-
 ri ℥vj. excepta in mortario plumbeo, pistillo plum-
 beo agitentur; deinde in vterum iniiciantur. Oleum
 ouorum frequenter ductum & agitatum in morta-
 rio plumbeo, donec spissum reddatur & plumbi colo-
 rem

Chelido-
 nium mi-
 nus, alij
 scrophula-
 riam appel-
 lant.

rem contraxerit, efficacissimum est medicamentum. Cinis cancrorum fluuiatiliū lotus in aqua solani permixto pul. ex plumbo, vel antimonio, vlceratam cancrum curare dicitur, & creditur. Quod si non curat, saltem mitigat, exiccat, & depascentem cohibet. Nam difficillimum est partem iam induratum emollire, & pristinae sanitati restituere. Sed metallica omnia partim repellendo, partim digerendo, citra morsum morbum leniunt. Hac est cura, quam vocant palliativam. Cibus dabitur, iuxta Paulum, qui facile in corporis membra queat distribui, boniq; succi, vinum paucissimum, aquosum: acrium esus, & repletio omnis vitanda est, ut quibus cibi promptè corrumpantur.

OBSERVATIO XLVIII.

De ulcere matricis.

MATRONÆ nobilissimæ ex utero sanies effluebat, cum ardore & inflammatione; & cum subinde leuem febrem sentiret; cognouimus, in ea uterum exulceratum esse: nam in affecta parte punctorium dolorem percipiebat; & per intervalla, humor diuersus cum magno dolore excernebatur; modò paucus, cruentus; modò feculentus: qualia videlicet inflammato ulcere Paulus apparere dicit lib. 3. cap. LXVI. De uteri ulcere. Igitur cum hîc ardor, calor, & inflammatio aliqua simul adessent, prius assumpta ʒj. cassiæ in bolo, adiecto pul. sem. berberis ʒj. saccharoque asperso; cum in vere essemus, & sanguis videretur nonnihil abundare, sanguinem

296 DE MULIERVM MORBIS,
nem detraximus ex vena basilica; & altero die
ex saphena, sed in pauca quantitate; ob febre[m],
inquam, & inflammationem, cum non diu la-
borasset. Arabes verò in vlc[er]um locellorum
principio sanguinem demunt ex vena axillari,
altero die ex saphena. Id tamen faciendum iu-
dicio oculati Medici; potissimum vbi calor &
inflammatio simul adsunt cum vlcere. Aëtius
tamen nec Paulus de venæ sectione mentionem
faciunt. Vnde quoque, si ex apostemate vlcus
fit, & prius facta est missio sanguinis, tunc mi-
nus conuenit, & multo minus in vlc[er]ato inue-
terato, nisi mulier admodum sanguine laborare
videretur. Postea autem cum h[ic] sanies exiret
cum acrimonia, & materia esset acuta corro-
dens, syr[us]os præscripsimus bilem contempe-
rantes & acrimoniam restringentes: R[ecipe] syr. viol.
nymphææ, ex infus. ros. (propter abstersionem)
añ. ʒj. decoctionis solani, lactucæ, intubi, lupu-
lor. fumariæ ʒvj. fiat syr. pro ij. dosibus. Deinde
ita illam purgavi: R[ecipe] folior. senæ ʒij. β. rhab. op-
timi ʒj. epithymi ʒiij. sem. anisi ʒβ. schœnan-
thi ʒβ. infunde per noctem in ʒv. aquæ solani,
facta leui ebull. manè fortiss. express. adde syr. ex
infus. ros. pallid. ʒvj. fiat potio. & alius satis
fuit soluta. Deinde ad ardorem & intempe-
riem atque acrimoniam tollendam imperavi,
vt succum bursæ pastoris & plātaginis aliquan-
do iniceret cum lacte muliebri, & exterius cum
iisdem succis lauaret, vel cum panno lineo ap-
plicaret. Nam supposito ibidem calore & do-
lore, Valescus vtebatur aqua frigida: Noui
enim,

enim, inquit, aliquas mulieres sentientes se habere eiusmodi vlcera : lauabant ea cum aqua frigida, mūdabant deinde, & cum pannis lineis exsiccabant, & in matricem mittebant frequenter: atque iisdem præsidiis sæpe mutatis, hæc ipsa sæpe per se ad integram curationem sufficiebant. Ablata intemperie calida, & febre iam diminuta, ad vlcera detergentibus & exsiccantibus curanda accessimus, corpore etiam cum manna & cassia adhuc semel repurgato. Multum autem hîc resiccare oportet, tam ob partis naturam siccam, quàm ob recrementa, quibus pars illa abundat; vt latius in Scholio dicemus. Inter medicamenta detergentia vlcera, in quibus acrimonia puncturæque sentiuntur (vt hîc erat) cum sine morfu esse debeant, optimum hoc sequēs mihi esse videbatur, quod primò solummodo ex sero lactis constabat cum pauco saccharo; quod vt iniiceretur, iubebam ad vlceris deterfionem; postea etiam adiecto melle & syrupo ex ros. siccis. aliquādo vt etiam iniiceret consului decoctum lentium & plantaginis, quibus aliquando adiciebant folia myrti, olea, vel oleastri, ceterach, agrimonîa, in decocto præcedente: nam hæ herbæ, tum aliæ amaræ, sine magna calfactione iuuant. Quare absinthium, & similes herbæ calfacientes, hac in causa conuenire non possunt; sed potius in sordidis vlceribus, quibus alia mulier magis afficiebatur: ad quam curandam, iussi mulierculæ Adrianae Bieselingiæ, quæ tales curabat, vt post purgationes aptas totius corporis, pituita

T 5

salsa

298 DE MULIERVM MORBIS,
falsa & materia crassiore sordida prius digesta,
deinde euacuata cum decoct. senæ, epithymi,
agar. pauco adiecto diaphœniconis, vt, inquam,
iniiceret hydromel cum decocto ireos, absyn-
thij, agrimonix. In vlceribus certè sordidis &
pituitosis tales iniectiones fieri possunt, ex de-
coctione apij, centaureij minoris, fabarum, lupi-
norum, orobi; quæ magis detergunt. in iis ali-
quando etiam dissoluimus parum Ægyptiaci,
vel vnguenti Apostolorum in principio, cum
vltus obductum est multo pure & carne putri-
da. Ceterum in hac prima muliere, de qua nunc
agimus, cum & vltus per aquam hordei & mel-
le rosato satis abstersum foret, neque sordidum
vltus esset, mandauit vt vnguentum conficere-
tur ex thutia abluta, & præparata, partibus dua-
bus, cadmiæ, litharg. argenti, sarcocoll. añ. p. j.
cum oleo ros. vel cum aqua plantaginis inun-
gatur, & pars eius aliqua iniiciatur. Ita, vlcere
sufficenter deteriso prædictis iniectionibus,
commodè dissoluimus myrrham, aloëm, iri-
dem, & alia sarcotica, trochis. albos Rhaf. De-
mum ad vnguenta partem resiccantia est deue-
niendum, vt ad vnguentum pompholigos, de
cerusa, de plumbo, & de aliis metallicis insigni-
ter resiccantibus. Et sic nos imperauimus vt
collum vteri vlceratum inungeretur vng. dia-
pompholigos; &, vt etiam ad fundum perue-
nirer, vt aliqua pars cum decocto ros. rub. &
plantag iniiceretur. Egregiè illis medicamen-
tis, cum non diu hoc malo laborasset, curata
fuit. Si verò eiusmodi medicamentis non pos-
sunt

unt talia vlcera euinci, tunc alij iubent, & ten-
dum esse scribunt, vt fumigio pars exsicce-
tur. Faciendum autem id est ex sarcoticis, &
uliginem generantibus, vt lachrymis resinis-
que, aliis quibusdam permistis, vt sandaraca,
auripig. cortice thuris, ladano, hypocisthide.
vt: & thuris, mastiches, ladani puri, myrrhæ,
styrac. rub. añ 3 iij. marcas. & lapidis pyritus, au-
ripigmenti rub. añ. 3 ij. excipiantur terebin-
thina, & fiat fumigium. Quod si mulier fœto-
rem ferre non possit, optimum erit parare aliud
magis odoratum hoc modo: & aliptæ moscha-
tæ 3 j. beniouin, styrac. ladani puri, añ. 3 iij. ma-
stich. thuris, & cort. eiusdem, añ. 3 β. cum mu-
cilag. gummi tragacanthi fiant trochis. quibus
vtatur vt dictum est. Iohannes Tiengius, Me-
dicus Amsteldamensis, cuius secreta à genero
ipsius mihi aliquando communicata fuere, no-
bilem se matronam hoc modo ab vlcere vteri
satis restituisse dicebat. Dabat ex præscripto
Placentini de quarto in quartum diem 3 v. de-
coct. senæ, epithymi, ros. rub. myrobal. Indæ-
rum, saccharo dulcoratæ. & clysterem subin-
de in partem affectam iniici mandabat ex
aqua tepida decoct. senæ, epithymi, fuma-
riæ, florum chamæmeli, ros. cui terebinthina
exigua, mel rosaceum & hordei farina iniecta
erant. Deinde pessos in vterum, seu os vteri po-
nebat: & mellis rosacei lib. β. farinæ lupino-
rum, siliginis, fœnugræci, sarcocollæ, ana
3 β. fiant pessi. Si pruritus aut ardor adesset,
iisdem addebat semen papaueris, hyoscy-
mi,

mi, & caphuram. atque hæc etiam soluta subinde in vterum per obstetricem iniici iubebat, vel cum aquis conuenientibus. Facta repurgatione & mundificatione, commodè hoc medicamento utebatur, quod incarnabat, & exsiccabat, & consolidabat; valet enim ad hæc omnia post vniuersalia remedia, corpore prius ac vteri vlcere repurgatis: & aloës, thuris, lapid. hæmatitid. pul. cartæ combustæ, pul. cucurbitulæ combustæ, añ. 3 ij. puluerisuntur, & cribrentur, cum pennis imponatur, aut cum aquis appropriatis iniiciantur.

SCHOLIA.

Causæ.

EXVLCERATUR subinde vulua ex infelici partu, aut foetu excusso, aut corrupto, vel ex medicamentis acerbis, vel fluore, vel abscessibus diruptis, aut fluxione erodentium succorum; ut & Paulus ac Aetius testantur; quandoque etiam ex abortu, ut Erotis cap 9. De pass. mulierum refert. Sic igitur fiunt vlcera post alios morbos, ut inflammationem, vel abscessum; ut antea etiam ostendimus, & post fluxus muliebres acres, & post medicamenta acra apposita vel iniecta, & pessos acres in vuluam subditos. Fiunt aliquando per se incipiendo, ex materia calida acuta corrodente, vel ex phlegmate salso, adusto, aut aliis humoribus adusti; vel consequuntur apostemata vteri, post suppurationem & rupturam; etiam aliquando præcedente solutione continui ex vulnere, percussione, aut casu. Fiunt & hoc tempore etiam vlcera ob contagionem luis Ventree; aut propter recrementa

crementa recenta, & putrefacta circa pterygia vteri. Deprehenduntur faciliè à dolore,crementis & humore reiecto. Ex Aërio dignoscemus vterum esse exulceratum, quoniam pars agra & affecta dolorem percipit punctorium; & ex intervallis foetidi ac saniosi humores ab ulcere sordido prodeunt; & consequuntur etiam alia vtero affecto peculiaris symptomatica, velut est capitis, ac praesertim sincipitis dolor, ut de inflammatione vteri prius dictum est: item dolor ligamentorum & radicis oculorum, qui ad manus usque ad digitos se extendit; & reliqua supra de inflammatione relata, ex Aërij testimonio cap. 88. lib.

Signa vteri exulcerati.

16. Quid si prompta in conspectum exulceratio venerit, specillo oriculario, quod *διὰ τῆς οὐρ* vocant, deprehenditur: si aliè defuderit, vel in loco recondito, excrementis humor enim diversus excernitur: inflammato quidem ulcere (ut precedente Obs. quoque diximus) paucus, cruentus, aut foeculentus, cum magno dolore euacuabitur: at si sordidum, copiosior humor & sanies cum miro cruciatu profluit: si depascens, foetidus, niger, cum doloribus vehementioribus, aliisque inflammationis signis. praeterea qua laxant medicamina, hoc irritant, contraria leniunt. Si ab inflammatione, signa adsunt communia inflammationis, dolor, pulsatio in vtero, & effluxus saniei & virulentiae, apostemate aut abscessu perrupto. Si vero per se incipiant, aderit priuatio signorum inflammationis, aut apostematis in matrice. Ceterum licet causas ipsas singulas iam dictas faciliè ex loquela, vel earumdem egrotantium percipiemus, partim etiam ex nobismet ipsis ea qua praecesserunt & qua comitantur considerantibus: tamen prius distinguere oportet

Signa colli vteri exulcerati, & quando in profundo haereat.

Signa sordidi ulceris.

Ab inflammatione.

Signa à se incipientis.

Signa causarum.

et

Quibus
differant
vlcera vteri
à vesicæ.

Signa pro-
gnostica.

tet vlcere naturam; quam deprehendere poterimus ex causis non tantum, quæ præcesserunt, veram etiam ex victus ratione, & totius corporis natura: num etiã à lue Venerea factũ fuerit. Quæ post abscessus frigidos fiunt, solida esse solent: quæ post inflammationẽ à sanguine, & quæ post erysipelas, virulenta & depascentia fiunt: si post scirrhu, gangranosa: quæ post luem Venereã dysepulotica & chironia. At hîc quoq. animaduertenda sunt signa quæ vlcus vteri ab aliis affectibus distinguunt: quoniam si vlcera sint in matrice, apparebũt recrementa exeuntia separata ab vrina, & dolor sentietur in profũdo pectinis, & minorabitur color albus. Si verò sint in vesica, apparebũt exeuntia mixta cum vrina, & dolor sentietur magis apud anteriora vuluæ, & multiplicabitur color albus in rebus exeuntibus, & cõcurrent alia accidẽtia superius scripta de scabie vesicæ, eiusq. vlcere. Iam quoq. cùm vlcus est in vtero, adest ardor in vulua, & sentitur cum pruritu, primò quidem titilloso (vt dicebat Bertrutius) quemadmodum & in satyriasi: postea, dum fortificatur, est cum pruritu acuto & pũgitiuo: & si tunc nihil egrediatur, tum potius dicuntur rhagades & fissuræ; de quibus postea. Et si egreditur sanies nigra, viridis, liuida, cœnosa, fœtens, tunc vlcus appellatur: si verò sanguis niger & crassus, tunc hæmorrhoides matricis, seu vteri, vocantur. Quod ad signa prognostica attinet, nullum verò vteri vlcus contemnendum est, sed quàm primũ fieri potest curandũ. Nam cùm vterus totius corporis recrementa excipiat, atq. nervosa substantia sit, haud facîle curationẽ eius admittant vlcera; præsertim si diuturna fluant. Ex iis tamen ea quæ in conspectum veniunt, promptius, quàm quæ in profundo

undo sunt recondita; & quæ pura, aut etiam simpli-
 ter sordida existunt, facilius quàm depascentia, me-
 dicamentis cedunt. Rarius verò, secundùm quosdam,
 sunt consequendo; ut plurimum autem per se inci-
 iendo. Sollicitè statim sunt curanda: nam si perdu-
 auerint, fistulam periculosam, imò hecticam febrem
 inducunt, ut sæpe vidimus, & tandem mortem. Vlcera
 quoq. matricis in principio prohibent conceptionē; &
 si prægnanti superuenerint, abortum inducunt, nisi ilico
 succuratur: quoniam scilicet virtutē expulsiuam sti-
 mulant, quemadmodum & tenesmus. Quouis modo
 fiant, agrè semper curantur, quia pars illa, ut diximus
 multa recrementa colligit, quæ vlcus consolidationē
 retardant. Si igitur inflammationem experitur vlcus, Curatio.
 iis quæ ad illam scripsimus sub finem Scholij Obs. 44.
 huius libri, tum quæ apud Paulū lib. 3. c. 65. De vuluæ
 abscessu scripta sunt, utendū est. Si verò ex redūdanti-
 bus, & vitiosis ac erodentibus succis exulceratio vteri
 fuerit orta, purgātibus medicamētis prius erit utendū,
 præsertim vbi alterati, ac preparati fuerint qui redun- Purgatio.
 dant humores: & deinceps ad vlcus curationē con-
 fugiendum. Interea quantū ad principālē huius mor-
 bi curationem, diata sit ciuili, sine mœrore atque ani-
 mi sollicitudine quiescat ægra, atq. somnū capiat mo- Victus ratio.
 deratum, in contrariam vlcus partem. Plantum effu-
 giat locū, humidū præsertim, balnei vsum, crurumq.
 frictiones. In cibis acris & amara vitāda sunt, vel sal-
 sa, nimiumq. dulcia, ut quæ ex melle & saccharo con-
 ficiuntur. Vetustiora vina & dulcia damnātur, sicuti
 & aquæ puras potus. Panis siligineus utilis est sine sale,
 auicula & hedina caro. Siti ac fame vincitur id malū
 (ut quidā asserunt) modò debiles non sint: humida esca
 inuti-

Topica.

Si vlcus purum.

Si sordidum fuerit vlcus, curatio.

inutilis habetur. Frigida igitur ac sicca profunt, & initio quæ abstergunt eliguntur; demum quæ cicatricem inducunt offerenda sunt. Et, vt summarim dicam, ea victus ratio instituat, ac eadem exhibeantur medicamenta, quæ in reliquis exulcerationibus, renum potissimum & vesicæ, à nobis fuere cōscripta. Quantum verò ad topica medicamenta spectat, si purum fuerit vlcus, leuiter astringentibus atque exiccantibus medicamentis vtendū erit: quod vbi conspicuum erit, eisdem illinatur vlcus. Si verò profundum existat, infundere ea oportet per instrumentum ad hoc appositum: quare rosaceum aut tetrapharmacum basilicum cum butyro recenti infundatur, iuxta Paulum. Eluantur item loci decocto rosarū aut lentium, aut ptisanæ seu plantaginis succo: præstabit etiam portulacæ, aut polygoni decoctum cum rosaceo. Verum vbi sordidum fuerit vteri vlcus, detergentibus medicamentis vtendum erit; veluti est ptisanæ cremor cum melle; vel mulsa in qua scæneg. sit decoctū, aut malua, aut fursures, aut lenticula cui cortex sit detractus. Porro, quo magis expurgetur, etiam martubium, aut eruum, vel melli adiuncta erui farina, vel iris, vel alumen rotundum, vel aliquid simile iniiciatur. Hæc ipsa etiam extrinsecus ex mulsa macerata illinantur. Peculiaris est medicamentum, crocus leuigatus, cum lacte muliebri, deinde exceptus cerato rosaceo, cum adipe anserino: inungitur linteo. lo. atque hoc efficacius ad dolores. Capita papaueris in passo temperato madescunt diebus tribus, deinde insoquuntur donec emollescant, postea teruntur cum folior. ros. ʒ v. croci ʒ iij. iure capitis pap. admissi, inde cere cum rosaceo liquata denarij duo ipsis superfunduntur,

duntur, ac pessulo apponuntur in rosaceo tincto. Et illud salutare est, ex ouis, croco, rosaceo, adipe anserino, cerui medulla, preparatum. Utendum quoque ad sordida vteri vlcera eo medicamento, quod ex melle, terebinthina, rosaceo, & butyro, constat: cui aliqui etiam parum croci addunt. Efficax est & iris imposita cum melle; & aristolochia decoctum per se, vel cum melle infusum, teste Aëtio. Vbi pascendo serpunt vlcera cum inflammatione, illinitur panis egelida maceratus ex hydromelite, oleo, althæa, sænug. palmulis pinguibus. Ceterum plantaginis succus, solani, polygoni, sereos, indetur, primum per se, mox cum vino austero, aut aceto. At citra inflammationem serpentibus robustiora iniiciuntur; veluti decoctum malicorij, rosar. summitatis olea, cupressi, malorum coroneorum, rubi, myrri, lentisci fruticis, rhus coriarij, ex vino astringente: postea verò aluminis, acacie, lycij, hypocisthid. Ex eisdem verò decoctis, iubente eodem Paulo, parabitur etiam infusus. Si nihil proficiunt, non alienum fuerit ex carta medicamen cum posca primum demittere, deinde cum aceto, aut anthera, iisdemq; liquoribus & ceteris quæ dysentericis congruunt.

Vlcera serpentia, seu depascentia, cum inflammatione, quomodo curantur.

Citra inflammationem serpentium curatio.

OBSERVATIO XLIX.

De antiquo vteri vlcere & lethali.

MARIA Iacobi, mulier licet crassa, satis tamen prolifica, quæ in paruo Speculo apud pontem cespitarium Delphis habitabar, vteri vlcere admodum maligno, cum insigni dolore, vsque ad profundum vteri procedente,

V

cūm

306 DE MULIERVM MORBIS,
 cū a'iquamdiu laborasset, ex Chirurgi consilio
 variis vtens remediis, semper peius habuit. Ad
 quam tandem & ego accitus, animaduertens
 quōd vlcera essent depascentia & efferata, post
 purgationes totius corporis cōuenientes, impe-
 traui ex autoritate Aëtij, vt iis topicis medica-
 mentis vteretur, quæ ipse ex Aspasia lib. 16.
 cap. 94. ad vteri depascentias collegit. inprimis
 vt vlcera asinino lacte, vel equino, recēter mul-
 to ablueret, & hoc ipsum ad duas heminas re-
 cēns coctum, mellis hemina dimidia adiecta,
 & quatuor drachmis iridis farinae inspersis, ca-
 lidum vt saepius singulis diebus per mulierem
 Medicam infunderetur, præcepi: interdum &
 aqua malsa, in qua absinthium aut chamæme-
 lum incoctum erat. & vbi quod infusum esset,
 fuisset excretum, vt protinus loci malua deco-
 cto eluerentur; deinde pessus subderetur ex
 farinae, crui, iridis, añ. 3 ij. cum melle subactus.
 Ceterum nullo modo voluit admittere iniectiones,
 vel alia à nobis apta præscripta remedia:
 ita vt miserè diu superuiuens, cum vehementi
 cruciatu tandem, viribus consumpta, cū ali-
 quot mēsis hoc malo detenta esset, interierit.

SCHOLIA.

Canones
 obseruandi
 in curatio-
 ne vlcetum
 vteri.

NEOTERICI hīc quosdam canones ante vlcis
 vteri curationem præponunt: vt: Quanto vl-
 cus vteri fuerit humidius, tanto medicamenta sic-
 ciora adhibenda, & apponenda, cū & siccius me-
 dicamentum per se eidem conueniat. Volunt q̃, re-
 motionem materiae antecedentis & peccantis cum ca-
 rbar-

harcicis, & victum optimi succi, haud minimam
urationis partem in se continere. hisdem itaque in-
rimis conueniunt abstergentia, detergentia, & mun-
tificantia, & consequenter exsiccantia: sub finem verò
incarnantia & consolidantia. Tam internas quàm ex-
ternas partes colli vteri mandas tenere cum pannis
ineis puris, & albisimis, & ab omni sorde immunes
ac securas, conuenit. Si itaque ab humore acri, mate-
riam digerimus, seridu, cichorij, lupuli, lactuca, sola-
ni, aqua, vel decocto, addita viola, nymphaea, ac tribus
santalibus; syr. etiam viol. pap. nymph. alijsve adiectis.
Præparatam materiam euacuamus manna vel cassia,
vel syr. ex infus. ros. pallid. Phlegma salsum præpara-
mus decoctis & syr. è bugloss. fumaria, polytricho,
adiantum, scolop. chamæpit. chamædr. & rad. apij, pe-
tros. scæniculi, polypodio adiecto cum saccharo, & vi-
no mali punici. Digestam materiam subducimus dia-
phœn. cum agar. epithymo, & senæ fumariæq; deco-
cto. Ab his, si corpus sanguine sit repletum, cubiti ve-
nam & tali, si opus est, secamus. & ubi expedit, di-
gerentia & cathartica reperimus. aliqui & vom-
itum laudant ad auertendam materiam. Ab his, quæ
vlcera abstergunt infunduntur, mox quæ persanant.
Interea si qua inflammatio fuerit, quæ calorem mi-
rigant imponimus. Syr. ex pap. iuiub. damas. luuani &
insestiones, ac vnguenta refrigerantia; vel tepidum id
infusum ex quatuor ouorum albis quassatis, succo se-
minis melon. pepon. cucurb. cucumeris rotundi ac ma-
gni, ex aqua viol. addito muliebri lacte. In vehementi
cruciatu, & aqua virgæ pastoris, siue polygonij, aqua
hordeacea, añ. lib. ꝑ. in ea semen psilly maceretur,
& panniculo compresso; addatur ouorum candidum

Ab humore
calido acri.

A phlegma-
te salso.

Abstergen-
tia.

Topica.

Putria vl-
cera.

Consoli-
dantia.

Fistula in-
curabiles.

Curatio vl-
cerum vteri
à lue Ve-
nerca.

cum pap. & hyoscyami seminis succo, ac muliebri lacte. & si opus est, in ea mixtura exiguum caphura, opij, croci, addatur. Extrinsicus solanum imponitur, vel cotyledon, vel lactuca, pap. aut hyoscyamus. Quæ verò repurgant subinde iniicienda sunt; vt caprinum serum, & aqua hordeacea in qua glycyrrhiza incocta sit, vel saccharum. alij oleum cucurbit. viol. cum amylo & cera confecta, soluta cum lacte muliebri aut asinino iniiciunt. At deplorata vlcera mitigatioris (vt diximus) infusionibus mitigantur. Putria verò mulsæ prius purgantur; mox adiecta iride ac aristolochia absterguntur. Vtistati vlcerum vehementiora conueniunt; vt decoctum iridis, hyssopi, aristoloch. rotunde, artemisæ, admixto melle, & virili vrina. Repurgato vlcere, sanandū erit medicamento li bary cerussæ, sarcocolla, ex oleo ros. & cera composito, tum alijs glutinantibus & consolidantibus, superius dictis; quæ ex aloë, myrrha, draconis sang. sarcocoll. ac thure cum plantaginis succo bene irita imponuntur. Tunc etiam agra boni succi cibus vinoq; refici debet, quo caro statim procreetur, ex Pauli sententia. Deinceps his vtendum quæ ad cicatricem perducunt; primò mitioribus, deinde efficacioribus; etiam de foris adhibitis, abdomini videlicet & vteri regioni. Nam quemadmodum cataplasmatum, ita etiam emplastro- rum facultas per latentes meatus traducitur, vt idem inquit Paulus. At vteri fistula sanari non possunt, sicuti & quæ in aluo sitæ sunt. Si autem vlcera vteri à lue Venerea facta fuerint, vtile erit malam illam morbi qualitatem in toto corpore euincere & auferre, prouocando sudorem vel stuphis, vel iniectionibus, vel vsu guaiaci, vel similibus, & vnguentis prædictis

elis argentum viuum addere, & fumigio parato ex
 nnabari vii. Tunc videlicet fumigiis dictis Obs. 48.
 ubi finem addenda erit ℥ j. cinnabaris, & per embo-
 um, vt ibidem dictum est, fumus recipiendus. In om-
 nibus his vlceribus vsus stupharū est vtilissimus, quia
 corpus vniuersum exiccat. Sic post decoctum guaiaci,
 aliquando curauī vlcera in vulua vnguento Egy-
 tiaco soluto cum aqua plantaginis, etiam leuiter at-
 tingendo ea quæ in ore vel in parte exteriori conspi-
 ua forent. Vidi Chirurgum cum pluma attingentem
 cum aqua plantag. aut solani, iniecto exiguo puluere
 præcipitati, tamen non sine magno dolore. Verū de
 his latius, De lue Venerea, suo loco.

OBSERVATIO L.

De pruritu vuluæ.

VETULA mulier Alcmariana, cū pruritu
 vuluæ intolerabili afficeretur, ex materia
 biliosa, acri & salsa, multumque pungente, ad
 me consultandi causa venit anno 1555. Quæ
 equidem paupercula existens, istis remediis ab
 illa molestia liberata fuit. Eramus in æstate: &
 fumarie, acetosæ, lapathij acuti, cum rad. sum-
 mitat. lupul. bugloss. cum floribus, añ. m. j. co-
 quantur in sero lactis, adiectis xv. prunis; co-
 que bis utebatur in die. Deinde, vt magis pur-
 garetur, adieci ℥ j. foliorum senæ, sem. acetos. &
 anisi añ. 3ß. Vt vuluam lauaret præcepi cum
 aqua plantag. quæ cū non satisfaceret, hoc de-
 coctum præscripsi: Folia plantag. lapathij acuti,
 cum rad. coquantur in aqua plantag. Post lo-
 tionem,

V 3

tionem,

tionem hoc linimento inungatur: & lithargy-
rij auri per diem ac noctem in acerrimo aceto
macerati ꝑj. olei viol. q. f. fiat linimentum mol-
le. Ita à fœda illa passione liberata est. Fuit hoc
secretum præceptoris mei Elidei, Medici insi-
gnis; modò accipiendò ꝑß. litharg. ita in aceto
acerrimo macerati, addendo olei viol. modò ꝑj.
modò ꝑß. Hoc eodem remedio per me curata
fuit & alia post vniuersalia remedia, à pruritu
vulvæ vnâ cum satyriasi, anno 1560.

SCHOLIA.

GUAINERIVS in Commentariolo suo De agri-
tudinibus matricis, cap. II. sub vno capite tra-
ctat de pruritu matricis, & priapismo. Fortè intelli-
git pro priapismo satyriasm. Pruritus tamen matri-
cis potest esse etiam absque satyriasi. Priapismus verò
est proprius morbus mentula, vt ad longum docui-
mus Obs. 9. lib. 26. & in eiusdem Scholio; & satyria-
sis similiter, vt Scholio Obs. 27. eiusdem libri osten-
dimus: quamuis inter se modò conueniant, modò dif-
ferant, vt ibidem ad longum explicauimus. Satyria-
sis tamen, vt ibidem quoque diximus, etiam mulie-
ribus accidit, ex mente Aëtij lib. 16. cap. 82. ad quam
etiam sequitur ingens pudendorum pruritus cum do-
lore; ac eadem adsunt signa quæ ponit Guainerius de
pruritu matricis. Potest tamen aliquando esse pru-
ritus ex humore bilioso, salso, adusto, sine desiderio
coeundi. Satyriasi, vt Moschio cap. 4. Harmonie Gy-
næciorum, tum Aëtius referunt, à Satyris nomen
antiquitas dedit, quòd illi, vt in fabulis est, proclues
in Vene-

Priapismus.

Satyriasis.

in Venerem essent. In mulierum certè satyriasi adest
 partium pudendarum prurigo cum dolore, ita vt im-
 patienter manus suas illuc mittant, cum insatiabili &
 stabili virorum desiderio, amissa scilicet omnis pudor-
 is verecundia. Si quidem enim res hæc, quæ matricis Moschio.
 consensum habeat, & verecundiam eū confundat ac
 tollat, & aliquantulum eas delirare satiat. Hæc Mo-
 schio. Noui ego vetulam quandam, cuiusdam sacer-
 dotis famulam, hoc vitio adeo impudicam vt satiari
 non posset coitu, quo imò magis inflammabatur; quæ
 ad hecticam febrem quasi peruenerat antequam cu-
 rari posset. Huius mali curationem diximus ex Aërio
 Scholio Obs. 27. lib. 26. Addit Moschio, curam ean- Curatio
pruritus.
 dem esse cum feruore. Potest tamen, vti dixi, esse pru-
 ritus, absque desiderio coitus. Interea si à bile vsta,
 quod ex colore luteo seu citrino cognoscitur, ea ipsa
 contemperanda cum syr. viol. nymphaeæ, & aliis cum
 aquis refriger. vt dictum est saepe, & cum infus. rha-
 barb. oxyphœnico, & syr. ex infus. ros. purganda.
 Si à sanguine color erit rubens, fiat venæ sectio si sang-
 sit adustus. Si sit à pituita salsa, contēperetur similiter
 & euacuetur cum cathol. & diaphœn. Deinde topica
 remedia adhibeantur. In materia calida succus solani,
 aut lactucæ, portulacæ, iniiciantur; vel eo vterus la-
 uetur, vel hoc: R. succi foliorum salicis, succi lactu-
 cæ, añ ʒ iij. stercoris muris ʒ ij. misce, & in vterum
 mittantur; vel betæ succus. & si adest simul satyria-
 sis, pul. nymphaeæ ʒ j. excipiat syr. de pap. aut
 succo foliorum salicis, & ante pastum bibatur:
 vel succi portulacæ cum saccharo & similibus fiat
 syr. Lauentur cum decocto lapathij acuti, fumarie,
 maluæ, oxalid. solani, scabiosæ, betæ, & pentaphylli.

A pituita salsa, valet hoc vng. & litharg. cerusa lota,
 añ. ℥ iij. plumbi vsti, scoria argenti, añ ℥ j. s. masti-
 chis, olibani, añ ℥ j. s. pulueriscentur in mortario plum-
 beo, & pistillo plumbeo agitentur, adiectis oleo ros. &
 aceto albo, non simul, sed alternis repetitis vicibus,
 donec vng. formam induat: deinde quidam addunt
 argenti viui, hominis ieiuni salua extincti, ℥ iij. ster-
 coris muris ℥ ij. Accipiatur huius vng. ℥ s. stercoris
 muris ℥ iij. dissoluantur in ℥ vj. decocti suprascripti;
 eo pruritus lauetur, tum vulua ipsa; & si opus est,
 in vterum iniciatur, ut pruritus simul & satyriasis,
 si illa adfuerit, tollatur. Renes quoque inungantur
 cerato albo, adiecta exigua portione caphura, & la-
 mina plumbea perforata super renes feratur; & vi-
 tex, tum alia per cubiculum spargantur, qua ad
 compescendam Venerem scripsimus valere: & si sim-
 plex sit pruritus, absq; desiderio coeundi, vtere vn-
 guento illo ex lithar. cum oleo viol. ut nos vti sumus.

OBSERVATIO LII.

De vuluæ excoriatione.

MULIERI excoriationem vuluæ habenti,
 cum ardore, post exhibitam cassiam cum
 fero lactis, mandavi, ut folia salicis, maluæ, viol.
 & solani decoqueret cum lacte, & eo sæpe loca
 excoriata ablueret, & deinde vng. ros. & de ce-
 rusa & albo caphurato simul mixtis inungeret;
 continuò bibendo lac ebutyratum cum foliis
 acetosæ coctum. Quibus cessauit. Alteri ex lo-
 rione sequenti intra biduum cessauit: & capri-
 folij, bursæ pastoris, caudæ equinæ, plantag. sem-
 perui-

peruiui, saniculæ, bugulæ, añ. m. j. trag. gummi Arab. añ. 3 ij. spodij, granor. myrti, añ. 3 ij. sem. & cort. pap. albi 3ß fiat decoctio in aqua plantag. caprifolij & scabiosæ. Valent & ea quæ mox de rhagadibus & fissuris vteri dicturi sumus.

SCHOLIA.

EXCORIATUR vterus, teste Gilberto Anglico lib. 7. sui Compendij, cap. De excoriat. eiusdem, interius. imò etiam aliquando exterius, ex bilateralibus eiusdem inherente: & aliquando in eius concavitate; ut per puncturas & ardores resudante humiditate citrina cognoscitur. Imò patitur subinde & scabiem ac pustulas; ut pruritus indicat, tum superfluitates ab utero emanantes aut vulua. Digeratur oxysacch. & purgetur elect. de succo ros. & fiat balneum ex herbis refriger. & si opus est, vena saphenæ secetur; & temperetur licium cum lacte, ac immittatur. Vel pap. alb. gummi Arab. trag. terantur, & fiant trochis. ponderâtes 3 j. vnum dissolue in lacte, & iniice. Quæ ad vesicæ excoriationem valent, & hic locum habent. Adici poterit medulla vituli & ceruina; & ita scabies pruritusq; soluetur. Interea studendum vteri repurgationi, ne post istas iniectiones sempiterna inducatur sterilitas; & ideo à violentis iniectionibus abstinendū. Si exterius sit excoriatione, fons & vnguenta iam dicta ad pruritiū vulua, exterius adhibenda. At si vulnus sit in utero, utuntur recentibus succis arnoglossæ, solatri, cum album. oui & succo portulacæ; & in venis corrosis, succo centaurij, sang. drac. bolo Arm. aristoloch. rotunda, lycio,

V S

lycio, acacia & similibus; & pessus ex litharg. capb.
& albo oui, & oleo ros. Sed de his satis. Nunc ad rha-
gades, quæ simile ferè curatione obinent, accedamus.

OBSERVATIO LII.

De uteri rhagadibus ac fissuris.

MULIER aliqui honesta & pudica, ex de-
fluxu acrium humorum in orificio vulvæ
rhagadas seu fissuras patiebatur. Adhibita pur-
gat. ex infusione senæ & rhab. cum syr. viola-
ceo, commodè oleum rosaceum cum vng. de
cerusa adhibuimus, prius tamen ablutis locis
cum sero lactis. Ita & Rhas. ubi calor adest cum
acuitate, oleum rosaceum, cum vng. de cerusa
capit. In altera & hoc nutrito commodè vti su-
mus: & olei myrtini, rosacei, añ. ʒj. β. succi
plantag. & consolidæ, vel polygonij, añ. ʒj. li-
thargyrij ʒiiij. cerusæ lotæ ʒij. plumbi vsti, an-
rimonij, boli Armenæ, añ. ʒβ. tritarentur subti-
lissimè, & reducantur ad formam nutriti.

SCHOLIA.

Rhagades.

Causæ.

Notæ.

IN vulvæ ostio rimæ, quas Græci rhagadas vocant,
ex enixu violento fiunt, teste Paulo lib. 3. cap. 75.
& iuxta Aëtium lib. 16. cap. 109. Etiam circa os vte-
ri, ob acrium humorum defluxum, loca effringentem
& exurentem, fieri solent. Primum sanè latent, iuxta
eosdem, cum recentes adhuc ex partu sunt dolores:
postea verò paulatim percipiuntur, aliàs manu, aliàs
in coitu. nam & propter affricationem cruorem red-
dunt: certius tamen speculo deprehenduntur: sinu
enim dilatato, diruptiones fissuræq; in ostioli circuitu
oculis

oculis patent, vel in ambitu oris vuluæ visuntur. Et sic rhagades propriè sunt fissuræ, quæ fiunt in collo *Differentia.* vteri, recto intestino, & labiis aliquando, ob ariditatem, vel ob condylomatum inflationem; & inflammationem; quamuis condylomata à scissuris, ut postea dicemus, differant; licet quidem aliquando simul, aliquando seorsim spectentur. Et sic quoque rhagades vlcera sunt vteri & sedis diducta in fissuras. Sed alia humida & saniosa, alia callosa, quædam cancrofa sunt. Humida & saniosa detergentibus & *Prognostica.* exiccantibus citius curantur; callosa difficilius; cancrofa sunt maligniora. In eiusmodi ergo (iuxta Aëtium) muliebribus locis chirurgiam atque omne mordicans medicamentum effugere oportet: nam talia inflammationes & conuulsiones afferunt: ergo simplicioribus, etiam Paulo admonente, in scissionibus pessulūq; utemur, velut ad vlcera superius memorata. Prodest etiam tetrapharmacū dilutum. Ad rha- *Curatio.* gadas quoque utitur Aëtius hedricis medicamentis, præcipuè iis quæ è pompholige, stibio, & plumbo vsto conficiuntur Asclepiada. At nos etiam hoc vii poterimus: R. vnguenti pompholigos ℥j. aluminis ℥j. misce. Si saniosa, abluuntur à quibusdam sero lactis, deinde tetrapharmaco dissoluto in rosaceo illinuntur. postea utuntur medicamentis consolidantibus, quæ parantur ex lithargyrio. Si fiant ab humoribus acribus, purganda sunt medicamentis præscriptis ad fluorem muliebrem à bile, & optima victus ratione acrimoniam temperare oportet, & illas humectare cibo & potu; atq. illos fructus edere, qui acrimoniam humorum frangunt, ut pira, poma, iuscula cum lactucii. Supra partem vnguentum resiccans,

vt

316 DE MVLIERVVM MORBIS,
vt in vlceribus, applicandum, quale iam diximus.
Dum curantur abstineant à coitu, & pars diligen-
tissimè obtegatur, ne ab aëre frigido laedatur. Callosæ
egent mollientibus, æsypo, radice lilij, terebinthina,
admista parte iridis Florentina; tum veniendum ad
ea topica quæ scripsimus Obser. 10. lib. 23. De ani-
affectibus, & in Scholio eiusdem Obser. Vide pluri-
ma remedia etiam ad rhagades callosas apud Pau-
lum & Aëtium locis citatis. Si cancri suspicio sit,
valent & illa paulo antè descripta ad canerosos vteri
affectus; & diapomphol. cum cerato liquido rosaceo.

OBSERVATIO LIII.

De condylomatibus vteri.

CONDYLOMATA (de quibus etiam diximus
Obs. 8. & Scholio eiusdem, lib. 23.) sunt
velut hypofarcoses, quæ in collo vteri, etiam in
fede fiunt, post aliquam vlcerationem vel in-
flammationem; quemadmodum & Aëtius lib.
16. cap. 108. ex Aspasia annotauit. Condyloma,
inquit, est rugæ excrecentia: rugæ enim circa
os vteri existentes, dum inflammationem pa-
tiuntur, incuruantur & indurantur, & euer-
sionem quandam & crassitudinem in locis effi-
ciunt, præcipuè verò in mensium excretioni-
bus, & post partiū turbulentias attolluntur, fa-
cileq. tactu noscuntur. Eiusmodi excrecentias
duplicatas & complicatas in vuluæ labiis, ver-
sus collum vteri, mulier quædam patiebatur.
Cum autem caro esset fungosa, & vriticis mari-
nis similis, adhiberi iussi fomenta exiccantia &
astrin-

astringentia ex decocto gailarum, aluminis, & malicorij. Memini me quoque felicissimè vsum fuisse vnguento Ægyptiaco & Apostolorum, vt arroderentur & detergerentur. Aliquando etiam sumsi sublimatum in aqua ros. vel puluerem præcipitatum cum decocto plantag. infundendo elychnia, & pannum lineum in ea decoctione, & supra partem adhibendo. Aëtius rectè iubet vt fomenta astringentia adhibeantur; & eiusdem facultatis suppositoria applicentur, quæ suprâ ad sedis condylomata memorauimus; maximè quod è malicorio & butyro, aut quod è lycio Indico, & æsypo conficitur.

SCHOLIA.

DICTVM est prius quòd in vtero fiant rhagades & condylomata, modò simul, modò seorsim. Curantur verò primùm condylomata, deinde scissura, si simul fiant, vt fiunt magna ex parte. Imò scissura veteres, seu rhagades, aliquando in condylomata degenerant: quod vbi contigerit, exscindere iubet Paulus, atque ad cicatricem duci. Cùm enim condyloma sit hypofarcosis, siue carnis additio, ablationem sui indicat, tanquam aliquid redundans à toto genere præter naturam. Sed quia condylomata sunt in vna tantùm parte, veluti verruca pendentes, filo ligantur, & sic alimento destituta decedunt, vel abscinduntur nouacula. Sanguis sinendus est aliqua parte fluere, vt pars leuetur sanguine crasso attracto, ex quo fiunt condylomata. Cùm autem fiunt in circulo ani, (de quibus antea dictum est) vel in circuitu

ani

ani totius, eminentiora & maiora sunt auferenda
 chirurgia: minora verò, si ferre possunt, medicamen-
 tis facile resiccantibus, cum quadam astrictione. Vel
 si hac non proficiant, arrodentibus sunt auferenda, vt
 emplastro diachalcitidis dissoluto in oleo rosaceo, re-
 duplicata quantitate chalcitidis. Pulueres autem vi-
 dentur magis conuenire ad exiccationē, qui parantur
 ex resiccantibus, arrodētibus, cōstringentibus: quia hac
 caro flaccida exiccanda & cōstringenda est. Quod si
 dura esset, & ad naturā duratū verrucarū accederet,
 absissione est potius curanda, vel emollientibus; & po-
 stea detergētibus exsiccanda, vt facere solemus in scir-
 rho. Sed magna ex parte caro illa est fungosa. Ideo
 pulueres actu sicci & facultate meliores sunt. vt: ex
 sabina exiccata, & tenuiss. pulv. ℥j. hermodact. vñ o-
 rum & myrtill. vñorum, añ. ℥ij. chalcitid. aluminis,
 añ. ℥ij. auripig. rubri ℥j. reducantur in tenuissimum
 puluerem, qui supra partem adhibeatur. His pulueri-
 bus nonnumquam vrile est, vt in collyriis, admiscere
 parum rad. mandrag. aut opij, ob sensum partis, quæ
 medicamēta exiccantia cum morfu aut arrodētia dif-
 ficile fert. Laudat & hic Rondeletius, vbi magna co-
 pia sanguinis apparet, prius mittere sanguinem è bra-
 chio, deinde è poplite; aut cucurbitulas in coxis, vel
 natibus applicare, cum profunda scarificatione in na-
 ribus, & leui in coxis, ad sanguinis deriuationem, in
 ea parte redundantis. Aut quoque vomitum esse con-
 uenientissimum, & purgationem leuem, aut leni-
 tionem ventris. Huc etiam pertinent scirrhomata
 miliacea vteri, ex Aërio 16. lib. cap. 110. pudendo
 innata, quæ tactui occurrunt, vel certius speculo de-
 prehendantur, solentq; veneris præcipue confricatu
 menses

Scirrhomata
 miliacea.

mensēs & conceptum interciperē. In hīs alius primō
purganda, deinde linteolo locus abstergendus, & ex
carne carycarum pinguium & alumine scissili impo-
nenda, vel pessus ex alumine & felle, aut medicamen-
ta maturandis discutiendūq; panis idonea illinenda:
collutionesq; ex aqua mulsa, aut quopiam aromaticum
decocto, faciendæ. Iam quoque in pudendo & uteri
ore (eodem autore cap. III.) scabiose pustula exoritur,
turbatur, furfuraceas squamulas emittentes, pruritusq;
inferentes, & calida aqua persusione gaudentes: ad-
uersus quas aluum asinino lacte purgare, à cena ro-
mere, in balneo sudare, aquam calidam ingredi, vino
cum nitro calfacto, & post vinum, aqua calida col-
lui oportet, lociq; licium indicum, aut amurcam,
aut butyrum cum sulphure, aut ceratum myrri-
num cum spuma argenti, aut alumen rotundum
cum melle, aut malicorium cum myrtino oleo &
melle, illinere. Squamas autem & formicas exte-
rit cyclamini radix cum melle illita. Ceterum ab
omni acri, salso, acido, in alimentis cauendum.

Scabiose
pustula
vicia.

OBSERVATIO LIIII.

De sycofi uteri.

DIXIMVS lib. 23. Obser. 9. de sycofi &
thymis. Iis rustica mulier in puden-
do laborabat ex lue Venerea: quamvis
etiam eiusmodi excrecentiæ etiam sine ista
lue contingere possint: quemadmodum eue-
nit matronæ nobilissimæ, quæ ficus nonnul-
las habebat in orificio exteriori ipsius vulvæ,
cum intensissimo dolore, ita ut quiescere

non

320 DE MVLIERV M MORBIS,
 non posset. Huic consului, quo ab hoc fædo
 malo liberaretur, cùm non esset grauida, vt ex
 talo vena secaretur; vt ita sanguis fœcalis, etiam
 digesto humore melancholico, deinde ater ille
 humor, expurgaretur. Venit mihi in men-
 tem historia Guainerij, qui ita mulierem, post
 vniuersalia remedia, curauit: Capiebat picem
 Hispanicam, & puluerisabat in terreo vase, su-
 pra quam laridam ignitum inflammatumque
 guttatim stillare fecit, vt sic pix liquefacta in
 formam vnguenti coiret: eo oblinebat vteri hæ-
 morrhoïdes, & ficos ac dolorem sedabat. Mo-
 dō accipiebat butyrum recens, & in mortario
 plumbeo cum pistillo plumbeo ad formam vn-
 guenti cogebat, eoque mirabiliter dolorem se-
 dabat; etiam appposito succo herbæ Sancti Petri
 dictæ. Et vbi ardor insignis esset cum dolore,
 hoc vnguento commodè utebatur: & vng. po-
 pul. ʒ iij. croci ʒ ij. opij ʒ j. vitellum vnius oui
 recentis: incorporentur simul, & locus affectus
 inungatur. Magna admiratione dolorem se-
 dat. Consului vt hæc matrona iisdem remediis
 vteretur.

SCHOLIA.

GVAINERIVS in Commentariolo suo De agri-
 tudinibus matricis, sub vno cap. nempe 12. tra-
 ctat de hæmorrhoidibus matricis, vris, & ficos, cla-
 uis, siue verrucis, & carne addita. Alij de his seorsim
 tractant. Huc etiam pertinent thymi, excrecentia
 eurgida; de quibus diximus Scholio Obs. 9. lib. 23. à
 corymborum montana herbæ similitudine sic dictæ
 sunt,

sunt, vt etiam refert Aëtius lib. 14. cap. 4. De thymis, sycoſi, formicis, verrucis, clauis, reliquisq; eminentiis ani, quæ etiam in pudendo mulierum fiunt. Quibus autem à ſe inuicem differant, iam diximus Scholio Obſ. 9. lib. 23. vt non opus ſit eadem repetere. Ibi etiam de curatione harum eminentiarum egimus. Reliqua vide apud Aëtium loco citato, qui curationem longo ſermone proſequitur. Ceterum quod ad præſens negotium attinet, moros ſeu ficus, ex fœcali ſanguine ad hæmorrhoides etiam vteri Guainerius refert; & etiam verrucales ex melancholico humore; veſicales verò & vuales, etiam ſi in ano apparuerint, ex phlegmate vel ſanguine pituitoso fieri vult. Carnem autem additam ex ſucceſſione vlcerum rhagadiarum. Refert, excreſcentias tales modò in profundo, modò in collo vteri, ſeu oriſicio, originem ſumere. Profun. Notæ.
de verò nec comprehenduntur, nec curantur: attamen cognoscuntur apparentes vel tactu vel viſu; honeſtius ex relatu infirmæ. Verruca difficulter, aut numquam, iuxta eundem, ſanantur. ceteræ curationem recipiunt, & magis ſi ex retentione menſtruum fiant, ſanguine melancholico emanante. aliquæ Curatio.
ſerico filo ligatæ decidunt. Inungantur eæ oleo ſem. lini ex nucleis perſicorum; & pul. pineæ combuſtæ inſpergatur, & cortex querc. ſpongia, ariſtolochia rotunda aquis partibus in olla furno impoſita exſiccantur, ac puluere tali locus affectus cum melle inungatur, puluere ſuper aſperſo. vel hic, qui fortior exiſtit: R. folior. vitis, ficus, & ficuum immaturarum, añ. m. j. viridis aris ꝑ j. ſimul ponantur in olla ad furnum, & fiat pul. quo locus oleo de ſemine lini perunctus aſpergatur. Succus thapſi barbati cum oleo de
X ſemine

Thymi, ſycoſes, ſeu ficus, formicæ, verrucæ, clauis.

Hæmor-
rhoïdes vte-
ri ex Aëtio.

Calculus
vteri.

322 DE MULIERVM MORBIS,

semine lini istas verruciales excrescentias egregiè cu-
rat. At Aëtius cap. proprio De hæmorrhoidibus vteri,
ex Aspasia, lib. 16. c. 99. Hæmorrhoides, inquit, quan-
doque in ore vteri, quandoque in collo, quandoque in
ipso vase, nonnumquam etiam, licet rard, in puden-
do contingunt; quæ quidem interdum tactu, melius
tamen speculo deprehenduntur; eademq; omnino ac-
cidentia inferunt, quæ reliqua in sede cuenientes in-
ferre solent; ac præterea sterilitatem, lumborumq;
grauitatem purgationis tempore inducunt. Varicosas
igitur & maleficas prætermittere oportet: reliquas
non aliter curabis, quàm quæ in sede oriuntur: duras
quidem & modicum cruorem emittentes, neque va-
sis annexas, confestim amputando. Quæ verò cruo-
rem affatim fundunt, eas circa basim orbiculatim sca-
rificabimus, deinde volsella suspendemus, scarificatio-
niq; nodum innectentes constringemus; quas postea
paulatim extensas amputabimus; atque inde anthe-
rum medicamentum aridum applicabimus. Quòd si
absque chirurgico opere malueris hæmorrhoidas are-
facere & excacare, huiusmodi arida appones: spo-
dium, ros. siccas terito, & inspergito: vel acaciam
cum vino austero subactam, vel Lemnium sigillum
cum aceto illinito. Si plura desideres remedia, eun-
dem consulito. Idem cap. sequenti facit mentionem
de calculo vteri. Sed quomodo is extrahatur, potius
ad chirurgiam spectat. De thymis & formicis vteri,
& de verrucis, quomodo tales excrescentiæ cum chi-
rurgia & sine chirurgia curentur, & de nymphoto-
mia, & cauda vteri, quæ similiter ad chirurgiam
spectant; vide apud eundem Aëtium lib. 16. capp.
105. 106. & 107.

OBSER-

OBSERVATIO LV.

De utero imperforato.

QUÆDAM à natiuitate (inquit Aëtius lib. 16. cap. 98.) imperforatum vuluæ meatum habent, idque tripliciter contingit. Quibusdam enim extrinseca figura solidâ validâq. membranâ, vel carne agnatâ conglutinatur; aliis sinus ipse; aliis vteri os obstruitur. Hanc membranam ipse specillo dissecat donec figuram ad naturalem dimensionem duxerit, postea linamentis, quæ ex diuulsi linteoli filis conficiuntur, sectionem replet & aptè deligat; tum curationem puri generando idoneam, & cataplasmata aliquot diebus adhibet; & reliquam curationem aptis medicamentis absoluit, ut loco citato videre poteris: mulierem interea supinam, puluinar intra femora habentem, usque ad cicatricem inductam, seruat. Si in sinu sit caro innata, quomodo ea manu chirurgi curari debeat, ibidem docet. Sic filiola illius obstetricis Quirinæ dictæ Alemarianæ, cum naturalibus feminarum clausis nata erat: quæ septem annos cum nata esset, mater pro re monstrosa id mihi ostendit. Pinnacula autem sibi cohærebant, & erat parua rima, per quam lotium reddebat, & videbatur tantum membrana coaluisse, quæ facillè incidi poterat. Consului ut ensiculo acuto & paruo aperturâ faceret; deinde quæ ad cruenta valerent medicamenta adhiberet. Mater tamen medicastra & obstetrix

eo tempore non ausa fuit incisionem tentare. Sed tandem post aliquot annos filiola suæ miserta, incisionem fecit, & filiam viro aptam reddidit: vti postea Delphis Alcmariam redeunti mihi narrauit, insignes quoque gratias agens, quòd incisionem eidem commendaueram. Cùm autem hæc puella ad me veniret, memini illico puellæ illius quæ naturalibus quoque clausis incisione à Beniuenio curata fuit, vt haberetur cap. 28. De abditis causis morborum: è qua, membrana incisa, statim tanta tam ingenti impetu nigrior materia profluxit, vt grande lumen, quod tunc minister admouerat, extinxerit. nam menses intus retenti fuerant, fuitque dextrè ab eo curata. Hæc autem natu maior erat quàm nostra puella.

SCHOLIA.

ἀτρετῶν.

TALES ex Moschione dicuntur *Atreta*. Fit tribus modis: *pinnaculis* sibi coherantibus: vel, ipsis patentibus, in medio sinu muliebri pulpa vel membrana innascitur: vel etiam sinu patente, orificium vteri clauditur. Vbi pinnacula coherent, ad tria officia mulieres impediuntur; ad vsum Veneris, purgationem, & conceptum: si in medio sit clausura, communicationem viri, & conceptum; siquidem menstrua liquari possunt per cauernam, qua etiam vrina concluditur: si orificium fuerit clausum, non purgantur, nec concipiunt, virum tamen sustinent: si verò cauerna, conceptus sit, partus tamen denegatur. Secundùm eundem, clauditur & feruore; aliquando sicatrice, præcedente scilicet vulnere, aut durissimo callo

callo. Dicitur & phymos, vel phymosis, iuxta *E-*
 ginetam lib. 3. cap. 73. Muliebrium locorum clausu-
 ra; quæ etiam in pene fieri potest, vt aliàs diximus:
 cuius & exemplum apud Amatum habes curat. 24.
 cent. 1. de quodam cui glans penis non erat à natiui-
 tate perforata, sed circa testes foramen, per quod
 vrinam reddebat. Iam & ano clausa natos quosdam
 Beniuenius refert. Ita quandoque viria quadam ho-
 minibus connascuntur, quæ arte subinde corrigi
 queunt: vt in hac puella, tum illa muliere apud Be-
 niuenium euenit. Quandoq. tamen corrigi nequeunt.
 vnde Paulus loco citato: Loci muliebres circa ipso-
 rum os clauduntur, vel ex precedente exulceratione,
 vel durata illi inflammatione. Curabuntur tunc in-
 seßibus, qui emolliant, ex hydrelao, & fœnug deco-
 cto, consimilibusq. cataplasmatibus & pessulis. Porro
 si malum inueterauerit, suffimentis vaporibusq. aro-
 matum vtendum erit. Iam verò soluit etiam hoc vi-
 tij, si nihil aliud sit quàm vuluæ ostioli astrictio, pessu-
 lus ex hyssopo, nitro, resina & terebinthina. At si pin-
 nacula sint clausa, vel membrana, faciliè curari pos-
 sunt, vt in priori puella. Membrana enim faciliè tolli-
 tur & aperitur incisione, & sanguinis meatum non
 habet, nec aliquando renasci potest. Sed durissima
 pulpæ cum ingenti difficultate præciduntur, molestè
 sanguinant; & si non sollicitè fuerint curatæ, citò re-
 nasci possunt. Harum curationem vide chirurgicam
 per incisionem apud eundem, & Aëtium loco citato.
 Quemadmodum sit clausura vteri, vel vuluæ quoq.
 nimia arctitudo: ita sit & nimius hiatus ostij vteri.
 & quæcunque ad hiatum vteri commendantur, ea-
 dem valent ad violatas ne cognoscantur: quale est

Vteri clau-
 sura seu
 phymos.

Curatio.

Ex Moschio-
 ne, in parte
 Harmoniæ
 posteriori,
 cap. 15.

Hiatus ostij
 vteri.

Ad virgini-
tatem post
stuprum
mentiendā.

perclysina ex Prisciano, alumen scissum, galla cum vino & ammeo trita ac decocta. Vel si eadem trita feruesceris, suffitu mentiri virginitatem efficit, ut docet Galenus. Alij corticem mali Punici in vino nigro austero discoquant, alumen quoque adiciunt, & lana pessi modo inuunt. Sic Erotis cap. 35. De modo coarctandi matricem. Nisi de restrictione amplitudinis vulue propter honestam causam liceret tractare, nullam de ea mentionem faceremus: sed cum per hanc impediatur aliquando conceptio, necesse est tali impedimento subuenire hoc modo: R̄ sang. drac. bol. arm. corticis mali granati, aluminis, mastiches, gallar. añ. 3j. in pul. redige. & omnia simul in aqua calfacta consiciantur; & de hac confectioe pone in matricem. Vel hac, aut similia coquantur in aqua pluviali, & hac decoctione pudenda fomententur. At quibus modis virginitas cognoscatur, lege Gilbertum Anglicum. Virginum quoque probatio habetur in libro matricis, ex lapatho trito carbonibus inuncto & suffumigato: si se comminxerit, virgo est.

OBSERVATIO LVI.

De puella ab hernia inguinali curata, si nupsierit, num sterilis sit futura, per modum Consultationis.

QVÆRITVR à me, nunquid puella 22. annorum nubilis, statura mediocri, bona habitudine, quam tamen non viderim, si nupsierit, sterilis sit futura, ob herniam inguinalem probè tamen curatam? Et, si non sit futura steri-

sterilis, nunquid etiam ob eam causam in partu periclitatura sit? Omissis aliis causis sterilitatis, tam viri, quàm mulieris, pro hoc tempore, quæ si abfuerint, quantum ad herniam curatam, videtur mihi quòd ob eam causam solam non erit sterilis: quia illa incisio non peruenit ad matricem aut collum eius, nec ad membra generationi deputata; ut constat ex Aëtio lib. 16. cap. 103. de inguinalis ramicis curatione per chirurgiam. Ideo cum membra iam dicta in tali operatione non læduntur, nihil obstat quin concipere poterit: & cum cicatrix in puella trium annorum cum ab hernia curaretur, iam dudum coaluerit, & rectè sit curata, non rumpetur, & per consequens, ubi conceperit, ob hoc non periclitabitur in partu. Non tantum ratione id constat, sed etiam experientia; cum tales mulieres & proles conceperint, & retinuerint, & feliciter sine periculo pepererint. Id multis herniosis contigisse, non solum nos nouimus, sed & mecum vidit Nannius me senior, Medicus ille insignis quondam apud Amstel-damenses, mihi quoque intimus & familiaris. Et, quod magis admiratu dignum est, nouimus nos mulierem quandam Alcmarianam à fratre transfossam per ventrem paulo infra umbilicū, ut totum ventrem cultro aperuerit, aded ut intestina per vulnus propenderent, factaque per chirurgos maiori incisione, ut viderent num intestina essent læsa, iisque rectè repositis in locum, quæ quidem virago ipsa conspiciebat; eandem, inquam, rectè conualuisse, & post an-

328 DE MULIERVM MORBIS,
nos aliquos viro nuptam, & tertio anno filiam
quoque peperisse; nec ea in partu periclitata est:
quanquam hæc quasi virago post filiam illam
non amplius conceperit. Hæc igitur causa de
qua quæritur, conceptionem non impediet, ne-
que periculum etiam in partu adferet. Quam-
obrem me puto huius viri doctissimi ac consu-
laris, qui hanc quæstionem mihi proposuit, po-
stulatis puellæ nomine satisfacisse. Faxit Deus
Opt. Max. vt illa ipsa mater fiat multarum pro-
hūm, tam ad corporis quàm animæ salutem.
Delphis, ex nostro Museo, anno 1558. 19. die
Aprilis.

Petrus Forestus Medicus
ita sentiebat.

SCHOLIA.

FEMINA (inquit Galenus) *maris imperfectior est,*
quoniam & frigidior: etsi interea partes genita-
les cum venis & arteriis omnibus, per quàm similes
esse videantur, ea videlicet duntaxat differentia, quòd
hæc intus, illa foras promineant. Nulla sanè prorsus
in viris pars est, quæ in feminis eadem per resectio-
nem non videatur: verùm imperfectiora omnia mem-
bra existunt, minùsque calida. Et quamuis mas &
femina principium conferant generationis: tamen
initio generationis, sicut maribus contingit, non pro-
diere partes ipsæ mulieri, virtutis imbecillitate. Sed
expedit vniuerso, imperfectum cum imperfectiori co-
puletur, ex quibus alii progenerarentur. Ita à sum-
mo Creatore constitutum est. Nam si femellæ natu-
ra calidior esset, maris semen protinus feruor absu-
meret:

meret: quod in bonum propterea cessisse videtur, ad generis humani propagationem. Et quia membrum id intus collocatum est, ob eam rationem & testiculos habent & minores & frigidiores; unde semen frigidius ac humidius prouenit, ac pariter imperfectius. Sed matricis situs intus est, cauius, ut semen virile suscipiat, atque contineat: propterea in viris colus figura oblonga est, ut semen longius emittat; quod crassum & calidum esse constat. Hinc duo motuum principia cernuntur: nec tamen alterum sine altero, hoc est, maris semine efficere potest; sed ea pariter misceri atque confundi necesse est: etsi de cetero agere, donec animal perficiatur, tum sanguine menstruo opus est, ad conceptus nutritionem. Femininum semen per se perficere semen nequit, & ex ambobus moribus, vnus exultat communicans motus. Est hoc (inquit idem autor) in gallinaceis conspicuum: concipiunt enim oua, quæ hypneumia dicuntur, hoc est, subuentanea, vel Zephyrina inania oua, sine galli semine orta, quæ fœtum nunquam excludunt, sed incubatu corrumpuntur ocys: album enim ac luteum ex femella habetur: deest tantum gallinacei seminis calidioris perficiens virtus. Ex albo pulli membra cōstituuntur; ex luteo, quo perficitur animal donec excludatur, alimentum capit. Sic in muliere conceptus mensium facultate, donec in lucem edatur, nutritur. Nam & quas molas vocant (de quibus postea) in feminis carnis frustra inertis nature infirma, ouis subuentaneis similes esse putant: ad id vsq; adeo procedere femininum semen volunt. Quod natura, si fieri potuisset, maximè optasset suum opificium esse immortalē, nemini in dubium venit: verum

cum per materiam non liceret (nam quod ex arteriis, venis, nervis, & ossibus, ac præterea carne est compositum, incorruptibile id esse non potest) subsidium quod potuit ipsi ad immortalitatem est fabricata. Propterea mirabilem quandam rationem invenit, quomodo in demortui animalis locum, novum aliud sufficeret, quo nullum animalis genus pereat, sed incolume semper sit, & quasi immortale. Qua de re omnibus animalibus concipiendi instrumenta natura instituit; ad generis, inquam, instaurationem. Hæc cum communia sint, cum viris, tum mulieribus; ea propter, eisdem quandoque oblaſis, contingit, aut viri, aut mulieris, aut utriusque ratione, conceptionis impedimentum; quod quidem sterilitas appellatur.

Sterilitas
quid.

Nam nihil aliud est sterilitas, quam privatio conceptionis, tempore potissimum quo eandem perficere deberet. Pars igitur genitalium, tum etiam membrorum generantium, tam in viris quam mulieribus hæc

Pars affecta. affecta esse potest. Sic etiam in muliere uterus afficitur tamquam concipiendi instrumentum: quod ex eiusdem uteri propria actionis seu usus læsione cognoscitur: ita quoque ut si partes genitales virorum generationi deputate fuerint oblaſæ. Et sic affectus præter naturam sterilitas est symptoma in genere noxa functionum ablatarum, vel in membris generationis virorum, aut mulierum, aut utriusque. Et sic omnino abolita est propria ipsius uteri tamquam instrumenti actio; concipiendi, inquam. atqui cum sterilis est, non concipit eo tempore quo concipere debet. Ita quoque sentiendum de membris viri generationi deputatis, si eorum actio fuerit læsa & abolita. cum & plures huius affectionis causæ esse possint, testis Aristotelem.

Quis affectus præter naturam sit sterilitas.

Causæ secundum
Aristotelem.

tele

tele 2. De generat. animal. cap. 5. Nam & à primo ortu natura locis ad coitum commodis oblaſis, & mulieres & viri redduntur, vt altera non pubeſcant, alteri non barbeſcant. Aliis in proceſſu ætatis idem accidit affectus, aut propter corporis nutritionem pleniorẽ, aut ex morbo. Viris humidum, frigidumq; emittitur ſemen, mulieribus purgationes vitiantur. Sic & Aëtius lib. 16. cap. 26. Sterilitas aut viri, aut mulieris, aut vtriusq; ratione contingit. A viro quidem eſt cùm ſemen eius vel ſeruidũ, & veluti torrefactum, vel frigidum, vel tenue, aquoſum, languidũ, quale decrepitorum eſt, vel craſſius quàm oportet, emittitur; vel quòd viri ſemiſpadones ſint, penemq; breuiſſimum habeant, vt in vulua reſeſſum ſemen iaculari nequeant. quòd etiam interdum nimia obſeſitate contingit: tales enim aded ventricofi euadunt, vt ſemini iaculatio ad profundiores vteri partes impediatur. Iam & qui immodico pene longiſſimoq; procreati ſunt infœcundiores eſſe traduntur; teſte quoque Ariſtot. Ceteris quibus mediocriſ, propterea quòd ſemen frigidum infœcundum eſt: refrigeratur autem, quòd longè admodum fertur. Sic etiam Paulus lib. 3. cap. 74. Neque pingues liberis procreandis ſunt idonei, eo quòd genitalibus mutuo ſe contingere haud poſſint commodè, tum quòd momentum ſeminiſ emittunt. Neque tamen nimis extenuati liberis operam dare feliciter queunt. Ita ex Cleopatra & Moſchione: Maſculi valetudinarij, partes conceptui neceſſarias impeditas habentes non concipiunt; neque frigidi, quibus ſemen extinguitur; nec nimium calidi, aut luxuria ac frequentiore Venere eneruati, & ſine viribus, ac ebriofi. Erotis quoque: Semen viri ni-

Cauſæ cur
viri & mu-
lieres non
generant.

Cauſæ ſte-
rilitatis viri.

mis

332 DE MULIERVM MORBIS,
nis tenue infusum matrici, liquiditate sua, inquit,
foras labitur: & viri testiculos habentes frigidos, ra-
rò aut nunquam generant. ita & spado factus & te-
sticulus carens, non generat. Et sic causæ interna ste-
rilitatem inferunt, testes vitiosi, aut colis vitium, te-
stium abscessus, & simile quid; vlcus, calculi renum
vel vesicæ extracti, & inde natum vlcus, colis longi-
tudo, breuitas, foraminis obliquitas, penis mollities,
conuulsio, vlcus, verruca in meatu virgæ vt semen
eiaculari non possit, qualis à me curatus fuit, vt su-
perius dictum est. Sic quoque noui pistorem, cui penis
à natura aded breuis, vt pollicem non excederet.
numquam is genuit. Tumores itaque præter natu-
ram & penis & testium sterilitatem quandoque ad-
ferunt. Sed inter omnia membra, cerebri infirmitas,
iecoruq; aut renum, sterilitatem adfert. & quibus
post aures vena perfecta fuerint, vesica tum aliis
membris communicatione lasis, non generant: & qui
caphuram quoque ebibunt, aut hyoscyamo cicutave
testes illitos habent, sterilescunt. Ita & virile semen,
si nimium vitiatum fuerit, mulieris temperamentum
corrumpit. Nam vtriusq; sexus nimia distemperan-
tia conceptum inhibet: qui si sortè disiungantur, co-
pulata quadam cum aliis naturæ germanitate, pro-
lem facile suscipiunt. Fecunditatis primariam præ-
rogatiuam possidet naturæ æqualitas & tempera-
mentum. Senectus quoque modò non generat, quod
ex sexagesimo anno plerumq; contingit. Tempestate
tamen nostra, inquit Benedictus Veronensis lib. 25.
cap. 11. quidam Germanus nonagenarius prolem sus-
cepit ex casta coniuge, quem vidimus. Eadem de
Masinissa accepimus. Glaciales aquæ gelida conce-
ptum

ptum inhibent, autore Aristotele. Sic causa externa multa, aërque frigidus aut calidus impense, exercitium vehemens, animique affectus, inærores gaudium, coitus superfluus, tum aquæ potus, ac alia innumera aliquo modo sterilitatem inferre possunt, ut latius apud Medicos tum veteres tum neotericos, videre liceat. Sed nunc precipuas causas adferamus quæ peculiariter ad mulieres pertinent. Mulier (inquit Aërius loco citato) sua ipsius ratione non concipit, quod uterum habeat vel calidum & igneum, vel frigidum & humidum, vel squalentem & aridum, vel carnosum & pinguem, vel excarnatum & gracilem, vel debilem, vel angustum, vel breuem; aut quod vasa eius clausa obstructaque sint, aut cicatricis superuentu excæcata; aut quod membrana ostium uteri obstruentes nullum foramen relinquant; aut quod eiusdem uteri cervix in obliquum ducatur; aut quod ostium sit vel nimis angustum, vel nimis amplum; aut quod quispiam alius affectus eorum de quibus superius diximus, & qui infra dicuntur ab ipso Aërio, vuluam impediat: sed & inuiti concubitus inanes ac steriles sunt: amor enim genituram conciliat; ideo femina amantes creberrimè pariunt. Noui nihilominus aliquas per vim stupratas, semel tantum coeuntes, prima vice inuitas concepisse. Sis Cleopatra: Corpus habentes siccum, & tenues existentes, ac macilentæ, & phibificæ, & contra pingues, crassæ & iracundæ, furiosæ, non concipiunt: partibus autem mulieres impediuntur, quoties non purgantur, aut orificium matricis obductum habent, vel contortum, aut membrana vel aliqua re aliena clausum; aut callositatem, aut duritiem, aut vulnus;

Causæ sterilitatis mulieris.

aut

Ero-
tis.Ex Hippoc.
& Gal. Cau-
sa Sterilita-
tis.

aut si in communicatione viri semen non emittunt. Eros quoque inquit: Habentes matricem leuem & lubricam, semen receptum non retinent: suffocat quoque semen viri aliquando sua humiditate. Verum enimvero in ipsis mulieribus nonnullæ ipsius vteri præter naturam dispositiones possunt esse causæ sterilitatis, & præsertim eiusdem intemperaturæ, quemadmodum & ab Hipp. & Gal. aph. 62. 5. libri scriptum est. Namq. bene temperati vteri ad conceptionem sunt idonei: malè autem temperati si parum à bonitate recedunt, difficulter concipiunt: si verò nimium mulieres steriles fiunt; & proinde mulieres esse fecundas sine ambabus bonis temperaturis est impossibile, ut inquit Galenus in Comment. Appello ambas bonas temperaturas, mediocres scilicet, tum ex calidi & frigidi, tum etiam ex humidi & sicci commixtione; cum fieri possit, ut secundum vnam oppositionem bene temperatus sit vterus, secundum alteram verò malè: propterea Hippoc. dicebat: Quæcunque verò ex utrisque mediocrem habent temperaturam, ea fecunda sunt. Nam ne mulier concipiat, potest altera efficere intemperatura, ut inquit Galenus, modò nimium à bonitate recedat. Hæc enim ubi frigida fuerit immodicè, aded quòd ex ea vterus spissior efficiatur, sterilitatem efficit. Nam angusta quidem erunt supra modum ora vasorum, quæ ad ipsum pertingunt vterum, aded ut neque secunda possint adnasci ad iam dicta ora vasorum: neq. si hoc fiat aliquando, potest bene nutriri conceptus; cum vel nullo modo fiant hisce mulieribus purgationes, vel omnino pauca, & ea ipsa vitiosa, solo tenuiore ac aquosiore sanguine perlabente. His item eadem ora facile ob-
struun-

struuntur, & propter naturam angustiam, & quoniam magna ex parte hæc mulieres humorem aggregant pituitosum, siquidem corpus totum ferè est vtero simile. Ad hæc in talibus vteris contingit etiam maris semen refrigerari, nisi natura sit calidissimum. His itaque de causis vteri nimia frigiditas conceptionem omnino impedit, ac mulieres steriles facit. Ex nimia quoque humiditate vteri mulieres non concipiunt, ut paulo antè dictum est, cum genitura in his extinguatur, quemadmodum in terra palustri cerealia semina; ex Galeni testimonio præcitato aphorismo: calida quoque, veluti calida terra si semina committantur, ut in aestibus sub cane, iuxta eundem. Item sicciores vteri non concipiunt: nam in ipsis tale quid accidit, quale ubi aut arena, aut argillosa terra, aut petrosa mandantur semina, eodem Gal. teste. Pingues nec macilentæ concipiunt. Accidit quoque ex vitiosorum humorum abundantia, quod mulier non concipit, ob cicatricem inductam si vasa fuerint excacata; ob vlcera membranam osculum vteri obstruantem; vel eiusdem angustiam, vel amplitudinem, ut dictum est. Si etiam menses mulieri non omnino prodeant, aut pauciores quàm debent, aut plures quàm oportet, non concipiunt, ex Hippoc. auctoritate lib. De sterilibus. Flatus quoque in vtero existentes impediunt conceptionem, & assumptum pharmacum; coitus inuiti & inanes. Etas etiam vel iunior vel proeclior conceptum intercipit. Propterea nunc primum pubescentes à Venere arcere oportet, ita ut vir trigessimum annum, mulier decimum octauum attingat. Præcipuè verò inepta mulieris forma sterilitati occasionem præstat. Fæcunda enim mulier habere

336 DE MULIERVM MORBIS,
 bere debet proceritatem corporis moderatam, lumborum & suminis latitudinem, nates eminentes, commodam alui molem, pectus angustum, mammillas amplas: eiusmodi mulieres fecundæ; his verò oppositæ steriliores sunt. Potest quidem, præter enumeratas causas, alia quæpiam magis recondita superesse: sed totidem ferè sunt quæ noscuntur. Et sic mulier infœcunda est propter affectus eosdem vteri præter naturam, tum seminis sui, tum testiculorum in ultimis cornibus sitorum: si semen sit calidius, frigidius, siccus, humidus, ob similem corporis totius & partium principium, & potissimum testiculorum. Sic & virago, mulier barbata, audax, virilis, voce graui, infœcunda est: quia calor multus sanguinem dissipat. Meretrices, quibus attritu multo partes sunt callosæ, non concipiunt, vel rarò; cum & lubricæ sint partes, vnde vasa spermatica infirma fiunt. Omnes vteri affectus superius descripti, phlegmone, erysipelas, vlcus, abscessus, cancer, vteri procidentia, scirrhus, fluores muliebres, & alia antedicta conceptionem impediunt; & semen viri ac mulieris diuerso tempore emissum. Intempestiuus etiam congressus causa sterilitatis est, cum conceptionis tempus sit, vel incipientibus vel cessantibus mensibus. Reliquo autem alio tempore toto expurgationis, licet aperta fuerint vteri venarum ora, non tamen tunc concipere mulier vlllo modo potest, cum semen nequeat in vulua remanere, sed ab influentis sanguinis copia eluatur. Cessantibus autem, vel incipientibus mensibus, & ora aperta sunt, & menstruum non multum, neque vniuersum, sed paucum & paulatim effluit; vnde efficitur vt ob asperitatem vuluæ semen adhæreat, satisq; alimenti ex sanguini.

sanguinis confluentis paucitate habeat : ante etiam quam menses veniant , conceptus fieri propterea non valet , quia & alimento caret semen , & adhaerentiam nullam inuenit , cum eo tempore occlusis vasis leuis vulua relinquitur : defluit itaque semen , neque vniri cum tunica eius potest ; siquidem aspera magis idonea sunt quam leuia ad coalescendam , ex sententia Gal. lib. De dissectione vteri , vt etiam à Donato citatur . Nam si leues fuerint vteri , mulier in ventre non concipit , quoniam licet genituram suscipiant , foras tamen emittunt , vt testatur Hipp. eodem lib. De sterilibus.

OBSERVATIO LVII.

Num vir aut mulier sterilis sit , per modum Consultationis.

CVM variæ sint causæ , vir nobilissime , difficultatis imprægnationis , vel sterilitatis , quæris ex me , eò quòd ab vxore tua generosa prolem non suscipias , quamuis ipse ante coniugium proles ex concubinis susceperis , nunquid causa hæc ad te vel vxorem sit referenda . Intellexi autem ex te , coniugem tuam nobilissimam multum iampridem vteri fluori , seu muliebri , fuisse obnoxiam , etiam aliquot annis , ita vt illa ipsa , doctissimorum Medicorum consiliis , thermas naturales accesserit , licet nondum aliquid commodi ex iis acceperit . Ego tamen ex vsu aquæ Porretanæ , nobilem Matronam Bononiensem ex consilio Elidei præceptoris

Y

ptoris

338 DE MULIERVM MORBIS,
ptoris mei charissimi, ob humidum vterum
sterilem existentem, noui tandem concepisse.
Ideo verisimile mihi videtur, quòd ob phleg-
maticas humiditates matricis (vt magna ex
parte fieri solet) vxor tua charissima non con-
cipiat, & quòd causa sterilitatis potius penes
Dominam sit, quàm penes te. Nam & humi-
dum vterum habet, in quò genitura facilè ex-
tinguitur, multoque magis cùm fluore vteri
laboret. Hanc autem temperaturam humidam
vteri, indicant, teste Paulo Ægineta, in coitu
humor destillans tenuiùs, & copiosum men-
struum, multoq. magis album profluuium, ideo
ait Benedictus, Medicus Veronensis insignis,
lib. 25. cap. 12. De sterilitatis & fœcunditatis
notis, quòd illæ quibus alba profluvia fiunt,
rarò concipiunt. Et propterea cùm generosa tua
vxor iis fuerit remediis vsa quæ ad fluore mu-
liebrem conferant, nec ab iisdem adhuc probè
curata fuerit, in dubium vertitur nunquid ab
ea sterilitatis causa amoueri poterit. Et quia hæ
causæ potissimùm impediētes conceptionem
valde sint diuturnæ, ideo & curatu difficiles.
Mulier enim facilè lassatur in sumendis medi-
camentis, & victus rationem strictè obseruan-
do. nam iisdem ad minus per annum esset in-
sistendum. & nunc maximè coniux tua rædio
medicamentorum affecta est, quia iam variis
& multis vsa est remediis, etiam Medicorum
excellentium, quæ nihil tamen profecerunt.
Attamen iisdem adhuc esset insistendum, si re-
ctè curari veller: nam continuata vigent, inter-
cisa

Alia verò pereunt. Ideo imprimis fluor ille albus
esset curandus. natura enim humens à mulie-
ris purgatione ac lubrica si fuerit non concipit;
nam facillè semen excidit. Præterea ante cura-
tionem quidam certis experimentis periculum
faciunt, num mulier sterilis sit, necne. Et ita
sterilitatis, vt tradunt, indicia deprehendun-
tur. In olla hordei plena vrina coniicitur; deci-
mo die quod erumpit fœcunditatem arguit.
Alij fursures imponunt, & vrinam infundunt;
ubi vermes progeniti fuerint, sterilitatem indi-
cant. Mulier pariter circumpositis vestimentis,
subditaque fumigatione, si ad nares nidor de-
fertur, fœcunda creditur ab Hippocrate, ob
aperitas videlicet naturales vias. Nam & virgi-
num futura fœcunditas eodem modo speratur.
Verùm vt sterilitas amoueri queat, causa om-
nium primò auferenda erit; præter ea quæ ad
uorem muliebrem valere scribuntur. Hic ita-
que & vteri ratio huius nobilissimæ Dominæ
habenda est, & ideo cum eius humiditas causa
sit, quo minus concipiat, aridioribus alimen-
tis (vt Aëtius etiam docet) vti oportebit: pluri-
mum exerceri ac perfricari: & euacuationis
conuersionisque causa interdum pransam, inter-
dum ieiunam euomere; & cibi parsimonia de-
stinari, carnesque potius rostas vigentium ætate
animalium, quàm elixas, ac pisces solidiores
comedere, vinumq. potens meracius quidem,
sed parcius bibere. Arida præterea fomenta
rebrò, at balnea perquàm rarò adhibenda sunt.
Qui verò statim à principio desiccantia & ad-
strin-

340 DE MVLIERV MORSIS,
stringentia vtero apponunt, non parum laedunt.
Cohibita enim materia ad principes partes re-
currit. Sed vbi totum corpus purgatum fuerit,
tutius deinceps vtero adstringentia & firman-
tia medicamenta applicabimus. Verum cum
& his adsint pituitosi humores, laboribus qui-
dem, vt etiam Paulus suadet, vacuare, sudori-
bus & vomitu, vel per inferiora, expediet. Et sic
materiam pituitosam prius paratam cum deco-
ctis calfacientibus, mox educemus cum dia-
phœnico, agarico, & similibus, vel pilulis fœ-
tidis, & de agarico, añ. 3 ℥. vel cum Indo maio-
re. deinde post euacuationes conuenientes, dan-
da erit 3 j. theriacæ, & conueniunt medicamen-
ta descripta apud Guainerium & Fontanum
lib. 3. morb. inter. cap. 27. De œdematis vteri cu-
ratione. Quæ valde calfaciunt, & potissimum
quæ exsiccant, egregiè his conueniunt. Nam
& Paulus ex medicamentis epithymum, eu-
phorbium quoque, piper, dauci semen, petro-
felini semen, omnia contrita denarium duum
pondere potui dat. Sed modum pro corporis
viribus, propter euphorbium, obseruandum
putamus. nam humorem alui turbat, & vte-
rum validè calfacit. At medicamentum ex aloë
picra satis erit, etiam à Galeno commendatum
ad fluorem muliebrem. vel dentur turpeti se-
lecti ʒ ij. ℥. sacch. 3 ij. redigantur in puluerem,
qui iure cicero rubrorum exceptus appetente
diluculo sumatur. valent & hîc quæ ad hydro-
pem vteri valere Veteres scripserunt. At cor-
pore bene purgato, resiccantia ac astringentia
commo-

commodè vtero applicantur. Huiusmodi sunt, inquit Aëtius, lentisci decoctum, item myrti, ros. foliorum rubi, vel tenerorum virgultorum rubi, rhus coriarij, mali punici, florum & gallarum, pillularum cupressi: ex quibus infusus, irrigationes, fots, cataplasmata, iniectiones, pessi formari poterunt. Adhibet idem & malacotonea similiter palmulis excepta. Ad nimiam quoque vteri humiditatem huiusmodi portiones conueniunt: Myrti baccas, aut malicorium punici dulcis cum vino terito, & exhibeto: aut auellanas nuces vstas, cum vino tritas propinato, ex eodem auctore. Interea vtendum iis quæ propriè ad conceptionem faciunt, quibus antiqui utebantur; vt pastinacæ erraticæ foliis, vel semine. Leporis vterum aridum tritum vtrique dari iubet idem Aëtius. quin ad vuluæ fluxiones feminisq. incontinentiam cerebrum leporis assum assumunt. iam & leporini coaguli, ac eiusdem fimi pares portiones ex melle coguntur in pessos. Donatus pro remouenda sterilitate pluribus vti consuevit, potissimum vbi orta sterilitas non fuerit ex immodico vteri calore; id quod perrarissimè accidit: quorum primum est: R. testiculi apri siluestris exsiccati in vmbra, scobis eboris, añ. ʒ j. testiculorum vulpis ʒ j. β. matricis & coaguli leporis, añ. ʒ ij. sem. melon. ʒ iiij. cum saccharo dissoluto in aqua ros. & melissæ fiant morsuli. Vel: R. sem. feselios, scobis eboris, & matricis leporis in vmbra exsiccata, añ. ʒ j. diambra seu eclegmatis de xyloaloe ʒ j. β. cum saccharo in aqua ros.

Y 3

disso-

342 DE MULIERVM MORBIS,
dissoluto figurentur morsuli quibus vtatur mu-
lier cum paucō vino albo aut aqua melissæ seu
florum citrangulorum, per plures dies, ante viri
congressum: quo etiam tēpore pessi adhibean-
tur ex coagulo, matrice & stercore leporis, ca-
rycis pinguibus, adipe anseris, paucō croco, aut
moscho, figurati; qui etiam in linteo serico in-
uoluti, & oleo itino, seu liliaceo intincti sub-
dantur. Habemus & portiones, & pessulos, &
suffumigia innumera apud Aëtium lib. 16. cap.
33. Sed hæc pauca remedia nunc dicta suffi-
ciunt. Interim vngula aromatica, spica, aut cy-
perus eisdem permisceri poterit. A quibus, desi-
nentibus iam mensibus tempore (quod tempus
optimum est) mediō, mutuo amore (nam amor
genituram conciliat, vt inquit idem Aëtius)
Venus incunda est. Sed & virum strenuam
operam nauare oportet; interimque à Venere
abstinuisse, & boni cibi succis nutritum esse, ex
eiusdem Aëtij decreto; corporisque temperies
tum viris tum mulieribus seruanda, & sine
omni excessu. Atque his puto me satisfacisse
tuæ petitioni, Vir nobilissime. Faxitque Deus
optimus maximus, vt his remediis aptis vxor
proles ex dulcibus amplexibus, quique Vene-
rem & amorem incitant, assequi possit. Vale,
10. die Feb. anno 1570.

Petrus Forestus, reipub. Delphensis
Medicus, tui obseruantissimus.

SCHO-

SCHOLIA.

CAUSIS sterilitatis Scholio precedente enuclea-
tis, harum signa diligenter excutienda sunt,
antequam vera curandi methodus instituat. Ve-
rum cum aliqua causa ad virum pertineat, alia
verò ad mulieres; de viris sterilibus, & quomodo co-
gnoscat, primò dicemus; deinde verò de mulieribus.
Effeminatū virum sterile iudicabimus eum, qui timi-
dus existat, actusq; muliebres plurimos habeat, & vo-
cem muliebrem; quales eunuchi sunt, barba carentes,
& frigidum temperamentum habentes, quod partes
circumpositæ testibus glabræ cōmonstrant. Sterilita-
tis plerunq. indicia sunt, si semen genitale frigidū sen-
tiatur, & tardius exeat; pauca adsit voluptas, nullaq;
coitus appetentia. nam quibus colis rix tumet aut eri-
gitur, totumq; membrū sit remissum, piliq; sunt exi-
les, vel glabrities est circa testes, quiq; rubore in cœtu
mulierum suffunduntur, imbarbes, tales intempe-
riem frigidam testium habent. Quibusdam testiculi
cōulsi sunt, paralytici, ulcerati. Aliis maligna aliqua
agritudo præcessit. Quibus & vena circa aures præci-
se, aut qui in principe aliquo membro agritudinem
tibi notam habeant, vel antea passi sint, vel quibus ni-
mis brevis est virga, vel nimium extensa, aut fora-
minis adest tortuositas, vel ex quibus lapis chirurgia
extractus, testesq; intus latent, vel partes genitales
ignave sunt; quæ omnia visu vel relatu agri cognos-
ces, quæq; ex penis ac testium (de quibus antea di-
ctum est) propriis locis petenda sunt; ij, inquam, num-
quam, aut raro generant. Sterilem verò, qui ex sorti

Signa steri-
litas, quæ
ex viro su-
muntur.

aut potenti calore suo generationis materiam exterminat, ex habitudine eiusq; robore comprehendens: ac eum pariter qui pinguedine nimia sterilis factus est. Nam ab excessu sex rerum non naturalium, tum ex agri ac astantium sermone, diligenti examine plura innotescunt. Calidius siquidem temperamentum viri facile deprehenditur ex pilorum copia, potissimum verò nigrorum in partibus genitalibus, & omnibus quæ circumstant, supra quidem vsque ad media femora. Petulca est etiam hæc temperatura, & ad libidinem prona: statim verò satiatur. Reliqua vide de testium temperatura, apud Galenum in Arte parua, & De sanit. tuenda, & Method. medendi. At verò mulier sterilis dicenda, cuius crassa vox est, piliq; multi & duri rigidiq; pubem obsepiunt, mystacem mentumq; barba circumdat; quæq; plurimorum virorum amplexus experta est, neque concepit. Vterorum frigiditatem coniectamus ex suppressis mensibus: neque enim præ nimia crassitudine commodè feruntur: sed & stupidus sensus circa pectinem, lumbos ac crura percipitur. aliqua etiam crurum impotentes sunt, victus quoque præcepsit frigidior, ac crassi succi. At si prorsus perfrigerata fuerint, ne Venerem quidem appetunt; uteri osculum contractum habent, vt ex Aëtio cap. 27. lib. 16. & Paulo cap. 78 lib. 3. liquet. Menses his aut suppressuntur, aut parcè fluunt; suntq; decolores, & menses albicantes, non rubri; fluxiles & aquosi, à liquidiore pituita. Coniectatur autem uteri caliditas ex reliqui corporis caliditate; & ex mensium paucitate cum dolore prodeuntium; ita vt pudenda mulieris exulcerent; sed & quæ prodeunt nigriora sunt, & ob
nimiam

Signa ex
parte mulie-
ris.

Signa vteri
frigidi.

Calidi.

nimiam puncturam nullum ordinem seruant. Sequitur etiam ad hanc temperaturam insignis salacitas, & totius corporis siccitas, celeris excretio seminis: his adest audacia, ira, sitis inexpleta, & ad omnia promptitudo; pulsus celer, vrina flaua, menstrua pauca, crassa, calida, flaua, aut ex adustione nigricantia. Signa humidi iam diximus Obs. precedente Humidi. & quomodo curetur. Adest videlicet hic saepe vterinus fluor, frequens lumborum & pubis grauitas. Arabes addunt pilos molles, Venerem sopitam: quæ si conceperint, in incremento foetus abortum patiuntur; habentq; oculos lachrymosos a siccitate, vt Erotis ait. cum enim matrix cerebro per neruos alligata sit, necesse est vt cerebrum matriçi compatiatur. Vnde si matrix nimiam in se habet humiditatem, ex ea cerebrum impletur, quæ ad oculos redundans, eos inuoluntariè cogit emittere lachrymas. At in vtero sic- Sicci. cior humor in coitu ex eisdem haudquaquam destillat: exiguum quoque ac crassum erit menstruum, aderitq; totius corporis exsiccatio. paucus enim adest mensium fluxus, os siccum, labra scissa; coitum appetant, vt sicca terra rorem; facile irascuntur, corpore tenues sunt, in actu Venereo nihil fere seminis emittunt. Si quando verò prædictæ simplices temperature inuicem misceantur, ex earundem indicis manifesta erit earum commixtio. Et ita frigidior & humidior ostendet reliquum corpus molle, tactu Frigidior & humidior vterus. frigidum, aliosum, fluxus muliebris, perpetua vuluæ humiditas in coitu, plurima, & viro molesta, semen aquosum, quod nequit continere; menses multi, fluxiles, aquosi; facultas retentrix imbecilla ob frigiditatem & humiditatem; vnde facile abortiunt, teste

Y S

Hipp.

Hipp. Frigidiorē & ficciorē indicant menses pauci, rari, crassi, semen paucū, appetentia coitus maior, quā in precedente; os vteri collum siccum, & ob siccitatem rhagadibus obnoxium. vide aph. 57. lib. 5.

Ex abundantia humorum.

Si simul ex abundantia humorum vitiosorum, dignosces ex iis quæ de mensium suppressione scripta sunt. Breuiter, si ex sola causa calida sine humore, id per calorem in fundo vteri, per punctiones oculorum, palpebrarum, & amaritudinem oris, sitimq; continuam percipies, & per exiguam mēstruorum educationem, per appetitum coitus & delectationem.

Signa si à pinguedine, vel nimia macilentia.

Si cum humoris vitio, aderit pondus & grauedo, & ita in reliquis ex gravitate, cum signis prædominantis ipsius humoris, de quibus ad nauseam iam sæpe dictum est. Si enim ex pinguedine, vel nimia macilentia, ex te ipso dignoscere valebis. Pingues enim, ut diximus ex Paulo, liberis procreandis non sunt idoneæ, eo quod genitalibus mutuo se contingere non possunt. Macilenta momentum seminis tantum emittunt, neque extenuata materiam habent. Crassarum habitudo facile nota est: è pinguedine enim comprimuntur, & eorum orificia clauduntur. A flatu vteri etiam conceptio impeditur, quem insequitur pectinis & imi ventris tumor, extensio, dolor pungens, etiam ventus inde erumpens, ut antea de spiritu incluso dictum est prius. At si per aliquod assumptum pharmacum, vel pessos injectos, mulier non concipiat, ex eiusdem mulieris loquela, aut astantium, percipies. Si locellorum vitio eueniat à carnis excrecentia, tuberculo, resolutione, conuulsione, ulcere, apostemate, aut quouis alio vteri vitio, ex propriis locis cognoscuntur. Ita quoque si ob mem-

A flatu.

Ab assumpto pharmaco.

Ex vitio locellorum ac vteri.

branam

branam osculum vteri obthurantem fiat, vel ob nimiam eiusdem angustiam, vel amplitudinem, vel quod ceruix vteri obliqua sit, ex obstetricum relatione tum mulierum querimonia percipies. Quibus addas experimenta per aromata, iuxta Hippocratem præcedente Observatione dicta, & apud Gal. Comment. aph. 62. lib. 5. Vel allium expurgatum pesti modo dormitura subdatur: si odor vel sapor ad os pertingat, fecunda est: sin minus, sterilis. Hæc ad prognostica pertinent. Si medicamenta sterilitatem inducentia vasa vteri excacant, incurabilem plerumque affectionem faciunt: licet quedam potiones cecitatem curabilem inducant, cui si protinus subvenias mederi possis, ex Aëtij testimonio. Quod verò quæcunque præter naturam crassæ sunt, priusquam extenuentur non concipiunt, quod omentum iis os vteri comprimat, constat ex Hipp. auctoritate aph. 64. lib. 5. & aph. 44. lib. 5. Præterea menses iis pauci feruntur, quod potissima alimenti pars in pinguedinem conuertatur, ut Aëtius refert. Quæcunque præter naturam tenues existentes vterum gerunt, abortiunt priusquam crassescant. Quapropter prius eas rescicere oportet. Atque hos duos habitus præter naturam sterilitatem efficientes ex te ipso facile dignosces. Similiter ex Galeno liquet quod malè temperati vteri, si parum à bonitate recedunt, difficulter concipiunt; si verò nimium, mulieres steriles fiunt. Si vlcera in vteris fuerint etiam oborta, & si menses sano modo prodeunt, plerumque incurabilia sunt: & propterea in ventre tales non concipiunt, quàm diu vlcera habuerint; ex sententia eiusdem Hipp. citato lib. De sterilibus. Mulier puerpera, vel quæ vte-

Signa prognostica.

rum

rum gerit, sepe sanior est, iuxta Auic. sed imbecilla
 & cito senescit. Serilis contra est valetudinaria, ve-
 geta diu & florens. Si mulier post menstruam pur-
 gationem humida manet, in vtero lubricat semen.
 Quae uteros habent calidos, frigidos, humidos, siccos,
 non concipiunt nisi ex contrario semine; aph. 72. lib.
 5. Nec viri qui semen habent calidum, frigidum,
 humidum, siccum, generant, nisi in contraria vteri
 temperatura. Galenus tamen hunc damnat aphor.
 asseritq; non esse Hippoc. Sterilitas ex occacatis ori-
 ficis vasorum in vtero, & in vteri paruitate, penis
 breuitate, longitudine, insanabilis. Ex lapide dissecto
 curatu difficilis, nisi roborantibus partem emende-
 mur. Os vteri durum, callosum, compressum, quia
 claudt exacte nequit, conceptum impedit, aut si clau-
 so eo conceptus sit, partum, quia dilatari nequit, sup-
 primit. Durum autem sit aut à tumore præter natu-
 ram, ut dictum est ex Hippocrate, Quibus os vteri
 durum est, &c. aut à frigore; ex mora longa in aqua
 frigida, aut sessione longa supra lapidem: aut à ci-
 catrice, post continuitatem solutam: à partu diffi-
 cili, vel defloratione puellæ iunioris: à balano penis
 enormiore. Quæ duos aut tres menses à Venere ab-
 stinent, conceptui aptiores euadunt; & viri conti-
 nentes aliquamdiu generationi. Ait Gordonius, si se-
 mina vtriusque prouocantur in vas plenum aqua fri-
 gida: si supernatet, sterilis est; si fundum petat, fœ-
 cunditatem arguit. Hemorrhoides & excrementa
 in vtero non videntur recipere curationem; nec fora-
 minis tortuositas virgæ virilis, & paruitas virgæ no-
 tatu digna curationem non admittit. Mulier quoque
 cicatrice è vulnere obducta non curatur: & si concipi-
 at,

piat, metus est de morte matris, cum collum dilatari non possit in foetus exitu, ita ut oporteat chirurgia aperire, non sine vitae periculo. Sterilitas vel difficultas impregnationis ex verruca, apostemate duro, cancro, non curatur, quia causa remoueri non potest. Sed ob fluxum menstruorum assiduum, vel retentionem, curatur per eorundem curationem. Quae ex lubrica vulua, difficulter concipit, ex leui causa abortit. Vidi tales quae quatuor vicibus admodum breui tempore abortum passae sunt. Caucant sibi a statione, multa vociferatione & forti, a pondere eleuando, cibis vinctuosis, vtantur exsiccantibus. Ad 60. annum mares plurimi gignunt. compertum tamen est (vt superius diximus) ad 70. nonnullos ad 75. & 80. sobolem procreasse, sed perpaucos, & valentissimos. Quin etiam Masinissam regem post 86. annum filium, quem Methimathuum appellauerit; Catonem Censorium octogesimo exacto e clientis sui filia Salonij, generasse clarum est. Mulieres vero ad 45. magna ex parte foetificant: etsi nonnullae annos sexaginta natae, validiores tamen, pepererint. Noui mulierem, cum in Gallia essem, quae anno aetatis 53. peperit, quae adeo foecunda dicebatur, vt 23. proles pepererit. At viri (teste eodem Aetio) qui ob deprauatam viuendi rationem semen corrumpunt, ad magis compositum salubrioremque victum conuersi geniturae foecunditatem acquirunt. Verum qui alienis feminis oblectati cum propriis vxoribus non conueniunt, seruata pudicitia generabunt. Qui seminis fluore laborant, curati foecundi fiunt. Sic nouimus mulieres alias sexdecim annis viris copulatae, alias octodecim annis quasi steriles, tunc prius concepisse. Ita noui & honestam

Curatio.

Frigidi vteri
curatio.

nestam matronam, quæ cum ex primo viro non concepisset, postea alteri valde sæcundo nuptam, neque tunc sæcunda fuerit: verum tertio marito copulata, tunc demum concepit. Quod ad curationem attinet, vnicuique causæ suæ propria debetur curatio. Si ex mala intemperie, ea ipsa auferenda erit contrariis, eaq; inclinanda seu flectenda ad oppositum temperaturæ sui paræ. Si simul adsit humor, usq; concoctus, purgandus erit. Si verò aliud vitium vteri fuerit, hoc ipsum propriis remediis remouendum. Nudæ intemperiei sufficiunt alterantia & roborantia. Iam dictum est quomodo curantur si ob humiditatem vteri non concipiant. Si ex frigidityte, vniuersa victus ratio ad calidum vergat: cibi sint boni succi, attenuantesq;, ac omnibus alimentis admisceantur, quæ purgationes irritare possunt, veluti sunt olera odorata & acria; scandix, inquam, crythmon, fœniculum, gingidium, apium, smyrnium, tum alia: ac speciatim victum præscribendo, qualem diximus de menses suppressione ex frigidis succis. Reuocabimus & calorem fomentis, & potionibus, iuxta Aëtium lib. 16. cap. 26. ex castorio, cumino, aniso, pulgione; & lumbos inungemus irino & amaracino vnguento; & pessis utemur è myrrha, ruta, galbano, & castorio. Vel validioribus etiam, felle bubulo adiecto, molli lana inuolutis, vt sine corporis erosionem attractionem perficiant: neque difficile est eorum quantitatem metiri. Pro affectuum magnitudine, & diuturnitate medicamentorum, vires augebimus, eisdemq; insistemus, vel contra minuemus, breuiq; tempore applicabimus. Sunt tamen sæpe causa impediētes conceptionem vt plurimum diuturnæ: ideo obnixè persua-

persuadendum ne mulier, aut vir, si in causa sit, citò
 medicamentorum tediis afficiantur aut lassentur; &
 curandum ne Medicus in iis administrandis deficiat.
 nam res aliquando eò deuenit, vt per integrum an-
 num vel duos, vterque desistere non debeat; vti Va-
 lescus rectè annotauit. Verùm vbi frigidi etiam &
 crassi succi cum frigida vteri intemperie redundarint,
 post eorum coctionem ac preparationem, purgante
 medicamento vacuandi sunt: quorum copiam etiam
 loco iam citato inuenies, tum apud Aëtii loco citato,
 & cap. 31. Laudat is & vomitum per interualla;
 postea adhibet iam dicta: qualia & Paulus etiam
 præscribit, vt ad longum videre licet lib. 3. cap. 74.
 Verùm si caliditas vteri sit in causa, humidiora ali-
 menta conueniunt; vt malua, lactuca, bliti, cucur-
 bita, atriplex, portulaca, cucumeres, vinum album
 & dilutum, somnus, ac dulcium aquarum balnea.
 Lumbis verò ac sumini refrigerantia adhibenda
 sunt; vt solani aut vmbilici Veneris succus rosaceo
 admixtus, ac lana exceptus; quem etiam in sinum
 pudoris vtiliter imponemus: mercurialis præterea
 lumbis & pubi illita calidioribus vteris confert. Idem
 potest spuma argenti; & cerussa, si ex aqua teran-
 tur: quorum omnium quantitatem, inquit Aëtius, re-
 ctè metieris, si semper singula quæque multum posse
 arbitreris: ita enim refrigerationis nimietatem ca-
 uebis. Quòd si cum calida vteri intemperie, calidi ac
 vitiosi redundarint succi, iidem etiam prius purgan-
 di sunt, concoctis ipsis ac preparatis, seu à natura
 deuietis; vt exemplo mox ostendemus. Nam quoad
 menses morboosi fuerint, siue biliosi, siue pituitosi ex-
 isterint, mulier non concipit, vt liquet ex Hippoc.
 eodem

Si ex calidi-
 tate vteri,
 curatio.

Si propter
siccitatem
uteri, non
conciat,
curatio.

352 DE MULIERVM MORBIS,
eodem lib. De sterilibus. Mulieri verò qua ob uteri
siccitatem non concipit, constat ex Aëtio lib. 16. cap.
30. humidiora alimenta offerenda esse: toto enim
corpore humefacto, uterus quoque eiusdem qualita-
tis particeps erit. Valentq; balnea, inunctiones, cata-
plasmata, infusiones, & omnia humectandi vim
habentia. Sed, antequam ad alias causas amouendas
procedamus, exemplum sequens interponamus.

OBSERVATIO LVIII.

*De difficultate imprægnationis in duabus
mulieribus, una pituitosa, altera
biliosa.*

QVIDAM differentiam faciunt (ut Guai-
narius) inter sterilitatem & difficultatem
imprægnationis. Voluntque, sterilitatem esse
dispositionem quandam à generatione vel tem-
pore acquisitam, per quam vir siue mulier ad
producendum sibi simile impotentes sint. Im-
prægnationis difficultatem aiunt esse disposi-
tionem in viro aut muliere ex tempore aut à
principio generationis acquisitam, per quam
etsi eo tempore ad sibi simile generandum im-
potentes fiant; tamen beneficio Medici, vel
alia re, talis impotentia remoueri potest. Vide-
mus enim aliquando quòd habitudinis disso-
ciatio, sterilitatis, vel potius imprægnationis
difficultatis, principalis causa existat. Hinc, ut
diximus, bis coniugio copulati viri, aut mulie-
res, primo sæpe sunt steriles: si inde vir cum se-
cunda

cunda copuletur, generabit aliquando; aut mulier secundum nupta concipiet. At quamuis propter causam corrigibilem, difficultatem imprægnationis vocant, easdem tamen causas cum sterilitate ponunt; vt Guainerius facit in suo Commentariolo de ægritudinibus matricis: de quibus nunc satis tam ad virum quàm mulierem pertinentibus diximus. Interea tamen si vitrumque sterilem nouerimus, procreandæ prolis nulla spes habebitur: eorumque curationem relinquimus: quamuis vna haberi potest, si fiat coniugij mutatio, vt contingit in maleficiatis. Quòd si sola mulier in causa fuerit, diligenter eandem considerabimus. Ita istis diebus mulier pituitosa cùm ob humiditates & succos pituitosos imprægnari non posset, consultandi causa me accessit. Signis iam probè inuestigatis, cùm intemperies minimè simplex, frigida & humida, vteri adesset, verùm etiam cum humoribus pituitosis; consului vt hoc apozemate digerente, vel simili, primo vteretur: & rad. brusci, asparagi, fœniculi, cyperi, rubiæ tinctorum, añ. ʒj. artemisiæ, betonicæ, sabinæ (quia aderant humiditates pituitosæ instar fluoris albi) menthæ, melissæ, maioranæ, añ. m. j. rad. inulæ, asari, añ. ʒij. sem. anisi, seselis, dauci, añ. ʒj. flor. anthos, stœchados arab. añ. p. j. calami arom. incisi ʒij. passul. ʒj. glycyrr. ʒij. fiat decoct. in aqua communi pro lib. j. β. dulcoretur saccharo & melle; fiat ad modum syr. longi, & arom. cum paucis cinnamomi & nucis moschatæ. Materia parata purgetur cum pilulis fœtidis,

Z

dis,

354 DE MULIERVM MORBIS,
dis, dando ʒj. vel cum diaphoen. & elect. Indi,
añ. ʒ iij. ʒ. cum aqua artemis. ʒ iij. Vel detur
diacarthami solidi ʒ ʒ. in tabul. A ventris de-
iectione quidam & hñc balnea naturalia com-
mendant: quæ si desunt, fiant ex herbis iam di-
ctis, & radicibus; vt de superfluitatibus, humi-
dis matricis, & fluore muliebri antea diximus.
In exitu detur ʒj. theriacæ. & vbi non amplius
fluunt humiditates, tunc vtendum exsiccanti-
bus, adiectis in balneo balauſtiis, mentha, cor-
ticibus olibani, mastiche: fiantque pessi ex
myrrha, alumine, aloë, & storace calamita.
Deinde veniendum ad ea quæ matricem præ-
parant ad conceptionem, vt fumigia ex lada-
no, myrrha, galbano, baceis lauri: quorum cõ-
piam inuenies apud Guainerium De iis quæ
extra admota ad conceptionem præparant.
Habet idem multa remedia, sed superstitiona.
Etiam eo tempore quæ ad coitus delectatio-
nem faciunt non omittenda: qualia diximus ad
Venerem sopitam conuenire, & virgæ erectio-
nem; vt sunt oscula suauia, suctio labiorum,
amplexus iucundi, & alia apud eundem Guai-
nerium descripta cap. 24. quibus etiam simpli-
cia Venerem instigantia addere possemus, vt
apud eundem Medicus domesticus legere po-
terit. omnia hñc recensere non opus est. Ideo &
hñc auxilia tam viris quàm mulieribus commu-
nia adhibenda, vt corpora in quodam tempe-
ramento, cibo, exercitationibus, seruentur. In-
uant calefacientia; ex oleribus, cruce, erysimon:
vitanda ruta, & calamintha. profunt & redo-
lencia

lenticia olera, scandix, marathrum, apium, smyr-
nium. Cōceptus adiuuare creduntur pastinacæ
erraticæ folia & semen, & cancalis potus. Ma-
rem præterea concipi putant, si vulua leporis in
cibo sumatur, & testiculis & coagulo epoto. Al-
tera verò mulier biliosa, cūm difficulter impræ-
gnaretur, me quoque consuluit. hæc enim pro-
pter humiditatem biliosam, cum acrimonia ex
succis biliosis concipere non poterat. Cūm le-
uiter plethora, sed exigua laboraret, vt venam
ex talo seu saphena incideret iussi, sed in exigua
quantitate. at si sanguinea fuisset, & maiori ple-
thora laborasset, venam prius basilicam, deinde
ex talo incisam, magis commendassem. Qua-
lia autem sanguineis conueniant, quæ difficul-
ter imprægnantur, vide apud Guainerium li-
bro citato, cap. 27. Ceterū in hac muliere, vt
materia biliosa victu humectante & refrigeran-
te moderatè contemperaretur, præcepimus: iis
adhibitis quoque quæ præcedente Scholio dixi-
mus caliditati vteri conuenire. Interim cum
syr. & decoct. ex viol. lactuc. end. scariola, &
similibus materiam paratam euacuari iussimus
cum cassia & manna & syr. ex infus. ros. pallid.
cum rhab. modò etiam cum pillulis de rhab. &
aggreg. deinde & corroboratione facta cum
tribus sant. & similibus. Etiam si balneo vii
vellet, quale descripsi de fluore bilioso, con-
cessimus; & vt hoc pello vteretur, qui proprie-
tate sua abundantem in superfluitatibus bilio-
sis matricem ad conceptionem præparat: Re
medullæ cruris vituli, cerebri cerui, butyri vac-
cini,

356 DE MULIERVM MORBIS,
cini, adipis caprarum, seminis mercurialis, añ.
ʒ β. acaciae, hypocist. sandal. rub. storacis liqui-
da, cornu cerui vsti, añ. ʒ ij. cum oleo ros. in-
corporentur, & fiant pessi filo appenso, vt ex-
trahi possint. Deinde adhibeantur ea, quæ ab
autoribus descripta sunt valere ad conceptio-
nem. hoc tamen semper præmonito, quòd mu-
lieres, quas ad conceptum facilitare volumus,
sint curandæ euacuando medicamentis leuiter
laxantibus, abstinendo ab opiatis resiccantibus
multum & semen absumentibus. Sunt autem
nutriendæ alimentis Venerem excitantibus, quæ
tardiores sunt. Hoc tantum (vt dicebat Ron-
deletius) remediis addere oportet, quòd eis
peffaria alia conficienda sunt post exactam vte-
ri purgationem, os vteri interius dilatando (mi-
nus tamen in biliosis, vbi acrimonia humorum
adeft) exterius constringendo. Dilatatur au-
tem vterus vnguento ex adipibus à Rondele-
rio descriptis cap. De mensibus retentis, aucta
dosi rad. iridis, & additis ʒ ij. styracis, & ʒ j.
tereb. abietis. Sed magis in frigidis, & post
vsum illius vng. vtitur nascali, seu pessò ex fel-
libus hirci vel lupi cum moscho, castorio & zi-
betto. Hæc enim omnia laxant, & vterum deor-
sum trahunt, calfaciuntque, Venerem stimu-
lant, vt & stercus murium. minus tamen, vt
diximus, in biliosis. Exterior pars constringi-
tur fotu parato ex rad. herbis, floribus, & aliis
constringentibus odoratis. vt: & rad. bistortæ,
quinquefolij, & cyperi, añ. q. j. ros. rub. cum
calicibus, corticis mali granati, & balaustio-
rum,

rum, añ. ʒj. suberis ʒß. hederæ m.j. fiat deco-
ctio in aqua & pauco vino adstringente. Fouea-
tur pars in introitu lecti. Post mensium purga-
tionem, & vsum aliorum remediorum, paulo
antequam congressura sit cum viro, quia ma-
gna ex parte mulieres non concipiunt, cum se-
men non trahunt, aut tractum non retinent,
emplastra supra vterũ & renes ponenda erunt.
His quæ non trahunt semen, emplastrum ce-
roneum, & alia quæ ex gummis aliisque attra-
hentibus conficiuntur, erunt ex vfu. His verò
quæ non retinent, emplastra constringentia,
vtcunque calida, quale est comitissæ, pro ma-
trice, de pelle arietina, de mastiche, additis rad.
bistortæ ʒij. ladani, hypocisthid. añ. ʒj. Misce,
fiat emplastrum; quod gestent, donec apperat
tempus alterius purgationis. Eo enim tempore
amouenda sunt emplastra astringentia, ne men-
ses retineant; nisi in quibus maior sanguinis
copia fluit, quàm pro corporis habitu conue-
niat. Si mulier non concipiat ob salacitatem,
& nimiam ad Venerem propensionem, quod ob
acrimoniam seminis, & caliditatem fit, vt in
hac vltima nostra muliere, alenda est crassis ali-
mentis, quæ sanguinem inspissent, & semen
crassius reddant. Vfus fructuum est vtilis; vt
pirorum, pomorum, castanearum, quæ crassos
humores, & crassos gignunt flatus, impetum-
que illum retardant. At stuphis vtuntur mulie-
res humidiores; balneis verò durum habentes
vterum, aut frigidum: sed his vtendum paulo
antequam fluent menses. Si mulieres sint val-

358 DE MULIERVM MORBIS,
de obesæ, extenuandæ sunt vsu medicamento-
rum calidorum, & incidentium, & aperien-
tium; & tenui victu diu, antequam vrantur re-
mediis supradictis. Postea illas optimis cibis,
multumque sanguinem generantibus, oportet
rursus nutrire; & imperare frictiones, cucurbi-
tas, aliaque remedia, quibus vsi sumus ad san-
guinem deorsum trahendum. In illis constri-
gitur os vteri, si credimus Hippocrati ab epi-
ploo, quod ad os vsque pubis descendit. In fri-
gidioribus ergo & humidioribus mulieribus, vt
in priore hac nostra muliere, vtile erit vti hac
opiata, siue humiditas sit in toto corpore, siue
in vtero tantum: ꝛ conser. iring. & cort. citri,
añ ʒj. conser. anthos, zinz. conditi, añ. ʒj. ꝑ.
cineris priapi tauri, & cineris vteri leporis, añ.
ʒꝑ. pul. diagal. diamoschi dulc. vel diambrae,
añ. ʒij. pinear. & auellan. añ. ʒiij. sacch. pa-
rum; cum syr. conseruat. cortic. citri fiat opiata:
de qua capiat ad magnitudinem auellanæ lon-
gè à pastu, cum ibit dormitum. Hæc opiata
magis conuenit frigidis & humidis toto cor-
pore. Nam si vterus tantum frigidus & humi-
dus sit, & totum corpus calidum & siccum, sa-
tius erit fumigio per embotum recepto exsicca-
re, ex odoratis resiccantibus & leuiter adstrin-
gentibus. vt: ꝛ nucis moschatae, macis, benio-
uini, styrac. añ. ʒij. castor. ʒꝑ. aliptæ moschatae,
vel galliæ moschatae ʒij. caryophyl. ladani pu-
ri, añ. ʒj. zinz. cinnamomi, folij spicæ nardi,
añ ʒij. excipiantur omnia terebinth. & fiant
trochisci, quibus fumigetur manè & serò post
men-

menſium purgationem. Illis opiata utilis erit,
ſi augeatur doſis pinearum & auellan. in lacte
ſimul, & pauco melle mixtis; ſubinde remo-
uendo lac, ne aceſcat, & recens infundendo.
Talis reficiet corpus exſiccatum, & copiam ſe-
minis generabit. In iſtis opiatis adduntur mul-
ta alia exſiccantia, quæ ſi per ſe ſicca aſſume-
rentur, potius impedirent, quàm iuuarent. Sed
quia permilcentur ſyr, & rebus dulcibus tem-
perantur, conueniunt: & raſura eboris, & cor-
nu capræ, ſemen ſeſeli, medulla ſeminis fraxi-
ni (linguam auis vocant:) addentur & paſſe-
rum cerebella, quamuis magis in cibo ſint aſ-
ſumenda, quàm vt præmiſſis miſceantur. Nam
iuiuant, quòd multum ſeminis generent: id non
poſſunt facere, ſi in pauca quantitate aſſuman-
tur. Satiuſ erit cerebellum porcelli, & porci,
diligenter coctum cum pauco origano, poſtea
frixum in ſartagine, edere. Multum enim nu-
trit & ſemen auget. Opiata ad mulieres ſala-
ciores confici debet ex leuiter aſtringentibus,
& copiam ſeminis generantibus, parum cali-
dis. vt: R. myrobal. condit. embl. & cheb. añ.
n. ij. corticis citri conditi cum ſaccharo (in
aliis melle) ℥ j. pinearum infuſ. in lacte, ſemi-
nis fraxini eodem modo infuſi, añ. ℥ ſ. ſyr. de
pomis redolentibus fiat opiata, additis raſ.
eboris & cornu capræ, añ. ℥ ij. capiat ad quan-
tatem auellanæ. Quæ minus propenſæ ſunt
ad Venerem, geſtent ambram vel moſchum,
vel chirothecas odoratas: & maximè noctu ha-
beant ſub puluinariis, niſi obnoxia ſint ſuffo-
cationi

360 DE MULIERVM MORBIS,
cationi vteri. Tunc enim melius esset illa odo-
rata coxis alligata habere; vt egregiè iam pri-
dem Rondeletius admonuit.

SCHOLIA.

SATIS iam constat quibus modis intemperies vteri
simplex, vel cum humore, si causa sit sterilita-
tis vel difficultatis impregnationis, sit curanda. In-
temperie itaque illa, & humoribus purgatis, ad re-
media quæ proprie ad impregnationem faciunt ac-
cedimus. Eorum alia id qualitate præstant, vel per
delectationem vteri in actu coeundi adferendo; vel
actiuam vim eiusdem excitando: alia quidem id
præstant quadam stipticitate roborando vim reten-
tiuam ad conceptum. A proprietate valent, vt etiam
antè dictum est, coagulum leporis, stercus vulpis,
medulla osis cerui vel vituli, vterus leporis, & alia
multa à Medicis descripta. A qualitate verò con-
ferunt, vterum delectando, & vim attractiuam ex-
citando, cinnamomum, cubebe, masticata & cum
salua virga inuncta: zibettum, moschus, foramini
virga imposita ante coitum, & oleum balsami, si
habeatur. Quæ autem vterum qualitate roborant,
exsiccant, retinent, sunt balnea stiptica, aromatica,
& fofus, ac fumigia, quorum exempla plurima, præ-
ter iam dicta, apud auctores inuenies. In omni cu-
ratione oportet vt causa amoueat: quæ cum varia
sit tam in viris quàm in mulieribus, ea ipsa semper
corrigenda. Ita in viris si longo morbo detineantur,
nisi ab illo curentur, non possunt generare. Sic ali-
quem noui, qui, cum duobus annis ex quo vxorem
duxerat valetudinarius fuisset, curatus postea sin-
gulis

Causa diffi-
cultatis im-
pregnatio-
nis seu ste-
rilitatis om-
nium primò
amouenda.

gulis annis ex vxore prolem suscepit, vsque ad numerum vigesimum. Si igitur debilitas corporis in causa sit, corpus cibis resumptiuus reficiatur; & si adsit frigus neruorum virga, eiusq; mollificatio, curetur vt paralytis: alioqui si sperma ipsum vel genitalia frigore laborant, vtantur vnguentis calfacientibus. Si adsit paucitas inflationis, quæ Venerem incitent & inslent, vt fabæ, præscribantur. Si siccitas sit in causa, humectentur; & si caliditas, infrigidentur. Et si virga nimis curta est, (non enim turpe est Medico teste Auic. cap. 44. de his loqui) in coitu ipso crura mulieris eleuentur, vt semen recipiatur. Frictio cum adipibus calidis, & cibus multiplicat sanguinem, magnificat virgam. Si nimis magna, vt tota virga non immittatur, iubet Gordorius vt mulier strictam cum manu teneat, ne semen in via infrigidetur. At si adsit phymosis, quomodo curetur, prius dictum est. Ita in muliere, si collum vteri clausum est, vel callosum, relaxantibus pessis emolliendum: de quibus videas Cleopatram cap. 3. de Harmonia gynæciorum. Si adsint alia vitia in vtero ex supradictis, prius tollenda. Angustia ipsa in seſſionibus, fomentis, perfusionibus curanda cum emollientibus. Nimia apertura constringenda. Ita & Aëtius cap. 31. lib. 16. De diuersis affectibus vteri curandis quorū ratione mulieres non concipiunt, inquit, Clau-
 Ad vteros
 clauſos.
 ſos vteros odoratorum perfusionibus, & mollitoris ex anserino adipe confectis aperire oportebit: prius tamen à mollioribus in seſſionibus & ablutionibus inchoabimus, sicut è fœnugr. sem. lini, oleo probo, interdum & melle preparatis. Postea ad validiora pergemus, vt artemisiam, conyzam, calamintham, pul-
 Z S legium,

legum, amaracum; his etiam adicientes irinum
ligustrinumq; vnguentum: & mel, myrrha, aut tro-
glodytica, terebinthina, nitrum, casia, carycarum
carnes, vnguentum amaracinum, & huiusmodi,

Ad vteri os
nimium de-
hisceus.

supponantur. At his quæ ob vterum, seu vteri os ni-
mum fatiscens, non concipiunt, aridus victus, ari-
dæque fomenta conueniunt, medicamentaq; astring-
gentia, quæ supponantur, vt hians ostium occlu-
datur: qualia sunt gallarum decoctum, cytini, len-
tis, rub. rad. myrt. & eiusmodi. Postremò vteri

Ad vteri
auersiones, si
non concipiant.

auersiones mollientibus fomentis dirigemus: id enim
fomenta maximè possunt. sed & mollitorq; pessuli
vtiliter supponuntur. imò specillo & digito corre-
ctionem interdum tentabimus. Præcipuè verò pu-
legij, & artemisia, decocta, & castorium è posca
bibitum, vtero auerso conferre solent: omninoque
tota curatio declinationis huic vsui accommodabi-

Si mulier ob
humorum
crassitudi-
nem non
conciat,
quid facien-
dum.

tur. At si ob humorum crassitudinem mulier non
conciat, humorem (inquit Aëtius) spectare oportet:
ac mordicantem quidem seri lactis heminas quin-
que paulatim exhibendo contemperabis; cibosq; boni
succi offeres; vomitumq; ex interuallis prouocabis.
Pituitam verò & aquositatem laboribus exerci-
tiisq; plurimis, & in sudorem resoluentibus, cre-
broque vomitu absumes; atque agræ interim suffi-
ciet castorium iugiter bibere, ac suffimentis fo-
ueri. Sed quoniam flatus quoque vteri conceptio-

Si à flatu
vteri conce-
ptio impe-
diatur, quid
agendum.

nem impediunt, & flatus ab imperfecta coctione
fiunt; primò quidem parcitas cibi adhibenda est,
deinde quæ expellendo flatui conueniunt; sicut ru-
ta, cuminum, ac reliqua consuetæ semina & aro-
mata: quæ etiam supponi possunt, præcipuè ruta

cum

cum melle & modico nitro: atque ex iisdem fomen-
ta confici possunt, & cataplasmata, ac cerata, publi-
applicanda. à leguminibus autem, dulcibusq; edulis,
& flatuosis omnibus abstinendum. Sed si medica-
mentorum violentia sterilitas inducta fuerit, eius
medicamenti facultas noscenda est, nunquid attra-
ctione semen eluerit, an flatuum multitudine eie-
cerit, an multa astrictione os vteri obstruxerit, ge-
nituraq; aditum interceperit; & inde singulis erro-
ribus occurrendum perfusionibus & insectionibus,
prout unicuique congruunt: quæ præcipue utiles
erunt, si forte os vulvæ & acetabula adstricta sint.

Pingua etiam cuncta & fomenta adhiberi oportet,
ac quæcunque humiditates attrahere possunt. Me-
dicamenta sterilitatem inducentia si vasa vteri ex-
cæcent, insanabilem plerumque morbum efficiunt.
Ea tamen medicamenta non statim omnes penitus
vires adimunt: quedam enim potiones locis dem-
ptilem cæcitatem asserunt, cui si protinus occurras,
interdum mederi poteris. quemadmodum enim le-
thalia venena statim vomitu, aut clysteri, aut
congruo ad eos usus medicamento exsoluuntur;
temporis verò progressu nullo consilio emendari
queunt: ita quæ valide sterilitatem inducunt, si il-
lico aggrediaris, licebit quandoque depellere; sin diu-
tius perseuerauerint, insanabilia reddentur. Hæc
quoad istas causas. Ulcera autem vulvæ, & inflam-
mationes quemadmodum curare oporteat, & quo-
modo carnis excrescentias, thymos, & tuniculæ au-
ferre, singula in propriis locis seriatim declaravi-
mus. proin supervacuum est eadem sæpius repete-
re. Si verò nulla re infesta, vel in vtero, vel in

reliquo

Sterilitas à
medicamen-
torum vio-
lencia indu-
cta, quomo-
do curetur.

De his quæ
non concipiunt ob
medicamen-
tum ad steri-
litem inducendam
assumptum.

Curatio earum in quibus nihil infensum apparet.

reliquo corpore apparente, incompertum sit, cur mulier non concipiat, eam asinino lacte purgabimus, cibisq³ boni succi alemus, ac fomentis suffumigensq³ odoratis; & pessulis os vteri aperiemus, & sanguinem euacuabimus, Veneremq³ per duos aut tres menses (inquit idem Aëtius) prohibebimus. Ita & de aliis omnibus causis statuendum. Si habitus sit gracilis, reficiatur: si sit obesus, extenuet; si sit vlcus, cicatrix, membrana os vteri obthurans, mensium suppressio, seu immodicus fluor & intempestiuus, curentur singula vt propriis locis dictum est. Nos multas vidimus mulieres quæ ob menses retentos non concipiebant: sed iis ex consilio nostro arte, vel natura, apertis, facile imprægnabantur. Ita quoque quædam iisdem nimium fluentibus restrictis, tandem concēperunt.

OBSERVATIO LIX.

De dubia conceptione, vel imprægnatione.

MULIER annos 34. nata in pago Egmondano, Houæo dicto, prope Alcmariâ, multis symptomatibus affecta decūbebat, anno 1557. Alij grauidam esse, alij verò non concepisse dicebant: aderant & qui molam in vtero habere suspicabantur. Cùm ad eam 14. Aprilis accederer, quatuor iam vel quinque diebus suppressione vrinæ laborauerat, cui & ventris tumor ac pedum aderat, & facies inflata: quæ licet in prægnante aliquando adesse solent, sunt tamen etiam in mola vteri, quam iecore refrigerato hydrops subsequi solet. & ipsa quoque
ad

ad hydropem tendere videbatur. Constanter tamen modò se grauidam esse dicebat; postea rursus dubitans, idem negabat. Afficiebatur intensissimo dolore circa imum ventrem, vrina in totum suppressa, vt per quinque dies neque dormire, neque quicquam edulij sumere potuerit; licet minimè febricitaret. Sed & hoc malum accesserat ab obstetrice imperita, quæ medicamenta per os nescio quæ exhibuerat, vnde & vomitus enormis processerat. Quartus erat mensis quòd se rursus grauidam esse diceret. Sed pestini apposita parietaria decocta cum vino Rhenano, pauco adiecto oleo scorpionis, & assumpto decocto parietariæ, maluæ cum radicibus, adiectis granis aliquot alkekengi, & cumino, cum liquir. minxit, & dolor sedatus est. & quanquam Oribasius ex Galeno dicat, cuminum menses prouocare, hîc tamen prius maceratum in aceto grauidæ mulieri obesæ & pituitosæ nihil obfuit. Postea tamen iterum rediit dolor 21. April. ac me rursus vocauit. præscripsi clysterem in hunc modum: R maluæ m. ij. meliloti m. j. cumini, sem. lini, scænug. añ. ʒ. β. carui, ammeos, añ. ʒ. ij. β. fiat decoctio in lero lactis (nam feces erant valde induratae) pro lib. j. adde olei oliuar. ʒ. j. β. sacch. rub. ʒ. ij. duo vitella ouor. salis communis ʒ. j. β. tepidè iniectum fuit; & multis ventositatibus reiectis, liberiùs mingere potuit, dolore etiam iterum sedato. At postea curationem reliquit, cùm paupercula esset. Verùm post aliquot dies iterum iisdem doloribus affecta, cùm illam in-

uisere

misere non possem, Alcmariam venit, vt integrè curari posset. Fœtum tunc nullo modo sentiebat, putabatque esse mortuum, vel molam esse, ventre tum cruribus magis intumescantibus. Sed inuestigatis signis fœtus mortui, cum ventrem duriores lumenq. calidum more solito haberet, vt tactu percipiebam, neque anhelitus eidem fœteret, nullo modo fœtum mortuum esse referebam; neque molam vteri adesse, cum antea perfectè motum fœtus sensisset. Verum vt hæc certò mihi constarent, obstetricem peritam vocari iussi; cui mandabam, vt digito molliter os vteri cōtingeret: quod cum molle diceret, mulierem concepisse, vt latius in Scholio dicturi sumus de signis conceptionis, dixi. Obstetrix addebat fœtū ad ostium vteri subsidere: quod neque credebam: facillè enim abortus subsequutus fuisset. Atque adeò mirum erat aut fœtum non mortuum esse, aut abortum non subsequutum; quum prior obstetrix medicamentum vomitorium mulierculæ propinasset, atque illi imperasset, vt anhelitum eo tempore comprimeret, vnumque pedem supra alium poneret. Abhorrendū profectò consilium. Sed ego priore experimento contentus eram: cum os vteri occlusum esset, & molle. Alius tamen Medicus accersitus dicebat illam minimè gravidam esse; & proposuit, medicamenta esse propinanda quæ euocarent menses, & abortum facerent, cum molam vteri esse contenderet. At ego rationibus firmis persistebam, illam gravidam esse, cum & mammillæ mane-

manerent dura. Quare vsus sum lenioribus remediis, ad cachexiam valētib; ut rad. & sem. fœniculi cum parietaria; cerefolio & alkekenge, cū difficulter meieret, in vino Rhenano decoctis: quibus tandem facies tum crura detumuerē, & vrinam liberē reddere potuit; licet ob imbecillitatem fœtum non ita sentiret. Tandem ita procedendo vsque ad mensem Maium, paulatim omnia accidentia dicta cessarunt, & fœtum viuum naturaliter se sentire dixit; & dolor in totum ablatu; & crura pristinae sanitati paulatim restituta, ut nunc rectē inambulare potuerit, quod antea facere minimē poterat: atque ita, etsi grauida existens, omnibus admirantibus, perfectē curata fuit, & nono mense completo feliciter peperit.

SCHOLIA.

CAPVT allij integrum depurgatum ac dera-
sum ad vterum quidem apponunt, & postridie
vident an per os oleat; & si oluerit, concipiet; sin mi-
nus, non. Si verò velis cognoscere an mulier concipiet,
vel non, butyrum & lac mulieris masculi alentis
bibendum dato, & si eructauerit, concipiet; sin minus,
non. Item anisum in aqua tenuissimē tritum bibat, ac
dormiat, & si quidem pruritus ipsam circa vmbilicū
corripuerit, concipiet; sin minus, non; ut liquet ex Hip.
in lib. De sterilibus. At si velis dignoscere num præg-
nās sit mulier, mel & anisum tenuissimē terito, dein-
de in aqua diluito, ac exhibeto, & dormire finito; & si
quidē tormen ipsi fiat circa vmbilicū, prægna est; sin
minus

Num mu-
lier cōcipiet.

Signum
num mulier
prægna
sit.

Notæ con-
ceptionis ex
Aëtio libi
16. cap. 26.
sub finem.

minus, non est, vt liquet ex eodem, citato loco. Item cum dormitura est, aquam mulsam potandam da, & si alui tormina patietur, concepit; sin minus, non concepit, vt liquet aphor. 41. lib. 5. At conceptionis notæ erunt, iuxta Aëtium, si os vteri claudatur, & desiccetur, atque à pudendo recedat. Imò peritiores femina post seminis ingressum, vterum moueri percipient. mouetur enim genituram circumplexurus. Quibusdam ilia exultant, alijs cordis dolor & exolutio cum quadam voluptate superuenit. Nec paruum, præter reliqua, indicium est, si mulier quopiam vrina stillicidio vexabitur: quod præcipue patiuntur, quæ tunc primò concipiunt, & quæ menstruas purgationes integrè non exegerant: quamuis idem ceteris quoque vsque ad VII. diem quadantenus accidat. post septimum verò obscura quædam picæ signa oboriuntur, acidorum salforumq; desideria, vertigines, pallor, somni longissimi. constat & eodem tempore menses sine molestia detineri. Ita ex Moschione: Quoties in fine coitus horror quidam mulieri accidit, ipsumq; orificium vuluæ concludi & conducì sentitur, nihilq; reliquum seminis sinum mulieris humectat, & valde modicum remanet. Secundum Priscianum, si collum calidum & dorsum frigidum habuerit, concepit; si verò æquale est corpus, non differunt tamen inter se, conceptio, generatio, & impregnatio: Nam conceptio est attracti à locellis seminis commistio, in sanguinis menstrui puriori parte, in quam locellorum calor natiuus ita agit, quòd viuificato, demum fœtus generatio sequitur. Moschionem autem interrogatus, Quid est conceptus? inquit, Ingenti corporis labore & tormento perfer-

Conceptio.

Generatio.

perfertur: successione, autem plusquam necessarius;
 unde & retentio perseverat: animal verò aliud, cum
 naturali ratione & necessitate efficitur. Embryonis
 verò, vel, ut alij, foetus generatio, est virilis seminis
 cum menstruo sanguine tam diuturna actio, quoad
 materia illa formam recipiat humanam. Impragna-
 tio tantummodo ex parte mulieris se tenet; quae est
 aliud nihil quam conceptio, & embryonis generatio.
 Simul ac genituram intra se vterus traxerit, uniuersum
 alueum, se supra duo semina colligens, ac vndiq.
 ea comprehendens, ita contrahit, ut nulla penitus,
 siue multum, siue parum seminis iaculatum fuerit,
 vacuitas relinquatur: atque aded os sigillat obsepitq;
 uti etiamnum deductissimi corporis acies neutiquam
 ingredi queat: quod Hippoc. (quem ceu alteram re-
 bus humanis lucem Deus dedisse videtur) ita prodi-
 dit. Sed primis diebus lactis similitudinem semen
 vtero detentum refert; novem diebus sequentibus in
 sanguinem vertitur; duodecim aliis diebus caro effi-
 citur; decem tandem & octo diebus reliquis mem-
 bra omnia formantur.

Embryonis
 vel foetus
 generatio.

Impragna-
 tio.

Hippoc. lib.
 1. apho. 3.

Sex in lacte dies; tres sunt in sanguine terni;
 Bis seni carnem; ter seni membra figurant.

Vel, Iniectum semen sex primis certe diebus

Est quasi lac, reliquisq. novem sic sanguis; at inde

Consolidat duodena dies; bis nonaque demum

Effigiat, tempusque sequens producit ad ortum.

Aegidij ver-
 sus, qui
 etiam reci-
 tantur à
 Guainerio.

At Eretis: Primo mense fit purgatio sanguinis; se-
 cundo fit expressio sanguinis & corporis; tertio un-
 gulas & capillos producit; quarto motum, & ideo
 nauseant mulieres; quinto accipit foetus similitudi-
 nem patris vel matris; sexto nervorum constrictio-

A a

nem;

Quo tem-
pore infans
mouetur.

De die natali
cap. 12. ex
Pythagora.

nem, septimo ossa & nervos confirmat; octavo mo-
uet natura, & infans rerum beneficio repletur; nono
à tenebris procedit in lucem. De his plura vide apud
Ludouicum Bonaciolum, Muliebrium lib. 2. cap. 3.
Anima autem creatio à Deo est: sed quo tempore
corpori infundatur, furor est ac stultitia id inquirere;
tum quomodo in corpus descendant anima, & qua
parte cœli descendant; ac denique in iis quæ cum in-
diuisibilia atque materiae prorsus immunia sint, nullo
situ clauduntur, situm inquirere, vesanum est. Sat
nobis est cum Augustino, animam à Deo unico pro-
creari & infundi. Triginta igitur dierum spatio ef-
formatus est. iis sexaginta adiectis, nonaginta (tres
constituentes menses) soles consurgent: hoc ipso mo-
uebitur tempore: & sic variis pro efformationis va-
rietate, temporum impendiis corporis fiet. Sic Hippoc.
lib. De pueri natura, Puerulum dierum triginta tra-
ctu, femellam quadraginta & duobus consingi, pro-
nunciauit. Huic quidem quartum sui motus men-
sem, illi verò tertium præsignauit. Et sic quidem ma-
res circa quadragesimum solem, feminas circa nona-
gesimum moueri, complures diligentissime explora-
tum habuere. De his varias vide opiniones aucto-
rum; & cur septimo mense nati viuant; & qui octa-
uo, moriantur. Astrologi octauum mensem ascribunt
Saturno. Tamen octauo mense natus aliquando
vixit, auctore Aristotele. lib. histor. animalium 2. De
partu septimestri & octimestri, vide Hippocratem.
Quia autem nono mense partus naturalis est, ideo
aliqui duos partus generaliter dixerunt, vt Censo-
rinus; alterum minorem, quem vocant septimestrem:
alterum maiorem decimestrem, qui edatur die 274.

Mensis

Mensis tamen, vt Ophusius, praeceptor meus Mathematicus, authoritate Cardani, & aliorum Astronomorum, referebat, ad Lunam refertur. Primus & tribuitur Saturno, secundus Ioui, tertius Marti, quartus Soli, quintus Veneri, sextus Mercurio, septimus Lunae, & tunc perfectus est fetus & viuere potest, octauus Saturno, & moritur si producat; quamquam, iuxta Aristotelem, aliquando uiuat: nono mensi Iupiter praest, vitæ amicus, quamobrem partus ille laudatissimus censetur. Mars decimo mensi dominatur, vnâ qualitate amicus vitæ: natus igitur in hoc mense puer interdum uiuet. Sol rursus vndecimo praest, & vitam nato influit; sicq; in ipso natus viuere potest. Si ad duodecimum mensem pueri natiuitas protendatur, quamuis nunquam id viderim, iuxta illas rationes, quia Venus dominatur, aliquando viuere posset: sed rara auis. Appellamus autem mensem lunarem, reditum Lunae ad eundem locum; namerando, vt habetur apud Cardanum Segm. 1. aph. 47. dies per reditus Lunae ad circulum horizontis, diebus viginti sex, horis nouem, minutis 30. & secundis 15. Vel crassiori calculo capimus mensem pro diebus viginti octo; vt quatuor septimanae mensem constituent. Nam vt secundum ipsum, Luna primo mense materiam conceptionis preparat, & membra adaptantur, vt deinde secundo mense à Mercurio formam accipiant, & tertio mense à Veneri sexum virilem, tum femineum fetus acquirat; quarto mense à Sole vitam, quinto à Marte robur: (nam is firmat creata, potissimum neruos, suo robore) deinde sexto mense Iupiter gubernans foetum disponit, omnia confortando; deinde ad Saturnum

Ratio Me-
dicorum,
cur septimo
mense fœ-
tus expulsus
viuat, &
octavo mo-
riatur.

Signa im-
prægnatio-
nis cur dili-
genter no-
tanda;

septimum mensem referebat: qui tamen computa-
tione incidebat in sextum mensem Medicorum. Sed
eorum opinione qui octauum mensem attribuunt Sa-
turno, vt dictum est prius, isto mense vel mortuus
producitur infans, vel non diu vitalis: Septimo verò
viuit, iuxta astrologorum rationem. Medici, vti &
Auienna, aliam rationem adferunt: Fœtus aiunt
septimo perfectè completus, auræ seu nutrimenti de-
fectu petit exitum; quòd si tunc in radice sortis fue-
rit, nascitur, & viuit. si autem virtutis impotentia,
aut coryledonum resistentia, nasci non possit, maxi-
mè debilitatur: quare si in octauo tunc nasci contin-
git, eidem aduenit quod qui laborem secundo aggre-
ditur, à primo nondum releuatus: etiam in tantum
in secundo illo motu debilitatur, vt natus viuere non
possit. Sed eadem ratione nec in decimo mense aut
vndecimo natum posse viuere argui queat. At Astro-
logi moras fœtus in vtero distinctas inuenerunt; maio-
rem scilicet, mediam, & minorem. Maior siquidem
existit 288. dierum, qui menses nouem & dies 18.
constituunt. Media dierum 273. existit, quibus per-
ficiuntur menses nouem & dies 3. Minor dierum est
258. menses octo & dies 15. perficientium. Sed hæc
ad Astrologos pertinent. Istis ergo omisso, diligenter
oportet distinguere notas conceptionis & imprægna-
tionis, ne error contingat: cum aliqua mulieres vir-
gines se fingant, licet grauida sint, vt Medicos de-
cipiant: quod aliquando euenit Medico licet peritissi-
mo, qui puellam grauidam hydrope fingentem se la-
borare curabat, etiam adhibitis multis medicamen-
tis. Ad hanc ego noctu euocatus, animaduerti quòd
conceperat. Cum autem famula esset, neque domina
ipsum

ipsius aut astantes gravidam eam esse suspicarentur, ipsa acriter id negabat. Ego nihilominus perstabam, & obstetricem accersendam dixi. qua præsente, feliciter peperit, dolo iam omnibus aperto. Tam scelestæ est hæc puellarum quarundam impostura, ut etiam Medicos, maximè nihil tale suspicantes fallat. Præter autem signa conceptionis iam dicta, statim hic post conceptionem vteri os retrahitur & occluditur, ut diximus, etiam Veneris actus prægnanti languescit, & menstrua purgatio præter consuetudinem subsistit. Nec tamen hoc postremum statim tempore procedit: si enim vteri acetabula secundarum adhaesu obturentur, & os ipsum interius coniuget, nihil sanguinis ex vteri capacitæ elabatur. at quibus fortasse sanguis primis mensibus, aut etiam postremis, effluerit, ex iis venis quæ ad vteri cervicem pertinent, quemadmodum & virginibus, emanat citra ullam fœtus offensionem. Mense secundo, etiam si menstrui aliquid profluat, quia tamen provida solersq; natura sanguinis nonnihil reponit in mammas superioresq; sedes, pectoris venæ impleri, mammae verò turgere ac durescere incipiunt. Fœtus grandescente latera lumbiq; expanduntur, dilatanturq;, ac venter citra manifestam gravitatem intumescit. Quibusdam tum temporis in facie citrinæ vel lividæ maculæ, ut in puella quam Medicus pro hydro-pica curabat. Iam & lentigines quoque efflorescunt, vel oculorum ambitus liuescit, aspectu languido; & alia symptomata vrgent, de quibus dictum est prius. quibus & illa addere posses quibus virgines probari diximus. Plura de his habes apud Bonacium lib. I. Maliebrum cap. I. Quo examine grævda cognosci-

Quomodo
prægnanti-
bus sanguis
effluere po-
test ex vteri
cervice.

tur. At signa ex vrina sola desumpta saepe fallunt, quamuis aliqui, vt & Fernelius, & Guainerius, & Auic. velint esse subsidientiam tenuem, dissectam carminato gossypio perquam similem. Verum illud, vt in lib. nostris De incerto vrinarū iudicio, contra Vro- uantes, patet, saepe Medicum fallere potest. Sed quibus modis foetus & gestatio discernatur à mola, mox dicemus. At qui putant in parte vteri dextra semper mares constitui, in sinistra feminas, ex animalium resectionibus (inquit Benedictus Veronensis lib. 25. cap. VII.) facile redarguuntur: tum saepe numero euenit, vt eadem in parte vteri gemini, mas & femina generentur. Idq; satis inspeximus in viperis pedestribus. Quod igitur mares semper in dextra, & femina in sinistra parte concipiantur, mera somnia sunt. Nam cum etiam gemini gestarentur, mas & femina, marem in leua, feminam in dextra contineri conspectum est. Qui verò testem dextrum marem generare arbitrantur, facile, inquit Aristoteles, serpentum argumento conuincuntur, qui testibus carent; in quo genere & mares & femina conspiciuntur: sed à partibus dextris vel sinistris qualis exeuntis seminis non sine aliqua ratione calidius, ex quo mares progenerantur. Alij, si à parte dextra auulsum semen est, & descendit in vuluam, aut locos, masculus gignitur: femina, cum id quod à sinistra: alij propter propriam seminis commistionem, vel propter caliditatem, vel frigiditatem gigni. Calidius verò semen marem progignit, frigidius feminam.

Gemelli, & tergemini. Gemelli & tergemini secundum aliquos, generantur propter calidum semen in locum contractum, atq; ibidem decisum. Alij autem comprehensiones causantur.

stantur. Nos verò dicimus quòd si decisum sperma defluxerit in locos binos, tunc gemellos; si in trinos, tunc tergeminos nasci. Alij quædam experimenta addunt num femina masculum vel feminam gerat; vt ad longum videre poteris apud Guainerium: vide & ea quæ Priscianus & Erotis in Harmonia Gyneciorum scripserunt. At Aëtius inquit: Hippocrates ceteriq; asseruerunt, marem futurum iudicari, si prægnantis color iucundior, facilioresq; motus fuerint, & dextra mamma amplior tumidiorq;, ac præcipuè pupilla, apparuerit. Contrà pallidus color, mammaq; sinistra & pupilla tumidior feminam indicat. Sed & in maris conceptu, dextræ partis vasa, venæ, inquam, & arteriæ, magis intumescunt, præsertim quæ sunt in lingua: sicut in conceptu feminae oppositum conspicamur. Certissimum verò ac minimè fallax masculi fetus indicium est, si prægnans dextræ manus pulsum validiorem, velociorem, maiorem, duriolemq; habuerit: ac femina, si talis sinister fuerit. Nunc ad molam nostra vertatur oratio.

Num mas
vel femina
sit futurus.

OBSERVATIO LX.

De vteri mola.

RVSTICA mulier in Waterlandia, cùm Alcmariaë medicinā adhuc facerem, multo tempore carneam molam gestabat in vtero, aliquot etiam annis, plus minus sex; ita vt tandem in hydropem conuersa fuerit; doloribus tandem superuenientibus: Iis illa tamen remediis quæ ad menses euocandos faciunt, tum hydropem,

à me curata fuit, carneamque molam excreuit. Ita etiam per me curata fuit, cum praxim in Gallia Pithueris exerceré, & altera mulier, quæ prope Pithueros habitabat, quæ per triennium molam gestauerat. Neque illud admiratu dignum, cum & Dodonæus, amicus noster referat in suis Obser. cap. 49. viduam quandam in utero olim gestasse molam annis plus minus quindecim. Existimabat utrum prolapsum, quod in ostio uteri propendere aliquid sentiret; profluebant statis temporibus menses (quod tamen nostris agris non contingebat) & subinde copiosiores, quam par erat. Tandem quodam tempore, superuenientibus nonnullis partus doloribus, rudem excreuit & informem carneam molem, pedem ferè longam, latam semipedem, tres quatuorve digitos altam.

SCHOLIA.

EA est nature providentia, ut calor opifex & formator eorum quæ operantur, nunquam sit otiosus; sed quantilibet materiam in opus aliquod miro artificio ducat, quæcunque tandem sit. Sic ex putredine Aristoteles vermes generari scribit. Sic ex materia quam pro arbitrio tractare non possit, quia aut copiosior, aut minore copia, aut ex diuersis generibus constans, minusq; sequax est, monstrum generat, siquidem aliquid perfectius non licet. Ita materiam tractabilem si repererit ex viriusque semine, in utero fetum pulcherrimum ad viriusque exemplar disingit fabricatur, aut vni magis quam alteri similem,

similem, pro ratione materiae & viribus imaginatri-
cis facultatis, tanquam optimi moderatoris. Si verd
ipse imbecillior sit, materia autem subiecta quali-
tate, quantitate, consistentiâ, aut mixtione alicuius
extranei, vt sanguinis craffi, aut alterius succi vi-
tiosi, ineptior ad tantam perfectionem, aliquid ta-
men, ne nihil, generat, siue animatum, siue rude &
expers vitæ. Sic Hollerij interpres vidit mulierem,
quæ cum nouem mensium spatio vterum gestasset,
omnibus quæ in legitimo partu euenire solent, mirifi-
cè respondentibus, tandem nihil aliud præter ani-
malia quedam ranis haud absimilia, cum multis pur-
gationibus cruentis & corruptis, in lucem edidit. Re-
fert & de alia cui carnea moles informis cum fœtu,
veluti superfœtatione quadam, exiit. Et ego mu-
lierem rusticam noui, quæ cum grauida putaretur,
animalculum peperit instar limacis. Dominus Vale-
riola multas habet & admirandas in eiusmodi partu
observationes, curationemq; pulcherrimam de mola
cui partus quatuor mensium erat alligatus, cum ipsa
iam pro vero fœtu nouem mēfibz in vtero latitasset.
Ceterum mola, de qua nunc dicere cepimus, diuerso
modo sumitur: nam Molam vteri, quidam omnem
rem præter naturam, quæ pondere grauat, & mole
extendit vterum, nominant; vt Rhases; vt videan-
tur caput de falsa conceptione fecisse. Sed Auicenna
etiam extensionem flatuum sic nominari vult, dum-
modo cum suppressione malum sit. Paulus lib. 3. cap.
69. De mola, omnem duritiem comprehendit, vt &
scirrhus: sic enim scribit: Mola quoque induratus
est tumor, interim in vuluæ ostiolo, interim in tota
quoque prominet, vnde in tophaceam quoque duri-

Historia
mulieris pa-
tientis ani-
malia ranis
similia.

Mola vteri
diuerso mo-
do sumitur.

A a s tiers

Mola vnde
dicta.

Barbaram
sectantes
medicinam,
multiplices
molas fa-
ciunt.

tiem occalescit, tum ea quæ superiacent contrahuntur. Nam & inter propria quoque vteri vitia connumeratur id quod à Grecis Μόλη, à Latinis Mola nuncupatur, nomen sumens à motus, tum difficultate, tum grauitate, vt Aëtius refert cap. 80. lib. 16. Nam veluti mola ipsa grauis atque difficulter mouetur; ita & affectus hic mola appellatur ad eius similitudinem, & grauat & difficulter mouetur, licet non nisi per accidens, vt dicemus; quemadmodum & ipsa mola. Hanc molam induratum esse vteri tumorem, qui modo in vuluæ ostiolo, interim in tota ipsa prominet, Aëtius citato loco, & Paulus cap. 69. libri 3. fatentur; etsi idem Paulus in fine citati capituli aliorum quorundam autoritate asserat, molam carnem esse informem, ipsis vuluæ tunicis adhaerescens, ac factus modo in lucem edi. Barbaram sectantes medicinam cum etiam triplicem molam faciunt, nonnulli & quadruplicem, carneam, humoralem, ventosam, & aquosam. De mola ex flatu extat apud Valescium exemplum lib. 6. cap. 15. Ego, inquit, tempore pueritiæ meæ dum addiscerem artes liberales Vlissoponæ, vidi quod quædam Iudæa credidit se prægnantem, cui fuerunt preparata omnia quæ sunt necessaria, & dum obstetrices matricem tractarent, tanta ventositas sine vlllo alio liquore exiuit à matrice, quod fuit mirum: & hoc per totam ciuitatem Vlissoponæ, & per totum studium fuit diuulgatum. Id quoque à Dodoneo scribitur obseruatum cap. 49. & eiusmodi inflationem efficaci remedio ab ipso curatam, prodeuntibus per pudendum, veluti per anum excerni solent, ventis. Aqua collectionem ipse etiam in vidua quadam vidit; quæ, defuncto marito, cum se graui-

gravidam relictam aestimaret, nouem mensibus ad-
 impletis, superuenientibus partus doloribus, non nisi
 aquosos humores enixa est, à quibus liberata, lacte
 vbera repleta habuit, haud aliter, quam si foetum
 peperisset. At eodem quoque autore in Scholio, hæ-
 quidem mola ventosa & aquosa cognominata, à
 Græcis & veteribus Medicis pro molis non agnoscun-
 tur. Flatuum in vtero collectionem *ἐμπνεύματων*
 & *πνέσας*, Inflationem vteri, & posteriores Inflatio-
 nem matricis nominant; de qua dictum est antea; &
 curatur vt vteri inflatio. De aquosi humoris in vtero
 collectione meminit Hippoc. in lib. De natura mulie-
 bri; tum & Aëtius, qui vteri hydropem appellat; de
 qua prius quoque diximus. Hippocrates aquæ in vte-
 ris collectionem gravidis superuenire affirmare vide-
 tur: Aëtius tunc humoris copiam in vterum confluere,
 quando menses suppressi sint, & imprægnatio impe-
 dita. Vtrumque nobis, inquit Dodonaus, obseruare
 contigit: memini enim nonnullis vnà cum foetu copio-
 sum aquosum humorem ex vtero processisse, foetu de-
 bili ac non vitali. Id etiam nos aliquando vidimus.
 Sed vidua altera de qua scripsit, quæ existimabat
 gravidā se relictam, solum aquosum in vtero gestauit
 humorem. Sed & Neoterici quidam barbaram fa-
 cientes medicinam, ipsi Mola quoque varia nomina
 & diuersa imposuere. Nam à Gordonio cum sit fru-
 stum carnis informis & sine figura, vocatur Pecus;
 alij verò vocant Fratrem Lombardorum; quem, in-
 quit Gilbertus, mulieres Salernitanæ tempore viuifi-
 cationis nituntur occidere potu succi apij & porro-
 rum. Sed apium foetui epilepsiam generat. Alij, eodem
 Gordonio teste, vocant Harpyiam. Intelligendum
 enim,

Diuerſa
Molæ no-
mina.

enim, inquit, quod vermes, reptilia, harpyia, & Frater Lombardorum possunt generari in vtero. Sed vermes raro: quia in intestinis generantur ex superfluitate multum impura; rarissime autem in matrice: sed aliquid enorme, ut mola seu harpyia, ex semine mulieris corrupto, & ex carentia spermatis viri, & ex calore innaturali. Sed frequentius in mulieribus Lombardie (hinc forte quoque nomen Fratris Lombardorum assumpsit) aut quia magis laborant, vel magis his subiecte sunt, propter corruptionem nutrimenti, sicut in Apulia. Vnde communiter dicitur, Italas mulieres pessime viuere ex fructibus & herbis, at bene se induere. Azaranius Molam ad similitudinem lapidis molaris dictam putat, ex pondere & grauitate contingente in ventre mulieris, tamquam ibi lapis molaris esset; etiam ex motu huius materiae per ventrem, dum mulier se reuoluat; vel quod ventrem comprimat ad similitudinem lapidis se mouentis. & Valescus dicebat ex pondere aggraunte dictam esse. Verum cum alij triplicem molam faciant; melius tamen est seorsum curationes variorum affectuum ponere, neque confundere; & molam eam solam & proprie appellare, quam dixerunt talem veteres, Aristoteles & Galenus, sic definientes: Mola est caro inutilis & informis in vtero genita; quae & aliquando breui emittitur, aliquando vero diu durat per annos. Et ideo, quidquid praecitati auctores afferant, nos cum Iacchino & Donato Galenum sectantes, dicimus cum eo, molam esse carnem informem, quae in mulieribus vtero gestatur; ut 14. Method. med. ab eo scriptum est. Vel, molam esse carnem quandam inuilem atque informem; eiusdem Gal.

senten-

Mola est
caro infor-
mis atque
inutilis in
vtero ge-
nita.

Mola quid
sit, ex Ga-
leno.

sententia 14. De usu part. Quapropter non omnem induratum uteri tumorem molam esse fatemur, ut Paulus & Aëtius sentire videntur, sed inutilem illum conceptum carnosum atq. informem, qui etiam utero gestatur. Inutilis namque est, cum sit à natura aliena caro illa, nec utilis mulieri; cum & ipsi grauet, ac laborem inferat, impediatq. mensium purgationes. Nec etiam utilis pro generis propagatione, veluti naturalis conceptus est. Est item informis caro hæc, cum artificiosa forma & humana careat, licet quandam figuram contineat: quinimo diuersasfigurationes suscipit, pro diuersitate materie, ex qua generatur, similiter & agentis, à quo figurationem recipit. Quod verò sub conceptu mola contineatur, licet idem imperfectus, atque inconcoctus sit, confirmatur ab Aristot. 4. De generat. animal. cap. 7. dum dixit: Cum igitur ex humore concoctu difficili conceptus consistit, tunc gignitur quod mola dicitur: afficitur enim conceptus eo modo, quo ea, quæ inquinari dicimus cum elixantur. Portatur etiam seu gestatur utero conceptus hic qui mola appellatur, & non est uteri tumor induratus in eius substantia ortus, quoniam interdum foetus modo in lucem editur. Pariunt enim quandoque mulieres carnem hanc, quam Molam vocamus, ut testatur idem Aristot. eodem loco & Aëtius aliud, quorundam auctoritate, confirmavit citato loco, cum dixit: Quidam verò tradunt in quibusdam mulieribus carunculas ad inglandis magnitudinem per pudendum excretas esse, aliquando singulis mēsis, aliquando bimestres aut trimestres. Præterea Gal. eodem 14. De usu part scriptum reliquit, mola conceptum euo proportionem respondere, quamuis

Error quo-
runda de
Mola.

Quod vterus
afficiatur.

Quis affe-
ctus præter
naturam sit
mola.

quamuis non perfectio, sed subuentaneo: at oua ani-
malium partes non sunt, nec eorundem tumores præ-
ter naturam, sed proportionem respondent iis quæ ad-
nascuntur, vt liquet ex eodem Galeno i 1. De simpl.
med. facul. Quare & mola in numero eorum, quæ
adnascuntur existit, non tamen familiarium; &
vtero gestatur, at non ipsius induratus tumor est.
Hinc quoque patet eorum error, (vt paulo antè di-
ximus) qui volunt molam esse in multiplici differen-
tia. Nam præter hanc quæ carnosæ existit, quam-
piam etiam flatusosam esse fatentur: quoniam nisi
caro sit inutilis, atque informis, quæ in mulieribus
vtero gestatur, haudquaquam mola appellari debet;
vt paulo antè recensuimus ex Arist. & Galen. Quod
verò vterus afficiatur in hoc vitio ex mensium sup-
pressionem, præter naturam tumore, ac ipsiusmet vteri
dolore percipitur. Affectus verò morbus est in com-
positione, speciatim in numero, ac inter eos, qui toto
genere præter naturam existunt; velut est lapis in
vesica, iuxta Galeni sententiam eodem 14. Meth.
med. Quamquam Aristot. velit, quod nec perfectam,
nec alienam omnino habeat naturam mola ipsa. At-
qui Gal. propterea toto genere præter naturam eam
esse fatetur, veluti in vesica calculus, hypochyma, &
myrmecia, quoniam omnia talia tanquam molesta,
& inutilia, in totum submouere properamus; & non
quod in eius generatione seu substantia nihil sit eo-
rum, quæ secundum naturam sunt, quæ de re ab Ari-
stotele non discrepat. Sed hæc exemplis subsequenti-
bus multo clariora patebunt.

OBSER-

OBSERVATIO LXI.

De mola reiecta quasi oculos multos habente; & de aliis diuersa forma.

ANNA Iuonis, vxor Bartholomæi Simonis Mercatoris dicti, mulier si quæ altera valde obesa, attamen fecunda, quæ Alcmariæ habitabat, in platea vulgo *houil* dicta, cùm aliquot mensibus sese putasset grauidam, postea cepit dubitare: cuius causa me vocauit. Ex signis dictis animaduerti illam mola laborare; ex tumore videlicet duro circa vteri partes distractione, seu contractione partium superiacentium; deinde, cùm illa ex natura crassa & obesa esset, quod corpus gracile euadebat, deinde appetitus prostratus esset, mensesque non solum suppressi, sed & colore vitioso afficeretur; & quamuis mammae intumescerent, manus tamen pedesque molliores gracilescerent, incessus grauior erat; ac oculi labiaque tumebant, & facies pallecebat, stomachusque subuertebatur, lumbi grauabantur, venterque attollebatur; adeo ut primum conceptus veri de se signa præberet; quod etiam peritissimis imponere potuisset; verum temporis progressu apertius discernebatur; cùm & dolor punctorius adesset, nec motum vllum sentiret: nam molam dolor punctiōis sensum inferēs subsequitur, nec in ea motus vllus, velut in vteri conceptu percipitur, nisi

384 DE MULIERVM MORBIS,
nisi quod per compressionem dextrâ & sinistrâ
mouetur, cùm manibus mola comprimitur, &
ex accidenti quoque cùm mulier de vno latere
in alterum vertitur. Cùm hæc adessent, & po-
stea, toto corpore imminuto, venter ampliaretur,
existimauit se hydrope laborare. Præfert
quidem per se postea hydropis imaginem: ta-
men ab illa discernitur per tumoris duritiem,
& quòd tumor hic ad digitorum compressio-
nem, ac pulsationem non cedit, neque tympa-
ni sonum veluti in hydrope edit; & quòd neque
ad manus contactum vlla fluctuatio percipitur;
quanquam temporis progressu (vt sæpe vidi-
mus) quandoq. hepate perfrigerato hydrops ei
superueniat, vt liquet ex Paulo & Aëtio. Quòd
igitur hinc neque tympanitis modo venter sona-
bat, neque ascitis modo ad manus contactum
fluctuabat, molam esse percepi ex signis iam
dictis. Primò autem nostris monitis non au-
scultans, multa ac varia remedia apud illam
tum diuersa tentata fuere, tam per obstetricem
quàm per alias mulieres. Verùm cùm non pro-
ficere, de quo me vocauit. Cui vt minus tæ-
dio medicamentorum afficeretur, vt nostra tum
remedia tum præcepta diu diligenterque ob-
seruaret, neque à curatione desisteret, vtilis fuit
hæc historia Gradi de Medico qui breui tem-
pore molam se curaturum promittebat. Noui,
inquit, ego Medicum præstantis famæ, qui
mulieri patienti molam à multis mensibus, pro-
mittebat, intra duas vel tres horas curationem.
Verùm ipsa animaduertens quòd emitteret fru-
stum

stum carneum magnum durum, idque per
duas horas quibusdam medicamentis adhibi-
tis; prudentior ipsa admodum appositè & face-
tè suo Medico respondit: Bone domine mi, si
ista materia crassa per tot menses generata est
in ventre, seu vtero, & continuò etiam augmen-
tata in tanto tēpore, quia iam transiit annus &
amplius quòd hac mola laborauerim, quomo-
do tam exiguo tempore poterit educi, nisi cum
maxima violentia? Ego, inquiens, non volo li-
berari tam subitò & repente cum medicamen-
tis ita violentis: nam timerem quòd citius me
interficerent, quàm curarent. Et ita cùm prius
hunc Medicum virum doctum & peritum esse
existimabat, eundem nunc minimè doctrinā
præditum iudicabat. Verùm hæc nostra ægra
tandem totum negotiū mihi commisit; donec
ab illa molestia, & graui malo liberari posset.
Ideo cùm alium lenem non haberet, omnium
primò exhibui lenitiuum medicamentum ad-
vnciam vnā, & quamuis hīc sanguinem mit-
tere iubent, si adsit plethora, & mulieres ferre
possunt, vt adimatur alimentum; tamen hīc
non conueniebat in pituitosa & crassa muliere,
frigidis & crassis humoribus abundante. Iis ita-
que prius præparatis & purgatis, eodem modo
quo faciendum docuimus ad menses suppres-
sos; medicamentis deinde tam intus quàm ex-
tra, quæ laxandi ac molliendi & mitigandi vim
haberent, vsi sumus, etiam subinde alio irrita-
ta, si illa durior esset, per glandes acutiores.
Inprimis ventrem inum oleis dictis sæpe fo-

B b

ueri

386 DE MULIERVM MORBIS,
 ueri iussimus, anethino, chamæmelino, & li-
 liaceo, tam ob dolorem quàm emollitionem.
 Hoc quoq. decoctum sæpe ebibit: & rad. brusci,
 asparagi, añ. ʒj. malua cum rad. parietariae, viol.
 (ad emollitionem) sabinae viridis, stœchados
 Arab. florum chamæmeli Romani, cassuta, fœ-
 niculi virid. saxifraz. cum rad. pulegij, artemi-
 sia, añ. m. ʒ. glycyrr. ras. ʒ vi. ruta, anethi, añ.
 ʒj. sem. anisi, carni, fœniculi, añ. ʒij. coquan-
 tur in aqua & vino Rhenensi pro lib. j. ʒ. stent
 per noctem supra herbas, colatura addendo
 syr. de stœchade, de artemis. de calaminth. añ. ʒ
 ʒ. mellis ros. colati ʒij. ʒ. arom. cum ʒij. cinna-
 momi electi; fiat apozema ad modum clareti.
 bis eo utebatur. Ruta & anethum hîc maximè
 commendantur. Sic Philosophus (teste Aëtio
 lib. 16. cap. 82. De mola) Derentis, inquit, vx-
 ris amici menstruis, primò eam concepis-
 se arbitrabar, postea exaucto magis tumore, hydro-
 pem suspicari capi, quod totum corpus ac pe-
 des tumefieri cernerem: at tandem ubi id esse
 morbi genus depræhendi, quod alij Plinthum,
 alij Molam appellant, rutam & anethum in
 vino antiquo rusto odorato decoxi, atque inde
 herbis abiectis vinum calidum propinaui, pro-
 pe aqua loco huiusmodi offerens, statimque
 mulier, excreta cruentis copia, salutem adepra
 est. Sed ut reuertar ad nostram agrotam, postea
 dabam has pilulas subsequentes: & trochis. de
 myrrha ʒj. euphorbij gr. j. cum syr. de artemi-
 sia fiant pilulae ix. dentur iij. omni vespera. Po-
 stea decocto superscripto addebam folior. senæ
 ʒj.

℥ j. & ℥ ij. agarici optimi, & zinz. ʒ j. Deinde ite-
 rum pilulas dedi, ventri cataplasmate sequenti
 imposito & pectini ipso: & rad. althææ mund.
 ℥ iij. folior. maluæ, althææ, & rad. maluæ, añ.
 m. j. coquantur in aqua communi, ad mollitu-
 dinem pistentur, adde mucilag. fœnugr. semi-
 nis lini, añ. ℥ β. pul. sem. anisi, fœniculi, añ. ʒ j.
 farinæ seminis lini, fœnugræci, añ. m. j. butyri
 recentis, olei liliorum, añ. ℥ j. olei chamæme-
 lini ℥ β. fiat cataplasma. Alij addunt aquam
 mullam & paucum vinum odoratum, & inde
 cataplasmata conficiunt. Pessis quoque uteba-
 mur ex œsypo, butyro, adipe anserino, medulla,
 cum oleo sampsuchino, & intus oleo liliaceo
 oblinebat. Aëtius & ex iisdem pessos subicit,
 vel ex medulla aut cerebro ceruino, melle, ca-
 rycis pinguibus, passulis, cum oleo antiquo li-
 gustrino, irino, sampsuchino, susino. Verum
 cum nostra mulier etiam interiora vuluæ digi-
 to inunxisset sequenti linimento: & olei lilior.
 ʒ j. moschi optimi gr. vii. croci orientalis ʒ β.
 tandem, his remediis reiteratis, molam car-
 neam reiecit quasi multis oculis refertam, ro-
 tundam, multo ampliorem palma manus, imò
 ad duas ferè excedentem. Noui & aliam mi-
 licem, quæ nullo modo nec medicamentis po-
 terat curari, & valde de vita periclitabatur, cui
 consultum fuit à vetula, ut fumigium ex anc-
 tho & cumino super prunas iniectis sub vesti-
 bus fieret, vel sub sella perforata: illudque re-
 cipiens, molam carneam cruentam & satis ma-
 gnā excreuit, & conualuit. Ita & alia, cur em-
 B b 2 plastrum

388 DE MULIERVM MORBIS,
plastrum ex fimo bouillo pectini appositum
fuit. Venit & mihi eo tempore quo præceden-
tem mulierem præ manibus haberem, in men-
tem historia Antonij Betti, Medici Bononien-
sis præclari, quam ex Cronenburchio Medico
Colonienfi, qui ante nos Bononiæ eundem
Bettum subinde in praxi sequutus fuerat, ac-
cepimus. Anno videlicet 1538. mense Februa-
rio, vnâ cum Betto Medico, vidit mulierem
quæ mense tertio abortiit, & vnâ cum fœtu hu-
mano perfectè & rite figurato molam carneam
ad magnitudinem ferè gallinæ, eiecit: in qua
caput erat configuratum cum rostro in simili-
tudinem aquilæ, sed aduncum non erat; rictus
cartilagineus utrimque diduci poterat, ocu-
lorum loca expressa erant informia, à latere
membranae carnosæ, cuiusmodi in effigie scul-
ptæ quoque erant. Cronenburchius cum con-
discipulis causam inquirentes, quæ huiusmodi
figuram, seu formam materiæ impressisset,
offenderunt in cubiculo, vbi decumbebat puer-
pera, ad focum in cantino sculptas monstrosas
imagines, inter quas duæ sibi ex aduerso scul-
ptæ, exquisitè, perfectèque capita ad humeros
vsque isti monstro à puerpera edito similia præ-
ferebant. Iudicauit cum illis præceptor, vehe-
mentem earum imaginum in phantasia im-
pressionem, causam fuisse, vt in semen virile
copiosa materia menstrua monstrosam for-
mam induxerit; aut virtutè formatiua seminis
virilis debili existente. Hoc ipsum confirmat
Galenus libro De theriaca ad Pisonem pag. 77.
histo-

historiam narrans de deformi quodam puellam
 pulchram procreare cupiente, qui depinxit in
 ato ligno elegantem puellam, dicebatque mu-
 ieri, vt inter coeundum in illam inspiceret.
 Bettus huic mulieri ad secundinam propocan-
 dam dedit hanc compositionem: ꝛ pul. cassiæ
 lignæ, cort. interioris cassiæ fistulæ, rubiæ tin-
 ctor. croci, sem. porri, trochis. myrrhæ, añ. ʒ
 ꝑ. misce: dosis erat ʒj. in iure gallinaceo aut
 carniū; & contulit. Eiecit autem postridie
 molam dictam quum hunc puluerem ad se-
 cundinam depellendam sumplisset. Tandem
 compositionem in pilulas formauit, ad elicien-
 dos menses, atque in 12. pilulis formato pul-
 uere, dedit & manè tres ante potum cum de-
 cocto cicerum & capill. ven. Vidimus Cydone,
 inquit Benedictus Veronensis lib. 25. cap. 34.
 De mola ex Aristotele, mulierem quæ octauum
 antè partum gestauerat, & cū insequenti se
 etiam concepisse putasset, & iam decimum
 mensem attingeret, vna nocte ei sanguis con-
 gij mensura rubicundus effluit. Vidimus mu-
 lierem, quando eo trepido profluuiū omnes
 territi fuerant: eius labra animaduertimus ru-
 mentia, ac oculorum genas, facie de cetero
 pallecente; brachia præter consuetudinem ma-
 cilentia videbātur: ventrem deinde detumuisse,
 & in eo pondus molestum sentire se aiebat:
 proinde in vtero molam esse omnino adiudi-
 cauimus. Obstetrix clausam esse naturam nū-
 ciauit: coniectis inuicem tribus pessis ex gal-
 bano, bdellio, ac opopanace compositis, iam

naturalia ora patefacta sunt, miro naturæ opere; molam subinde extraxit obstetrix in tria frustra discerptam, quæ subinde confuta molam integram rotundam constituere, superstitione quadam, ad auertendam talem molam, & infumari camino iusserunt. Ea informis erat, cute humana obducta, intus materia sine ossibus, sine corde, sine iecore ac intestinis; sed confusa quædam caro erat mollis, venis conspersa pluribus, cucumeris magni rotundi modo; ea duritiem nullam adhuc contrahere poterat. Huius rei infinita penè exempla sunt. Vidimus Genuensem mulierem ad vitæ usque exitum gestare vêtosam: ac aquosam pariter ad quintum decimum mensem; cumque omnia ex ratione cõceptus veri venissent, præter quòd in ventre punctiones crebras submordentes patiebatur, soluto demum exiguo aquæ, cetera per se subsedere. His tamen vera mola & carnea non erat. At vera mola, ut idem refert lib. citato, cap. 36. De molæ generibus & signis, Apoliam infestat, ac ora maritima Italiæ circa Pisanum agrum; plures enim molas simul parere visuntur. Nam quibusdam in locis superfoetant, bubonis similitudinem, & animal dirum pariter cum partu humano edunt. Interdum harpyiæ (ut dicunt) forma vivere subinde eas dicunt, ac per cubiculum volitare, quæ sæpe in vtero partum necauere, aut rostro infesto, aut compressu. Et ego audini (inquit Gradus) mirabilia, sed non vidi, de animali generato in vtero cum alis, quod cum exiret matricem, volauit:

lauit: multa tamen dicuntur quæ non semper sunt vera. At Benedictus Veronensis inquit: Eam vim astro attribuunt incolæ philosophantes: propterea fera illa belua appellatur. Vidi-
dimus & retentis menstruis, ad quintum deci-
mum vterum gestasse mulierem, quæ medica-
tis locis spirauerat, vno & continuato proflu-
uio exonerata est, vnde molam sanguineam vo-
cabant. Filia Gualtheri, nuper nupta, apud
Amatum, cum omnium opinione pragnans
diceretur, loco fœtus quatuor animalia ranis
simillima peperit, & optimè valuit: sed postea
circa pectinem dolorem sentiebat, quem pau-
cis adhibitis remediis sedauimus, & pulcherri-
mè viuit. Similiter mulier Dionysij Pintii, cum
puerum optimè peperit, inter secundas animal
ranæ simillimum eiecit, & ipsa & puer pancrea-
ticè habent. Mercatoris quoque qui ex Anglia
venit vxor abortiuit, & secundo die post abor-
tum simile quoque animal peperit; vt multis
aliis euenisse vidimus, præcipuè Anconitanis.
Debet verò animal hoc inter molæ genera ad-
numerari; quale etiam illud quod altera post
abortum pepererit frustum quoddam carnis
galli cristæ cum rostro gallinaceo similitudi-
nem habens.

SCHOLIA.

ARISTOTELES igitur ait, molam esse inchoa-
tam fœtus formationem, sed nunquam abso-
lutam, vt carnis genere deficiat generatio, ad genus

B b 4

verò

392 DE MYLIERVM MORBIS,
 vero animalis peruenire nequeat. Hæc ergo aut bre-
 uiparitur, aut toto vite tempore seruatur, atque in-
 terim durefcit adeo, vt nec ferro quidem difcindi
 poffet; vt nos aliquando etiam fpectauimus. Quod
 verò poffit diu durare, caufa eft, quoniam non pror-
 fus præter naturam, vt corrupta: eft enim inchoata
 actio. Quod verò durefcit, materia cruda eft in
 caufa. Causa autem cur ad perfectionem non ducatur,
 eft debilitas agentis, qua materia generationis
 non bene concoquitur, fed femicotta remanet, vnde
 & opus imperfectum facit, rerum inftar, quæ ob de-
 bilitatem perfici nequeunt. Cur verò hoc in aliorum
 animalium feminis non accadat, caufa eft (inquit)
 quod mulier plurimum abundat menftruis, & affi-
 citur vtero, id eft, patitur affectus, à quibus impe-
 ditur actio concoquendi, vnde massa femicruda per-
 manet. hæc ille. Et eft eadem ratiocinatio, qua de
 menftruis agit 4. De generat. animalium 3. Cum
 enim agens non fuperat, motum non attingit: fed
 vel extraneum à fimilitudine parentum gignit; vel
 etiam animal folum, id eft, monftrum, vt paulo antè
 dictum eft; vel etiam carnem informem, id eft, non
 animal, fed viuens. Galenus eadem via ingreffus 14.
 De vfu part. & cuncta in agentis debilitatem refert.
 Primum igitur generationem hanc fimilem facit, vt
 paulo fuperius dictum eft, generationi omni fubuen-
 tanei: hoc verò vno difcrepare ait, quod illud fine
 maris confuetudine gignitur; at mola non nifi mu-
 lieribus concumbentibus. Aliis enim nunquam (vt
 & Iacchinus teftatur) vifa eft eueire. Vnde con-
 cludit Galenus, in hac conceptione, dimidium agen-
 tis, & imperfectius concurriffe, id eft, femen femina:

At

Femina
 aliorum ani-
 malium ab
 homine non
 patiuntur
 molam.

et quod viri est, minimè, vel protinus restinctum. Igitur itaque concoquendo sanguinem menstruum, & in quandam carnis speciem ducendo, sed animal delineare nequit sine ope maris. Relinquitur igitur corpus viuens, & vegetans caro, quæ in nulla specie erit, nisi ut imperfectum ad genus perfecti reduci-
tur, id est, ad genus carnis humanæ, sicut & em-
bryo ad genus hominis. Coitus autem non iuuat ad hoc ut semen maris in generationem deducat: sed quia in coitu ob voluptatem mouetur naturali motu semen mulieris ad uterum, atque admiscetur sanguini menstruo, vnde & concipit. Quod verò durescat, mora fortè in causa est, vnà cum materia cruda & crassa, ut Aristot. dixit. Ita & Fernelius molæ causam efficientem dixit esse non solum sanguinem menstruum, aut muliebne semen, sed viri semen, idq; corruptum, aut quouis modo inualidum, quod alimentum quidem trahere, nihil verò conformare potest. Rondeletius putat, tam informem carnem, quam durum tumorem esse in ostio (iuxta Aëtium & Paulum) fieriq; primum ex semine veluti duram tunicam, & è sanguine crasso spissoq; calore concreto, quæ nullam formam habet, & velut parenchyma quoddam vtero alligatur, & quod sic tumor apparet, ob inuolucris duritiem, ideoq; tumorem durum dixerunt; informem autem, quia nullam animalis figuram habet. Fit autem secundum ipsum à semine & à sanguine multo crasso, spisso & concreto, quem immodicus calor cogit & in carnis formam transfert. Nam id euenit, quando plus sanguinis menstrui influit, quam sit necessarium pro fœtus formatione. Spiritus autem genitiuus, aut qui opificis vires gerit, ut

B b 5

ait

Contra Aë-
cium.

Materialis
causa mola.

ait Galenus, non potest tantum materia elaborare,
& ex ea foetū formare. Nam ad foetum utrumq. se-
men sufficit. Sanguis verò menstruus ad nutrienda
illa semina vel augenda trahitur. Donatus tamen
aliam generationem suscipere ait secundum quos-
dam, & quod haec non (vt Aëtius asserit) aliquando
pragressa inflammatione succedit; nec aliquando
post locale vlcus cui caro supercreuit, velut ea, quam
ipse tumorem vteri induratum appellat: nec ex se-
minis muliebris, & plurimi sanguinis menstrui
affluxu, ac in vtero retentione, quem cogit calor im-
modicus, ac in carnis formam transmutat, genera-
tionemq. suscipit: sed aliam tum materialem, tum
efficientem quoque causam habet; vt ex Hippoc. Ari-
stot. & Gal. auctoritatibus (inquit ipse) demonstra-
bimus. Ait enim Hippocrates lib. De sterilibus: Mola
porrò conceptus causa haec est, cum multi menses mo-
dicum & morbosum semen conceperint, neque con-
ceptus rectè sit, & venter plenus est, velut pregnan-
tis: quibus verbis clarè ostendit, materialem causam
ipsius mola esse menses multos cum modico & mor-
boso semine commixtos; semine, inquam, maris, &
non femine. Nam si de femineo semine intellexisset,
frustra modicū & morbosum adiecisset, quum quan-
tulumcunq. & qualecunq. tale semen esset. frigidius
& humidius existens, atque imperfectius viri semine,
mola conceptus non sequeretur. Addidit etiam, Neq.
foetus rectus sit; quasi imperfectus conceptus sit in mola
ex paucitate & vitio seminis ortus: namque ex eius
mediocri multitudine ac salubritate foetus rectus ge-
neratur, si cum moderatis mensibus fuerit permixtū.
Quod verò idem sentiat Aristot. (addit Donatus)
lib. 4.

lib. 4. De generat. animal. clarè patet. Nam quarens
cur ceteris animalibus mola non generetur, nisi quid
admodum lateat, sed mulieribus duntaxat, respon-
det, eam inter animalia affectionibus vteri obnoxiam
esse, & menstribus abundare: quibus verbis menstuo-
rum copiam necessariam esse pro mola generatione
fatetur. Quod verò necessarium quoque sit viri se-
men, eodem loco ostendit, cum dixit: Iam accidit
cuidam mulieri, ut cum concubisset, & se concepisse
putasset, primum ventris moles augetur, & reliqua
ex ratione venirent: quæ demum difficultati intesti-
norum implicata, eoque modo periclitata peperit car-
nem, quam molam vocant. Quid clarius quod semen
viri simul cum sanguine menstuo concurrat in mola
generatione? Galenus autem lib. 14. De usu part. ad-
uersus eos, qui volebant femina semen conferre ad
fœtus generationem tamquam motus principium
quoddam, hæc protulit verba: Si igitur eò vsque vo-
lunt semen femina progredi, primum quidem quod
parum artificiosam actionem ei tribuit, quæ utique
vel soli menstuo fortè affuerit, nemo est, qui ignoret:
secundo autem quod mentiuntur etiam in his quæ
accidunt explorandis, non enim sicut gallina sine ma-
ribus oua pariunt, ita mulierem aliquando viderunt
sine viro, vel molam, vel huiusmodi quippiam aliud
concepisse. Cum igitur in femineo semine nullum ad-
sit motus principium, neque perfectum, neque imper-
fectum, licet ad animalis generationem aliquid con-
ferat, aut saltem si quid haberet, non nisi cum maris
semine habere putandum est; ut in eiusdem Galeni
doctrina sæpius legitur: absque controuersia censen-
dum erit, neque perfectum fœtum, neque etiam mo-

lans

Efficiens
mole causa.

Concludi-
tur modus
generatio-
nis Mole.

lum citra viri semen posse generari, vt quidam ad pauca respicientes falso putarunt. Ceterum quod efficiens mole causa non sit immodicus calor, sed potius eiusdem caloris imbecillitas, ab eodem Aristot. citato loco scriptum est. loquens enim de mole generatione sit ait: Afficitur enim conceptus eodem modo, quo ea, quæ inquinari dicimus cum elixantur; nec per calorem, vt quidam volunt, sed potius propter caloris debilitatem. natura enim de vita certare videtur, nec posse perficere, finemq; apponere generationi. Et demum subdit: Causa namque duritiæ cruditas est, quippe cum inquinatio quoque cruditas quædam sit. Nam loquens de ouis, quæ subuentanea nuncupantur, quibus proportionem mole respondent, asserit, ea propterea esse imperfecta, & ex ipsis animal gigni non posse, veluti ex aliis ouis, quoniam vt perficiantur à masculo solam desiderant caliditatem. Ergo veluti ex diminuto calore subuentanea fiunt oua, ita & mole, quæ eisdem proportionem respondet, ex imbecillo & non immodico calore ortum ducit. Erit autem eius generationis modus talis, quod cum in concubitu multa copia sanguinis menstrui in vteri cavitae contineatur, proiecto à mare modico, eoque morbofo semine, ac eidem sanguini menstruo commixto ex imbecillitate caloris, præcipue ipsius seminis, & secundario fortè ipsius sanguinis menstrui, utroque tamen in vnum motum tamquam vno principio conspirante non potente eandem materiam perficere, ac concoquere, cum sit humor concoctui difficilis, vt inquit Aristot. neque finem generationi apponere, carnem hanc inutilem atque informem, quam molam vocant, idem imbecillus calor procreat, quæ interim per annos tres

aut

ut quatuor, quandoque tota vita perdurat, adeo
 et consenescat, ut inquit Aristoteles. Hæc satis de
 causis mola vera. Nunc aliud exemplum profera-
 mus. Sed illud prius addere libet, quod Amatus cen-
 tur. 4. curat. 3. idem sentit. Cum enim monacha ex
 iis quæ religiose & secretè à turba viuunt, malè ha-
 beret, & intra corpus motum persentire se diceret,
 vnde ceteræ monachæ illam molam intus habere con-
 tendebant; & cum illud fieri non posset, consuluit
 Amatus ut rem aut occultarent, aut alterius morbi
 genus asseuerarent. Quod Auerroës testatur, ex se-
 mine viri in balneo relicto mulierem pregnantem
 fuisse, quod & ante eum Hebræi testantur, qui ex
 filia Hieremiæ prophete natam esse Benziram tra-
 dunt, virum doctissimum & sapientissimum, id Ga-
 lenus 7. Meth. med. cap. 6. & aliis locis non admittit.

OBSERVATIO LXII.

*De mola instar accipitris caput rostra-
 tum habente, eiecta.*

GERTRUDIS, mulier si quæ altera procera
 & pulchra admodum, & fecunda, quæ
 Delphis pro ædibus corui insignium habebat,
 cum se gravidā putaret, vndecimo mense per-
 acto, molam se habere suspicabatur. quanquam
 aliquando contigerit, post decimum & vnde-
 cimum mensem peperisse; vtriam Amatus re-
 fert centur. 1. curat. 27. de partu decimestri, &
 de molæ generibus ac matricis varietate. Anna,
 inquit, consanguinea, Stephani Pyrrhi vxor,
 cum

cum exactè conceptionis tempus obseruaret, post decem menses & vndecimi tres exactos dies puerum optimè peperit: vterum enim gessit decem mēsis & vndecimi tribus diebus. Vnde Plinium verum dixisse lib. 7. naturalis histor. cap. 5. deprehendi, inquit, vbi præter Lucij Papirij prætoris opinionem affirmantis, homini nullum esse pariendi statutum tempus, homo vsque ad initia vndecimi gignitur mensis. Vndecimo verò ab hora conceptionis mense Salomon Hebræorum sapientissimus in lucem prodit; vt ipsemet testatur cap. 7. Primogenitus quoque Domini Herculis Ferrariæ illustrissimi Ducis decimestris est, vt omnes ibidem norunt, & Brasauola scripsit: quem terminum Hippocrantum lib. De natura pueri prope finem signare videtur. Sed de iis, & eorum causis, Leonardum Fuchsiū Germanum legere est, qui, Amati sententia, præ ceteris melius & accuratius lib. 6. Epid. ea differuit. Ceterum mulier illa de qua nunc dicere cepimus, cum non amplius se grauidam esse putaret, molam caput rostratum instar accipitris habentem cum vi quadam & maximis torminibus peperit, quam molam vidimus, adeò duram vt ferro incidi non posset; & post eam reiectam subsequutus est ingens fluxus menstruorum, ita vt omnino ad deplorationem decumberet. Mulierculæ vulgari nomine hanc beluam appellabant *een zuyger*: verum vbi carnea est quidem spongiosa, & non ita dura, cum oculis referta, & mollior, solent suo idiomate appellare lingua Germanica

manica een manendracht; quamuis eadem etiam
nola existat quænis caro informis. Ceterum
luxu enormi adeo subsequente, ut ipsa in syn-
topen inciderit; hoc præscripto condito, seu
opiata, viribus refocillatis, & fluxu paulatim
inhibito, cum pro mortua satis haberetur, præ-
ter opinionem astantium conualuit: & confer-
ros. antiquæ seu veter. ꝑ j. diacydon. sine spe-
ciebus ꝑ ꝑ. trochis. de carabe, de terra sigillata,
de spodio, cum sem. acetos. cornu cerui vsti,
añ. ꝑ j. manus Christi cum perlis ꝑ ꝑ. rasuræ
vnicornu gran. iij. cum syr. cydon. & mentha-
ceo q. s. fiat conditum. eoque cum videretur ad-
libitum, tandem fluxus cessauit.

SCHOLIA.

SIGNA mola iam ex parte diximus Obs. 61. præ-
cedente, & quibus modis ab hydropo & conce-
ptione distinguatur, & quod deprehendatur graui-
tate uteri, & tensione maiore quam in vera impræ-
gnatione: sequiturq; mensium suppressio, decolora-
tio, appetentie deiectio, mammarum inflatio; & ut
breuiter rursus dicam, omnia quæ in vera impræ-
gnatione solent accidere, nisi quod grauitas corporis, de-
coloratio, & appetitus deiectio diutius durant. Quod
verò accidentia eueniant conceptioni similia, in cau-
sa est, quod uterus occluditur, non secus ac su-
per factum, non discernens initio utile ab inutili:
vnde retinentur menses. Sed post tractum tempo-
ris, cum solent fetus copiam absumere, mulieres me-
lius habent: hic verò semper deterius; quoniam
semper

Signa mola
& quibus
modis diffe-
rat à conce-
ptione, &
in quibus
cum conce-
ptione com-
municet.

Signa di-
stinguentia
à concep-
tione.
re.

semper causa malè habendi abundant magis, id est, retenti menses: vnde & cachexia fit, & tandem hydrops. Signa verò distinguentia sunt à conceptione, saltem post tempus: quoniam vbi concipiunt leniri in vtero solent; hic ingrauescunt, & multo deteriora sunt de grauitate, colore. Ex motu quoque, quoniam velut pondus iners debilitatur: quòd si moueatur initio, at non consequitur augendo corpus in tempore, quo fœtus augeri solet. Addunt Arabes, mēstruis propriis ordinatè fluentibus imprægnatio vera fit; mola nunquam. Ante mensem tertium motus in matrice sentitur in vera imprægnatione nunquam. Quod aliqui dicant molam viuere etiam post partum, id ego non vidi: at Gradus scribit bis aut ter se vidisse, frustum carnis quod mouebatur vixisse per horas, cum tamen mulier se credebatur pregnantem verè; sed eo emissio cessauit prægnatio cum accidentibus eius: quanquam alij etiam harpyias volitasse scripserint, vt antea dictum est, easq; partum necasse aut rostro infesto, aut compressu. Verum hæc nostra mulier, de qua nunc diximus, solam illam molam rostratam peperit sine fœtu alio. Præterea distinguitur mola ab iisdem, quòd in ea alius citissimè in tumorem tum venter attollatur, & velocius incrassetur, imò sæpe in tempore non perceptibili: fœtus quoque dextrorsum sinistrorsumq; mouetur: contra mola nisi comprimatur, aut mulieris motu excitetur, non mouetur; vel compressione violenta manu, eaq; amota, ad pristinum locum redit. Fœtus quandoque ex tali compressione mouetur, quandoque minimè. Prægnans quoque agilior quàm molam gerens. in mola alius tactu durior reperitur, in vteri gestatione tracta-

tractabilior. Quamuis his modis cognoscatur, ut apud Guainerium ad longum quoque docetur; tamen aliquando ita signa obscura sunt, ut saepe fallant etiam Medicos peritos; ut contigit Grado in propria sua vxore; cuius historiam hic libet adferre. Vxor mea (inquit) aetatis annorum 33. vel 34. bona habitudine, sanguinea, bona etiam compositione, postquam habuisset prius, dante Deo, tres filios; at filius postea orbata, & tali, tertio nempe filio, annorum 14. mediocri ingenij & bona spei, adeo vehementer mater praetristitia continua per tres quasi continuos menses quasi amens & debilis discursus effecta est. Tandem ei successerunt signa vera impraenationis, unde incepit leniri de afflictione mentis ob defunctum filium; incepit quoque in operationibus animalibus & naturalibus rectificari; restrictis mensibus venter paulatim intumescere, & incresebat, cum bonitate caloris matricis, & aequali quasi pondere ventris & dorsi, & cum reliquis accidentibus, quibus ipsa olim praegnans afficiebatur: saluo quod in singulis temporibus debita suae menstruationis ordinatè parum & valde modici sanguinis & menstrui manifestabatur. Cum tamen ante apparitionem signorum impraenationis copiosè multum menstruabatur. Succedente tertio mense ad finem, vel in principio quarti, percepit ipsa motum quasi concepti, ut alias consuevit tempore praenationis, cum accidentibus reliquis, & appetitu, & bonitate coloris ad melius conuersis: & ita successiue indies amplius manifestabatur motus, ita quod 7. & 8. mense, & manifestius in 9. mihi saepe palpani manibus supra ventrem eius obiciebatur motus velut infantis, cum inspissatione, ali-

Historia
Gradi, quo-
modo fuerit
deceptus in
propria sua
vxore, in
falsa impra-
gnatione.

C c

quoties

402 DE MVLIERVM MORBIS,
quoties impetuosè sub manu comprimente, & am-
plius sepe etiam, ipsa & iacète & aliquoties stante,
manifestabatur visu situalis motus rei globosa in
vtero, à dextro aliquoties versus sinistrum, & quasi
depressio, crescentibus semper in ea accidentibus ad
bonum; & de appetitu & bonitate coloris: crescente
sola grauitate ex pondere circa partes inferioris ven-
tris, & inhabilitate ad motum progressiuum, vt in
reliquis communiter verè pragnantibus euenire solet
in dictis mensibus. Ipsa tamen aliquoties leuiter du-
bitante de vera pragnatione, propter id solum quòd
singulis suis tēporibus parcissimè menstruabatur; cum
tamen aliàs, cum esset pragnans, nullo modo men-
struaretur: hoc tamen & mihi & alijs quibusdam
doctissimis viris ad augmentum fidei pragnationis
faciebat; vt idem faciet tibi, si considerabis quæ dicta
sunt. Et ita his signis confirmatus sum in opinione
veræ pragnationis, cum iudicio etiam multarum ma-
tronarum in his expertarum. Ipsa etiam annuente,
accepimus in domo vnā nutricem in principio noni
mensis, quæ erat proxima ad partum, & infra octo
dies peperit vnā filiam, & eam tradidi vt nutri-
retur sub alia nutrice, sustinendo lac enixa cum alijs
aduentitijs lactantibus & sugentibus lac eius; hoc fine
tantum, vt purgato lacte eius tempore partus vxoris
fœtus haberet sibi nutrimentum conueniens. At tan-
dem transiuit 9. mensis, 10. & 11. cum continua
expectatione futuri proximi partus. tandem transiuit
12. & 14. continuatis semper accidentibus apparen-
tis veræ impragnationis, & reseruando nutricem in
domo, vt dictum est. Post x1. tamen cepit spes minui,
& diffidentia intendi: ita quòd expedito 14. mense,
sublat a

sublata mihi omni spe, dixi ego consorti meae, non
amplius sperandum de pragnatione, cum nusquam
legissem veram pragnationem ultra 14. mensem ex-
tendi posse; imò raro ultra 9. & rarius ultra 10. licet
aliquoties mulieres cum sunt mola affectae in primis
mensibus aut duobus vel tribus mensibus, si impra-
gnantur post vera impragnatione: quod possibile est,
sicut possibilis superimpragnatio, de mente Philosophi
& aliorum: & tunc cum pariunt in 9. mense, &
simul cum partu naturali emittitur sola mola, saltem
si fuerit menstrualis; dicunt tunc mulieres se peperisse
in 12. licet partus in veritate fuerit in 9. Verum tan-
dem sic nos delusi de ista pragnatione. at ex vna parte
dubitabam de mola vera animata, & sic quasi de
impossibilitate cura: ex alia parte, cum operationes
omnes essent in ea incolumes, & naturales, & ani-
males, praeter motivas, insurgebat dubitatio, quod
ibi non esset aliquid tale innaturale. Nam in tanto
tempore debuisset communicare nocumentum hepatis
& reliquis membris, &c. Et ita in facto fuit: quo-
niam intra mensem, sine medicinis aliquibus acutis,
sed cum solo usu pilularum elephanginarum, sensel
in hebdomada, remota est omnis detumescencia ven-
tris, & inhabilitas motus, & remansit perpetuo sana.
Neque verecundor ego dicere, me casum illum non
intellexisse: quoniam & sapientiori Medicorum
Auenzoari, cui non essem dignus soluere fimbrias
calciamentorum, idem contigisse legitur de quadam
pregnante. Nam, ut ipse refert 36. Theisis, erat in
domo Haly filij Ioseph mulier quae conceperat, quod
mihi erat incognitum, ut dixit, cui dedi medicinam
mirabilis fortitudinis, in qua nullus posset existimari
C c 1 euadere,

euadere, sine abortu, bibendo etiam paruum eius mensuram: & tamen nihil perturbationis & malitiae pertulit, & in debito termino peperit infantem à leſione immunem. Dolui errando quòd illi dederim medicinam talem, contra mandatum artis; sed feci deceptus, id est, ignorans. Subiciamus ergo ceruices nostras, & superbiam nostram: neque existimemus nos omnia posse scire; non propterea desistamus à studiis continuis. Hactenus Gradus. Diligentes igitur simus ut rectè molam à conceptione distinguamus.

Mola vera
distinguitur
à non vera;
nempe
aquosa, &
ventosa.

Verum quod ad alias species attinet, quæ propriè non sunt mola vera, etiam doctiores de iis mentionem faciunt, ut Benedictus Veronensis: At aquosus (inquit) interdum sanguis vitio iecoris in matricem transmittitur, unde aliud mola genus concipitur: venter gravidarum more tumet, sed mollior; præcordia plurimum veluti hydrops hyderos suppressit; unde difficulter anhelant, & cum supina mouentur, sonitum intus cum murmure seu fluctuatione edunt. Simili modo & ventus concipitur, qui per naturalia ingreditur; quod percussione quandoque euenit, frigore, cibo inflante, vel crasso in vtero humore, qui in spiritum versus inflat, is saepe per crepitus emittitur: tum tympani modo sonat percussus venter, unde tympanica hyderos à nonnullis putatur; nam præcordia, ilia, inguinaq; non sine cruciatu extenduntur. Prima pertinet ad hydropem vteri ut diximus: secunda ad vteri inflationem. Nam in vera mola carne pondus maius quàm in prædictis sentitur, & motus est ex compressione ad latera. in aquosa est maior grauitas, quàm in ventosa, sed durities minor & quasi nulla; quamuis in vtraq; venter vndique extendatur, &

ita

ita grauantur partes diuerse, sed in ventosa pondus extendens & grauens dorsum. Hæ rursus distinguuntur ab hydropo: quoniam in vera hydropo inter intestina & peritoneum colligitur aqua, & motu sentitur, ex fluctuatione: ita in tympanite vndique venter inflatur. Verum cum hæc non sit vera mola, recurrendum ad ea quæ de inflatione vteri diximus, & de hydropo matricis. Restat vt sola signa prognostica de vera mola addamus. Cum ergo intenditur hic affectus in aquam subtercutem degenerat, nonnumquam etiam insanabilis magna ex parte redditur: quibusdam & sanguis erumpit, Paulo auctore. Hanc affectionem alij velut incurabilem penitus reliquerunt, alij incipientem tantum curari posse confidunt. Negligenda eius curatio non est; sed omnia quæ conuenire videbuntur facienda, vt asserit Aëtius. Quanquam Hippocrates lib. eodem De morb. muliebribus sic de ea scripserit: Hanc igitur maximè quidē ne curato, aut certè cum prædictione. Addunt Neoterici, si initio deprehendatur, non expectandum tempus partus, sic enim sæpe incurabilis est, aut onere graua natura propulsatur, sed exeundo interficit, aut dolores acerbissimos, symptomataq; periculosa inuehit. Perpiniani (inquit interpretes Hollerij) vidimus mulierem nobilem interiisse, cum molam gestasset duodecim mensibus. Oranis, inquam, mola (teste Guainerio) siue pauci siue multi temporis, difficulter curatur: nam plurimi Medici, dum dubitant de signis imprægnationis, timentes abortum, partus naturalis tempus expectant: eaq; de causa fortè in principio curationem facillè recepisset, nunc autem cum difficultate curatur. Alj verò qui præter car-

Signa prognostica.

406 DE MULIERVM MORBIS,
neam molam veram, alias species constituunt, dicunt
humoralem difficilius curari ventosa, carneam diffi-
cillimè. Iam & mola innumeros Medicos aberrare
fecit. Antiqua hydropem ascitem inducit lethalem,
vt postea exemplo docebimus: tympanitem quoque
periculosam, si inflatio perdurans vterum infestau-
rit: sed illa vera mola non est, vti diximus. Post
molam raro rursus impregnantur, & si conceperint,
facile abortum patiuntur, aut morbosum fœtum pa-
riunt, propter vteri vehementem debilitatem post
molam relictam. Mola quoque indurata, siue id per
congelationem acciderit, seu per adustionem, diffi-
cillimè emittitur.

OBSERVATIO LXIII.

*De mola post fœtum perfectum
relecta.*

MARGARETA Cornelij, vxor Harweri
mercatoris Delphenis, quum anno
1559. nono mense peperisset, eam eo tempore
à secundina relecta liberauimus. Hæc ipsa rursus
anno 1562. 29. die Maij, qui Veneris erat, cum
feliciter peperisset masculum, bene deinde ha-
buit. Die autem Dominico (qui erat vltimus
Maij) subsequente, cum paulum vini sumpsisset,
horrorem experta est, ac parum febricitauit, &
capite dolebat. Die verò Martis magis febrici-
tauit, in ventre ac lumbis admodum torque-
batur, molamque carneam reiecit. Et tunc ad
illam vocati sumus. Mola autem, vt vidimus,
erat instar volæ manus rotunda, dura, carnea,
qualem

qualem etiam tertio die à partu nobilissimam matronam reiecisse vidimus, vt antea dictum est. At hæc mola de qua nunc loquimur, erat partu quasi secundo vel secundina interuestita, ita vt pars superior magis neruosa propenderet istar secundinæ, adeò vt mulieres astantes secundinam ipsam membranam fœtum inuoluentem esse putarent, & obstetricem inculparent, quòd puerperam à partu secundo seu secundina reliquerat. Sed ea aduentante, Heyla nomine, in arte obstetricandi gnara, vt sæpe vidimus, molam quoque esse affirmavit, nobiscum sentiens, nec secundinam esse, licet membrana secundinæ instar carnea illa mola vestita erat; cùm in principio partus secundinam ipsam vnà cum partu excepisset. Cùm autem molam hanc pareret, plurimum angebatur, cum ventris dolore ac lumborum acerbissimo. Sed quia purgatio non satis subsequēbatur, nisi sordido quid ac malè olente emanante, ventrem vndiq. inferius inungi iussimus oleo liliaceo, & pro febre quæ tunc continua erat, ptisanam ex hordeo & glycyrrhiza pro potu bibendam concessimus: nam cereuisia ad caput ferebatur, & facilè paraphrenitidem induxisset. Sub noctem verò Cornelius Leydius, collega meus me senior eo tempore, vnà ad eam vocatus fuit: sed nescio qua de causa noluit venire. Quare vt glans iniiceretur iussi, cùm aluum non deponeret: at cùm & Hugo Nieuenius, Medicus Haganus, eius mariti sororius, expectaretur, id distulerunt in diem sequentem. Mane sequenti

408 DE MYLIERVM MORBIS,
summo diluculo Hugo accessit vnà cum Cor-
nelio Heydio. Communi consilio tunc glans
indita fuit ex pul. spec. hier. 3 j. salis exig. cum
melle parata; atque conclusum, si aluus à glande
non solueretur, potionem sequentem exhiben-
dam esse: & elect. lenitiui 3 vj. cum decoct. ci-
cerum rub. propinetur. Verùm à glande co-
piosè satis aluum deiecit; ac dolore ventris
nonnihil sedato, potio exhibita non fuit. Inte-
rim vt purgatio magis succederet, & menses
magis fluere, ac in partu probè purgaretur,
excrementis communibus nunc à glande edu-
ctis, pul. hic præscriptus est: & nucleor. persica-
rum, rasuræ dactylor. añ. 3 ij cinnamomi electi
3 j β. sem. viol. commun. seu catulearum 3 ij.
misce, fiat pul. & diuidatur in ij. partes. hic enim
puluis nec febris oberat, & post partum febrici-
tantes puerperas egregiè purgat, & menses in
febricitantibus euocat, vt sæpe experti sumus;
ac idipsum pro arcano habemus. Vnam do-
sim manè dedimus, alteram hora quarta po-
meridiana. Menses satis fluxere, & à partu op-
timè purgabatur, & febris minuebatur. Hor-
deatum pro cibo dedimus. Sub noctem vbi
rediuimus, venter minus dolebat, & lumborum
dolor magna ex parte cessauerat: licet in vertice
capitis nonnihil doleret ad frontem & oculos
dolore tendenti. Quare hic sacculus capiti ap-
positus fuit: & flor. nymphaeæ m. j. β. corticum
cap. pap. albi 3 ij. flor. viol. m. j. coriand. præ-
par. & modicè contusi 3 j. in sacculum corona-
lem vt artis est redigantur. Die Iouis Febris
mul-

multum sese remiserat, & omnis dolor in ventre ac lumbis sedatus est, nec amplius caput dolebat, ac bene in partu purgabatur: hoc tantum restabat quod nocte non dormierat; & hoc ex hordeato venisse putabat, inquiens, si lac acetosum vel ebutyratum cum ovo bullitum comedissem, ut in puerperio alias solita fui, bene dormiuissem. Tunc iterum iniecta glande, & ut illud lac sumeret admissio, amplius non febricitavit, sudavitque egregie; & purgatione menstrua optimè procedente, septimo die à partu computando, à febre libera, rectè deinde valuit.

SCHOLIA.

QUIBVS modis mola vera curetur, exemplis dictis, & postea etiam vno subsequenti, satis constabit. Attamen pro eius curatione, si non sponte reiiciatur, curabimus ut agra decumbat in domuncula angustiore, minus luci exposita, modicè persflata, cubili immobili, sed ita ut pedes habeat elatiores quietosque, motus enim quamlibet fluxionem concitat, ut testatur Paulus. Itaque aer temperatus in actiuus, aut modicè ad calidum & siccum vergens eligatur, somno moderato utantur, exercitium potissimum partium infernarum fugiant; quandoque verò moderata deambulatio confert: sit alius lenis quotidie, & immodici animi affectus omnino vitentur. Cibi tribuantur quantitate moderati, ac boni succi; sitque vini odorati, optimè diluti potus: cum quibus interim ea quæ laxandi viribus prædita sunt, permisceas, & ea etiam quandoque quæ extenuandi vim habent,

Curatio
mola.Ratio vi-
ctus.

C c 5 Vbi

De venar
sectione.

Vbi corpus plenum, in principio, vt diximus, venam secare iubent Paulus & Aëtius, ac alij, si nihil prohibeat, venamq; cubiti secant: interim quoque, praesertim circa initia huius affectus, malleolorum venam secare conuenit, multo sanguine abundante post sectionem venae cubiti. Alij imprimis corpus purgare iubent cum propriis preparationibus, respiciendo excrementa quae magis abundant, ne copia trahatur ad vterum: quo facto, si ferat agra, venam secant tali; ob has cucurbitulas cum multa flamma pubi apponunt. Haud tamen multa copia sanguinis extrahenda est; quin potius, vbi opus fuerit, reiteranda.

Purgatio.

Verum si frigidorum crassorumq; humorum copia adsit, ij parati purgandi sunt, vt alias diximus de suppressis mensibus. Deinde particularem curationem absoluemus, iuxta Aëtium & alios, per cataplasmata relaxandi vires habentia, fomenta, collutiones mitigatorias, pessos mollitorios, qui ad durities vteri ante descripti sunt, in sessiones eiusdem facultatis, cerata ex althaea & diachylo supponemus; deinde (vt Aëtius inquit) cucurbitulas cum scarificatione apponemus. Haec quidem in ipsis exacerbationibus admittere oportet: in intervallis autem corpus reficiemus iis quae ad hunc vsum conueniunt, vt gestatione, deambulatione, balneis, idoneis cibariis, ac vini potione. partibus etiam affectis dropaces illinemus, & nitrum cum sale inspergemus, easdemq; insolabimus; & medicamento è sinapi & carycis rubificabimus: mollitoriis praeterea è seminibus, & baccis lauri & polyarchio ac similibus vtemur: sufficimusq; vapore marinae aquae. Primò tamen sessionibus emollientibus locos, vt facile mola excutiat,ur,

iis

his utemur quæ etiam ad partum facilitandum postea dicemus conducere; atque iisdem quæ valere diximus ad ostium uteri clausum relaxandū & aperiendum; quemadmodum etiam vtilia scripsimus in virginibus, in quibus de angustia uteri nobis suspitio erat, ut sunt decocta althææ, fœnugraci, ficuum: è quibus etiam emplastra imò ventri conuenientia parari poterunt. Sed sessiones magis sunt vtilis; etiam ex decoct. maluarum, althææ, chamæmeli, sem. lini, fœnug. meliloti, anethi, in aqua vel hydreleo. Osculo præterea uteri cerata mollientia vñctionesq; admovebimus, ut œsypi ceratum, adipēs, & medullas, & cataplasmata apponemus qualia posuimus Obs. 61. & pessos mollitorios ibidem descriptos imponemus. Temporis processu lauri folia vel baccas, pulegium, hyssopum, thymum, saluiam, marrubiū, dictamnū, scordium, polium, centaurium, iisdem miscebimus; vel ex decocto. olla autem cuius operculo perforato arundo commodè inserta fuerit, sella supponetur, atque inde per arundinem vapor excipietur. Ex eorundem quoque decocto, exiguo vino albo addito, fœtus cum spongiis fiant: post quos imus venter, pecten, & inguina infra scripto vel simili vnguento perungantur: R. olei irini, lilior. albor. anethini, chamæmel. añ ʒ j. butyri recentis, adipis anseris, añ. ʒ ss. ladani ʒ iij. ceræ & vini odorati parum, fiat vnguentum. Adici poterunt cremor sem. lini, fœnug. althææ, ammoniaci, aut bdellij dissoluti in vino pauxillum. & pessi subiciantur ex œsypo, butyro, adipe porcino, medulla aut cerebro ceruino, melle, carycis pinguibus, passulisq; cum oleo antiquo ligustrino. Perseuerante verò malo, acrium eduliorum vsus est admit-

admittendus; inq̃ fontibus calidarum aquarum, & marina, iuxta Aetium, est innatandum, atque à sumptis raphanis euomendum. Pessos tamen acriores & inſeſiones acriores euitare oportet, ne loca aſidua eorum uſu vlcerata maleſicum morbum efficiant. Quibus peractis frequentiffimè plurima atri & grumeſcentis ſanguinis copia repente excernitur, & morbus diſſoluitur. Neoterici hæc addunt, quod eadem ratio curandi hunc affectum & intentio ſit mouere menſes, planè vt ſi deberet extrahi fœtus mortuus medicamentis, vel cùm retinetur ſecundina à partu. Omnia enim quæ venas aperiunt, & impetum humorum faciunt ad inferna, poſſunt hæc tria facere, ſicut & facerent abortum. Priuatim verò in mola tentabimus id potionibus trahentibus ad inferna cõpiam ſanguinis, præcedentibus prius purgationibus & remediis vniuerſalibus, & demum aperientibus localibus, ſeu peſſi ſint, ſeu balnea, vel emplaſtra, vel inunctiones: tamen iſdem prius relaxantibus, mitigatoriis, emollientibus vtendo, vt diximus; deinde magis aperientibus, menſes euocantibus, & fœtum mortuum educantibus: nam poſtremo loco potionibus rem agemus, & peſſis & balneis validè prouocantibus, de quibus etiam diximus in menſium prouocatione. Ad molam igitur, vt nos fecimus, trochiſcis de myrrha vtemur. Sed qua intentione? mouendi menſes. Sic Rhæſes propinat in potione trochiſcos, quos etiam propinabat ſuprà in menſium ſuppreſſione. Etiam priuatim hos trochiſcos cum adipe aliquo miſcebimus, & peſſum conſiciemus. Quod ſi fortias facere libeat, cyclaminis radice vtemur, modis omnibus parata, & in peſſo, & in balneo, & emplaſtro pubis

pubis: scilla cocta & imposita cum adipe. Iuuant
verò & quæ commotionem multam faciunt, vt ster-
nutamenta, & quæ tuſim moent. Vnde Hippoc.
Si secundam procidere vis, sternutamenta moue. Est
autem his omnibus vitiis utilis aristolochia vtriuſq;
radix, quocunque modo vtaris. Nam ad facilitan-
dum partum eius potione vtūtur, sic & ad secundam
extrahendam, & foetum mortuum. Iuuabit & in-
fessus. Sed secunda ſapius retinetur (de qua ſuo
tempore latius) quoniam in partu vterus est inflam-
matus, ideo extrahi nequit, ni prius inflammatio
ſoluatur, vena ſecta, & fotibus, & inedia, & bal-
neis. Solent autem hi affectus periculosi eſſe ob acutas
febres, quæ hinc ſequuntur. Ex compositis etiam lau-
datur in hos vſus elleborus albus ſuppoſitus cum ſty-
race liquida vel ladano. Rurſus ſabina herba bibita,
ſimul & ſuppoſita naphtha. Iuuat in his omnibus
caſibus item hoc: R. opopanacis, fellis taurini, elle-
bori albi, q. ſ. miſce. Aliud ex ſcammonio & agarico
& hiera miſtis. Aliud ſimplex, borax dictus ad D. ſ.
Modus emplaſtri ſupra pectinem, cum colocynthide
& cyclamine, & ſucco rutæ. Sic & Rondeletius ad
molam vtitur aperientibus & foetus mortuos aut ſe-
cundinam reiicientibus, de quibus multa propriis ca-
pitibus. Componit has pilulas quibus frequenter vtan-
tur manè: R. boracis ℥ j. carabes, aſari, cinnamomi,
nigellæ Romanæ, & vulgaris, ſabinæ, añ. ℥ j. galbani,
aſſæ ſætidæ, opopan. bdellij, añ. D ij. cum melle ſcil-
litico: de quibus capiat ℥ j. (textus corruptus eſt,
qui habet ℥ j.) duabus vicibus, deinde ℥ ſ. poſtea
bibat parum vini hippocrat. aut ſyr. quem deſcribit
cap. De ſuppreſſis menſibus. Vtatur frequenter in
cibo

Casus mola
curata.

cibo apio, alijsq; herbis aperientibus, & incidentibus, ut sanguis concretus dissoluatur eiiciaturq;. Non esset inutile, inquit, cutim, si in orificio appareat, nouacula, aut alio instrumento disseccare, deinde ea ratione curare, qua vsi sumus in secundina adherente, ex putrefacientibus vel arrodentibus, iuxta eundem Rondeletium. Addam hic casum (qui satis erit pro exemplo curationis) Iohannis Tiengij Medici quondam Amstelredamensis, qui anno 1518. in fine Augusti hoc modo mulierem Dauentriensem curauit à mola quam per annum gestauerat. Primò exhibuit ʒj. turbit. & ʒinz. cassie lignee, cinnamomi, añ. ʒ. ʒ. cum decoct. artemis. Post 4. dies idem dedit. deinde omni mane cyathum vnum clareti, quo solitus erat uti pro partu facilitando: attamen prius dederat iuleb descriptum à Nicolo cap. De retentione menstruum. At claretum ita parabatur: R. capill. ven. ʒ. ʒ. verbenae, artemis. beton. pulegij, sabinae, rad. peon. & sem. eius añ. ʒ. ʒ. corticum cassie, gallie moschate, añ. ʒ. ʒ. nucis moschate, rasura lapid. dactylor. sem. althae, fœnug. caryophyl. añ. ʒ. ʒ. croci ʒ. ʒ. dictamni, baccar. lauri, blattae, byzantie, cubebarū, añ. ʒ. ʒ. cinnamomi electi ʒ. ʒ. bulliant in vini Rhenensis optimi ac puri lib. ij. vel iij. cum ʒ. iij. sacchari, & ʒ. j. de corde cerui, fiat claretum. Deinde iussit ut inungeret locellos, ilia, & pectinem vnguento suo molliente, manè & vespere, ita parato: R. olei lilior. amygd. dulc. viol. ping. anseris, gallinae, añ. ʒ. ʒ. olei chamamelini, anethini, ping. anatis, mucilag. fœnugræci, lini & althae, añ. ʒ. ʒ. olei cheyrini, medullae cruris vituli, butyri recentis, añ. ʒ. ʒ. vitellos duos ouorum, cinnamomi electi, gallie mosch.

mosch. ʒ β. puluerisentur vt docet, & fiat vnguen-
 tum secundum artem: quandoque addebat parum
 pulueris paeoniae. Deinde aperiri iussit venam sa-
 phenae pedis dextri. Et omnibus quatuor diebus
 dabat turbitum modo iam dicto. Postea dedit ʒ j. con-
 fectionis suae de assa foetida cum cyatho vno succo-
 rum verbenae, praesij, mixtorum cum vino Rhenensi.
 Haec est descriptio valens ad foetum mortuum quo-
 que educendum: & assa foetida ʒ β. sem. ruta, cas-
 sia lignea, rasura lapidis dactylorum, boracis, añ.
 ʒ j. β. croci ʒ β. myrrhae, theriacae diateffaron, añ.
 ʒ j. Misce, dabat aliquando ʒ j. cum aqua sabinae.
 Cum eo (vt idem refert) curauit mulierem quan-
 dam quae prius pepererat infantem viuum, sed re-
 licto deinde altero mortuo, cuius caput & brachium
 detracta ac abscissa erant, reliquijs remanentibus,
 cum clausum esset os sacrum, & cessassent acciden-
 tia partus. Dedit manè & vespere ante cibum ʒ j.
 donec ab omnibus repurgata & curata fuerit. Idem
 quoque dedit (vt asserit) aliquando cum decoct. ar-
 temisiae, modò cum succo verbenae, & praesio mixtis
 cum vino Rhenano, & hoc autoritate Nicoli; modò
 etiam cum vino decoct. verbenae & praesij. & sem-
 per (inquit) gratia Dei, bene successit. Sed praeter
 haec iam dicta, etiam huic mulieri molam habenti
 dedit omni vespere ante coenam per horam ʒ j. trochis-
 de myrrha cum cyatho vno clareti supra scripti. Dein-
 de etiam peracta phlebotomia, & sumpta cofectione
 ac potione, etiam pectinem fouebat, ac loca dicta, fotu
 sequenti: & maluae, parietar. branchae vrsinae, mer-
 curial. añ. m. j. pulegij, sabinae, artemis. añ. m. β.
 sem. fenug. lini, althaeae, anethi, añ m. β. fiat deco-
 ctio,

416 DE MULIERVM MORBIS,
ctio, & fotu peracto, & corpore repurgato, vnge-
bat vnguento suo emolliente dicto. Quibus praesidiis
fuit à mola liberata & curata. Ac iisdem reme-
diis, vti addebat, curauit illustrissimam Elizabetham
reginam Dacia, cōsultatione ad eandem praescripta.

OBSERVATIO LXIIII.

*De mola aut sanguine crassiore, quem hy-
drops subsequatur, deinde mors.*

VXOR Domini Gulielmi Cripij, viri con-
sultissimi, & vrbis Delphenis Pensiona-
rij, cognata D. Viglij, cū ventrem tumidum
à puerperio haberet, post duos menses, tumore
perdurante, & magis crescente; ego & Cor-
nelius Heydius, collega meus, anno 1563.
10. die Augusti ad eam curandam acciti fui-
mus. Signis igitur praecedentibus, tum prae-
sentibus animaduersis (vt postea latius dice-
mus) cū à tempore partus praecedentis tu-
mor remaneret, & non satis purgata esset, imò
omnia statim retenta essent, ventre tumido per-
durante; vel molam, vel saltem sanguinem
crassiorem, huius mali causam esse existimaui-
mus. Ideo operæ pretium esse duximus menses
aperire cum relaxantibus & emollientibus;
etiam vnguentis per intervalla, & quæ simul
flatus discuterent; primò adhibitis quoque pur-
gationibus aptis, cū alius sicciior nequaquam
responderet; etiam externis appositis quoque
emollientibus linimentis, & vnguentis; habita
semper

semper ratione ad fontem illius mali, nempe
vterum. Nam ex eo reliqua symptomata orie-
bantur; vti cachexia, & postea superueniens
hydrops, hepate refrigerato per consensum.
tandem etiam incrementum maius malum ce-
pit. Decimo itaque die Augusti, vtriusque con-
silio, pro fecum communium educatione leniens
medicamentum præscriptum est: & elect. leni-
tium ʒj. dissol. cum ʒij. decoct. pectoralis. Ma-
ne sumpsit hora septima, & fecibus commu-
nibus eductis 11. Aug. potio sequens exhibita
fuit: & corticum radicum fœniculi, petroselini,
cichorij, asparag. añ. ʒβ. sem. fœniculi, pe-
tros. carui, dauci, añ. ʒj. sem. 4. frig. maior.
añ. ʒβ. matricariæ, calaminthæ, artemisiæ,
añ. m. β. capill. ven. polytrichi, ceterach, añ. p.
j. vuar. pass. ab acinis repurg. ʒj. folior. senæ
ʒβ. rhab. selecti ʒj. schœnanthi ʒβ. fiat om-
nium artis ratione decoct. in aqua communi ad
ʒx. col^r addendo ʒij. syr. capill. ven. syr. de ca-
laminth. añ. ʒj. arom^r cum ʒij. cinnamomi
electiss. & fiat claretum pro duabus dosibus,
fuitque ter reiteratum. Ventrem inunxit cum
oleis emollientibus, vt liliaceo, & pinguedini-
bus anseris, gallinæ, & similibus. Postea & hoc
linamento: & olei sabinæ ʒj. olei lilior. irini,
vng. Agrippæ, añ. ʒβ. misce. Die 17. Augusti
& spec. dialacæ, diacurcumæ, añ. ʒj. spec. dia-
cumini ʒβ. dissolutis in aqua artemisiæ, adiectis
ʒij. sacch. fiat confectio in tabulis. diuidatur
in partes sex: capiat vnā ante meridiem, &
hora quarta pomeridiana alteram partem. Ven-

D d

tre

418 DE MULIERVM MORBIS,
tre modò etiam inuncto oleo liliaceo, & irino
postea, etiam suprascripto, & post aliquot dies
sumebat rursus quod sequitur: ꝛ calaminthæ,
pulegij, nepetæ, sabina, añ. m. j. ceterach, po-
lytrichi, añ. m. ꝑ. sem. fœniculi, dauci, pastina-
cæ, añ. ꝓ ij. folior. senæ ꝓ ꝑ. agar. albi feminini
leuis, rhab. electi, añ. ꝓ j. zinz. albi, schœnanthi,
añ. ꝓ j. fiat decoct. in aqua & vino Rhenensi,
vsque ad ꝓ viii. colꝝ adde syr. de artemis. ꝓ ij. fiat
apozema pro ij. dosibus matutinis, clarificetur,
& aromꝝ cum pauco cinnamomo ad formam
hippoc. Semper ter eo ad minus ventrem de-
ponebat. Eodem tempore accitus est Hugo
Nieuenius, Medicus Haganus: & rursus com-
muni consilio fuit repurgata; & puluere diacu-
mini, dialaccæ, diacurc. diagal. rursus exhibito
& lenitivo, & medicamēto purgante vsi sumus
ac vng. emollientibus insistebamus, eisdem
pulueres, vel similes, cum vino maluatico ex-
hibentes, etiam lotionē pedum vtentes ex flor.
chamæmeli, meliloti, artemis. pulegij, sabina,
matricariæ, malua, alihæa, fœnug. cumino, &
pastinacæ sem. in vino & aqua decoct. vt mate-
ria deorsum detraheretur, & vterus aperiretur,
etiam subinde claretis supradictis reiteratis, rad.
iridis adiecta, tum aliis, vt foliis senæ, agar. &
rhab. vt prius, in maiori dosi. Tandem etiam
post emollitoria, hoc sub vestibis suffitu vsi su-
mus: ꝛ myrrhæ, cumini, añ. ꝓ ij. calami arom.
cinnamomi, galangæ, macis, aristoloch. long.
añ. ꝓ j. fiat pul. crasso modo contusus in tres
partes diuisus: præiiciebatur vna pars supra car-
bone s

bones ignitos, & fumum ac odorem sub vestibus recipiebat. & capiebat hora quarta matutina tres pilulas infra-scriptas: ꝛ trochis. de myrrha ꝓj. cum syr. artemisiæ fiant pilulæ ix. Ex istis medicamentis continuatis tantum semel visi sunt menses; sed iis rursus restrictis, nihil subsequutum. Vnde tædio affecta, omnia remedia respuendo, vltius progredi recusauit.

Postea anno sequenti 1564. iterum ego & Cornelius Heydius vocati fuimus, cum per annum curationem intermisisset, & rogatu Domini Pensionarij, eius mariti, hanc epistolam à me tum Heydio scriptam ad Medicos Brabantinos, vt Dominus Viglius à Pensionario efflagitauerat, misimus.

S.P. **I**AM integer annus elapsus est, quod nos ad uxorem Domini Pensionarij vocaremur, vt presentes omnia contemplantes commodius ac firmitus eius incolumitati pro ratione consulereimus. Deprehendimus insignem quendam ventris cum duritie quadam tumorem. Ex Domini Pensionarij matre didicimus, hebdomadas aliquot antè peperisse, vel potius ob fœtus immaturitatem abortum fecisse: & propter partus accelerationem obfetricem non adfuisse in tempore, atque diutius hasse in secundarum extractione. Additum est quoque, in puerperio non satis fuisse expurgatam, & subitò omnia fuisse retenta. Hinc collegimus, crassum aliquem sanguinem in matrice suppressum, & in eo viscere impactum esse, cum admixtione humorum flatulentorum. Et quia negotium nobis videbatur non sine periculo,

D d 2

vocatus

420 DE MULIERVM MORBIS,
vocatus est tertius Medicus D. Hugo Hagensis, ve
communi consilio inuestigaremus quid utile factu
foret. Primò vsi sumus aperientibus, incidentibus, &
flatus dissipantibus. Deinde moderate purgantibus,
atque incidentibus, per interualla. Tandem ad ea
peruenimus quæ exterius applicata emolliunt; per
os sinterea administrando ea quæ menses euocare
queant; immixtis semper iis, quæ flatus discutere de-
beant. His remedijs effectum est, vt semel visi sint
menses. Ad extremum radio affecta, & medicamen-
torum vsum respuens, vltius progredi recusauit:
tum quòd bellè se habere videretur, tum quòd vte-
rum gerere se suspicaretur. Id quia nobis non appa-
rebat, agerrimè tulimus quòd à bene captis desisteret.
Interea temporis vterus cum ventre toto molem illam
sibi seruauit in hunc vsque diem. Veritus igitur D.
Pensionarius, ne malam accresceret, ac tandem ad
desperatam aliquam valetudinem deueniret, denuo
nos vocauit ad diem Augusti decimum, vt diligentius
omnia peruestigando de morbo vxoris, tractaremus
necessaria ad salutem. Inuenimus tumorem paulo
maiores quàm anno præterlapso, cum aliqua corpo-
ris macie, sine vlllo tamen pedum tumore. Venter circa
sinistra hypochondria ad ilia vsque nullam præ se
manifestam duritiem ferebat. Totus autem versus
dextra intumescibat, & tribus quatuorve locis dis-
iunctos in scirrhi modum nodos animaduertebamus.
Bene tamen concoquit, & nullum prorsus sentit vllius
membri aut visceris dolorem. Hoc tantum patitur,
quòd còsueti more diuturna exercitia ferre nequeat:
nam solito citius lassitudinem, ob spiritualium par-
tium præ vteri distentione coarctationem, sustinet.

Eriam

Etiā si insignis durities circa hepatis regionem reperiatur: vrina tamen optimam indicat tam colore, quā substantia ac hypostasi, concoctionem. Pulsus minor, crebrior, ac cum quadam tensione, quā olim duriore. Suāsimus igitur ut rursus eadem remedia quæ aliās, & si res postulet, vehementiora pro virtutis ratione adhiberi permittat. Nobis autem vsus eorum quæ flatus dissipent & menses euocent, placent. Balnea emollientia, aut saltem fomenta meatus recludentia non erunt inutilia; adhibitis etiam si opus est, metrenchytis. Si hæc omittantur, veremur ne temporis tractu in ascitem, ac tandem in mortem incidat. Non dissuaderemus interea, ut peritiores aliquot medici super hac agritudine consilia sua patefacerent, priusquam res ad actum deducatur. Nos autem accuratissimè omnia perpendimus, & pro arte ac conscientia nostra hæc facienda duximus. In rei veritatem ac fidei confirmationem, nostrum consuetum chirographum apposuimus. Delphis 16. Aug. anno D. M. D. L. X. I. I.

Cornelius Eriicius.

Petrus Forestus.

Antequā ad reliqua remedia veniamus, quibus denuo vsi sumus, libet his subiungere scriptum ipsius Cornelij Gemmæ Medici Louanienſis.

*Consilium in casu vxoris clarissimæ
D. Pensionarij.*

QUANTVM ex narratione vestra, celeberrime D. Pensionari, & signis omnibus oratione expertiſs. Domin. Doctorum luculenta atque erudita

D d 3

admo-

admodum descriptu, consequi licet, omnes sanè me-
cum, vt coram differui, tum in morbi ratione, tum
medendi methodo, atque vniuersali quadam conse-
quendi scopi notione pulchrè conueniunt. Sympto-
mata etenim præcipua sunt, ventri immodicus tu-
mor; abscessus quidam scirrholes in ipso epigastrio
cum duritie quadam, tensio quoque sub hypochon-
drio dextro, ac mensium suppressio nimis diuturna;
qua tamen non tam symptoma, quàm mali causa
meritò recenseri debet. Verùm quia circuitus quidam
inter causas & effectus apparet, dicimus, factum ex
suppressione mensium, vt ipse uterus inciderit in in-
temperiem frigidam & obstructionem validam; fie-
riq; rursus, velut per circuitum quendam, vt ex flatu
& intemperie frigida iam uterum occupante, causis
quoque morbificis robur accedat, ac menses ipsis ma-
gis magisq; indies obstruantur. Causas externas om-
nino in aeris externi iniurias reici, forsan & in in-
tempestiuam victus rationem, non improbo. Locus
affectus omnino in utero est, si de fonte mali quaestio
fiat: quanquam & per consensum verisimile est, vt,
paulatim ad hepatis regionem affectus & intemperiei
noxa pertingente, paulatim quoque in corpus vni-
uersum deriuari possit, atque (vt clarissimi Domini
Doctores referunt) etiam in tympanitem, atque inde
in ascitem atque hypofarcam permutari. Posset ta-
men ipsam abdomen istiusmodi scirrhis corripì, aut
etiam aquoso tumore repleri, non affecto hepate; vt
aliquando accidisse memini. Verùm tunc potius affi-
citur ea capacitas qua est inter abdominis musculos
& peritoneum, ni humor aquosus abscedat. In hoc
enim casu videtur ab utero refrigerato per venas eò
pertin-

pertingentes paulatim ad venam cauam atque arteriam aortam intemperies frigida processisse: inde verò propagines proxima venarum atque arteriarum ad abdominis regionem protenduntur. Et quia non ab ipso fonte sanguificationis, sed alia parte minus principè venæ refrigerantur; ideo nec equalis tumor, nec aqualiter diffusus, sed, per modum adhuc virtutis validè expellentis, in scirrhus degenerat, exundante eo quod inutile est, & aquosum per orificia venarum in abdomen; ubi rursus à frigore circumfuso concrefcit, & digesto eo solo per cutem quod tenue est, reliquum magis indurefcit. Iam & ex vtero affecto, ut dictum est, hepar affici possit; vnde timenda ascites, ut Doctores eximij quoque timent, si remedia apta omittantur. Imò, si rem omnem ingenuè fateri liceat, iam & ipsius hydropis, potissimum ascitis, rudimenta ex scirrroso tumore satis elucescunt: quæ tamen sperarem in ipso mali exordio, si, ut ceperunt eruditissimi Domini Doctores, cum medicaminum convenientium, cum victus probè rationi obtemperet, omnino comprimi & extinguere posse. Causam materiale[m] vniuersim flatus nomine comprehendendo: etsi hic ipse paulatim, maiori oborta refrigeratione, in aquam transmutetur. Causa formalis est distensio vteri à flatu. cui ut causa continens adiuncta est alteratrici facultatis imbecillitas in venis vteri. Morbus autem ipse obstructionis nomine est comprehendendus, cui annexa est causa continens temperies frigida. Cui ut occurratur, omnino in rem fore existimo, ut Doctorum virorum consiliis, quæ experta sit hætenus, audacter obsecundet: sunt enim Methodici, atque experientia non parua, quantum

ex scriptis elicere potui. Sed vt particulariter aliquid ex me depromam, quo humanitati vestra satisfaciam, mihi sanè non inutile videretur, si lenitiuo medicamento ex rhab. & agar. & folijs sena prius exhibito, etiam, si opus videbitur, adiecto pauxillo elect. de succo ros. aut consimilis medicamenti, quod eius vim suppleat; ad potum ligni Indici cum vino Pictauiensi & aqua decocti iuxta rationem quæ commodissima videbitur, velut ad salutarem anchoram, confugiat. Merito enim huiusmodi medicamentum exhiberi debet, quod continua transmutatione corpus afficiat, ac partes affectas vnà corroboret, ipsiq; minimum fastidij pariat. Hac omnia puto esse in ligno Indico: aperit enim potenter cum adstrictione moderata, atque frigidam intemperiem, partium maxime, ad natium calorem reuocat, si pro natura & morbi conditione exhibeatur. Quæ si paulo medicandi ratio asperior videatur, habetis & radicem china, cui etsi molliori, non minores tamen vires attribuant neoterici. Verum de his vberius atque exactius DD. Doctorum esto iudicium, quibus illam quotidie coràm intueri, ac singula definitius examinare datum est. Ego suaderem, vt semel in mense vteretur hoc infuso: R. rhabar. selecti ʒ ij. agarici optimi ʒ j. folior. sena ʒ ij. anisi, spica, zinç. añ. ʒ ß. colligata in puppulam macerentur in lib. j. decocti, in quo sint prana vj. numero, cuscute, agrimonie, eupatorij, añ. m. j. rad. asparag. ʒ ß. rad. iridis Illyricæ, gentiana, cappar. tamaris. cyperi, añ. ʒ ij. coletur. adde sacch. optimi q. s. vini Rhenani parum: fiat potio pro iij. dosibus matutinis: puppula infusa per noctem & expressa validè, quod si minus sit efficax, addatur elect.

elect. de succo ros. 3j. Inde verò confugiat ad potum ligni guaiaci preparati secundum artem; vel hoc modo, si consultum ceteris videbitur: R. ramentorum ligni sancti lib. j. ß. minutim concisa maceretur in lib. xij. aqua fontis per 20. horas, inde bulliant in duplici vase bene cooperto, adiectis lib. iiij. vini Rhenensis, circa finem decoctionis; bulliant per xij. horas, colentur, atq. ex eo bibat manè hora vj. & post meridiem hora 4. Rursus super iisdem ramentis fiat altera decoctio, adiecta simili quantitate aqua ac vini; adiiciantur & anisi 3 ij. bulliant omnia per xij. horas. Utatur eadem decoct. loco potus familiaris. Sequatur hanc rationem, si possit, per sex septimanas; sin minus, per quatuor. Quod si ab hoc curationis genere prorsus abhorrebit, suaderem illi vsum huius pulvisculi, aut non absimilis: R. rhabar. electissimi 3 ij. sem. bismalæ, liquir. rasæ, anisi, añ. 3 j. ros. rub. cort. rad. cappar. cyperi, añ. 3 j. granorum paradisi, macis, sem. leuistici, sileris montani, baccarum lauri, galangæ, rad. irid. Illyricæ, gentianæ, salis gemmæ, añ. 3 ß. cinnamomi opt. 3 ß. sacch. diatr. frig. 3 j. fiat pul. dos. 3 j. semel in die sub auroram, cum modico vini Rhenensis diluti aqua cocta, in qua sit modicum sacch. candiæ. Communiter suaderem & hoc elect. frui, præsertim horula vna ante cibum: R. anisi, sem. bismal. glycyrr. rasæ, melon. flor. viol. añ 3 ß. gran. paradisi, cort. arantiorum, ligni aloës odorati, añ. 3 j. galangæ maior. baccarum lauri, añ. 3 ß. sem. plantag. maior. 3 j. croci, mastiches, cinnamomi, ros. rub. añ. gr. vj. calamintha 3 j. sacch. albiss. dissoluti in aqua ros. q. s. adiecto modico vini granat. fiat elect. in tabul. Vnguentum quo vteretur

D d 5

ad

ad emollitionem & digestionē moderatam, sic parari iuberem: R. vng. resumpt. opt. ℥ ij. olei mastichini, viol. olei de cappar. añ. ℥ ij. mucilag. cydon. ℥ β. comae absynthij pontici ℥ j. flor. viol. ℥ β. styrac. calamita ℥ β. misce. Aut si malit emplastrum: R. comae absynthij pontici ℥ ij. flor. ros. ℥ j. vng. resumpt. ℥ j. adipis equinae testibus detractis, aut alterius magis emoll. ℥ β. styrac. calamita ℥ β. cera parum, mucilag. cydon. ℥ ij. misce. fiat emplastrum molle. Utatur familiariter sem. anisi, sceniculi, etiam rad. eringij conditis, quarum ego vim in hoc malo non leuem expertus fui; accedit quod admodum sint delicata. Caueat à vehementer diureticis, nisi adiuncto rhabar. aut aliquo solutiuo, quod crassiorem materiae partem ad intestina trahat. Vinum illi potissimum Rhenense exhiberem; sed quia diureticum est; potius cum offula darem excalfactum; idque pro ientaculo. Vina fulua putarem non obfutura, etiam quae moderatam astrictionem obriunt. Imò ego vidisse memini, quae solum epoto vino Hispanico, quod tincturam vocant, omnino liberarentur, expulso copiosissimo lotio, & mensibus prouocatis; sed tantum utebantur dimidia vncia post meridiem aut à coena intinctis offulis. Facit id compressione quadam & partium corroboratione; nec est quod aluum obstructam iri metuamus. Caueat sibi à caseo, lacte, pinguibus & viscidis cibis, pane recenti, cereuisia malè cocta aut crassiore, vino crassiore, terrestri, nimium adstringente, austero, vel acerbo, fructibus omnis generis tamquam à peste, lactucis & omnibus olerum generibus, salsis omnibus, & carnibus porcinis, anatis, anserum, & id generis crassi succi, à frixis in sartagine, aut bis coctis, piscibus

ous lentis, viscidis, duris, atque crassi succi, pastillis, aut leguminibus. Utatur carne potissimum vitulina, agnina, veruecina, pullorum, perdicum, cornucum, &c. Utatur in cibis calamintha, hyssopo, salvia, maiorana, radice siferis, thymbra, granis paradisi, cinnamomo, macere, nuce myristica, sed moderate tamen. Vitet omnem animi egritudinem; letetur, otium vitet; fruatur Venere tempestiva & moderata, &c.

Ex animo tuus

Cornelius Gemma.

Secunda verò nostra epistola ad D. Pensionarium transmissa, hæc continebat.

S. P. **S**CRIBIS ad nos, Clariss. Domine, D. Mathisum optare plurimum, ut symptomata explicatius paulo à nobis enucleentur, quo firmitus iudicium de vxoris tue valetudine ferre valeat. Apertè matricarium esse morbum, & nodos illos (qui maioris pile magnitudinem, quod olim non indicauimus, superant) non in musculis sed intus in vtero, ob sanguinis crassioris suppressionem latere significauimus: vnde nullo negotio poterat aut molam esse, aut sanguinem concretum induratumq; (vt malum) colligere. Hypochondria sinistra olim quidem molliora, sed nunc propter abdominis distensionem prorsus indurata sunt. Necdum omnia nobis apparent magnorum vasorum oppilationis indicia: veremur tamen ne propter lienis præsentem duritiem breui adsit. Vniuersi corporis habitus, excepto abdomine, ad frigidam quandam siccitatem inclinare videtur: priusquam tamen nobis innotesceret, calida ad humidum parumper vergentis tempe-

428 DE MULIERVM MORBIS,
temperiei fuisse putabamus. Hac sunt quæ paucis, ob
tabularij festinationem, ad T. D. exarare potuimus:
pluribus egissemus tecum, si per confratris mei agri-
tudinem licuisset. Existimamus equidem hæc satis
fore, modò accuratius olim à nobis scripta examinare
voluerit. Ego Cornelius, cum hoc mane Domicella
coniunx tua mihi à te scriptas redderet litteras cum
multis lachrymis, ad misericordiam, si tamen ea sic
appellanda sit, inclinatus sum: vt planè nihil atten-
tare audeamus sine Domini præsentia, quia visa est
omnino fugere medicamentorum vsum diuturnio-
rem. Obsecramus igitur D.T. vt quàm citissimè, ne
præterlabatur occasionis opportunitas, ad nos huc re-
deat. Id quod enim præter naturam est, siue mola
sit, siue sanguis concretus, statim amoueri oportebit,
ne in hydropem, vt antea scripsimus, vxor tua cha-
rissima incidat. Nam ad eam iam tendere videtur.
Bene valeat Excellentia tua.

Cor. Ericius.

Petrus Forestus.

Missa fuit hæc epistola in principio Septem-
bris, anno 1564. ad D. Pensionarium, qui apud
Vigiliam Præsidem Brabantia agebat Bruxellis.

*Consilium Mathisij, Medici olim Impe-
ratoris Caroli Quinti.*

DOMINE Pensionarie, legi ea quæ à Doctoribus
Delphensibus priori subscripto addita fuerunt.
Mibi verisimile non sit, molam esse qua vxor tua la-
borat. Mola enim ex viri semine, aut corrupto, aut
alioqui ad formationem inepto ac inualido, gigni so-
let; quæq; ea laborant, cibum fastidiunt, ad incessum
grauio-

graviiores sunt; artus gracilescunt; extrema adematosa fiunt; denique omnes functiones imbecilliores fiunt: venter saepe compungitur, & quasi pondus pendet, quod in decumbente imperu quodam in quodcunque latus se vertat deoluatur; tum etiam venter durior est, quam si legitimus inesset foetus. Ex scripto animaduerto, aliquam esse corporis maciem, sed sine vlllo pedum tumore. Scribitur etiam solito citius lassitudinem quandam sentire, sed bene concoquere, & urinam optimam ostendere concoctionem, tam quoad substantiam, quam quoad hypostasim. Posterius scriptum addit, nodos sentiri in vtero pilae in modum ob sanguinis crassioris suppressionem; & hypochondria sinistra aequè ac dextra distendi, & circa lienem non secus ac circa iecur duritiem sentiri; adeo ut vereantur, breui adfore vasorum magnorum obstructionem ac oppilationem. Ex his colligo, functiones naturales probas esse, & in prima ac secunda concoctione nihil desiderari: verum animales, quod lassitudo illa facile indicat, imbecilliores esse. Et quod primum scriptum habeat, pulsus minorem, crebriorem, & solito duriores esse in praesentia, videtur vitalis facultas non admodum esse robusta. Sunt haec difficilia iudicatu, & quae praesentiam agra omnino requirunt: alioqui vix est ut accuratè aliquid aut certò statui possit. Secundum tamen ea quae proponantur, ita iudico, vim illam naturalem, etiamnum vigentem, in agra omni diligentia esse conservandam in suo robore, & nihil propinandum esse medicamenti, quod ipsam possit prosternere. Siquidem hac iacente, nihil proficietur. Itaq, si quid medicamenti est exhibendum, ut per intervalla omnino
opus

opus est, sit illud clemens, naturam non admodum fatigans, quale possit esse rhab. aut agarici dilutum senna infusum, & syrupus ille ros. medicamentosus & qui de cichoreo Nicoli nuncupatur. Cibi interim offerantur medicamentosi quidem aliquid obtinentes: sed gustum non offendant; qui cuiusmodi sunt, non est necesse doctis. Medicos docere. Nouerunt enim ipsi, incidendi, attenuandi, & abstergendi quapiam vi praeditos debere esse; & temporis longinquitatem constante functione naturali, morbum euicturum esse. Quae licet sit molesta, est tamen tuta, & hic ut existimo, necessaria in agra quae medicamento- rum usum auersatur. Nodos & scirrhosos illos tumores, quos Medici in utero statuunt, ego autem dubito annon potius in mesenterio aut pancrea subsint, cum emollientibus & discutientibus oppugnandos esse censeo. quae emollientia & discutientia ita temperabuntur, prout ipsorum in progressu usus indicabit. Fetus eiusmodi & illinitiones non est mihi necessum ascribere. Sic illas hypochondriorum durities tractandas esse putarim: & externis auxiliis maxime est fidendum, non neglecta, ut antea memini, recta victus ratione; sine qua in vanum omnino laboratur. Et cum dico rectam victus rationem, omnia ea complector, quae Medici non naturalia nominare solent. Equidem scio, vterinos morbos, & praesertim chronicos, difficiles plurimum esse: atque ea propter agra adhortanda est, ut pertinaciter consilio sibi adesse & opitulari velit. Nam ubi tria sunt, morbus, natura, & Medicus naturae minister; si victoria speranda est, necesse est ut agra naturae eiusque ministro faueat & adsit. Alioqui si agra morbum fouet, &

Medi-

Medicum natura inferuentem, & manum adiu-
 tricem porrigentem non audit, verendum plurimum
 est, ne natura subsidio destituta vt vndique compres-
 sa concidat. Vides, mi Domine Pensionarie, me quo-
 que in externis auxiliis multum spei ponere, atque in
 iis porius, quibus Medici quoque tui probant esse in-
 sistendum, quàm in iis quæ per os solent magna cum
 instantia, & ægra stomacho, obtrudi quotidie. Non
 quodd horum aliquando, sed clementiorum, non sic
 vsus; sed cum prudentia & per intervalla ipsorum
 auxilium sit inuocandum. Reliqua Medici præsen-
 tes pro suo iudicio & rerum vsu moderabantur. Ipse
 autem Deus opt. max. suo fauore & gratia pro sua
 erga nos φιλανθρωπία cuncta secundabit. Bruxellis
 14. Septemb. 1564. raptim & persunctoriè.

D. T. paratissimus

H. Matthiſius.

Ceterùm Cornelij Gemmæ consilium, tum
 Matthiſij quoque scriptum Dominus Pensio-
 narius nobis tradidit. Quodd autem Matthi-
 ſius molam ob hoc esse non putaret, quodd sem-
 per à viri semine corrupto aut inualido gigna-
 tur, id quiddem & nos facilè admittimus. In-
 terca fieri potest vti vir validus, optimo semi-
 ne præditus, molæ causam generet. quemad-
 modum contigit in muliere illa valde prolifica,
 de qua paulo antè diximus, quæ tamen postea
 rursus imprægnata, præter fœtum etiam molam
 peperit. antea quiddem semen in viro ipso fuit
 validum; at nunc cùm molam conciperet, non
 est dubitandum quin tunc semen fuerit vel in-
 ualidũ, aut nimis frigidum, aut nimis calidum,
 aut

aut nimis paucum, aut nimis multum, vnde
mola generata, & post partum quoque reiecta
Ita & hinc fieri potuit. Nam, vti ex obstetricibus
etiam postea intelleximus, licet tempore parien-
di fœtus, non tempestiuè adfuerat, tamen in
secundina parienda adfuit; post partum æqu
tumido permanente ventre: quamuis primū
putabat fœtum secundum adesse; postea ven
cū partus alius non subsequeretur, & statim
purgatio non procederet, & omnia retenta man-
nerent, existimabat vel molam adesse, vel san-
guinem concretum, aut aliud quippiam etiam
purgationem solitam impediens. Quod si mola
la non fuerit, saltem sanguis ille menstruus con-
cretus & crassus in vtero procul dubio aderat
ita vt verisimile sit, totum mali fontem ex vtero
venisse; eoque refrigerato, reliqua viscera po-
stea læsa fuerunt: vnde & hydrops metuebat
cuius rudimenta iam aderant, quasi quæ &
molam subsequi solet diuturnam; postea quo-
que crure dextro œdematoso superueniente
licet bonis remediis, vt dicturi sumus, detu-
muerit. Sanguis autem ille ex consueta purga-
tione retenta, si non fuisset adeò crassus, facile
educi potuisset remediis ad menses euocando
valentibus. Ideo fortè ob suam crassitiem quasi
molam sanguineam contraxisse, verisimile quo-
que esse videtur; vnde durior, & minus putre-
dini obnoxius consistentiam parenchymatis
acquisiuit. Nam mola aliquando, vt Ronde-
letius refert, quemadmodum & superius di-
ximus, ex sanguine crasso spissoque calore con-
creto,

retero, quæ nullam formam habet, velut paren-
chyma quoddam vtero alligatur, & sic tumor
apparet durus: qui etiam hîc in principio in re-
gione vteri sentiebatur. Potest & talis sanguis
i menstrua purgatio non subsequatur, frigore
concretescere & durior euadere. Quanquam me-
mini filiam seniore[m] Domini Comit[is] de Eg-
mont, quæ nupserat Domino Houtkerchio,
lum in puerperio existeret, & suffocatione
vteri aliquando laboraret, à qua tamen subse-
quente mediocri purgatione menstrua vtcun-
que curata fuerat, vt me relinqueret, postea
diebus aliquot intermissis syncope præhensam
dum in Haga Comit[is] ageret, subitoque extin-
ctam fuisse, vt tempus me rursus vocandi non
superfuerit. Verùm cadauere postea dissecto,
dum balsamo, per me & Huernium, Medicinæ
professorem, cadauer condiretur, sanguis ad-
huc leuiter concretus in vtero inuentus est, quasi
putrefactus, ex quo fortè vapores ad cor ascen-
dentes, causa synopis, deinde mortis fuere.
At in hac nostra ægra cùm, vt verisimile est,
durior & crassior fuerit sanguis in vtero, minus
corruptus, talia accidentia non adferebat. Ideo
quamuis Matthi[us], Medicus excellentissimus,
subdubitabat sanguinem concretum, vel nodos
illos scirrhosos, potius in mesenterio seu pan-
crea subsistere, & non in vtero; minus credere
potuimus, ob consuetam purgationem in vtero
retentam, quæ post partum subsequi solet. In-
terea tamen vnà sentiebat, qualiscunque is tu-
mor esset vel sanguis, semper iisdem remediis
Ec quibus

434 DE MVLIERV M MORBIS,
 nos vsi fueramus, eundem amoueri debere, &
 emollientibus & discutientibus. Ita & Corne-
 lius Gemma nostrum processum curationis non
 solum laudauit; sed quod iisdem remediis in-
 sistere deberemus consuluit: quod etiam exper-
 tissimus ille Medicus senior fecit Baesdorpius
 quondam etiam ipsius Imperatoris Caroli Quinti
 Medicus, quem & consuluerat Pensionarius
 Et ideo cum morbus ex ipso vtero fontem ha-
 beret, prius curandus erat; aliis visceribus per
 consensum tandem oblatis minimè quoque
 neglectis. Quare hic sanguis retentus & concre-
 tus, vnde totius mali origo, siue in molam con-
 uersus, siue aliter, tum emolliendus, tum diffi-
 pandus erat, etiam per ea quæ menses euocant
 exterius remediis iam superius dictis, tum aliis
 quæ per interualla per os exhiberentur, minimè
 postpositis. Quamobrem Cornelius Ericius me-
 senior, tum ego iterum, cum per annum cura-
 tionem intermisisset, eoque malo ob diuturni-
 tatem temporis in peius labente, vocati fui-
 mus anno 1564, vt diximus, mense Septembri
 Iisdem autem remediis, quibus prius vsi fue-
 ramus, insistebamus, lenitiuo prius propinato,
 & aliis vnctionibus exterius adhibitis; hoc quo-
 que apozemate rursus præscripto: ꝛ chamæ-
 mel. chamæpit. matricariæ, artemis. añ. m. j.
 ceterach, polytrichi, pulegij, origani, calamin-
 thæ, añ. m. ꝑ. sabina, trium flor. cord. añ. p. j.
 rad. brusci, asparag. apij, añ. ꝓ. sem. anisi, fer-
 nicul. carui, dauci, pastinacæ, añ. ꝓ. folior. se-
 næ ꝓ. polypod. quer. ꝓ. rhab. selecti, aga-
 rici

rici fem. añ. 3 j. schœnanthi, zinz. albi, añ. 3
 β. passul. enucl. glycyrr. rasæ, añ. 3 vj. fiat de-
 coct. in aquæ lib. β. & vini Rhenens. lib. j. ad 3
 x. col^r addendo syr. de calaminth. de artemis.
 añ. 3 j. β. clarificetur & arom^r cum 3 iij. cinna-
 momi: misce pro iij. dosibus. Interea tabul. su-
 prascriptis denuo utebatur, & in man. ventrem
 cum oleo liliaceo & irino inungebat. In Octob.
 decoct. præscript. adiectæ sunt 3 ij. folior. senæ
 & polypod. & hagioxyli artificiosè leuigati 3 j.
 β. decoct. in lib. j. vini Rhen. & 3 viij. aquæ puræ
 ad lib. j. saccharo dulcorabatur, & cum 3 β. cin-
 namomi aromat. ad modum clareti, ventre hoc
 linimento inuncto: & olei lini, lilior. añ. 3 j.
 ping. anat. gallinæ, butyr. recentis, añ. 3 vj.
 Venter æquè tumescebat, & durus erat; ut de
 hydropo magis suspicio incretaceret; postea &
 vmbilico magis eminente, vii in exomphalo.
 Appositum est vmbilico emplastrum ex oxy-
 crocei 3 β. supra corium rotundum firmiter
 ligando, ad aliquot dies retinendo; quo & vmbi-
 licus subsidebat, capiendo tunc 3 j. β. vel duas
 ex rotulis spec. diacum. dianisi, diacinnamomi,
 & spec. diarod. abb. omni mane; & in Nouemb.
 ex syr. magistrali hagioxyli sequente ita parato:
 & calaminthæ, orig. artem. nepitæ, sabinæ, pu-
 legij, añ. m. j. rad. brusci, asparag. apij, añ. 3 j.
 rad. ireos, inulæ, pæoniæ, fœnic. añ. 3 vj. sem.
 anisi, fœniculi, dauci, pastinacæ, añ. 3 iij. fo-
 lior. senæ 3 ij. agar. femin. 3 j. rhab. electi 3 vj.
 zinz. albi 3 j. spicæ schœnanthi, añ. 3 j. β. li-
 quir. ras. passul. mund. añ. 3 x. hagioxyli 3 iij.

436 DE MULIERVM MORBIS,
 fiat maceratio secundum artem, ad spacium 2
 horarum in lib. iij. aquæ, & coquantur in du
 plici vase, vt artis est, ad lib. j. ß. & fortiss. ex
 pressionem adde sacchari q. s. & coquatur ad con
 sistentiam syrupi magistralis: & huius capieba
 subinde cochlear vnū alternis diebus, ne tādī
 medicamentorum afficeretur. Interea & ven
 trem inungebat, ob tumorem durum, sequen
 vnguento: ꝛ gummi ammoniaci dissoluti in ace
 ro ꝛ ij. olei lilior. anethini, añ. ꝛ j. olei sabina
 vng. Agrippæ, añ. ꝛ vj. ceræ exiguum; fiat vng
 alioquī, vbi opus erat, apozemati superiori ad
 iectis ꝛ ij. hagioxyli, cum foliis fenæ, agar. rhab
 & polypod. etiam addita rad. irid. & inulæ: &
 post colaturam seu expressionem addebantur
 syr. magistralis prius descripti, de eupat. de ar
 temisia, añ. ꝛ j. cum ꝛ iij. cinnamomi electi, ad
 formam clareti. In Decembri adhuc eodem
 vel simili utebatur, etiam pro tribus vicibus pil
 lulas sequētes accepit: ꝛ pilul. de hiera simplic
 ꝛ ij. pilul. mastichinar. trochis. alhandal ꝛ j.
 fiant pilulæ xv. quinq. pro vna dosi dabantur.
 hoc quoq. cerato toto ventri appposito, excepta
 regione hepatis, in corio ea parte exciso, ne he
 par attingeret: ꝛ mucilag. rad. althææ, rad. li
 lior. alborum, sem. fœnugr. & lini, añ. ꝛ iij.
 axungia porcina recētis, butyri non saliti, ping.
 gallinae, caponis, anseris, añ. ꝛ j. ß. æsypi humid.
 ꝛ j. quibus adde pul. folior. maluæ, florum me
 liloti, chamæmel. anethi, añ. m. iij. cum s. q.
 ceræ, fiat ceratum secundum artem; & coope
 riatur sindone, cum interbastatione (vt ita di
 cam)

eam) vt artis est. Eodem tempore capiebat sub-
 inde cochlear vnum ex syr. sequentibus: & syr.
 hagioxyli, de calamentha, de eupar. añ. ℥ij.
 misce. Anno 1565. adieci mus syrupis dictis
 subinde syr. de artemisia & de praffio: & su-
 mebat subinde iterum ℥ij. confect. in tabul. ex
 diacur. dianis. & rursus decoctum superius
 descriptum, addendo, si opus esset, solia senæ,
 agar. & rhab. vt & in Februario sine nîdē. etiam
 condito ex cons. flor. rorismar. absinth. Rom.
 adiect. spec. plirisarcot. sine moscho, addito syr.
 de calamenth. & artemis. Fuitque imo ventri
 appositū aliud ceratum ex diachylo cum gum-
 mis, & mucilag. & empl. de melilot. etiam af-
 fuit pro subinde syr. de eupar. & artemis. co-
 chleari vno atque altero cum spec. dialacca, &
 diacurc. idque bis in die. Hoc tempore cepit
 totum crus dextrum à femore vsque ad talum
 intumescere, totumque crus durum euasit, non
 sine œdemate, vt iam de hydropē magis metus
 esset. Pro hoc symptomate totum crus balneo
 sequenti imposuit per duas horas, simul etiam
 fricando: & florum chamæmel. summitat. ane-
 thi, centaurij, absinthij communis, añ. m. 4.
 flor. genistæ p. j. salis nitri, cumini, añ. ℥ss. in-
 cidenda incidantur, & contundenda contun-
 dantur; coquantur in aqua communi pro lib.
 vj. adueciendo m. ij. salis communis. Confert
 hydropi & œdemati, vt aliàs experti sumus, &
 hic adeò contulit, vt totum crus breui detu-
 muerit. Rursus deuenimus ad decocta supe-
 rius descripta ex calamentha, puleg. sabina, &
 E e 3 aliis,

438 DEI MULIERVM MORBIS,
 alijs, iam adiect. sem. rutæ, rad. præon. rhab.
 senna, & agar. vt supra; postea sine iis vt hoc
 clareto vtentes & calament. puleg. sabina, ar-
 temis. añ. m. j. cap. ven. ceterach. polit. añ. m.
 ß. sem. iuniperi, catui, seselios, rutæ, pastin. añ.
 ʒ ij. sem. genistæ ʒ j. rad. ireos, brusci, aspar. añ.
 ʒ ß. liquir. ras. ʒ vj. coquantur in ij. par. vini
 Rhenensi & vna par. aquæ communis pro lib. j.
 colꝝ adde syr. de calament. de artemis. añ. ʒ j.
 ß. syr. de eupat. ʒ j. clarificetur & aromꝝ cum ʒ
 iij. cinnamomi selecti, & ventri inuncto hoc
 vng. & dialthææ ʒ i. olei lilior. ping. gallinæ, olei
 menthini, añ. ʒ ß. pingued. anatis, medullæ cer-
 uinæ, axungia caponis, añ. ʒ iij. misc. & denuo
 appposito cerato; etiam pessis ex iisdem pingued.
 mollitorijs utero impositis. At istis omnibus re-
 medijs nihil profecimus, nec aperti sunt men-
 ses, nec uterus aut venter detumuit. Ideo Pen-
 sionario proposuimus, vt denuo Hugo Niene-
 nius Medicus accerferetur. Qui cum adesset,
 & præscripta remedia laudasset, conclusum fuit
 vt iisdem insisteremus, & simul localibus reme-
 dijs proprijs ac pessis. Proponebam & ego eo
 tempore infusiones emollientes, deinde pessos.
 At pessi magis placebant & Cornelio & Nie-
 uenio. Clareto autem superiori addebatur rub.
 tinctorum, ad menstrua magis euocanda, ʒ j.
 adiectis passulis mundatis. Pessi & hoc modo
 præscripti mense Martio, anno 1565. & sabi-
 næ, pulegij regalis, origani Hispanici, florum
 rorismar. omnium exsiccant. añ. p. j. trochis.
 de myrrha, spec. dialacæ, diacurcumæ, añ. ʒ j.
 fiat

fiat pul. vt alcohol, & cum melle q. s. fiant duo
pessi, in quorum cuspide ponantur gran. ij.
moschi, & sindone rub. cooperiantur, & filum
sericum inseratur, vt ad libitum extrahi possit;
circumlinantur oleo sabinæ & spicæ, antequam
per vetulam quandam honestam imponantur:
idq. in diluculo manè, stomacho ieiuno, quàm
fieri potuit magna cum diligentia, in orificium
ipsius vteri vsq. ad fundum, per tres quatuorve
horas ibi relinquendo. Sequenti die iterum
impositum; deinde quoque adhuc semel sub
noctem, ad sex horas ad minus relinquendo,
vel per totam noctem. Sed vetula, vt impera-
uimus, prius intus vuluam digito hoc sequenti
liquore inungebat: & styracis, benzoini, añ. ʒ.
j. cinnamomi electi, nucis moschatae, galan-
ga, añ. ʒ. j. moschi gran. iij. fiat pul. vt alcor-
hol, & incorporetur cum oleo spicæ ad vnguen-
ti liquidi formam. aliàs ego commodè vsus
sum in altera vnâ cum Cornelio collega, prius
vtero inuncto cum oleo liliaceo, & adiecto mo-
scho, eodem tempore & hoc pello impositor
& trochis. de myrrha ʒ. j. ʒ. gentianæ, bacca-
rum lauri, aristoloch. vniuscusq. añ. ʒ. j. cum
suff. melle fiat pessus sindone inuolutus, &
filo alligatus, vti ex diatesiario theriaca, ita
dicta à quatuor rebus è quibus constat: &
gentianæ, baccatum lauri, aristoloch. rotun-
dæ, añ. ʒ. ij. mellis despumati lib. ij. Sed &
hoc feliciter vsus sum ex succo mercurial. ʒ.
ij. salis niri, gemmæ, ana. ʒ. j. ex præce-
pto Benedicti Faurentini præceptoris mei.

conuenit & hæc metrenchyta: & succi sabinæ
 ℥ iij. succi ebuli ℥ ij. croci ℥ j. aquæ matricariæ
 lib. β. fiat metrenchyta. At in ægra hac os vteri
 quoque oleo sequenti, tum pessum, antequam
 imponeretur, iussimus inungi: & olei sabinæ,
 lilior. sesamini, añ. ℥ j. moschi gran. j. Interea
 rursus utebatur hoc clareto: & pulegij regalis,
 calaminthæ, artemisi. melissæ, sabinæ, maiora-
 næ, añ. m. j. ceterach, capill. ven. polytr. chamæ-
 pit. añ. m. β. rad. fœnic. apij, brusci, asparagi,
 añ. ℥ β. rad. inulæ, præoniæ, añ. ℥ iij. sem. anisi,
 fœniculi, carui, ammi, pastin. dauci añ. ℥ j. β. li-
 quir. rasæ ℥ β. coquantur in ij. partibus vini Rhe-
 nensis & vna parte aquæ pro lib. j. colatura
 saccharo dulcoretur & arom. cum ℥ j. spec. dia-
 calamenthæ & cinnamomi ℥ j. β. & fiat clare-
 tum pro tribus dosibus matutinis. In Aprili
 pessi ter reiterati, & decoct. long. cum sena, agar.
 & rhab. cum suis correctoriis, & herbis supra-
 dictis; & hoc linimentum rursus descriptum:
 & olei irini, liliorum, lini, de meliloro, añ. ℥ j.
 mucilag. fœnug. althææ, añ. ℥ β. ping. anatis,
 gallinæ, añ. ℥ vj. ceræ modicum; fiat linimen-
 tum molle pro toto ventre, rursus appposito ce-
 rato mense Martio descripto. Paulo post pessi
 duo adhuc præscripti: & sabinæ m. β. calamen-
 thæ, nepetæ exsicc. añ. p. j. trochis. de myrrha
 ℥ ij. styracis calamitæ ℥ ij. β. rubiæ tinct. ℥ j.
 ladani ℥ β. gummi ammoniaci dissoluti in vino
 ℥ ij. rita cum s. q. mellis fiant ij. pessi vt su-
 præ. Tunc denuo visi sunt menses, & vtcunq.
 fluxere; at venter non detumuit. Postea rursus
 decoct.

decoct. aperitiua descripta, etiam quæ ad hydropem facerent, adiect. rad. ebulli & aliis in vino, cum rubia tinctorum; & sub finem Aprilis pessi inditi. denuo menses visi sunt in maiori copia. In Maio rursus decocta longa, vt supra, cum rhab. agar. sena, clareti instar descripta, & tabulæ ex speciebus diacal. diacur. dialaccæ, arom. ros. exhibitæ. At in mense Iunio magis ad hydropem inclinabat; & inter nos conclusum fuit vt adderentur non solum ea quæ aperirent & menses ducerent; verum etiam quæ ad hydroperem facerent iisdem commiscerentur. & ad maiorem emolliationem abdominis tum ventris inferioris, & vt commodius menses quoque euocarentur, conclusum fuit vti balneo artificiali, quo in hyeme præcedente, ob aërem frigidiorē, minus vti poteramus. Interim cum Dominus Pensionarius Bruxellis esset apud Viglium præsidem, facta est mentio de fonte quodam acido, qui in Spa visitur, de quo Limborchius Medicus libellum scripsit, quem & nos perlegimus. Sed reuerso Pensionario, atque rursus Bruxellas petente, is nobis iniunxit, vt quid de balneo sentiremus, eidem scriberemus. Nam animus erat eò mittere vxorem. Non diu post Dominus Viglius suam misit famulam Delphos, vt vnâ Domicellam ægram Bruxellas deduceret. Postridie litteræ a nobis scriptæ ad Pensionarium per me missæ sunt, omnium nostrorum nomine, cum reuersus essem Brilis: cuius hæc erat inscriptio.

Ec 5

Præstan-

442 DE MULIERVM MORBIS,
Præstantissimo ac Doctissimo viro Domino
Guilhelmo Cripio, Iurisconsulto pruden-
tissimo, & Pensionario Delphensi.

QVANDOQV IDEM à nobis flagitavit D. Pensio-
narius, ut qua nostra esset de fonte in Spa sen-
tentia, perscriberemus; quemadmodum & Nicuenio
nostro hinc discedens iniunxerat; Anne eius vsus Do-
micellæ uxori sua prodesse queat, ac an inde perfectam
morbi sui solutionem assequi possit: visum est nobis
pro ratione respondere, fontis illius naturam nulla
alia vi notam nobis esse, quàm quatenus scriptis &
sermonibus aliorum nobis innotuit. Cum igitur no-
uerimus, tam lenis, quàm vteri scirrho laborantes
eius vsu curatos; non videretur nobis alienum, si &
illa quoque experiretur; modò prius balnei emollien-
tis ac calfacientis vsus tentaret, quàm ad exsiccan-
tia animum applicaret: cum videlicet fons ille ex mi-
nera ferri & sulphuris constet. Nam si tum aquam
hanc assumeret, melius omnia succederent: quia (ut
author quidam enarrat) egregiè urinam proritat;
& per consequens ea quæ urinam solent euocare,
matricis obstructioni quoque succurrere, tum menses
educere consuevere.

Huc vsque litteras conscripseramus; & an-
tequam obsignaremus, alias à D. Pensionario
& Mathisij Doctoris sententiam de Spa simul
accepimus. quare epistolæ nostræ hoc accesso-
rium sequens adiecimus.

Dubitamus tamen, non satis fore potentem ad
abdominis & vteri duritiem depellendam, nisi simul
emollientibus cum menses euocantibus uti studeat. Ce-
terùm

erum ubi inter nos conuentum esset, accepimus & legimus tuas & D. Matthijs Medici literas, quæ scrupulum quendam animo nostro iniecerunt; quia idem ille D. Matthijs sentiri esse affirmat eluere, aperire, atque nimium ab obstructionibus excelsa refrigerare: at vxor nimio ac vehementi calori non est obnoxia: sed potius duris ac concretis in vtero ac frigidis humoribus vexata; qui potius hepar ipsum à iusta sua temperie ad frigiditatem, ac tandem, si vel exiguus comitatur error, in hydropem deducunt. Ab usu igitur huius balnei existimamus ac statuimus è re vxoris esse, si bituminosa illa ac sulphurea balnea inuisat tandem, qualia sunt balnea Aquisgrani. Nam inde speramus multo maiorem fructum, quàm ex ullo alio remedio; modo ea quæ prius scripsimus de emolliente balneo, præcedant. Hoc tamen nulli ratione negligi debet, ut corpus tum paretur, tum vniuersaliter expurgetur. Cui rei non dubitamus Dominum adhibitarum peritum aliquem, ac in arte nostram versatum Medicum, qui pro ratione ac rerum usu moderabitur omnia recte: Quod D. Pensionario maturius non scripsimus, causa est, quod cum vxore mentem nostram transcribere volebamus, quæ cum discederet, nemo nostrum aderat. Doctor Hugo Nieuuenius apud D. de Somerdijk, Cornelius Heydius Roterodami, ego Brilius, agebamus. Erant tamen litteræ paratæ, præter hoc accessoriū literis tuis adiectum. Hisce vale. Raptim, Delphis 19. Iunij anno 1565.

Hugo Nieuuenius. Cor. Heydius. Petrus Forestus.

Litteræ verò Crijp ad nos scriptæ, ita sese ad verbum habebant.

Clarissi-

Clarissimis ac Doctiss. viris D.D. Cornelio Heydio & Petro Forestio, ciuitatis Delphensis Medicis Pensionariis, Dominis suis atque amicis singularibus.

S.P. **C**LARISSIMI Domini Doctores, D. Praeses Viglius mandarat D. Matthysio Medico, ut virtutem Aquarum earum Leodiensium, quarum iam celebris fama est, paucis describeret, ut ex ea vos, qui longius ab iis abestis, num salutare ea uxori meae futura sint, statuere possitis; quod ipse cum agris aliquando eo profectus, vires earum & efficaciam perspectas habere videretur: in qua quidem re ille minime se difficilem praeiuit. Sed quantum angustia temporis patiebatur, paucula vobis sufficere existimabat, quae in hanc quam vobis mitto schedulam, coniecit. Rogo itaque vos, ut perpensa diligenter aquarum earum vi, morbiq; natura, num profectura illi videantur, difficiatis. Et si, quod futurum existimo, viles futuras iudicetis, illi diligenter persuadeatis, ne se difficilem ad proficiscendum praebeat. Decreuit quoque D. Praeses, post earum aquarum usum, si ea vel nihil vel non omnino eam iuuent; inde ad thermas Aquisenses mittere. De hoc quoque vestrum iudicium perscribatis velim, idq; primo quoque tempore. Valere Clarissimi ac Doctissimi viri, & D. Hugoni Nieuuenio, lectissimo atque clarissimo viro, plurimum à me salutem nuntiate, atq; in deliberationem, si, quod futurum credo, apud vos sit, vel aliqui profectio uxoris moram patiarur, adhibete. Bruxellis postridie Idus Ianij, anno 1565.

Vester, si quis alius,
Guilhelmus Cripus.

Hæc

Hæc erat schedula Matthijsi ad nos
missa.

AQUARVM acidarum in Agro Leodiensi sca-
turientium natura ferrea est à prædominio
um parte sulphurea, & non sine suspitione quadam
hæcanti, si eius sapor accuratius expendatur. Ita-
que facultas earum est aperire, eluere, refrigerare
quoque nimium ab obstructionibus excelsa, corro-
borare; ita tamen, ut progressu temporis excelsa
nonnihil & ficare valeant. Euacuant præterea alios
multo sudore, nonnullos crebris deiectionibus, plerosq;
vomitu, & plurimos copioso lotij profluvio, prout
subiectum corpus ad hoc aut illud euacuationis genus
magis est propensum. Omnibus certè utiliter bibitur,
quibus aliquid ex prædictis contingit. Illis tamen
obest, quorum meatus adstringit, & quando per-
meare nequit. Vnde patet, si cum recta vite ratione
& corpore preparato ad potationem, bibant, multa
inde sequi postea commoda, quare ipse rei euentus
declarabit, pro ipsius potantis ὑποστροφῆς. Quare
in hac re prolixior esse nolo, ut cui satis fuisset dixisse,
ferreas esse à prædominio, cum subdominante sul-
phure, & fortassis chalcantro. Nam qui horum vi-
res expendit, & facultates inde enascentes, probe
animaduertere valet (porissimum si cum his conferet
proprium & priuatum corporis temperamentum)
is facile diiudicare potest, cui affectui prodesse aut
obesse valent. Braxellis, 1565.

Matthijsius.

Matthijsius

Matthiſius hic doctiſſimus Medicus nihil noui nobis ſcripſerat, præter ea quæ ferè ac verbum Lymburchius Medicus in libello De eodem fonte habet. Quare cùm episto-
la noſtra ſupradicta ſcripta propemodum eſſe (vt diximus) præter acceſſorium quoddam quod poſt acceptas literas Domini Penſionarij tum hanc ſchedulam, adiunctum fuit, & ita miſimus. Eſt itaque Domicella hæc Bruxellas profecta, deinde ad fontem acidum in Spa. Ceterùm ea ipſa ſub finem Septembris anno 1566. domum rediit, neque ab iſdem fontibus vlllo modo in melius profecerat, neque Matthiſij opera, alioqui præſtantiſſimi Medici, Bru-
xellis venter detumuit. Qui Matthiſius, certè in artis operibus exercitatiſſimus & magni nomi-
nis Medicus, eodem ferè tempore cùm hanc nobilem matronam curaret, ab equo calcitrone inopinatò percuſſus (vt nobis relatum eſt) mi-
ferè, proh dolor, vitam finiit. Quare cùm ne-
que alij Medici Bruxellenses, alioqui in re Me-
dica verſatiſſimi, in curando Cripij noſtri vxo-
rem quicquam proficerent, cum morbo multo
validiore quàm antea, etiam hydropica, do-
mum reuerſa, nullam adhibens poſtea curatio-
nem, octauo die Decembris ad ſeptimam ferè
horam, noctu cùm animam ageret, ego, vt pote
vicinus, ſubito accitus ſum, ſed morte inſtante,
eaquæ à me prædicta, eodem tempore, anno
1566. obiit, proba me hercle matrona, cum
multis lachrymis ipſius mariti.

OBSER-

OBSERVATIO LXV.

De citta, pica, malacia, pregnantium.

Vxor Augustini Teylingij, Iusta dicta
sen Iodoca, matrona admodum hone-
ta, socrus mea, mulier admodum fecunda,
quæ & viginti proles peperit, hæc ipsa cum gra-
vida esset, ac Amsteladamum nauigio iret cum
uo marito, cumque ad pagum *Saradamum* di-
ctum peruenissent, maritus nautam interro-
gavit nunquid edulij penes se haberet; qui cum
obtulisset aliquid halecis iam nouiter saliti,
uxor ipsa duodecim comedit, nec quicquam
inde mali sensit. Erat autem hæc citta circa ci-
oum haud innaturalem: quemadmodum al-
teri mulieri etiam Alcmarianæ contigit, quæ
ad forum veniens, anguillam coëmtam statim
crudam deuorauit: alia verò (vt nobis quoque
relatum est) etiam pellem ouillam vnà cum
lana detractam deglutiuit. Altera quoque pi-
cem liquidam cochleari excipiens, nec offensi
quicquam accepit. Eua Teylingia, vxor mea
charissima, filia Iustæ superscriptæ, cum graui-
da esset, domi seorsim sportulam cerasis ple-
nam habebat, quam & sæpissimè salutabat, at-
que ex ea carptim subinde cerasa clam, ne quis
animaduerneret, sumebat. Sed hic appetitus
non ita innaturalis erat, vt quarundam mulie-
rum, quæ & carbones, cretam, aliaque absur-
da comederunt.

SCHO-

SCHOLIA.

Symptoma-
ta quæ præ-
gnantibus
euenire so-
lent.

Citra præ-
gnantium.

QVOMODO citra non solum prægnantibus, sed
et viris quoque, tum aliis etiam puellis con-
tingat, diximus cum de malis ventriculi ageremus
lib. 18. Obser. 7. & Scholio eiusdem: ubi & huius
symptomatis causam, signa, & curationem recen-
suimus, ut non opus sit denuo repetere. Verum tamen
cum nunc de mola sermonem absoluerimus, pauca
hic quædam de citra aliisque symptomati, quæ graui-
dis euenire consueverant, interserere libuit. qualia hæc
præcipua sunt: citra, cibi fastidium, flatu, atque
ventriculi dolor ex flatu, cibi reiectio, cordis saltus,
syncope, crura inflata. Urina difficultas, eiusque de-
stillatio & incontinentia, renes ex calore debiles, ac
alii suppressio; quibus & addunt pilorum defluuium
aut incrementum insolitum; lac in gravidis effluens;
mensesque gravidarum, & superfætationem, citra
(ut etiam alias diximus) ab hedera dicta existimatur,
quæ quicquid inuenit, foriiter amplectitur; mulieres
mollitiem seu malaciam vocarunt. Secundo mense
prægnantibus incipit, modò citius, modò tardius,
Moschione teste, quibusdam ad partum perseverans.
Galeno à 2. mense & 3. & quòd quarto quiescit,
partimque vomitionibus humoribus viriosis expurga-
tis, partim concoctis. Si fieri potest, interponenda
est vnius diei abstinentia: sin minus, parvus cibus de-
tur. Moschio aquam prius dat, deinde vinum, cibosque
constringentes. os inungit oleo mastich. ex cotoneis,
adiectis pul. caryophyl. mentha, corall. rub. & simili-
bus cera exceptis. dat acida; & post cibum pira, cydonia,
& ventriculum roborat. Vide quæ lib. 18. scripsimus

Scholio

Scholio Obs. 7. Fastidium eo tempore pregnantibus, Fastidium.
 quo foetus germinat capillos, contingit: tollitur cibus
 austeris, acidisq³, & sale modico cibo adiecto. conue-
 nit panis sine fermento, auicula. pingua detestan-
 tur. Noui ego pregnantes aliquas adeo cibum pro-
 prium fastidentes, ut alienos tantum vel emendica-
 os ederent. Valent pruna, sorba, pira, coronea, mala
 unica, olea alba ex dura muria, & cappares cum
 aceto. Flatus in ventriculo & alibi discuties, ilia & Flatus.
 luum inungendo oleo lilino, seminibus fœniculi, anisi,
 umini, & aliis etiam dolorem ex flatibus tollentibus.
 Cibi reiectio, punice coniectis vel cydoniis in vino, vel Cibi reie-
 ctio.
 orbis assumptis, curatur. Cordis saltibus, ut quidam Saltus cor-
 dis.
 olunt, aqua calida vberim pota opitulatur. ego
 commodè ad palpitationem cordis vtor conserua me-
 ssa. A syncope releuantur sale in os posito. Hoc mo-
 do Margareta Nannia, mea mater charissima, quæ
 septemdecim proles peperit, semper restituebatur.
 Nam si altius sederet, ea corripiebatur. Pedum tu- Pedes in-
 mores Egineta illinit cimolia cum aceto mixta. flatu.
 lētius perfricat cum rosaceo & aceto, sale etiam ad-
 iecto. brassica folia latè distensa vel cocta cum vino &
 aceto emplastri modo imponit. Ad vrinae difficulta-
 tem pregnantium millefolium tritum ex aceto, iuxta
 quosdam, bibitur. Ad incontinentiam vrinae, vngula
 pri vel suis cinis potioni inspersus iuuat; leporis cere-
 rum ex vino potum, vel eiusdem testiculi rosti si-
 lantur; anserum trium lingue in cibo sumantur. Si
 renes ex calore debiles sint, inungantur vnguento
 os. detur conseruatos. Ad alui suppressionem, pruna
 iunis edantur; iura pingua sumantur, cochlea &
 strea, saxatilesq³ pisces, panisq³ fermentatus. Si

F F

pili

Ad defluuia
pilorum.

De lacte gra-
uidarum ef-
fluente, &
de mensibus
gravidarum.

Superfœta-
tio.

Hercules &
Iphiclus na-
ti ex super-
fœtatione.

pili defluant, valet adeps vrsinus, & quæ de alopecia
diximus. Si gravidis lac vltro effluat, fœtum imbe-
cillum esse notatur ex Hippoc. & timendus est abor-
sus, ideo fœtus roborandus, & ea præscribenda quæ
aborsum impediunt; de quibus suo loco dicturi sumus.
Ita quoque si & menses gravidis fluant, fieri non po-
test ut fœtus bene valeat: tunc enim menses, si fieri
potest, retinendi sunt, ne abortus subsequatur. Est a-
bat superfœtatio, quæ tamen vteri symptoma non
est; sed res potius naturalis, teste Aristotele. Nam &
vtero gravidas superfœtare, neque fabulosum, neque
nouum est; quoniam omnium maximè animalium
mulier & equæ gravidæ initum nouere. Cetera (ut
pote quorum natura more leporis superfœtare recu-
set) ubi gravidæ exiiterint, mares contemnunt. Ve-
rùm equam haud vnquam superfœtasse cognitum
est. At mulieri, quamuis raro, interdum ut superfœ-
ter, euenit. Ob id qui longioribus temporum impen-
diis, post concepti sunt (altero iam pridem concep-
to) nihil quicquam proficere queunt: sed dolorem, quo
& ipsi, & primus partus intereat, præmaturus con-
tinnant. Olim ut vnde tredecim, superfœtata puer-
peria, corruptione peracta ederentur, incidit. At verò
si à primo conceptu secundus proximè secutus sit,
paululumq; temporis inter eos intercesserit, quod
superfœtarit (quasi gemini nasci videantur) absolutum
edique potest. Quomodo & Herculem & Iphiclum
conceptos esse fabulantur. Sed id etiamnum ex adul-
tera quadam, quæ alterum marito, alterum adultero
persimilem peperit, compertum est. Et item Procon-
nesia ancilla eiusdem diei concubitu, alterum domino,
alterum procuratori eius perquam similem egegit.

Insuper

Insuper quum geminos quadam ferret, tertium su-
perfoetavit, quumq; iustum pariendi tempus insta-
ret, primos vitales edidit, secundum qui obiter diem
vnum obierat, mense quinto elusit. Altera quum pri-
mum inuitalem mense septimo peperisset, mox ge-
minos mensum numero vitæ compotes enixa est. Et
adhuc alia iusto partu vnam, alterum quinque men-
sum emisit. Compluribus etiam id euenisse liquet,
et si octauo mense concubuerint, partus mucore op-
letus exierit.

OBSERVATIO LXVI.

*De muliere quinto mense menstruas purga-
tiones habente, grauida, in qua metus erat
de abortu; per modum consultationis.*

NOBILI matronæ ad quintum mensem gra-
uidæ existenti menses in copia fluxere,
quæ aliàs leuissima ex causa etiam primo, se-
cundo, & tertio mense conceptionis abortum
passa fuerat; de quo etiam nunc magis metue-
bat: ideo obstetricem ad nos misit, vt abortus
impediri posset. Huic igitur idem consulimus
quod etiam aliquando filiæ Ioannis Theodori
Larpardi, Consulis Delphensis, quam etiam
molera difficillima laborantē cūm metus esset
de abortu, curauimus; vt videre licet lib. 18.
Obs. 48. Consulimus, inquā, vt quieta se tene-
ret, & in deliciis versaretur, & vt graueolētiam,
conitusq; horribiles euitaret, & res immundas
conspēctu arceret, & odores graues: nam &
F f 2 abor-

452 DE MULIERVM MORBIS,
abortum facere tradunt nidorem extinctæ can-
delæ aut lucernæ: tanta est natalium nostrorum
imbecillitas; quibus & obest formido, subitusq.
metus, intemperataque iracundia. Rectè enim
iussit Aëtius lib. 16. cap. 12. de studio prægan-
tibus adhibendo ex Aspasia, Vbi prægnantes
nuper conceperint, obseruabimus ne timore,
mœrore, nève vlla validiore mētis perturbatio-
ne afflictentur. Currium præterea gestationes,
violentaque exercitia, vehementesq. spiritus de-
tentiones & coxendicū percussiones prohibe-
bimus; nec graue onus tollere, nec saltare, nec
duris sellis insidere permittemus. Sed nec acria
flatuosaq. edulia, nec clysteres acutos, nec cibi
& potus vel indigentia vel redundantiam con-
cedemus. Sanguinis etiā defluxus siue à naribus,
siue ab hæmorrhoidibus, siue ab alio quocunq.
loco prægnantibus periculū affert: ideo non sine
ratione metuebat hæc matrona nobilis ob mē-
ses fluentes: nam menstrua purgatione, ita &
fluxionibus albis foetum in vtero sæpe dimo-
ueri vidimus; vti & saltu, petulanti coitu, ster-
nutamentis, luctu, & similibus. Sed de his la-
tius in Scholio, cū de omnibus causis age-
mus. Alimentis (vt idem Aëtius refert) ergo
vtendum moderatis, & stomacho congruis, le-
cticæ gestatione, leui deambulatione, molli fri-
ctione, lanificio circa octauum mensem, qui
omnium molestissimus est; alimentum contra-
here oportet, & vehementes motiones prohibe-
re: & si alius detineatur ob intestini recti an-
gustias, edulia offerenda erunt ventri subdu-
cendo

tendo idonea, veluti ptisanæ succus, ruuex
 alixus, malua, lactuca; & mense nono, relaxandi
 corporis gratia, balneo frequentissimè vtemur,
 omninoque providebimus, vt paritura futuros
 dolores validissimè toleret. Hæc Aëtius. Sed quia
 hic in quinto eramus mense, fluentibus men-
 struis, maximus metus erat de abortu: ideo eam
 in quiete detinendam esse imperauimus: & ab
 omnibus iam dictis, casu, percussione, pedum
 eleuatione, aut brachiorum nimia extensione
 esse caueret iussimus: nam nostræ Batauæ mu-
 lieres nimis ædibus purioribus conseruandis
 leditæ, & tabularum frictionibus, & vt telæ
 trancorum, tum alia amoueant, curiosæ sunt.
 A publicis item choreis, balneis, nisi in fine,
 tum tussi caueant, & à frigore externo rebusque
 vaporulentis custodiendæ, ne in destillationes,
 raucedines, sternutamenta incidant. Ceterùm
 cum huic Dominae menses fluere, & aliàs so-
 lita esset abortire, præstabat hanc potius esse sel-
 lulariam, quàm vt ambularet. Sed quod ad præ-
 sentem huius matronæ affectum attinet, & au-
 thores, vt Gordonius, si plethora adest in san-
 guinea minus obesse scribunt, nec statim men-
 ses esse constringendos, vbi prægnans non de-
 biliteretur, aut mamillæ graciles non fiunt, neque
 motus immutetur: in tali, inquam, casu nihil
 faciendum volunt. Verùm cum hæc nobilis
 Matrona valde debilitaretur, referente obste-
 trice, & mammae extenuarentur, & menses co-
 piosè fluere, nec motum pueri vt antea sen-
 tiret, consului cum Medici præsentis modera-
 Ff 3 tione,

454 DE MVLIERV M MORBIS,
tione, vt menstrua cohiberentur atque restrin-
gerentur. De meo hîc addam, quæ aliàs in casu
prægnantis s. mense fluxu quoque laboran-
tis, vbi metus erat abortus, commodè præscri-
psimus, abortu impedito: & coralli rub. boli
arm. veræ, ossium dactylorum, añ. ʒß. detur
cum ouo sorbili duabus vicibus; renes tum-
imus venter inungantur vnguento Comitissæ,
adieccto oleo myrtino, & pauca bolo arm. ad
vnguenti consistentiam. Comedebat dactylos
pingues maturos; & sua viscositate abortum
inhibebant. Pulvere suprascripto adhuc semel
cum vino rubro, exigua mummiâ adieccta, flu-
xus restringi cepit; nec abortus subsequutus est.
Vel si velint ea sequi, aut processum, quo ali-
quando Bononiæ præceptor meus Elideus in
femina vterum gerente iam per sex menses, cui
vehemens quoque mensium fluxus oborieba-
tur, vsus est, eundem quoque hîc addam.
Primò apposuit partibus infimis mammilla-
rum duas cucurbitulas; nam sanguinem mit-
tere non audebat, iuxta Galenum lib. De cu-
randi rat. per sang. missionem, etiam Hipp.
vetante s. aph. propter abortum. Ex iis statim
menses suppressi sunt, & sanguis fluere cepit è
naribus. Exhibuit tunc haustum vnum aquæ
portulacæ cum sacch. ros. exiguaque portione
philonij Persici admixta, cuius descriptio est
apud Auic. lib. 5. summa 1. tract. 1. Atque hoc
ad refrigerandum & incrassandum sanguinem
& restringendum, & cessauit fluxus. Viçtum
incrassantem constituit, postea eduxit choleram
cum

um rhab. potionem. Cucurbitæ verò sæpius ap-
positæ sunt: sed illa conquerebatur de conuul-
sione mammarum: iussit itaque poni in regio-
ne hepatis. Hæc mulier neque passa est abor-
tum, & tempore postea pariendi completo fe-
liciter peperit. At illud non prætereundum
quod Medici aliquando in fluxu isto venam
basilicam incidunt cum foramine exili & paruo,
ut pedetentim sanguis exeat; deinde quoque
ne virtus concidat, & in modico sanguine ex-
eundo magis fiat diuersio. Quomodo autem
etiam in febricitatibus aliquando sanguis mitti
posset, & etiam lenis adhiberi purgatio, aut sal-
tem leniens medicamentum, aliàs ad longum
scripsimus in lib. nostris De febribus. Iam quo-
que cum hæc consulerem, accessit ad me alia
obstetrix cum rustico consultandi causa pro sua
uxore grauida etiam menstrua copiosè habente;
cui ne fieret abortus, imperauimus, ut renes
inungeret vng. ros. imum ventrem vnguento
comitissæ, & ut etiam hac mixtura frequenter
uteretur: & confer. ros. antiquæ, diacydon. sine
specieb. añ. ʒj. trochis. de carabe, de terra si-
gillata, de spodio, añ. ʒj. manus Christi cum
perlis ʒvj cum syr. cydon. q. s. fiat conditum.
Hæc suprâ dicta satisfacere ad rem puto. quæ
si diligenter obseruentur, sperarem, hanc nobi-
lissimam matronâ, Dei nutu, minimè ex abor-
tu periclitaturam, quodque purgationes men-
struæ superfluæ constringentur, & fœtus reti-
nebitur.

SCHOLIA.

Causæ ab-
ortus.

Exemplum
abortus &
monstrifici
partus.

OMNIA illa quæ à prægnantibus vitanda esse diximus, eadem & causæ abortus esse possunt, quemadmodum sunt incommoda saltationes: nam & pleraque abortum fecere: sicuti scalarum lapsu, velictu, fulgure, tonitru, subitoq; tormentorum sono fit, ac terræ motu; qualis anno 1511. vniuersam Italiam, teste Benedicto Veronensi, à septimo calendis Aprilis vltra quadraginta dies percussit. Pondere item, ac nimia Venere, aut petulanti, partus colliduntur: sanguinis præterea largamissione, vehementiq; ventris deiectione, albi fluxionibus, aut spiritu incluso disrumpente (vt Paulus demonstrat) vulnere item, narium vel hamorrhoidum profluvio, ventris fluxu vel tencismo. Sæpe abortum fieri vidimus ardente febre, imbecillitate partus vel puerperij, vel puerperæ, vel secundarum angustia, quibus partus strangulatus exit. Vidimus, inquit idem Benedictus Veronensis, anno præterito nobilem Venetam Dignoriam Georgiam 7. mense quo partum gestauerat polypum peperisse monstrificum, quem nos dissecuramus: in medio masculinus fœtus integer palmi magnitudine repertus est, quem monstrum illud in sese genitum inter eas angustias accrescere non patiebatur. annexus tamen erat vmbilicus polypo. Fame præterea, vel siti aut crapula, Galeno autore, aut mœrore, plurimas abortum fecisse non dubitamus: balneo item calido, vel nimium gelido partus sæpe eliditur. Si gemini præterea in vtero sunt sexus diuersi, facile ambo periclitantur, vel saltem quæ femina est, nam imbecillior est: sed plerumque altero enecto, alter pariter

riter menstruali profluvio eiicitur defunctus, ut aliquando vidimus. Abortus vel ab evidentibus (inquit Fernelius) vel ab interioribus fit causis. Evidentes alia foetum enecant, ut syncope, timor, & tristitia: & harum quadam toto genere extinguunt, ut quae vel suffitu, vel odore, vel substantia venenata sunt. Alia cibum subtrahunt, ut inedia, immoderata purgatio, sanguinis e naribus, ex haemorrhoidae aut aliunde reiectio, mulier enim sanguine misso abortum facit; idque magis si foetus auctior est. Alia vero acetabula dissolvunt, per quae foetus alimentum capebat: ut violenta exercitatio, saltatio, durior equitatio, aut vectio, grauioris oneris gestatio, casus violenter concutiens, aut ventris ictus foetum contundens: quibus addunt clamorem, cursum, coitum ineptum, petulantem, immoderatum. Interiores vero causae sunt cibi immoderatus, & plethora foetum suffocans, aut extinguens, mucosus humor uteri implens acetabula, & ligamenta ita remolliens ac dissolvens, ut foetum continere non possint. Et huius rei (quemadmodum addit Rondeletius) multae possunt esse causae. Alia enim os uterini claudunt & constringunt, & ob nimiam humiditatem relaxantur. Alia ob sanguinis feruorem nimis copiose menses patiuntur, & foetui adimitur alimentum. Alia uterum habent minus amplum, aut quia non potest dilatari uterus pro incremento pueri, unde reiciunt foetum, alia tercio, alia quarto, alia quinto mense. Iam quoque cibi mali succi (teste Fernelio) & inde nata cacochymia, ob quam foetus alimentum benignitate destitutus sensim languet & commoritur. Morbus acutus, febris vehemens, tum alia quae saepe foetum in grauius discrimen, quam matrem con-

Causae evidentes.

Internae.

F f 5

iicit,

icit, aliquando simul matrem cum foetu. His addere poterimus vteri affectiones, inflammationes, erysipelata, abscessus, & vlcera. Quacunque igitur mulier citra euidentem causam abortire consuevit, vel totius corporis, vel vteri totius vitio laborat. Id quoque vel ad vterum vel foetum referendum quandoque est: nam penuria, si cotyledones vtero alligatae, aut in dispositione vel impotentia seminis debiles procreatae, & non firmiter ligati foetus vel cotyledones abrum-puntur; & fit abortus, vel ratione vteri ob causas internas, vel oris ipsius; ut ad longum videre licet apud Guainerium in suo commentariolo De aegritud. vteri, cap. 33. De causis & signis abortus. adde quae in Gynaeciorum harmonia habentur. Attamen Bonaciolus videtur distinctionem facere inter corruptiones, effluxiones, abortus, abortus, vel eiectiones. Effluxiones tum corruptiones intra diem septimum incidere ait: tantisper enim genitura instar lactis elabuntur. Abortus primis mensibus conceptu exorso fiunt. Abortus prope pariendi tempus euenit. Quamquam haec quidem (grandiore iam foetu) eiectiones vel eiectiones vuluae dicuntur: illas vero quae intra quadragesimum a conceptu diem contingunt, abortus, illustriores appellare solent. Hinc apud Medicæ rei professores haec vocula plerumque confunduntur. Gal. lib. 3. De facul. natural. triplicem causam abortus statuit. Haec quidem, inquit est, aut moles nimia, aut pondus aliquod, aut morsus. Moles, vbi amplius distendi vterus non tolerat: pondus, cum supra vires eius sit quod continet: morsus, vbi vel humores qui prius in membranis continebantur, huiusmodi in vterum ipsam sunt effusi, vel etiam totus partus corruptus & putris, ac

Corruptiones,
Effluxiones,
Abortus,
Abortus,
Eiectiones.

Triplex causa abortus,
iuxta Gale-
num.

in noxiam saniem dissolutus, vteri tunicam eius occasione irritat, ac morder. Signa abortus praesentis, & quae abortum demonstrant, quamuis sint per se nota; abortum praesagientia interim considerata sunt antequam abortus oboriatur, ut sic abortum deslectamus. Ideo rectè dicebat Bonaciolus: Causae quae maturius abortum validè proritare queunt, eundem si praecesserint, futurum indicant. Etenim si mulier salibus inhumanius iactitetur, desultetq; immodicè, ac potissimum si resiliat, poneq; saltet, aut, ut libuerit, corpore sine ratione & modo moueatur, si immaniter & vastè clamet, si obirascatur, si parcus cibatum abliguriat, si extenuetur, ac precipuè venter, si in balneo calidae aquae vel frigidae moram traxerit; haec tum alia superius dicta si adfuerint & increcant, abortus subsequetur; multoq; certius si iam aucta mammillae detumescant mollesq; fiant, si immites & sine misericordia dolores pregnantem rapiant, si vigor aut horripilatio eandem interdum deprahendat, doleatq; caput, & potissimum oculorum radices: quod si talia quidem satis remissa fuerint, tardè abortum patitur: si intensa valde, & menstrua copiosè erumpant, ilico venturum expectato: Lacte ex mammilla continuè effluente, ego in muliere aliquando prognosticum feci, quod hoc argueret foetus debilitatem, paulo post abortum passuram, uti etiam euenit. Futuro abortui (inquit Aëtius) aquea primò euacuatio, deinde saniosa, aut cruenta, & tanquam carniū lotura praecedit: ubi verò planè exolutio, purus sanguis, postea grumi, ac demum foetus ipse vel formatus, vel informis excernitur. plurimis etiam lumborum coxendicūq; grauitas sequitur, nec minus sumi-

Signa abortus demonstrantia per se nota.

Signa praesagientia abortum.

Aëtius lib. 16. cap. 19.

suminis capitis, oculorum dolor, stomachi erosio, extremorum refrigeratio, animi deliquium, febris horrida: quibusdam conuulsiones opisthotonica, & epileptica superueniunt; vt nuper vidimus in vxore pharmacopœi abortientis: quanquam & hac præcipuè, iuxta Aëtium, contingunt medicamentorum violentia abortientibus: nam quæ sine medicamentis abortiuntur, præueniunt iis, sicut testatur Hippoc. mamillarum gracilitas præter rationem eueniens, femorum refrigeratio, grauitas lumbos & femora obsidens: omninoq; minus laeduntur abortu, quæ saniores, & quæ alui natura laxioris fuerint, & quæ vteri partes humidiores habuerint; quæq; frequenter magnos infantes sine molestia parere consueverint, atque ætate præuecta pauci sanguinis & minimè pingues: sed etiam hæc ad prognostica signa pertinent, vii & hæc subsequentiæ. A coitu si sternuerit mulier, abortiuum est. Ceterum effluxionum prognosticon censetur, si oris vulua labra lauia extiterint, proximè enim seminale excrementum delabi ac effluere præmonstratur. Mulieres solertes post mictionem introrsum agunt, labris liquida pice illitis: foetore namque vterus resiliens attollitur, quo fit vt ostiolum coercetur, sigilleturq;. Abortus verò index equidem euidentis vberum præceps extenuatio, Hippoc. sic dicente: Si mulieri vtero graui mammae subito extenuantur, abortus sequitur: ob defectum alimenti, inquit Galenus in Commento. Communes quædam vena sunt mammae ac vteris, qua vbi parum habuerint sanguinis, graciles quidem mammae ostendunt: inedia enim nonnunquam foetum perimunt, vel ad excretionem excitant. Et ideo

Signa prognostica effluxionum.

Prognostica abortus.

§. apho. 37.

in lib. De natura fœtus: Alimentum atque auctio à matre veniens non adhuc est sufficiens infanti, quando decem menses præterierint, & fœtus auctus fuerit: trahit enim à sanguine id quod dulcissimum, simul autem lactis parte aliqua fouetur. vbi verò hac illi rariora fuerint, & iam infans molem corporis habet, plus cibi requirens, quàm illud quod adest, calcitrat, & membranas disrumpit. Ita quoq. mulieri vterum gerenti si altera mamma gracilis fiat, geminos habenti, abortit: & siquidem mamma dextra gracilis fiat, marem: si verò sinistra, feminam. At quemadmodum extenuatis mammillis infans perditum itur; sic & perditum iturus est mammae gracilibus existentibus, Hippocrate monente: Mulieri vterum gerenti, si lac multum è mammis effluat, fœtum imbecillum significat: si verò mammae solidae fuerint fœtum significant saniozem. Quae corruptae sunt fœtus, his mammae extenuantur. Si verò rursus durasiant, dolor aut mammas, aut coxas, aut oculos, aut genua infestabit, & non corrumpet. Vide Galenum in Comment. Ita quoque si mulieri grauida mensium purgationes prodeant, fieri non potest, vt fœtus bene valeat. Mulieri vterum gerenti si tensio superuenerit, facit abortum: si videlicet circa intestinum quod rectum nominatur, tensio sit, seu tenesmus; ita & in difficultatibus intestinorum. nec mirum cum & aliis doloribus & moribus soleant abortiri. Ex tempestatibus etiam indicia eleganter trahimus. Etenim si hyems australis & pluuiosa fuerit, ver autem siccum & aquilonium, mulieres quibus partus ad ver inest, ex quacunque occasione abortiunt: quae verò parient, imbecilles & morbosos infantes parient: quare

5. aph. 8.

5. aph. 82.

5. aph. 60.

7. aph.

27. Gal.

Quo tempore abortus frequentior.

3. aph. 12.

s. aph. 32.

s. aph. 34.

s. aph. 30.

s. aph. 43.

s. aph. 44.

s. aph. 45.

Soranus, Hip-
poc. lib. De
fœtu.

quare vel statim intereunt, vel tenues & valetudi-
narij viuunt. Causa à Galeno explicatur. Ita & mu-
lier vterum gerens, sanguine emisso ex vena, abor-
tit; & magis si fœtus sit maior. intelligitur de ma-
gna euacuatione. Sed de his latius diximus in lib.
nostro de feb. num sanguinis detractio aliquando
conueniat, & quando noceat. Ita & de purgatio-
ne hunc quoque aph. explicauimus. Mulieri vte-
rum gerenti si aluus plurimum profluat, pericu-
lum est ne abortiat. & quod quarto mense sint
purgandi. Mulierem quoque vterum gerentem, ab
aliquo morbo acuto corripit, lethale: idq; propter fe-
brem fœtum occidentem, & quod tunc ex longis
interuallis cibus datur, vt Galenus longiore sermone
prosequitur: propter morbum acutum scilicet, vt
attonitum, & alios, ob magnitudinem morbi &
acutiem, abortiunt. Sic si mulieri grauida in vtero
sit erysipelas, lethale; nec mirum, cum etiam inflam-
matio id præstet. Rursus quacunque præter natu-
ram tenues existentes vterum gerant, abortiunt se-
cundo mense, priusquam crassescant. Quacunque
mediocriter corpora habentes, abortiunt secundo aut
tertio mense sine occasione manifesta. His aceta-
bula plena mucoris sunt, & non possunt præpon-
dere fœtum continere, sed rampuntur, sine causa
manifesta, vt sine febre vehementi, alui fluxu, tum
aliis dictis, etiam sine causis procatacticis. Vide
Commentum Galeni. Acetabula autem sunt ora ve-
narum & arteriarum, quæ feruntur ad vterum.
vide Soranum. Certo tempore mulier concipit aut
incipiente semine, aut deficiente. Saltus in primis
septem diebus perimit semen & locellis eicit. Infans
nisi

nisi latum locum habeat, quo nutriatur, agitetur, crescat, macilentum fieri necesse est; utpote qui satis amplum locum ad incrementum non habeat. Eadem ratio est cur modò parui, modò magni nascantur infantes. quemadmodum cucumeres & arbores, & alia quadam germina, si comprimantur, & in angustiis creuerint locis, partim mutila, partim tortuosa proueniunt: ita & fœtus in utero; iuxta ea quæ matri contingunt, vel mutilatur, vel non rectè crescit. Mulier cum concepit, semen extra locellos non exilit; menses non defluunt, siquidem fœtus sanus futurus est, præterquam pusillum primo mense. At quacunque uterum gerentes à febribus corripuntur, & fortiter calefiunt, sine occasione manifesta, difficulter pariunt, & cum periculo, aut abortum facientes periclitantur. Accidit videlicet quibusdam gravidis, in quibus vitiosi humores priusquam cœceperint sunt acervati, ut nonnunquam à febribus vehementibus corripiantur, ita quod ex necessitate abortiant: nonnunquam verò mediocribus; sed hæc cum non purgentur, aliquid superest reliquiarum humorum in corpore vitiosorum, ex quibus febres ab initio sunt constitutæ, utpote non potenti- bus Medicis mulieri gravis aliquod forte auxilium adhibere, neque exquisita victus ratione in ipsis vii. Ob hanc igitur causam febris in ipsis frequenter reuertitur, & magna temporis parte grauius se habent. Non sine ratione igitur fœtus aliquando nequit obsistere, sed ex febre, & vitio humorum corrumpitur: nonnunquam verò perdurat quidem usque ad tempus partus; sed quum & ipse valetudinarius sit, ut qui longo tempore labora-

Hippoc. lib. De
natura pueri.

5. apho. 55.
Gal.

Numerosi-
tas conce-
ptuum cau-
sa abortuū.

110. partus
minimi di-
giti magni-
tudine.

Quæ trans-
gressa abor-
tū faciunt.

laborauerit, & quum matrem habeat imbecilem, non sine periculo paritar. Nam ad bonum partum, duorum corporum vigore est opus, & grauida mulieris & infantis. Numerositas conceptuum, vt rectè dixit Bonaciolus, præterea abortum cit. Nam quandam duodecim, alteram duodeviginti, septuaginta alteram (omnibus efformatis) abortiuos abegisse, fabulosam non est. At, quod penitus incredibile censebitur (quamuis Medica rei professus non ignobilis prodiderit) nobilis quædam mulier vna centum & quinquaginta efformatos vitæ compotes, secundis obuolutos, præmatūrè abortu egeßit: quæ cum vermiculos se peperisse arbitraretur, Medicum accersitum iri iussit, quo præsentè diruptis secundis, magnitudine minimi digiti (compluribus motum habentibus) centum & quinquaginta partus connumerati sunt. Sed inter miracula, non sine magna superstitione, Losduyna apud Batauos nostros, prope Hagam Comitibus, ostenditur, comitissam peperisse tot proles, quot numero dies annus complectitur. At cum hoc fabulosum videatur, in omis, in Italia (inquit Bonaciolus) septem, & aliam tres (quod & assidue accidit) quam etiamnum nos ipsi nouimus, abegisse certum est. Sed, quod iam etiam in prodigiosam miraculorum admirationem acceßit, viperam mulier prægnans si transcendit, abortionem sequi produnt. Item amphibianam mortuam duntaxat: nam viuam habentes in pixide impunes transire, etiam si mortua sit. Et, quo magis miremur, si non asseruatam grauida transcendit, innoxiam fieri, si protinus asseruatam transcendat. Ouum etiamnum corui grauidis cauendum constat, quoniam transgressus abortus asperas molitur.

enolitur. Simili modo castorium fibrumve grauida supergrediente, abortum facere dicitur, periclitariq; partus si superferatur. Tantum inest semini draconculi virus, vt olfactum grauidis abortum inferat. Plura vide apud Plinium: etiam de rad. cyclaminis, & quod neutra filix danda sit pregnantibus; quoniam non solum abortum, sed sterilitatem inducit. Ceterum quod mola quoque, vt antea dictum est, etiam abortum frequenter inferat, non opus est illud repetere. Noui aliquas mulieres humidas habentes matrices, decimatertia vice ex tenuissima causa abortisse: quod etiam aliquibus contigisse nouimus, quibus acetabula muco referta erant. hoc est quod Aërius lib. 16. cap. 21. De his qui bimestrem aut trimestrem abortiunt, dicebat; Quacunque temperati corporis mulieres bimestrem aut trimestrem, sine manifesta causa, abortiuntur, his vuluae acetabula muco referta sunt; ideo fœtus retineri nequit, sed elabitur, vt Hippocrates inquit. Tales antequam concipiant, purganda medicamentis pituitam educentibus; & toto corpore prius purgato, deinde & vtero, victus ratio adhibenda est calfaciens & exsiccans, moderata exercitia, & frictiones concedenda, omnisq; refrigerandi modus euitandus, vt si ea ratione quoque steriles sint, concipiant. & vbi conceperint, ne amplius fiat abortus, ea quæ semen tum fœtum retineant, etiam exterius ad vteri constrictionem & roborationem adhibenda. His verd quæ ob naturalem retentricis facultatis imbecillitatem abortiuntur, innata quadam proprietate erinacei terrestris corium crematum opitulatur, si aqua aut vino dilutum propinetur, & pudendi mulieris orificio illinatur. Idem potest & martinus,

Vide Plinium
lib. 23. cap. 10.
lib. 24. cap. 16
& lib. 27. cap.
12. & lib. 28.
cap. 4. lib. 87.
cap. 9.

Quæ abor-
tum inhi-
bent,

466 DE MULIERVM MORBIS,
rinus, ac mitella viuentes vsa. Item myrri bacca &
vino lentiscinove oleo, aut susino illita: rubi etiam,
myrri, & similium decoctis loca vtiliter irrigantur.
Aëtites præterea lapis super ventrē gestatus prægnan-
tes fœtusq; conseruat, nec finit vuluam emollescere.
Item tritici granum, iuxta eundem Aëtium, quam-
uis superstitiosum, intra panem inuentum sinistro
brachio alligatum. vel sardonius lapis prægnantis su-
mini, vsque ad pariendi dolores, cum filo suspenda-
tur; & vbi partus accesserit, auferatur: vel lapis in
vulua aut corde, aut intestini ceruarum repertus
pro amuleto gestetur: est enim ad retinendos fœtus
remedium efficacissimum. Easdem vires habet lapis
trunco arboris cunei more impactus.

OBSERVATIO LXVII.

*De prægnante vomitum enormem habente,
vnde abortus metuebatur: & de altera
alui profluvio laborante.*

MULIERI prægnanti cum vomitum enor-
mem pateretur, ne abortus fieret, de
quo erat metus, omni mane cochlear vnum
atque alterum syr. de ribes, modò de agresta
exhibuimus; ita vt statim sanata, nullo modo
abortierit. Alteri quoque prægnanti cum aluus
multum flueret, & periculum abortus immine-
ret, (ex mente Hippoc. & aph. 34. lib. 5. superius
citato) commodè alicam in lacte caprino co-
ctam dedimus, & panem siligineum nauticum,
tum pira immatura exhibuimus, & caseum ve-
tustum,

ustum, iecur gallinaceum assum (quod vtiliter
in cibo datur) & merulam, & palumbum fe-
rum ex posca coctum, ouaque dura, & mala
pydonia: iis aliud scribebatur, abortu minimè
subsequente.

SCHOLIA.

CVM varia sint cause ex quibus abortus subsequi
possit; quantum ad curationem attinet, duplex
hic scopus in vnaquaque causa tollenda statim exori-
tur, primò prohibendo ne abortus fiat, si possibile sit.
& hic scopus in se continet pregnantis optimam gu-
bernationem, & conseruationem: de qua ex parte
diximus Obs. 66. precedente, & de victus ratione, &
quibus modis illa ipsa ab abortu custodietur. Enim-
vero aërem temperatum inhabitabit, in primis
mensibus sese custodiendo à laborioso exercitio, ne li-
amenta debilia abrumpantur, & somno temperato
tetur. & si aliud restricta fuerit, non nisi manna
aut clystere ex iure pulli cum oleo communi vel sac-
charo laxanda: accidentia animi omnia fugienda:
pretiosos lapides apud se porret, sapphyrum, hyacin-
thum, adamantem & turchesiam; fugiendo cibaria
periculosa, de quibus diximus. Et quia in pregnantē ma-
teria corrupta detinentur, & ad stomachum fluunt,
auseam inferunt, & vomitum & in appetentiam;
ventriculi ratio habenda, & is reborandus, ut Scholio
Obs. 65. huius libri diximus, ubi egimus quibus mo-
dis & accidentia pregnantium sint corrigenda & tol-
lenda. Reboratur stomachus, ut ibidem diximus,
oleo maslich. cotoneor. adiect. pul. corall. rub. men-
tha, & similibus, cera pro vnguento adiecta; & dia-

margariton, iuxta Auic. & quæ simul ad pedum inflationes faciunt in pragnantibus, ibidem docuimus, & ad renum debilitatem, quibus potissimum pragnantes afficiuntur. Secundus scopus potius pertinet ad fœtum mortuum; tunc enim abortus inuandus esset, vel ob matrem, ubi de eius morte timeretur: sed de eo postea. At primus scopus, de quo nunc agimus, maximè nobis utilis est, ut, cognitis causis, ob quas abortiri solebat, eas ante imprægnationem quouis modo tollamus, ne ob eas causas imprægnata amplius abortum patiatur. Deinde ea ipsa imprægnata ne abortum faciat præseruetur. Si igitur mulier propter extenuationem aut debilitatem abortire consuevit, omnibus modis, tum vitæ institutione ac victus ratione, ante imprægnationem erit impinguanda & roboranda. Eadem quoque imprægnata, si metus sit abortus ob eandem causam, vel ob inediam aut famem, resumptiuo victu utatur. Oportet enim pro causarum varietate remedia inuenire, quibusdam quidem ante conceptum, aliis verò post. Si ex nimia amplitudine vteri, quomodo is sit coarctandus suo loco diximus. Si ex intemperie aliqua vteri; nam calida absument nutrimentum, quo fœtus alii debet, multoq; magis sicca; frigida congelat & debilitat fœtum, humida nimis relaxat; quomodo ista intemperatura corrigantur, iam diximus prius, quando de sterilitate loqueremur. Si à ventositate, quomodo euitari debeat abortus, dictum est prius de spiritu in vtero retento & vteri inflatione: cauendo tamen ne valde diuretica exhibeamus, ut superius ostendimus exemplo mulieris imprægnatæ à nobis curatæ, cum tormina ventris pateretur. Cum enim abortus in tribus

Præseruatio
atque cura-
tio abortus
ab extenua-
tione vel de-
bilitate.

Ex nimia
amplitudine
vteri.

Ab intempe-
rie.

A ventosi-
tate.

tribus primis mensibus saepe contingat, inquit Alboali
 filius, à ventositate, tunc in cibis vtantur speciebus di-
 ctis: & cinnamomi electi ℥j. caryoph. nucus moscha-
 ta, cardamomi, añ. ℥ij. zin℥. ℥β. piperis ℥j. croci
 ℥β. Ventositas vbi multiplicetur, ita vt abortus me-
 tuatur, vtatur diagalanga. & vt ad caput ascensus
 vaporum prohibeatur, fructus stipticos, vt pira, coto-
 nea, mespila, & similia in fine pastus semper assumat;
 vel ex confectione diacydonite, vel de coriandris sac-
 charo modicè in crustatis aliquid capiat. Si vitio vteri
 abortus metuatur, ex eiusdem vlcerebus, abscessu, in-
 flammatione, erysipelate, ob vterum paruum aur-
 densum, ex propriis locis curatio petenda. Ad erysipe-
 las, vel ignem sacrum, terrenos vermes quidam ex
 aceto illinunt, aut oua cocta trita cum oleo impo-
 nunt, & ouorum trium calidam pari mensura amy-
 li. Ad densum quidem & constrictum vterum ea
 quæ dilatant, vt balnea quidem relaxantia, conue-
 niunt. sed id vbi in vtero gestant, vt dictum est prius
 ex Rondeletio, cum animaduersione, ne talia laxan-
 do abortum faciant: ideo subinde adstringentia ad-
 demus, vel is per interualla vtemur; vti est oleum
 mastichinum, lentiscinum: emolliunt ista quidem,
 sed simul adstringunt. At mulieres quæ ob nimiam
 humiditatem fetum retinere non possunt, eas ante
 conceptum pilulis ex hiera & de aromatibus purga-
 bimus, & vterum exterius quoque exsiccabimus, pi-
 tuitam digeremus & purgabimus cum pilulis alephā-
 ginis. Insestiones præterea vtilis sunt, quibus conco-
 ptus futurus custodiri potest, & balnea quoque iu-
 uant, qualis in agro Patauino sulphurata, ac bitu-
 minata, vel in agro Bononiensi, vel Alex. drino in

Ad sursum
 humorum
 vapores pro-
 hibendos.

A vitio
 vteri.

Ex nimia
 humiditate,
 vel ex fluore
 albo.

Vtrum in
gravidis
purgatio vel
venæ sectio
fieri possint.

Liguria: iis ceriè abortus eua sere plures feminae. Periculum abortiendi initio & sine est maius: à quarto mense ad septimum vsque non metuit Hippoc. neque potionibus; ita quòd & quartus & septimus à formidine non sunt tuti: ternis intermediis mensibus, obnixè radicator fœtus, & secundarum extantes caruncula acetabulis harent. Quarto mense vsque ad septimum si materia turget, purgare licet, iuxta Hippoc. sed non fortibus. At vtrum alius prioribus mensibus purgatio conueniat, etiam in vltimis, tum venæ sectio, quæstionem hanc lib. 2. nostro de feb. obseruationib. 28. & 29. & Scholiis earundem ostendimus. posse scilicet fieri, auctoritate aliorum, & præceptorum nostrorum experientia, cum mitiora habeamus pharmaca, vt mannam, pruna, tamarind. rhab. quibus & nos, tum alij, re vrgente, frequenter vsi sumus sine periculo, semper cum cautione. Sed à casta abstinemus, cum à renibus purget, vt alias diximus. Quare licet Hippocrates & Galenus eo quòd venæ secta in vterum gerente, abortus fiat, à venæ sectione abstinendum dixerunt; videmus tamen nostro seculo peritissimos Medicos non solum in 5. & sexto mense venam feliciter in pregnantibus secuisse; sed etiam in primis & in vltimis: quod & nos non semel, sed sæpius fecimus, in pleuritide, angina, peripneumonia, & alijs grauioribus morbis, non modò vt abortum non perpeffe fuerint, sed euidentissimam vtilitatem ex venæ secta senserint. Confirmatur proinde auctoritas Benedicti Fauentini præceptoris mei, & Elidei, ac aliorum quoque illustrium Medicorum, Amati ac Iacchini, vt in lib. nostris Obser. De febribus ad longum ostendimus. Adhibenda tamen semper cautio, ne
vires

ires deiciantur in pręgnante, maxime in principio
 & fine. à quarto ad septimum minus vereri oportet,
 sanguine tamen in minori quantitate extracto, quàm
 in aliis. vide lacchinum de acutorum morborum cu-
 ratione, qui hanc rem egregie tractat. Quamobrem
 si ob sanguinis acrimoniam foetum reiiciant, inquit
 Rondelerius, purgetur ante conceptum rhab. myrob.
 syr. ros. Utatur victu incrassante sanguinem, & ob-
 tundente acrimoniam. Post conceptum inungat par-
 tem renum vng. sequenti: R. olei ros. omphac. cydon.
 añ. ʒiij. cerusa lota in aqua ros. ʒss. rad. bistorta,
 coralli rub. añ. ʒij. sem. berberis ʒj. ceræ albæ q. s.
 fiat vnguentum pro renibus. Hoc ceratum etiam pro-
 batur ab aliis: R. mastiches ʒss. ladani ʒij. ceræ ci-
 trin. ʒij. bistor. nucum cypressi, hypocist. acaciæ,
 sang. drac. terræ sigillatæ, ros. rub. boli arm. añ. ʒj.
 ʒ. fiat ceratum, adiecto oleo myrt. & tereb. ut me-
 lius adhereat. Valet etiam si ex ea causa timeatur
 abortus. Emplastra tamen hic seu cerata minus con-
 veniunt, quia magis calfaciunt minusq; refrigerant.
 Quæ nimium sanguine abundant, quia natura gra-
 uata quantitate, aperit orificia venarum & multum
 sanguinis reiicit, deinde foetus ob penuriam alimenti
 vel moritur vel reiicitur; his ergo quæ propter hanc
 causam solent abortire, vtilissimum est sanguinem
 trahere ex vena cubiti interna, & ut minus plena vi-
 ctus ratione vtantur, præscribere. Vngantur renes &
 regio vteri vnguento præscripto ad sanguinis seruo-
 rem, ut partes refrigerentur, quæ ob nimium san-
 guinem incalescunt. Sanguinis etiam mistio in eius
 seruore & acrimonia fieri potest, sed minori quanti-
 tate, pro ratione habitudinis & sanguinis. Si mulier

Si ob san-
 guinis acri-
 moniam
 fiat abortus.
 quid facien-
 dum.

Si ex nimio
 sanguine ab-
 ortus fiat.

472 DE MULIERVM MORBIS,
multum sanguinis consueuerit reuicere tempore men-
sum, plus sanguinis trahere oportet; id tamen non
vnica vice, sed interpositis 10. aut 15. diebus, aut
mense vno vel duobus; idq; 4. 5. 6. 7. mense, quam-
uis Hippocrates à quarto tantum mense vsque ad 7.
uterum gerentes purgari posse scribat; quod in mor-
bis acutis faciendum dixit. Neque etiam formidan-
dum quod Hippoc. mulierem abortire ob sanguinis
missionem dixerit; quod est intelligendum de mulie-
ribus habentibus parum sanguinis, aut imbecillioribus.
Nam experientia constat, mulieres, quæ sunt fre-
quenter passæ abortum, hoc remedio retinuisse fœtum.
Non solum autem ad retentionem fœtus (inquit idem
Rondelerius) sed etiam in his quæ difficile pariunt,
sanguinem nisi cum summa utilitate. Nam cum
fœtus abundat multo sanguine, in magnam molem
crescit, maximè his quæ amplum uterum habent, &
postea ob magnitudinem exire non potest. Sed de dif-
ficili partu plura suo loco.

OBSERVATIO LXVIII.

*De fœtu mortuo, cum intensissimo dolore
ventris inferioris, cum stranguria
& dysuria.*

ELIZABETHA Henrici, vxor Magistri Iohan-
nis cognomento Buggen, apud Delphen-
ses cereuisiarij, pro cuius ædibus trifolium in-
signe erat, hæc ad quintum mensem ferè graui-
da existens, incidit in diuturnum fluxum men-
struorum. Pro quo symptomate depellendo
confu-

consultuit Cornelium Ericium collegam meum;
& tandem fluxus ille paulum videbatur repres-
sus; paulo post rediens, mox iterum constrictus.
Ea verò debilis existens ex naturali intemperie,
in domo perflatili, vtero iam aperto per conti-
nuam mensium purgationem, circa illos qui
terreusiam ferebant, valde laboriosa, multos
clatus in vterum excepit, ita vt vehementissima
mormina oborta sint, vt abortum merueret, sta-
tim quoque accersita obstetrice. Sed cum par-
tus non subsequeretur, dolores paululum sese
remiserunt; attamen motum fœtus vt antea
non sentiebat. Quare cum Cornelius Ericius
peregrè profectus esset ad 11. Octobris diem
anno 1569. hæc ipsa me vocauit. Aderat tunc
dolor rursus intensissimus in imo ventre & vte-
ri regione, & simul stranguria ac dysuria; ita vt
de abortu futuro, vel potius de fœtu mortuo
suspicio esset; quanquam illa hoc tempore di-
cebat, motum se exiguum infantis sentire, at
vix effatu dignum. Sed cum aluum non depo-
neret, neque medicamentum aliquod adhibere
audebam, glandem sequentem ad aluum irri-
gandam subiicere iubeo: R. pul. hieræ picræ ʒ
ij. pul. cumini, ob ventositatem, ʒ β. salis exi-
guum, fiat glans seu suppositorium. pectinem
pro dolore & dysuria inungebat oleo anethino,
parte vna, & parte dimidia olei amygd. dul.
quibus dolor paululum mitigatus est, & libe-
rius vrinam reddere potuit. At 13. die Octob.
cum rursus lotium cum dolore redderet, potu
sequenti utebatur: R. rad. maluæ ʒ β. folior. mal-

G g

uæ

474 DE MULIERVM MORBIS,
 uæ m. j. sem. anisi 3 j. ß. hord. mund. p. j. sem. 4.
 frig. maior. (ob vrinæ acrimoniā) sem. pap. albi,
 añ. 3 j. coquantur in cereuisia communi pro lib.
 j. Dulcia hæc planè abhorrebat, ob metum suf-
 focationis vteri, qua solita fuerat laborare. Ex eo
 decocto dolor nonnihil mitigabatur. 14. die cùm
 rursus aluū non redderet, glande leuiter solueba-
 tur. Sed cùm in vêtre inferiore duritiem quan-
 dam perciperem, hoc linimento vt pecten in-
 ungeretur mandauit: & olei amyg. dul. viol. pin-
 gued. gallinæ, añ. 3 iij. olei ros. 3 ij. misce. Eodem
 die sub noctem rediit collega, & is iterum voca-
 tus fuit. Eidem, tum mihi suspicio erat de fœtu
 mortuo, cùm motum infantis amplius non sen-
 tiret. Ad dolorem tamen sedandum, qui rursus
 vehemens erat, præscripti sunt sacculi duo: &
 maluæ m. iij. flor. chamæmel. meliloti, añ. m. ij.
 seminis lini 3 ß. parietar. attemis. añ. m. j. misce,
 fiant sacculi duo quadrati intersuti latitudine 8.
 digitorū, & longitudine 10. Sed eo tempore non
 vfa est sacculis. 15. Octob. cùm valde doleret in
 lumbis, eos vng. ros. inungi iussimus. nulla ade-
 rat febris. 18. Octob. valde debilis erat, & men-
 strua plus æquo fluxere: exhibita est conser. ros.
 At dolor quotidie magis intēdebatur, & maio-
 rem suspicionem concepimus de fœtu mortuo
 vel corrupto; & cepimus inter nos differere, num
 prouocandus esset; eoque magis, quod aquosa
 materia, quæ partum præcedere solet, & muco-
 sa in lotio conspiceretur, & liquor sanguineus
 efflueret. & ita cognouimus quod abortiendi
 tēpus instaret, cùm aqua primū saniosa pro-
 fluebat

fluebat loturæ carniū similis, deinde cruenta;
hinc purus sanguis, postea grumi; qualia dixi-
mus Scholio Obs. 66. huius libri abortum iam-
iam instantem præcedere. Postea ceperunt om-
nia ingrauescere; ita ut de fœtu extincto vix du-
bitaremus. Quum enim extinctus est fœtus, &
diu in utero subsistit, commemorata omnia, quæ
superius de futuro abortu sunt dicta, magis in-
grauescunt, adsuntque stomachi morsus, animi
deliquium, capitis & oculorum dolor, frequens
horror febrilis (qui aderat hoc tempore, & prius
non adfuerat) spiratio fœtida & graucolens,
veter grauis, & quasi procidēs, & qui etiam ad-
mota manu frigidus percipitur. Imò hîc obste-
trix immixtis digitis frigidam animaduertit ute-
ri ceruicem. Interdum conuulsiones oboriuntur
epilepticas finitimæ. Sed & secundum Guaine-
rium, fœtum mortuū cognosces, eo quod mo-
tus eius non percipitur amplius, ac oculi mulie-
rum profundantur, & fusca eorum albedo fit, &
circa umbilicū dolor atrocissimus ad pectinem
vsque vrget (ut in hac erat) & cum à fœtu ipso
mortuo inferiores partes comprimantur, stran-
guria (qua & hæc laborabat) & tenesmus acci-
dit, sæpe rigent, & interdum aures ac narium
extremitas ut labia denigrantur, tumescit facies:
& venter, si fortè non detumescat, mollis fit ta-
men. Quod si ventrē, super latus prægnans dum
iacet, manu compresseris, rem duram de latere
in latus quæ mouetur percipies. Similiter & su-
men pectinemque, qui antea calidus erat, nunc
frigidum inuenies: & si fœtus putrefactus
sit,

476 DE MULIERVM MORBIS,
fit, eidem anhelitus olet multum : cum quo si
mulier diebus quatuor vel ultra in partu labo-
rauerit, certior multo fiet, ceteris signis præscri-
ptis diligenter animaduersis. Cum igitur mu-
cosa & cruenta exirent in hac muliere, & liquor
sanguineus efflueret; ideo statim sacculos supra-
dictos, in vino coctos & expressos, vt appone-
rent suavisimus : sed antequam decocti essent,
paulo post sub meridiem pars caluariæ infantis
cum maximo dolore, vnà cum fluxu vehemen-
tiore, profiliebat ; indubitatum signum non
solum fœtus mortui, sed etiam corrupti. Ideo,
adhibitis sacculis, & porione sequenti propina-
ta, totum fœtum mox corruptum peperit, vel
abortiuum corruptum : & pulegij regalis m. j.
cinnamomi electi ʒ j. β. doronici Romani, cas-
tiæ lignæ, añ. ʒ β. lapid. dactylor. ʒ j. β. intern.
lapidum persicorum ʒ ij. seminis viol. ʒ j. re-
rantur modicè, & bulliant in lib. j. vini Rhena-
ni optimi pro ʒ ix. capiebat statim cyathum
vnum, & sub noctem alterum; atque hora no-
na sub noctem reiecit fœtum mortuum & om-
nino corruptum. At remansit secundina: quam
cum parere non posset, decocto superscripto
adiecimus sabinæ m. j. Et 19. die sequenti, post
eiectum fœtum, cum adhuc secundina rema-
neret, addebamus m. j. foliorum dictamni cre-
tici. verum secundinam adhuc parere non po-
tuit. Eo tempore Heyla, obstetrix bene ex-
ercitata, nobis narrauit de puerpera cui post
partum remanserat secundina, quod per partes
sine remediis paulatim corrupta exierit, maiore
tamen

tamen parte in vtero remanente; quæ tamen ipsa postea ex puerperio repurgata, & tempore puerperij absoluto templum adeunti, inter eundem ad templum, excidit. Ita & huic evenit. Sumens enim ex potione suprascripta, tandem per partes corruptam secundinam reiecit. Sed eodem tempore Cornelius Ericius, collega notester, narrauit, Traiecti mulierem prægnantem fuisse, quæ per nouem annos ossium particulas tantum fœtus corrupti reddiderit, vt à Medicis fide dignis accepisse se affirmabat. Neque minus admiratu digna historia memorabilis, quæ annexa est sub finem libelli Observationum Remberti Dodonæi, de muliere, quæ annis tredecim in vtero gestauit fœtum mortuum, vel potius sceletum fœtus mortui, quod tactu cum ab ipsa matre, tum ab omnibus illi præsentibus percipiebatur: eaque narratio scripta est ad Matthiam Cornacem ab Ægidio Hertogio Medico. Similiter & altera historia adiecta est, ab Achille Gassaro ad eundem Cornacem missa, de gestatione fœtus mortui, post integrum annum, tempore partus iam præterito. Vtraque tamen postea superuixit. Nostra quoque, de qua nunc loquimur, rectè sanata, etiamnum cum hæc rescriberem, anno 1589. mense Decembri, rectè valebat, & nunc cum recenseo, anno 1593. bona vititur valetudine.

SCHOLIA.

VBI timore matris, aut fœtus, vel propter mortem fœtus, aliquando cogamur abortum provocare

Theod.
Priscianus.

uocare, vel foetum corruptum aut mortuum depel-
lere; id nunquam faciendum est nisi re urgente in
tali casu. Hinc rectè Priscianus dixit, Abortiuum da-
re nulli fas. Enimuero ut ipse Hippocrates attesta-
tur, tam diri reatus conscientia, Medicorum innocens
officium non decet maculari. Sed quando matricis
vulio, aut etatis propria, frequenter eueniat ut par-
tus aut femina periclitentur; expedit praegnantibus
in vitae discrimine constitutis, vnius partis saepe iactu-
ra salutem alterius mercari certissimam: sicut ar-
boribus arescentium ramorum accommodatur salu-
taris abscissio: & naues pressa onere, cum graui tem-
pestate iactantur, solum habent ex damno reme-
dium. Sic quoque Guainerius ob duas tantum cau-
sas Medicum abortum facere posse iudicat; quando
metus est de matris morte, vel ubi foetus iam mor-
tuus est: tunc enim excusatur Medicus pius ab ipso
Hippocratis iuramento. alioqui fas non est foetum
corrumpere aut abortum procreare. Infinita autem
praescribuntur à Medicis medicamenta quae abortum
faciunt. eadem enim quae foetum corrumpunt, &
mortuum educunt, abortire faciunt. Foetum cor-
rumpentia Aërius lib. 16. cap. 18. ex Aspasia anno-
tauit, opposita offerens iis quae de studio praegnantium
egit ut foetus retineri posset. Hic videlicet contrario
modo iubet, ut vehementissimis moribus agitetur, ut
saluat, ut grauissima onera gestare enitatur, utq; de-
coctis vrinam & menses cientibus, atque aluum sub-
ducentibus iugiter utatur, & acrioribus clysteribus
ventrem abluat, in balneo etiam sumen & pubem
singulis diebus perfricando, in labro tepidiori aqua
pleno diutine immorando, in scenugraci althææ,
artemi-

rtemisia decocto. emplastra adhibet ex cyclamine,
 rtemisia, elaterio, & similibus: & carycas cum ni-
 ro, aut simile quippiam, in sinum pudoris ponit: vio-
 lę, albe semen, nitrum, & absinthium in vino de-
 cocta præbet: cum alia, ut apud eundem, & Guai-
 acum, tum alios videre licet; & quæ à Moschio-
 ne, Cleopatra & aliis scripta sunt in harmonia Gy-
 nacisrum. Hæc enim non nisi peritis Medicis cog-
 nita esse debent, ut foetum emortuum expellere sciant
 ubi opus est. quibus illa addere possumus, quomodo
 corrupti foetus eiectioni auxiliari oporteat, ex co-
 dem Aëtio lib. 16. cap. 20. Vbi foetus abruptus
 fuerit, si in uteri collo detineatur, ligustrino oleo te-
 rebinthina admixto in totum corpus, sed præ-
 cipue in partes utero adiacentes persundi oportet:
 eodem ligustrino oleo, etiam excreto foetu assidue
 loca irriganda sunt. Si verò id parum successerit,
 mulier aromatum decocto insidebit, atque interim
 sternutare cogetur, ac resina arida, bitumine pro-
 poli & cancri fluuiatibus aridis suffietur. Hæc &
 alia huiusmodi facienda erunt, si inflammatio non
 obstiterit: nam ea infestante, intra sessiones, quæ re-
 mittendi, mitigandique vires habeant continebi-
 mus; & si foetus detineatur, quod uterus absque in-
 flammatione oclusus persistat, papyrus quoque &
 spongas exurentes, pessuli modo, primò tenuio-
 res, postea crassiores, imponemus, atque extrema
 opoponace, vel radice eius è melle vel terebinthi-
 na trita illinemus. Excreto autem foetu, si locus
 adhuc non abscesserit, violenter euellendus non est,
 neque tamen umbilicus incidendus, & locus di-
 mittendus: summa enim suffocationes & certa
 perni-

Quomodo
 corrupti fe-
 tus eiectioni
 auxiliari
 oporteat.

480 DE MULIERVM MORBIS,
perniciēs, si id feceris, consequetur. Sed si tam gra-
ue incommodum protrahatur, vmbilicum incisum
femori mulieris alligare oportebis, omniq³ studio co-
nari, vt locus abscindatur; quemadmodum inferius
idem de sectione foetus docet. Verū: cū hac ad chi-
rurgos pertineat, id peritis relinquendum est, cuius
doctrinam quoque si videre libet, lege filium Aboali
21. terij.

OBSERVATIO LXIX.

*De partu facilitando, in nobili Domina
etiam ictero laborante.*

DOMINA de Schagen, cū pręgnans in no-
no mense esset, ac tempus legitimi partus
instaret, & simul ictero laboraret, sine febre ta-
men, ad eam in pago in arce sua Schagensi agen-
tem, anno 1548. cū Alcmarię tunc habita-
rem, accitus fui. Hoc itaque clareto seu vino
Hippocratico assumpto manē & meridie hora
quarta, quinto deinde die post assumptum cla-
retum feliciter peperit, & simul ab ictero libe-
rata est. Claretum, inquam, tale erat: ꝛ capill.
ven. verbenę, artemisię, prassij, pulegij, añ. p. j.
calami arom. incisi ʒj. ꝑ. croci orientalis ꝑ j.
cinnamomi electi ʒ ꝑ. cum vino Rhenensi pu-
ro, addendo sacchari ad saporem q. s. fiat clare-
tum secundū artem, pro pinta vna. Illud au-
tem ad partum facilitandum non adhibuissē,
nisi Luna noni mensis pręteruissēt, iuxta prę-
ceptū Benedicti Fauentini, charissimi mei prę-
ceptoris, qui ita in sua Empirica cap. 45. ad fa-
cilitan-

facilitandum partum, & ad mitigandum do-
lorem eius, nobis scriptum reliquit: Ad facilem
partum reddendum consulo, quod nullus Me-
dicus se intromittat, nisi posteaquam pragnans
egressa fuerit lunam noni mensis suæ impræ-
gnationis.

SCHOLIA.

MULTI morbi (ut hic icterus) cum partu finire
solent, quemadmodum & Amatus refert cen-
tur. 2. curat. 51. de muliere uterum gerente dysen-
teria laborante, qua cum gestationis nonum men-
sem aggredereetur, dysenteria lethali corripitur cepit,
qua nullis praesidiis domabatur. At quum pareret illico
dysenteria restricta est, & illa paulatim sanitatem
consequuta fuit. Alteram nouimus, inquit idem, pra-
gnantem sex mensium, qua cum dysenteriam patie-
batur, abortiuit, & sana facta est. Dysenteria ante
partum salubris ab Hippocrate iudicata est: quod ve-
rum esse historia Amati testantur. Ita & ego ali-
quando etiam Dominam de Harnes pragnantem
dysenteria laborantem habui, qua etiam restituta fuit.
Ita enim Hippoc. lib. 7. De morb. popularibus memo-
ria commendauit: Epicharmi uxori ante partum
dysenteria, dolor, alui egestionis subruentia, mucosa:
ubi peperisset, statim sana erat, diuersionis fortè ra-
tione. Ita & huic nostra Domina de Schagen eue-
nisse puto icterum solutum post partum, viis iam so-
lutiis ac apertis per diuersionem, materia deinde per
uterum euacuata. Ad facilitandum partum praeceptor
meus commendat hoc condimentum alternis diebus
sumptum in cena: R. gran. iuniperi, granor. lauri,

Morbi multi
cum partu
finiunt.

Ad facili-
tandum
partum.

H h

añ.

añ. num. vij. casta lignea 3 ss. cinnamomi integri 3 j.
omnia simul ponantur in ventre tarturis pinguis &
carnosi, deinde coquatur in veru cum pinguedine
pulli, & patienti mulieri pro esu dabis. Memini quod
ego anno 1554. die 13. Nouembris Christiana vxori
Iohannis Philippi de Eide Flandri, Mathematici in-
signis, cum vir à me consilium peteret pro partu fa-
cilitando, partu instante, consilium dedi vt quinque
aut sex grana iuniperi cum ficubus darentur: quibus
cum quinquies aut pluries vsa esset, mox, vt ipsa mihi
retulit, conamina partus apparuere, adeo. (quod &
dictu mirabile est) illa ipsa cum maxima facilitate
gemellos feliciter pepererit; & ego eo tempore vnus
de fonte susceptor fui. Habes apud eundem praepto-
rem meum Boredictum Fauentinum vnguenta rela-
xantia, linimenta, fomenta quoque ipsius pectinis; vt
apud ipsum ad longum videre possitis. Facilitant quo-
que partum ea quae ad difficiles partus prescribuntur,
vt exemplis subsequenribus clarius innotescet.

OBSERVATIO LXX.

De partu difficili ex magnitudine
fetus.

Vxor Iohannis Reyneri, mulier Alcmaria-
na, cum anno 1549. mense Martio in par-
tu periclitaretur, & ob magnitudinem fetus
parere non posset, quod id & aliis annis praece-
dentibus eide cōtigerat semper dum pareret,
ab ipsa, tum astantibus mulieribus intelleximus.
Nam & hoc notatu dignum à mulieribus lon-
go vsu obseruatum, quod viti quatuordecim la-

os habent, plerumq. magnos fœtus generant.
Inc Iodoca Teylingia, seu Iusta, socrus mea,
quæ viginti proles ex marito susceperat, filias
suas collocare volebat viris humeros latos ha-
bentibus; vti maritus huius mulieris habebat,
et etiam crassius. At verò proceritatis & impro-
prie magnitudinis partuum, Medici aliam cau-
sam referunt, vt postea latius in Scholio dicturi
sumus. Ceterum ad hanc, cum parere non pos-
set ob magnitudinem fœtus, accitus sum. Cum
aque aluum duriores haberet, glande eam
oleuebamus. Mox ad ampliandum vterum &
relaxandum, vt oleum sequens per obstericem
infunderetur, & vt intus atque exterius eodem
oleo inungeretur, præcepi: & olei amygd. dul.
seminis lini, lilior. viol. añ. ℥ j. β. misce. hoc ca-
plasmate etiam ventri post inunctionem ad-
moto, ac pectini ipso; & farinae hordei m. j. β.
mucilag. sem. lini, fœnug. althææ, maluæ, añ. ℥
j. olei amygd. dulc. lilior. viol. añ. q. s. fiat ca-
plasma; & cum decoctione earundem her-
barum, addito fœnug. & sem. lini, aliisque vi-
tuosis, fiat fœtus; quibus partes vteri relaxa-
ntur, & partes inferiores magis subsequen-
tes fiebant. Sunt autem inungendæ partes pe-
inei & caudæ. Nam eas dilatari ad meatus
amplificationem oportet; non autem os pubis,
quod firmiter per cartilagineum ligatum est,
& per ligamentum transversum parte inferio-
re positum. Sed cauda cum osse sacro articu-
lata est, vt extra moveri possit, ad ani & vteri
amplificationem. Quam ob causam mulieres

H h 2

non

484 DE MULIERVM MORBIS,
non debent inniti illa parte, sed lumbis vel co-
xis, vel debent sustentari viris fortioribus per
brachia. Nostræ Delphenses obstetrices habent
mulieres fortes ad sustentationem destinatas,
vt pręgnantes in sinu sedeant, vel potius libere
sustineantur, vt sic facilius parere possint. Nam
cũ sedent vel decumbunt, illius ossis (vt recte
quoque Rondeletius dicebat) amplificatio im-
peditur. Vtilissimum est etiam rectum intesti-
num vacuum esse omnibus recrementis. Quare
si mulier non exonerarit aluum, balanis solli-
citanda est potius (vt nos in hac fecimus) quàm
clystere, quia vterum constringere posset. sed
balani acrimonia facultatem expultricem mo-
uet, & sterqus ac fœtum aliquando propellit.
sic mihi sæpe euenit vt solo balano indito mox
fœtus subsequeretur, & parerent: vti vxori Af-
fueri Chirurghi Delphensis. Cũ itaque loca
iam dicta, perineum & cauda, oleis pinguibus
dictis inungerentur ac fouerentur, sternuta-
menta quoque incitauimus, vt vi illa commo-
dius pareret, & vt potionem infra scriptam si-
mul per os sumeret mandauimus: & cereuisiæ An-
glicanæ, qua delectabatur, cyathum magnum,
butyri ℥ ij. ꝑ. olei amyg. dulc. recenter expressi
℥ j. aquæ chamæmeli, lilior. albor. añ. ℥ j. ꝑ. to-
tum tepidè cũ ebibisset, maximam partem
euomuit; at reliquum cũ continuisset, non
diu post peperit feliciter, cum violentia tamen,
infantem magnum ac sanum, & salua euasit;
etiã locello vnà excusso seu secundina: in puer-
perio porro optimè habens, rectè deinde valuit.

SCHO-

SCHOLIA.

INTER partum naturalem & abortum differentia
est. Partus nominatur quando foetus absolutus ac
consummatus tuus emittitur, vel quando hoc ex
natura commodo fit: quando verò non natura spon-
dit, sed violenter incidit, abortus prouocatur, ut liquet
De facult. nat. Appello autem abortum imperfe-
ctum foetus emissionem vtcunq. factam, cum Gal.
De morb. vulg. E diuerso autem naturalem par-
tum nuncupamus eorundem foetus consummato-
rum, ac perfectorum naturalem emissionem: qui, ut
inquit Hippocrates lib. De natura pueri, hoc modo
fit: Vbi enim adeò auctus infans est, ut alimentum,
et augmentum, quod à matre descendit, non am-
plius ei sufficiens sit, copiosius alimentum appetens
alciat, & membranas disrumpens initium partus
nati affert. Foetus itaque vehementissimis motibus
succedunt partus, ex Hippoc. sententia. Hoc etiam
tempore vteri, qui amplius foetus grauitatem, ac eo-
rum distentionem ferre nequeunt, (Gal. teste eodem
lib. De facult. natural.) nec minus & sentientes in-
terim se morderi à qualitate humoris in se ipsos effu-
sæ, qui eos molestat, facultate propultrice media ab-
dicere properant: nec non & à se ipsis patienter in
hoc præstant opus, non mediis vteris, sed muscularis
qui in abdomine existunt: qui ad deiectionem etiam,
et tum ad reddendam vrinam, nobis sunt auxilio. Fit
itaque partus hoc modo. Verùm quo tempore fiat,
non admodum liquet, ut etiam superius diximus.
Modò enim 10. imprægnationis mense, iuxta Hipp.
vel iuxta Aristot. 10. quoque mensibus, utq. longissi-

Inter par-
tum natura-
lem & abor-
tum quæ sit
differentia.

Quomodo
fiat partus
naturalis.

De tempore
prius dictū
est. sed hic
conciliatur
Gal. cum
Hippoc. &
Aristotele.

H h 3

mè.

mē. quamvis & 7. mense & 8. & 9. (quod generaliter fit) parere possunt. At fœtus qui maturius quam in septimo mense prodeat, nullo pacto vitalis est: qui septimo, vitalis quidem hic plurimum erit, sed magna parte infirmior, ut etiam Hippocrates de partu septimestri scripsit. Galenus 9. mensibus perfici scribit, & hoc 3. De nat. facul. & 2. De caus. sympt. confirmavit. Atque hac fiunt prout alimentum perfecto & consummato fœtui ac augmentum à matre suppeditatur. Diversimodè enim in diversis vterum gerentibus se habet, si maiorem vel minorem sufficientiam considerabis, prout sufficientes vel paucos menses demittere consueverunt. Similiter & inter se non parum dissident fœtus: nam prout maiores vel minores existant, aut robustiores vel imbecilliores, plurimo aut pauciore alimento indigent, etiam dum perfecti ac consummati fuerint. Propterea Hippocrates horum haud ignarus, eodem lib. De natura pueri talia verba protulit: Quin et si alimentum à matre prius aduenit, & ante 10. mensem puer prodit; & hoc perpetiuntur magis mulieres primiparae: deficit enim pueris alimentum, ut ad 10. usque mensem sufficere non possit. Et demum: Quae verò menses paucos demittunt, ea etiam pueris postremo tempore, ubi iam maturi fuerint, alimentum rarius exhibentes, ipsos calcitrare faciunt, ut & ante decimum prodire festinent: modicus enim sanguis à iuenculis ac novellis matribus procedit. Longissimum itaque terminum naturalis partus conscripsit Hippocrates esse 10. mensem; quamvis non neget citius contingere posse, ut qui & 7. 8. 9. mense mulieres asseruit parere posse, & nonnullas 11. attingere. Et ita puer septimestri partu

natus,

natus, pro ratione natus est, & viuit: octimesis autem natus nullus vquam vixit: nouem vero mensium & decem dierum partus fit, & viuit. In eandem quoque sententiam deuenit Galenus. Nam licet nouem mensibus pariendi tempus praescripserit, illud plerumque mulieribus contingere asseruit, forte quia sic saepenumero obseruauerit, haudquaquam negans in decimo posse euenire: quin imò admittere illud videtur ex eiusdem Hippoc. auctoritate Comment. aph. 37. 5. lib. ac aliis quoque mensibus, pro praedictorum varietate. Cum igitur consummatus & perfectus prodeat, siue 9 siue 10. mense id contingat, & cum adeò miranda pro eius emissionem requirantur; euenit (idque non raro) ut difficulter edatur in lucem foetus, & sic difficilis fiat parientibus partus. Hunc quidam rursus naturaliter prodire volunt capite prius exeunte, facie versus terram prolapsa, deinde collo egrediente, mox humeris, brachiis, deinde extensis supra latera procedentibus: innaturaliter verò ubi exit resupinus, aut pedibus primò, aut manibus exeuntibus, vel secundum latera: difficulter, vel partum difficilem vocant, quando non potest exire, & laborat mater, & angustiat, ac moratur in illo labore & anxietate longo tempore. Alij verò partum innaturalem etiam ad difficultatem partus referunt: & ita partus difficultas symptoma est sub genere contentorum immodicè: sunt etenim foetus non vtero gerentium partes; sed proportionem respondentis, quae adnascuntur, familiarium, inquam, quemadmodum & oua, & fructus, nimirum ad generis propagationem à natura creati, ex Gal. testimonio 11. De simpl. medic. facultatibus. Et propterea ubi detineantur tempore

Alia distinctio partus naturalis, innaturalis, & difficilis.

Quis affectus sit partus difficultas.

Ad quam
noxam se-
quatur.

Procerita-
ris, improce-
ritatisque
partuum
causæ, & de
mira quo-
rundam pro-
ceritate.

quo edi in lucem debent, præter naturam detine-
tur. Consequitur autem hæc eorum præter naturam
detentio, aut ad noxam alicuius facultatis naturalis,
retentricis, inquam, aut expultricis, siue ipsius pueri
siue prægnantis. Interim verò citra noxam earundem
facultatum, ad alias consequitur causas, seu præter
naturam dispositiones. Sed antequam ad omnes cau-
sas veniamus, cum hic vnam tantum in medium pro-
duxerimus, nempe quod hæc mulier non poterat pæ-
rere ob magnitudinem fœtus; causam prius proceri-
tatis seu magnitudinis, vel improceritatis partuum
dicamus; quanquam aliqua ex parte prius diximus,
exemplo cucumeris & arboris, Scholio Obs. 66. huius
libri, de iisdem. At nostra vulgares mulieres, ex lon-
ga obseruatione dicunt, prægnantes magnos fœtus
pærere, quæ nactæ sint maritos platonicos humeros
latos habentes. At Bonaciolus lib. 1. mulieb. cap. 4.
inquit: Quosdam præstanti corporis magnitudine
partus, alios pumiliones, nonnullos proceritate insi-
gnes, improcera facie alios, obesos plerosque, alios gra-
ciles, quosdam inter hos omnes medios, pro locorum
capedine, recrementorum seminalium quantitate,
alimentaria materia inopia, vbertate, affluentia ve,
gigni compertum est. Etenim si vteri spaciositas an-
gusta fuerit, non amplum, sed angustum, quod in
ea procreatur, esse necessum est: instar fructuum, qui
quanquam sua vi suapteq; natura grandiores ado-
lescant, in angusto arctioreq; vasculo in sua genera-
tionis primordio coacti ac coerciti, excrescere ultra
vasculi limites (eo impediante) neutrquam possunt:
planeq; præpetibus hominum inuentis prodigiosis na-
turæ viribus abrogatis (cui nihilo secius imperari au-
dacis

dacis est credere) exolefcunt. Idem idem & de inchoati
 hominis magnitudine facile est cuique arbitrari. Quo
 fit ut nani pumilive degeneres admodum in lucem
 prodeant. subriceo Pygmaeos ad extremos India fines,
 ternos longitudine dodrantes non excedentes, quos
 etiam à gruibus infestari Homerus prodidit: eosdemq;
 fama est, sagittis armatos arietum caprarumq; dor-
 sis insidentes, verno tempore ad mare vniuerso agmi-
 ne descendere, & oua tum pullos quoque earum con-
 sumere, ternuq; eam expeditionem mensibus perfi-
 cere: alioquin fieri, ut futuris gruuum gregibus resi-
 stere nequeant. Contra, si vulua alueus vastior ex-
 titerit, modò parentes vberiores genituras suggesse-
 rint, ac deinceps alimentaria muliebria tantisper af-
 fluentiora affatim suppetant, maiusculum procul du-
 bio puerperium efficietur. Sin cauea intercapedoq;
 medium obtinuerit, medios quoque infantes (modò
 cetera respondeant) gigni, credi par est. Hinc breui-
 res quosdam patribus partus euasuros discas licebit;
 æquiuales nonnullos; longitudine magis euectos
 procerioresq; alios: tamen si raro admodum (seminum
 vbertatem exustione consumente) eam ætate nostra
 fortunam indepti sunt. Quandoquidem & Homerus
 vates ille iam ante annos prope bis mille & sexcentos;
 minora mortalium corpora quàm prisca vsque in id
 tempus conqueri non cessauerit. Nonnullos tamen
 patribus maiores extitisse creditur. Quemadmodum
 olim ille fuerat, cuius corpus (terramotu in Creta
 rupto monte) stans quadraginta & sex cubitorum
 inuentum est. Et adhuc Orestis corpus (oraculi re-
 fossum iussu) septem cubitorum fuisse traditur. Sub
 diuo etiamnum Claudio, Gabbara procerissimus ho-

H h 5 mo,

490 DE MULIERVM MORBIS,
mo, nouem pedum & totidem vnciarum ex Ara-
bia aduectus visus est. Et sub diuo Augusto Pusonius
& Secundilla duo in priori semipede addito exiit.
Quantos eorum parentes fuisse, nusquam proditum
est. Plura vide apud eundem loco citato. Nunc ad
alia exempla difficultatis partus properemus.

OBSERVATIO LXXI.

*De partus difficultate ob innaturalem po-
sitionem fœtus, ac humore elapso.*

QVÆVIS quantitas cuique in vtero fuerit, in
semet conglobatus homuncio sic gesta-
tur, vt nasum inter genua, super hæc palmas,
super hæc ocellos, aures extra genua habeat, cui
caput primum sursum, facie ad spinam matris
versa, tergore ad lumen est. At cum increuerit,
exitumque appetit (vt paulo antè etiam dixi-
mus) deorsum reclinatur. Egressus huius gra-
tia, rerum parens (quippe qui in caput commo-
dius ederetur) sic sitiendum in vtero duxit. Si
aliter exeat, difficilis fit partus; vti euenit anno
1557. mense Ianuario Mariæ Iohannis, vxori
Iacobi Teylingij, sororij mei; nam capite re-
trosum ad scapulas mento incumbibat vt exire
non posset, vti obstetrix nobis ad prægnantem
vocatis narrauit. membranis verò diruptis, hu-
more effuso, & enixu partus deficiente, ob lon-
gam moram & debilitatem, matrix minus lu-
brica partum adiutare non potuit. Quare con-
sului vt obstetrix ad humectationem oleo amygd.
dulcium

dulcium pinguisimè vterum obliniret, & quòd circa claviculam aut os pectoris digito inuncto leuiter cum oleo eodem paululum subleuaret, vt sic caput ad os vteri rectè descenderet. quod vbi fecisset, & artemisiæ decoctum cum vino Rhenano, adiecto puluere cinnamomi calidè propinasset, (quanquam prius ebibisset cereuisiam cum oleo amygd. dul. & butyro, quam etiam euomuerat, fœtu nondum egrediente) ilico peperit, deinde post partum bene purgata, optimè deinde habuit. Erat autem prius valde meticulosa, eo quòd octauus partus esset, cum mater eiusdem ex octauo partu obiisset. illa quidem imaginatione impressa, magis sibi metuebat. sed schemate optimi partus in rectum diducto, feliciter peperit. Eodem etiam planè modo, meo consilio, rustica feliciter enixa est, in pago ad Mosam sito.

SCHOLIA.

CAUSÆ autem difficilis partus variæ sunt. interea vniuersæ aut internæ sunt, aut externæ. Externæ siquidem, quæ partus difficultatem inferunt, sunt aut immodicum frigus quod vterum densauerit, aut immodicus calor, qui vires dissoluerit, aut quoddam aliud fortuitò eueniens, vt liquet ex Paulo & Aëtio: Nam & mulieres difficulter pariunt ob aëris præcedentem vel præsentem constitutionem, vt Hipp. locuit. Obest aquilonia: Austrina inuat sicca, fœtum & mulieris corpus exsiccant, & difficilem faciunt partum. nimis calida vires resoluit, vt diximus: frigida

Causæ ex-
terna.

frigida partes contrahit. humida omnium apertissima est. Quae modicè calida est, ut veris (quod cum autumno faciliores partus concedat) laudatur. Interna autem causa, aut vitio parientis, aut foetus, aut membranarum esse possunt. sub quibus & alij intelligunt etiam posse fieri ratione vteri, vel partium vicinarum. At parientis quidem, ut si crassa obesaque sit, vterus exiguus, dolorum impatiens, aut timiduscula, aut natura imbecillis, ut foetus nequeat propellere, aut etiam si ante tempus pateat, vel inflammationem in locis genitalibus, aliave particala fuerit experta, aut alio quodam modo laborans: ob ceruicis vteri obliquitatem, aut ob carnem eidem ceruici, vel osculo eius adnatam, abscessum vel duritiem. Potest & difficultas pariendi contingere, si etiam ossa pubis nimium conferta fuerint: quoniam enim in partu dilatari non possunt, pariendi difficultatem faciunt: similiter si puerpera vesica calculo labores, vel excrementorum copia in intestino recto, aut vesica fuerit detenta, siue prouecta aetatis fuerit, aut puella nondum virilis, nec vires vigoris adeptas: nec minus ob nimiam lumborum cavitatem vterum comprimentem difficulter pariet. Ita quoque si matris adsit mala confirmatio, statura breuitas: ex vicinarum partium tumore, vel vitio vesicae, aut musculorum abdominis. Nimia quoque omenti & vicinarum partium spissitudo & obesitas. Nam Hippocrates scripsit, omenti magnitudinem impedire conceptum, os vteri comprimendo: sic & facile partum molestat. In quibusdam enim omentum descendit inter vesicam & vterum, ibique spissius fit. Colli vteri longitudo facit quoque, saltem, ut longiori tempore exeat foetus.

Foetus

Interius
causae trifi-
dum.

Patientis
vitio causae.

Fœtus verò vitio similiter difficulter pariunt; ut si inu-
 sitate magnitudinis fuerit, ut Obs. 70. precedente
 ostendimus, vel exiguus, & modica gravitatis, seu
 magni capitis, vel monstruosus, vel mortuus; aut
 vivus quidem, sed adeò imbecillus, ut foras non possit
 procedere: similiter si plures fœtus fuerint. Nam He-
 rophilus quinque edidisse mulierem memoria prodi-
 dit. Confirmavit idem Gellij auctoritas, qui, diuo
 Augusto imperante, ancillam in agro Laurente quin-
 que pueros peperisse testatur. Vbi biceps prodit diffi-
 culter pariunt, vel quovis alio modo monstruosus, ge-
 mini, vel coniuncti, aut duo vel tres. nam duo corpora,
 teste Valeſco, nata viſa ſunt duo capita habentia, duo
 ora, quatuor brachia, quatuor manus, vnam anum.
 Primus mortuus eſt, & deinde alius longo tempore
 poſt, & fœtente altero. De monſtroſis partibus &
 diuerſis ſchematicis partium, vide 4. lib. Iacobi Rueſſ
 chirurgi Tigurini: nam & figura ipſius fœtus nature
 contraria, ut hoc exemplo precedente oſtendimus,
 difficilis efficit partum; ut ſi obliquus, aut in pedes
 procedat, ex Hippoc. auctoritate eodem lib. De na-
 tura pueri. Naturalis ſiquidem figura prodeuntis fœ-
 tus eſt (ut diximus) ut rectè in caput manibus ad
 utrumque femur extentis prodeat. proxima huic ubi
 in pedes conuerſus eſt, præcipuè ſi manibus ſuper utro-
 que femore extentis prodeat. Reliquæ verò omnes
 præter naturam ſunt, Aëtio & Paulo teſtibus: ut ſi
 caput in dextram vel ſiniſtram vteri partem decli-
 net; aut altera aut utraque manus exeritur, & cru-
 ra intus inter ſe diducuntur: aut etiam altero pede
 intus detento, altero prodeant, aut ſi duplicati vteri
 innitantur, aut etiam obliqui prodeant; licet hi mi-
 nus

Ex parte fœ-
 tus cauſæ.

nus improbandi sint, vt liquet ex eodem Aërio. Quapropter natura diligenter prouidit, quo pacto foetus qua conueniebat figura ad collum vteri proueniret. Caput etenim eius primum collo matricis indidit, tum per id alijs ipsius partibus viam munivit, vt liquet 15. De vsu partium. Procedit autem in caput, si secundum naturam prodierit, vt inquit Hippocrates, quoniam grauissima sunt ipsi superne partes, si ex vmbilico perpendatur. Atqui si foetus obliquus, aut transuersus paret egredi, aut si secundum longitudinem quidem, sed non vt nunc, scilicet caput non infereret, quod nonnunquam etiam, sed raro accidit, vel pedem ante caput, vel manum exerens, difficilem alijs membris exitum efficeret, vt eodem 15. De vsu partium à Galeno scriptum est. De his vide plura, & quae sint schemata infantis nascentis seu prodeuntis, in Harmonia Gynaciorum, & quae Moschio ad longum scripsit. Et ita Fernelius breuiter: Quum non rectè in caput fertur, nec manibus secundum latera adductis, sed vel ambos pedes, vel (quod multo operosius existit) alterum duntaxat, vel manus primum exierit, vel duplicatus in nates exit; vel obliquus alterutrum latus, vel pronus ventrem primum exhibet, quae omnium pessima est pariendi figura. Difficilis quoque sit partus, si secunda, aut propter crassitudinem non abrumpatur, aut propter tenuitatem antequam oportet, diuellatur simul cum alijs membranis foetum ambientibus; siquidem humore euacuat, infans praesiccitate agrè mouetur, ac per os & collum vteri difficulter elabatur: humor enim iste, qui in pueri membranis continetur, nedum eisdem
lubri-

Causa ex
parte mem-
brarum.

lubrificandis confert, sed vteri ceruicem ad maximam dilatationem reddit facilem: à prædicto namq; humore collum humectatum mollius redditur, dilataturq; facilius, eodem Gal. teste citato lib. 15. De usu part. Difficilem itaque partum in propinquo esse, prænuntiat (inquit Fernelius) humor aquosus allantoide conclusus, totus ante partum effluens, aut copiosior sanguinis eruptio multo tempore factum præcedens. Loci enim sicci manent, destituti eo humore, qui factui transitum facilem & lubricum præbet: languidi dolores ex intervallis longioribus recurrant, quandoquidem agrè abrumpuntur acetabula, vixq; secunda ab vtero diuellantur. Sed & hæc signa, præter ea quæ superius diximus, proximi partus sunt ex Mosch. Si septimo, vel nono, vel etiam 10. mense, grauedo vteri, & ex renum consensu feruor & dolor in clunibus, lumbis & inguinibus erit; ipsius etiam matricis ad inferiores partes discensus cum orificij apertione & humectatione. Cum verò proximatur, superiores partes graciliores fiunt, & extenduntur loca super pectinem & inguina, & frequenter vrinae desiderium nascitur. Immissoq; digito ad magnitudinem oui in orificio inuenitur: humor verò qui effertur, primò lentus, postmodum plurimus & sanguineus. Differt autem hic dolor à feruore qui in partu occurrit, & ab inflammatione vteri, eo quòd à feruore dolor cum clausura & siccitate in orificio inuenitur. At iam causa difficultatis partus antequam ad curationem accedatur, diligenter inquirenda, ut sic pro ratione cause commoda inueniantur remedia. Et licet rotæ sint pariendi difficultatis cause, haud tamen agrè à Medico

Signa difficilis partus in propinquo.

Signa proximi partus, ex Mosch.

Dolor parturientis differens à feruore seu inflammatione vteri.

Signa cau-
satum diffi-
cultatis
partus.

à Medico percipi poterūt: externa siquidem ex astantium seu puerpera sermonibus innotescunt: interna verò tum ex se ipsis Medici inuestigabunt, tum etiam ex earundem parientium loquela. Nam debilitas, agra, macilentia, veluti etiam pinguedo, ex habitu corporis deprehenditur. Si vteri vitio sit ex propriis indicis, siue adsit vlcus, abscessus, inflammatio, aut tale quippiam, facile deprehendes. Si quoque à frigore externo, vel calore, parientis indicio habebitur. Si mater debilis, vel lassata, vel morbum prius passam sit, vel ob longam moram magis lassata, vel famem experta, meticulosa, aut in pubertate, vel annosa, ab ipsa quoque vel astantibus percipies. Ita & fœtus imbecillitas ex debili & tarda motione habetur. si mortuus, eius signa antea diximus: à motu cessat, frigiditas ventris adest & lateris, dolor iuxta umbilicum grauis, febris lenta, faciei decoloratio, fœtidus anhelitus, ascensus vaporum horribilium ad superiora, immobilitas ventris, instantia vigiliarum. Magnitudo fœtus ex parentum corporis constitutione, ac ventris parientis mole coniicitur, eaq; grauiter incidit. Quando autem hæc deficiunt, & mater fortis est, facilis motus, & fœtus mouetur ad exitum, & tamen partus est difficilis, tunc signum est, secundam seu secundinam esse fortem; & tunc non exit aliqua aquositas nec superfluitas, & pragnans in enixu plurimum laborat: inde crassities secunda colligi potest. Et siccitas vteri facile cognoscitur per siccitatem pragnantis; quia est macilenta, sicca, sitibunda, agilis, minimè lubricosa. Nunc ad signa prognostica accedamus, exemplis prius productis de partu valde periculoso, & de primipara ex partu moriente.

OBSER-

OBSERVATIO LXXII.

*De partu valde periculoso: & de primipara
ex primo partu moriente.*

VALDE periculosum est si puer vel fœtus super pedes exierit. euasit tamen hoc modo nata Elizabetha Iacobi Teylingij sororij mei filia. Oportet vt obstetrix pedes impellat sursum, deinde paulatim conuertat fœtum. At si egrediatur vsque ad corpus, tunc præcipe ei vt comprimatur, & fac eam sternutare cum conditi: sæpe enim, inquit Albucasis, auxilio & gratia Dei, vidimus euasisse incolumes & matrem & fœtum. Et si non egrediatur hoc modo, tunc obstetrix reducat fœtum paulatim donec reponat eum secundum figuram naturalem. Si ita fortè reposuerit rectè, facilè pariet mulier. Quòd si nulla harum ratio subueniat, fove vterum cum mucilagine althææ & oleo sesamino. Puto autem filiam sororij mei præmissis pedibus, manibus deorsum ad femora deductis natam; qualis est prima figura apud Iacobum Rueff: in quo casu obstetrix oleo, conuenientibusque linimentis instructa, exitumque infantis vngendo & demulcendo tantum iuuat, ne retro feratur, sed vti cepit ita rectè pergat. Inprimis autem operam dabit vt vtræque infantis brachia deorsum porrecta apprehendat, firmiterque teneat, nec retrorsum deducere permittat; sed hoc ipso modo ad partum prodire compellat.

I i

& ad

498 DE MULIERVM MORBIS,
 & ad reliqua pergat vt ibidem annotatur. Si
 verò in pedes procidat, manibus supra caput
 surrectis, tunc melius est, partum in vterum re-
 pellere, vt videre est apud eundem autorem
 cap. 2. vel de secunda figura innaturali. Si ad
 genua descendat, facile repellitur. Si in nates
 sedeat, vt contigit vxori calcearij Alemaria, in
 qua foetus complicatus natibus exire nitebatur;
 sed manu infante repulso leuiter eductus fuit.
 Vide 9. figuram apud autorem citatum. Sicuti
 forma innaturalis foetus non careat periculo;
 ita pessima sunt symptomata quæ nos terrere
 debent; & tunc periculum prædicemus, si fe-
 bris inter pariendum præcipuè acuta adfuerit,
 dum diu in excutiendo foetum laborant, & si
 plurimum sudent pulsusque minuatur, & po-
 stea in totum non appareat, subsequente deli-
 rio. tales aliquando vnà cum foetu dum in par-
 tu sunt, moriuntur: vt nuper euenit primipa-
 ra valde tenuis constitutionis & imbecillæ
 existenti.

SCHOLIA.

Signa prog-
 nostica.

Ex parientibus ac puerperis maximè laborant pri-
 mipara, propter inexperienceiam dolorum: &
 dolent quidem totum corpus, maximè verò lumbos,
 ac coxendices. nam coxendices earum disparantur.
 Verùm experientia iam partus, minus primiparis dolent:
 quæ verò multoties pepererunt, multo minus dolent;
 vt inquit Hippocrates lib. De natura pueri. Primi-
 para & iuniores difficulter pariunt; ita & seniores
 quæ nunquam pepererunt; & aliquando cum vita
 peri-

periculo, si mala symptomata accesserint. Et ubi
bliquus, aut in pedes foetus procedet, nedum mulier
difficulter pariet, sed multæ vel ipsa perierunt, vel
uer, aut simul matres vnâ cum foetibus; ut Hipp.
n lib. citato scriptum reliquit. Huc referenda sunt
ræditiones habitæ de conceptione: nam & mulier
ost annum 25. primæm concipiens difficulter pa-
iet primipara. Pinguis mulier sicut difficile concipit,
ita & ægerrimè pariet. Si dolor imas partes ventris
entat, cum parientis virium robore, & nulla adsit
inhelandi difficultas in muliere temperatura & æta-
tis mediocris, bonum est: nam facilitatem partus
ræsignat: etiam cum dolor est prope vuluam, iam
lilatantur lacerti per embryonis præsentiam propè
annam existentis, & citò exhibit ille nouus calami-
osus mundi socius, dicente Valeſco. Quandocunque
gitur dolor declinat versus inferiora & anhelitus sit
bonus, partus erit facilis. Mulieres, ut dixi, pingues
magis laborant in partu, quàm graciles aut maci-
lenta. Masculus cum minori labore egreditur, quàm
femina. Si dolor ad ilia & os sacrum tendat, diffi-
cillimè pariet. aph. 55. lib. 5. Quæcunque vterum
gerentes à febribus corripuntur, & fortiter cale-
fiunt sine occasione manifesta, difficulter pariunt, &
cum periculo, aut abortum patientes periclitantur.
Non sine ratione igitur foetus (inquit Galenus in
Comment.) aliquando nequit obſistere, sed ex febre
& vitio humorum corrumpitur: nonnunquam verò
perdurat vsque ad tempus partus; sed cum ipse &
valetudinarius sit, ut qui longo tempore laborauerit,
& matrem habeat imbecilem, non sine periculo pa-
ritur. Nam ad bonum partum (ut aliàs quoque di-

500 DE MULIERVM MORBIS,
ximus) duorum corporum vigore est opus, & graui-
da mulieris, & infantis. Quidam hic adiiciunt quod
illa quæ in nauibus pariunt, mutos edant. vtrum ia
verum sit dubitamus. Plinius oscitationem in enixu
lethalem esse voluit, lib. 7. cap. 6. Quod verò mulieri,
quæ difficulter parit, sterilitatio superueniens bonum
sit, decretum reliquit idem Hippoc. aph. 35. lib. 5.
quoniam vehementiori concussu atque seruiore, par-
tim quidem naturam excitat, partim verò excernit
quæ partibus corporis firmiter infixæ adhærent, vt
inquit Galenus in Commento. Abscessus tempore
imprægnationis in vtero accidens lethale: & hoc quo-
que prius ex Hippocrate dictum. Partus autem diffi-
cilior in foetu mortuo, quàm viuo.

OBSERVATIO LXXIII.

*De quibusdam mulieribus in partu peri-
clitantibus, & egregiè liberatis.*

CATHARINA, mulier quæ extra portam qua
Schiedamum itur habitabat, vxor illius
Iacobi Iohannis, qui vela conficiebat, cùm circa
tres dies in partu difficili hæres parere non pos-
set nec lotium emittere, ad eam tandem ego ac-
citus fui, cùm obstetrix eandem pro deplorata
haberet. At his infra scriptis remediis anno
1571. per me descriptis tandem feliciter pepe-
rit. 24. Febr. eam accessi, & cùm aluum non
deponeret, balanis sequentibus soluta fuit: R.
pul. hieræ picræ ʒ ij. salis communis, & salis
gemmæ añ. parum, mellis q. s. fiant duo suppo-
sitoria.

istoria. Imperavi quoque ut obstetrix ventrem inferiorem ad pubem usque inungeret, ob humorem effluxum & matricem siccam: & ping. gallinæ, anatis, anseris, olei liliorum, cheyrini, añ. ʒβ. olei amygd. dul. ʒβ. misce pro linimento, interea dum in officio obstetricandi esset, intus vuluam quoque illinebat oleis sequentibus: & olei amygd. dul. ʒj. β. olei liliorum ʒβ. misce. Sacculi quoq. parati erant in vino Rhénano cocti, & expressi calidè pectini admoti ad vrinam prolestandam (cùm ea retenta esset) & partum facilitandum: & folior. maluæ, flor. chamæmel. melilori, parietariæ, añ. m. j. artemisæ m. β. sem. anisi. anethi, añ. ʒij. cerefolij m. j. fiat sacculus quadratus intersutus. Interim & pul. ad prouocandū partum non febricitanti per tres vices exhibitus est. Obstetrix aliū puluerem pro vxore Cornelij pictoris dederat; de qua muliere suo loco dicemus; quē citra meum consilium à pharmacopœo extorserat; sed nihil effecit, cùm casus ab altera diuersus esset. Verùm hæc subsequētibz pulueribus cum vino assumptis, & admotis sacculis, ex iis copiosè lotium reddidit, & mox feliciter peperit, & salua euasit, & sana etiamnum viuit. Hic erat pul. facilitans partum: & cinnamomi selecti ʒj. β. ossium dactylor. ʒβ. sem. viol. ʒij. rad. dictamni albi ʒβ. fiat puluis subtilissimus in tres partes diuisus. Venit mihi tunc in mentē textoris vxor, quæ cùm octo diebus in difficili partu valde angeretur, à M. Iohanne Tiengio Amsteldamensī Medico curata fuit, vbi nono die

accepisset 3j. pil. de assa foetida (de qua superius dictum est) cum cyatho vno decoct. sabinæ, idq. ter, post prandium, & hora 4. & sub noctem hora 8. quibus eadem nocte, Dei nutu, peperit filiam, & salua mansit. Sed & alteri etiam octo diebus hærenti in difficili partu, cui ante 4. dies matrix aperta humorem mensesque profuderat, exhibita est 3ß. pil. ex assa foetida iam dicta cum vino decoct. verbenæ, sabinæ & artemis. & liberata est illa nocte, cum bis sumpsisset. Ita & puerpera, cui duobus diebus secunda intus permanserat, valde defatigata tertio die extrema inunctio adhibita fuit, vt in deploratis fieri solet. sed singulis tribus horis accepit easdem pill. ad 3ß. (quâ descriptionē accepit à Nicolo Florentino, autoritate Rhas. cap. proprio De facilitando partum) exhibitas cum succo verbenæ & prassij mixtis cum vino Rhenens; & fuit liberata. Idē vtebatur suo clareto & vnguento emolliente, descriptis antea Scholio Obs. 43. huius libri.

SCHOLIA.

Qualis ob-
stetrix eli-
genda.

CVRATIONEM antequam aggrediamur, de ob-
stetrice perita ac gnara, & sagaci, ac minime
remulenta, prospiciendum est, vt per eandem omnia
illa quæ partum difficilem inferunt, recte curare possi-
mus: nam vt traditur in Harmonia Gynec. cap. 9. ob-
stetrix literas nosse debet, cui & ingenium promptum,
& memoria præsens adesse debent. Ea q. sit studiosa,
munda vniuerso etiam corpore, fortis & laboriosa;
quæ & iuxta Mosch. sit medicinalibus actionibus ex-
ercitata, prouidens, iusta, diligens in adiuuando, quæ q.
partes

partes diuidere nouit, & accidentia mitigare, non iracunda, nec turbulenta, compariens, sobria, pudica, arguta, quieta, prudēs, nec auara, atq; in eo munere facilis, audacula, qua animum primipara facile excitet, & qua praparcū animum coarguat, faceta, hilariq; non annosa, quaq; nō solum difficultati partus opportunē expediteq; succurrat; sed etiā cōtra ea (vt Benedictus Veronensis dicebat lib. 25. cap. 25.) qua accidunt ingeniosē agat; & in praecidendo deligandoq; vmbilico infans non impigra sit. non dicaculā, sed religiosam esse oportet. Nam saepe infans veluti emortuus enascitur, qui prius quā deligatur vmbilicus, cōpresso intus sanguine, tamquā recepto alimēto, vita restituitur: is alioqui deliquio moritur. At nunc de iis quibus obstetrices indigent, vt est sella obstetricalis ab ipso Mosch. tum veteribus descripta, instar sellae tonsoria similitudine lunae praecisa, vt illuc infans cadere possit. Sed quod sinu insident alterius mulieris, vt nostras obstetrices facere diximus, non adedō incommodum est, quā quod a viris fortibus brachia teneantur: nam quadā vel aspectū virorū dum parturiunt abhorret. Interea Moschio adesse vult ministras vnā cum obstetrice numero tres, ex quibus dua dextra laeuāq; ad latera stare debent, inter quas incubere possit; tertia verō dorsum eius teneat. Sed si in sinu sedeat mulieris robusta, tertia minus opus erit. Interea omnia sint parata qua ad partū sunt necessaria, vaporations ex oleis calidis, spongia mollis, lana munda, fasciae, cervicalia, resumptiui odores, & cathedra obstetricalis. Reliqua vide apud eundē, quid facere oporteat antequā in sella ponatur parturiēs, & quomodo eam collocare oporteat. Etenim si ita fuerit lassā, vt supina sedens in lecto parere non posset, ad sellā eam leuant,

Sella obstetricalis. vide Mosch.

De ministris, tum aliis rebus ad partum necessariis.

Obstetrix
quomodo
sedere de-
beat.

504 DE MULIERVM MORBIS,
vel in mulieris femoribus sedere debet (vt & nos
paulo antè diximus) vt illic pariat. Obstetrix ita se-
dere debet vt vtiliter sit cinctā, authore Moschione;
& si in lecto partus efficiatur, habeat modicè inferius
obstetrix sedile, in quo sedeat, vt ita facillimè manus
mittere possit. Si verò sedens in sella paritura est, &
sedeat inferius obstetrix humiliori sella, vt possit ex
superioribus partibus infantes adducere, & aliquan-
tulum pedibus suis apertis, plus tamen humiliori loco,
vt eam non impediat, faciem suam auersam auertat,
ne pariens præ verecundia se concludat. Ante omnia
tamen ligamenti omnibus & capillis solutis; quod
propter laxamentum solet fieri. Digito autem sini-
stro oleo calido peruncto, orificium matricis circum-
agendo aperiat, vt chorium illuc cadere possit. Omni
cura circa parturientem satagere debet, & petere
eam vt non clamet, sed omnem spiritum ad inferio-
res partes exponat, maximè cum dolor occurret. Si
folliculus diu non fuerit ruptus, vnguibus eum rum-
pere, & immixtus paulatim digitis plus adaperire co-
nabitur. Obseruandum est ne infans subito cadat, ne
quassatio capiti & ceruici infantis adducatur. Na-
turaliter verò orificium aperitur aliquando, mergen-
tibus humoribus per ipsum. Tunc apprehendere de-
bet obstetrix, & in diuersum adducere huc atque
illuc. Illo tempore quando se matrix aperit, conari
oportet; & quando se concludit, non conetur, ne fer-
uore aut sanguinis fluxu, ipsius matricis adductio
emergat. A lateribus verò ministra sine quassatione,
manibus aptis deorsum deducant. Cum verò exire
fœtus caperit, manibus pannum habentibus eum sus-
cipiat obstetrix; & id obstetrically quam lenissimè,
vt vnà

ut una cum secundis procidat. Quando autem & quomodo umbilicum oporteat praecidere, ex Moschione sic habeto. Cum modicè infans in terra requieverit, à ventre eius digitis quatuor scalpello aut cultro acutissimo praecidendus est. Nec superstitionibus antiquorum consentiendum est, qui lino aut vitro, vel canna acuta, aut cortice panis secabant. Cum verò praecideris, sanguinem, qui in eo remansit, coagulatū exsiccabis, & lana torta vel licio ligabis, ne subsequenti fluxu sanguinis infans periclitetur. Sed eadem hora qua natus est, ex utraque parte ligandus est, & sic in medio praecidendus, ne & ipsa parturiens fluxum sanguinis patiatur. De regimine parturientium hinc ea adiungere poteris, quae & Erotus de passionibus mulierum cap. 16. De regimine parturientium scripsit. Nunc verò quod ad difficultatem partus attinet, & rationem curandi, variatur quidem iuxta causarum diversitatem, ut nunc nonnullis exemplis praecedentibus constat, & etiam sequentibus manifestius ostendetur, si speciatim eas curare velis: quamquam quaedam sint animadvertenda tanquam omnibus causis communia, quae primò conscribemus; simul etiam & mentionem facientes quorundam medicamentorum, quae indifferenter omnibus puerperis difficulter parientibus ex quavis causa adhiberi poterunt; hinc etiam adducentes tria documenta ab ipso Donato ab Altomari cap. De difficultate partus etiam descripta. Primum est advertendum quod puerperae eo tempore, quo partus instat, non sunt multa alimentorum copia gravandae, neque varia alimenta & crebrò exhibenda sunt, veluti Neapoli abuti consueverunt mulieres, & vetulae, & quidam vulgares

Quando autem
quomodo
oportet um-
bicum
praecidere
ex Mosch.
lib. matricis.

Curatio.

Primum do-
cumentum.

Medici, vt eisdem obsequantur; quod & magis hic apud nostras mulierculas fieri solet. Distrabitur enim calor pro conficiendū multu ac diuersis alimentis, & quia etiam coctioni ac retentioni alimentorū vacat, vtiliter expellere nequit, qua facultate tamen ac functione valida eo tēpore parientes indigent. Pauca itaq. ac moderata alimentorū copia tribuatur, sintq. concoctu faciles, boniq. nutriti cibi; vt oua recentia, ac sorbilia, seu tremula, ius pulcorū, gallinarum, phasianorum, aut starnarū, quod ex contrusis carnibus fit, & vulgus consumatum appellat; vel etiam eorundem animalium contrusa caro, quam idem vulgus tortiliū nominat; aut buccellæ panis in vino Græco aut alio odorato vino macerate simul cum eodē vino tribuantur. Ita & Benedictus Veronensis: Tum interea (inquis lib. 25. cap. 23.) vitanda sunt acria, appropinquante partu, exiguoq. cibo vti necesse est. qui tamen plurimum alat, vinoq. odorato exinde hera interuallo. Partitura quoq. in aëre calido & humido, iuxta Guainerium, collocetur; in cuius domo nulla pira dimittantur, teste Diosc. vulnū aperire prohibet: omnes lapides preciosi ab illa amoueantur. Ad hac, pro secundo documento, permittendū haudquaquam est, vt obstetrices difficile parientium vterum diutius dilanient, sed leniter, & placidē vteri partes cōreddent, dulci interim oleo, aut alio quopiam, eiusdem locos persudentes. Item, pro tertio documento, non illico parturientes in sella collocandæ sunt; sed obstetrices prius os vteri tangere debent, & primū cum in dehiscentiū modū auctum animaduertent, quod ad fœtus transfuū satū pateat, tunc vt surgat mulier iubere debent, eandemq. in sub-sello collocare, adhortariq. vt ad expellendum fœtum stre-

Secundum
documen-
tum.

Tertium
documentū.

strenuè separet, quemadmodū 3. De natura facult.
à Galeno scriptum est. Spiritum quidem detineant;
verū non, velut imperita faciunt, ipsum in gutture
congregare debent; sed ad inferiores partes propulsa-
re, ex decreto Aëtij cap. 14. lib. 16. quo tempore, vbi
partus difficilis sit, corallum aut lapidem aquila, aut
styracem, coriandrum viride, seu polygoni radicem, in
dextro crure alligare conuenit. Guainerius ait: Lupi-
nas carnes paritura si comederit, pariet facilius, &
incantationes noxia versus illam (inquit) non vale-
bunt. Conducunt iaspis, smaragdus corā alligatus; &
cor gallinae adhuc palpitans; & tota ala aquila vel
penna vulturis pedibus paritura supposita; & vnguis
milui sub laborantis camisia portata, & magnes in si-
nistra manu retentus. Insuper, vt etiā Donatus refert,
& accipitris seu falconis stercoris 3j. cum vino albo
aut aqua capill. ven. prebe, vel tantundē cinnamomi
vel casia. Aut hunc in modum pulcrem conficias,
iuxta Donat. vel nostro vtere, de quo dictū est prius:
R. fini accipitris 3j. cinnamomi, casia, añ gr. viij. croci
gr. iij. misceantur, & cum paucō vino odorato albo,
aqua capill. ven. aut flor. citrang. exhibeatur. Interim
quoq. myrrha aut castorij 3ß. aut ʒij. cum gr. qua-
tuor cinnamomi propinabis. Sunt qui trochis. e myr-
rha etiā 3j. exhibēt. insuper & phaseolorum seu cice-
rum rub. as scœnogr. decoct. cum oleo amygd. dul. Quod
si parū cinnamomi, croci, aut casia, seu alterius prædi-
ctorum permisceas, magis conferet. Excitare quoq. hoc
tempore sternutamenta conducit, modò non admodū
imbecilli capitis parturientes sint. Suffitus etiā resi-
nae, aut cumini, aut pinus corticis, conserti, Hipp. aucto-
re, lib. De morbis mulieb. Verū speciatim vnicuiq;
causa

Quæ à pro-
prietate fa-
cilitant par-
tum.

508 DE MULIERVM MORBIS,
*causa qua conferunt nunc dicamus, facto initio, si
mulier ipsa, vel vteri vitium aut morbus in causa fue-
rit, hoc exemplo prius interiecto.*

OBSERVATIO LXXIIII.

*De muliere obesa in hyeme difficulter
pariente.*

MULIER obesa in asperrima hyeme diffi-
cultur pariebat: nec erat mirum, cum ta-
lis, eo quod esset obesa, vuluam quoq. strictam
magis habebat; tum in hyeme etiam naturaliter
orificium matricis magis strictum habent, vt
Erotis dicebat: nam propter frigiditatem tem-
poris & aeris, plus constringitur vterus. Ad
hanc accitus, quo melius pareret, propter fri-
gus condensans, vterum & meatus angustiores
reddens, obstetrici tum astantibus imperaui, vt
parturientem in cubiculo calido ponerent, &
pannos multos calidos simul circa vuluam ap-
plicarent, & eandem, quantum possibile esset,
a frigore externo custodirent, & vt partes ante-
riores & posteriores inungerent cum oleo sam-
psuchino, & etiam liliaceo. Alij, vt Rhases, in-
ungunt oleo iosephino, ab vmbilico infra; etiam
artemisiā contusā emplastri modo ventri
apponunt. Quia autem hæc erat valde crassa ac
obesa, cuius causa minus parere poterat, eandem
in lecto vt ponerent iussimus; nam & pronam,
vultu in terram deiecto, dum in lecto est, eam
figurari volunt. Illud enim & Haly & Auic.
iubent, quemadmodum & Valescus refert. Si
mulier,

mulier, inquit, fuerit pinguis, iaceat supra ventrem, id est, supra genna sub ventre. Ista positura (teste Valesco) lacerti ventris leuius & facilius stringuntur, & sic mulier facilius parit, si crassa pinguis & obesa existat: & ita pariunt quadrupedia. Iussi deinde vt obstetrix oleo liliaceo, butyro, axungia anatis & gallinae, os vteri lini- ret; simul propinans, cum non febricitaret, pul- uerem sequentem: & trochis. de myrrha ꝑ ij. cinnamomi ꝑ j. fiat pul. Sumpsit cum vino Rhenano, decoct. artemisiae: & tandem praeter spem, in cubiculo ab externo frigore tuta, feli- citer peperit; & deinde bene purgata, & à se- cunda vnà cum prole liberata, rectè valuit.

SCHOLIA.

CV enim pro ratione causae remedia sunt ad- monenda, speciatim quod ad mulieres attinet difficulter parientes, si ob aëris constitutionem praece- dentem, vel ab immodico frigore vterum condensante ac coarctante fiat pariendi difficultas, in aëre medio- criter calido locanda erit, & in eo gestationem eam mouere conuenit, modo febris, aut aliud quippiam non impediatur. Nonnulli etiam conquassationes va- lidas, sternutamentisq; ciendis idonea adhibuerunt, Paulo & Aërio testibus: quibus etiam opem adferre oportet laxatione per infusus calidos, & suffusionem, ac per infusiones oleorum, tum actu, tum potentia calidorum: itemq; per illinitiones, ac cataplasmata eiusdem generis. Qua de re infundere oportet lar- giter oleum dulce, & calidum: item decoctum saenug. aut maluarum, vel seminis lini; deinde & pubem etiam

Si ex immo- dico frigore fiat partus difficultas, curatio.

SIO DE MULIERVM MORBIS,

Si ex immodico calore fiat, curatio.

Si efficitate, curatio.

Si timide, quid faciendum.

etiam cum abdomine & lumbis eisdem medicamentis illinire, aut alio relaxante medicamento, ut hydrelao & aliis huiusmodi: eadem quoque laxamenta adhibenda sunt a balneo (Valescus vitur balneo aque calide, cauendo frigus) si non febris aut aliud quippiam prohibuerit, ex eorundem autorum testimonio. Si vero ob calorem immodicum vires exsoluentem pariendo difficultas excitetur, condensantibus ac maxime costringentibus, seu adstringentibus, & firmitatem inducentibus tam roborare oportet: qualia sunt insperiones & infesiones ex myrto, pampinis vitis, malis punicis, aut rosis: nec minus odoramenta fiant ex aqua ros. myrtill. & nymphae cum aceto, addendo, si labet, parum salutarum & corallorum rubeorum. Conuenit quoque vnguentum ex vino & oleo ros. frigidis, ut inquit Aetius: nec minus cibus & porionibus refocillanda erit facilis coctionis, multi nutrimenti, ac modica quantitas, permixtis semper quibusdam adstringentibus, ut cydonia, malis punicis, ac reliquis huiusmodi: insuper buccella panis vino imbuta, ad arcendum animi deliquium, eisdem offerantur, in aereque parum frigidiori degant. Si vero siccitate, vel aliqua re comprimente, partus retardauerit, oleum dulce calidum commodè iniicitur cum decoct. scennug. aut malua, vel seminis lini, aut oue coniecto, nam & plurimum recreat. Exinde ventri, pubi, lumbisque cataplasmata ex lini semine imponuntur, & hydrelao; vaporacionesque & balnea ex supra dictis, modo febris absit; & parturientem in lectica in conclaui, ut supra, ponemus: Timidis ac puellis mentis robur admouendum, quemadmodum eis, quae inexpertes dolorum sunt, ut validissime spiritum compriment, & ad inguina depellant. Inprimis enim metuentem

em adhortamur; sicuti inexpertam doloris increpa-
 tus: sed precipue spiritum continere & illa conflare,
 qua animi defectum pati inceperit: etiam, præter
 a qua diximus, odoramentis recreamus: & ad sensus
 euocatam, exigua cibo, sed præstanti, reficimus. Sicut
 imide sunt corroboranda, ita & ira cōcitatiores com-
 escenda sunt. At si mulier ob virium imbecillitatem
 parere non possit, reparanda est imbecillitas illa ante
 tempus partus; aut si imbecillior facta fuerit propter
 morbum præcedentem, aut aliquam euacuationem, aut
 dissolutionem spirituum, aut propter aliam causam,
 alenda est euchymis & multum nutrientibus, ut vino,
 succo carnis, testiculis galli, & similibus. Si autem ea
 imbecillitas proueniat ob longam defatigationem in ipso
 partu, citra insignem sanguinis euacuationem, bonum
 erit dare potionem cordialem ex confectione alcher-
 mes cum vino, vel cum iusculo; vel parare potionem ex
 aliis pulueribus cordialibus, ut: ꝛ diamb. vel diamoschi
 ꝛ j. pul. diagalanga & diarod. abb. añ. ʒss. vini albi ʒ ʒ.
 aqua betonica et meliss. bugloss añ. ʒij. misce, fiat potus.
 capiat ventriculo vacuo, & per duas horas nihil acci-
 diat. Quomodo modo igitur imbecille sint mulieres par-
 turientes, ex morbo, temperamento, vel ætate prouecta,
 eisdem cibis boni nutrimenti ac potibus reficienda sunt,
 vino odorifero, bonis iusculis, adiectis cinnamomo &
 croco, sumendo tessellam vnam diamarg. calidi. lucundi
 odores, ac styrax calamitu, moschus naribus admovea-
 tur; nec verendum, ut quidam sentiunt, matricem, qua
 bonis odoribus delectatur, sursum reuocari, sicq; partum
 impediri. Nam fetus grauitas vterum deprimit, sur-
 sumq; ascendere prohibet, atq; interim bonis illis odori-
 bus parturiens vires, & spiritus roboratur, valdeq; iu-
 uan-

Si mulier ob
 virium im-
 becillitatem
 parere non
 possit, cura-
 tio.

uantur. Quod si ob lumborum cauitatem, aut propter
nimiam pinguedinem, pariendi difficultas contigerit,
eadem erit curatio quam in præcedente Obs. diximus.
Puerpera misella prona flexis genibus collocetur, seu
in lectulo, vt vterus delabens ceruicem rectam ex-
tendat, atque idem è directo ostioli habeatur; quod
quidem ceratis, oleis, ac pinguedine delinire digito
oportet, & sensim aperire. Idem quoque vteri oscu-
lum, vbi clausum fuerit aut permanserit, pinguibus
medicamentis emolliatur ac relaxetur. Hæc vltima
causa, sicuti & sequentes, ad vteri vitia pertinet; de
quibus & nunc etiam speciatim agamus. Si igitur
contingat difficultas partus ex constrictione orificij
matricis, cuius cura grauior est inter omnes, idèd tale
subiungimus consilium Erotis seu Trotula. Prouideat
sibi mulier in tribus vltimis mensibus in dieta, vtatur
leuibus cibis & digestilibus, & per quos membra
dilatentur, qualia sunt vitella ouorum, carnes &
iura pullorum & minorum alium, perdicum, phasia-
norum, & piscium squamosorum cum bono condi-
mento. Sed hæc subsequencia, instante partu, adhi-
benda: balneum aque dulcis, in qua herba emollien-
tes bullierint: sed balneum ærium & stupham
fugiat. à balneo exiens inungatur oleo seminis lini,
axung. anseris, vel anatis, vel gallinae, ab umbi-
lico inferius. Aëtius lib. 16. cap. 22. paucis verbis
dicit: Si vteri ostium clausum persistat, pinguibus
medicamentis emolliemus & relaxabimus. Et ita quo-
que Aegineta: Si ex adstrictione sit, laxatione prius
opitulandum, infundendo largiter oleum dulce &
calidum, & decoctum scœnogr. malua, & sem. lini,
& aliis leniendi facultate præditis: in seffus ex hydre-
leo

Quomodo
difficultas
partus cure-
tur ex con-
strictione
orificij ma-
tricis.

leo & aliis supradictis. Si vulua paruitas in causa fuerit, loca pingui quopiam etiam inungenda & fouenda erunt, osq; vulua digitis dilatandum, ac foetus violenter extrahendus; idemq; si non successerit, dissectandus: quod praecipue facere oportet, si foetus praemagnus fuerit, vel interierit. sed de iis postea. Si ob alia vitia vteri mulier parere non possit, inquit Aëtius, siue ob inflammationem, vlcus, oedema, duriciem, aut quippiam simile; infestantibus morbis occurremus. Si ob carnem collo vteri innatam, aut tunicam obstruentem, pariendi difficultas eueniat, sicut non perforatis mulieribus accidit; quodcunq; impedimento fuerit, amputabimus. Et si morbus aliquis particulas vicinas obsederit, huic etiam prospiciemus: ut si ossa pubis nimium conferta fuerint, quoniam in partu dilatari non possunt, linimentis pinguibus oleosis ea relaxabimus. ita quoque si vesica calculus affuerit, eum primo propellere oportet: & si eadem lotio plena fuerit, idem educendum: similiter si intestinum rectum excrementis plenum fuerit vel repletum, clysteri, inquit Aëtius, abluemus, vel melius cum balanis, ut prius diximus, & urinam retentam tubulo, iuxta eundem Aëtium, eliciemus. Vtile enim est parturientibus ut quouia modo lotium emittant: imo periculosissimum ut rectum intestinum vacuum sit omnino excrementis; sic enim facilius parit, ut longa experientia vidimus, & exemplo antea ostendimus. Nunc de curatione dicamus si ex parte foetus fiat difficultas: quae etiam ex parte liquet Obs. 70. praecedente De partu difficili ex magnitudine foetus, & Obs. 71. ob innaturalem positionem foetus: tum ex sequentibus exemplis hac curatio multo clarior euadet.

Si vuluae paruitas in causa sit, quid faciendum.

Si ex aliis vteri vitiis.

Si ob partes vicinas laesas vel impeditas.

K k

OBSER-

OBSERVATIO LXXV.

De partu difficili ob geminos.

MARIA Petri Sasboti diuitis illius Zy-
 thepsæ Delphenis filia, quæ in ædibus
 paternis habitabat in Mundi intersignio, ex
 duobus gemellis masculis in partu difficili peri-
 clitabatur. Cùm itaque anno 1566. 25. Octob.
 parere non posset, nec obstetrix, etiam fotu ad-
 hibito ex floribus chamæmeli, artemis. & po-
 lygoni, quid proficeret, cùm prænantem in
 eo balneo pedibus ad femora vsque imposuif-
 set, maxima angustia parturiens correpta fuit;
 ita vt enixus partus qui prius aderant, omnino
 cessarint. Ad quam ego vnâ cum Ericio collega
 meo primùm 28. die Octobris acciti fuimus,
 & vnâ hæc subsequētia præscripsimus: R. pu-
 legij, calamenthæ, hyssopi, añ. m. ss. caput vnum
 radice liliorum albor. myrrhæ ʒ ij. puluerisatis
 adde terebinthinæ & mellis q. l. fiant duo pessi
 sindone serico obuoluti. R. olei lilior. albor. lini,
 amygd. dulc. añ. ʒ j. olei irini, sabini, añ. ʒ ss.
 misce; ac pessi illis oleis tum vulua intus inun-
 gatur: R. cinnamomi electi ʒ iij. ss. nucleor. da-
 ctyl. num. ij. casie lignæ, daronici Romani,
 añ. ʒ j. sabinae m. j. fiat puluis pro iij. dosibus.
 dedimus cum vino maluatico, cùm nulla ad-
 esset febris. 29. Octobris: R. cinnamomi selecti
 ʒ j. daronici Romani, galangæ, calami arom. añ.
 ʒ ss. sabinae p. j. pul. perlarum subtiliss. tritarum
 (quia

(quia debilis) vnicornu, añ. ʒß. rasuram nuclei dactyli vnus; fiat puluis pro tribus dosibus; & cum vino maluatico propinabatur. 30. die Octob. cum partus instaret, obstetrix Heyla nomine, alioqui in obstetricandi arte perita, paratam penes se habebat expressionem foliorum lauri, gallitrici, nepitæ, cum vino Rheno, quam propinare decreuerat. At nos, ne caput tentaret, folia lauri amouenda esse diximus, cum herba capitalis esset, & eius loco (ne gloriosæ obstetrici curatio adscriberetur) pulegium viride accepimus, atque illud expressum cum reliquis supradictis, exceptis foliis lauri, propinauimus, & post assumptum hoc medicamentum, hora secunda, eodem die peperit masculum viuum. Interea obstetrici ac astantibus mulierculis mandaueramus, si ob partus angustiam, qui tot diebus enixu lassauerat, in hypothyriam incideret, aut syncopen, vel in fluxum nimium, aut morbum vterinum, quo aliàs laborare consueuerat, à me tamen antea curata, vt ex syrupis qui tunc ad manum erant cochlear vnum sumeret: & syr. ex ros. sic. ʒij. syr. absinthij ʒj. perlarum exquisitarum subtiliss. tritarum ʒj. misce. Sed quia syncope illam non apprehendebat, ideo propinatum non fuit. Postea cum secundum fœtum parere non posset, neq. à se excutere, fluxu quoque iam apparente, inhibuimus tunc ne ex puluere superscripto cum vino maluatico amplius sumeret. Deinde quia certis signis fœtum mortuum esse coniciebamus, qui etiam inuersus & cum brachio malè

516 DE MYLIERVM MORBIS,
locatus erat, cum vt obstetrix dextrè reponeret
præcepimus. Interim dum rursus conamina,
seu enixus partus intendebatur, refocillatis vi-
ribus optimis cibis, & iusculis, adiecto cinna-
momi puluere, (nam omnibus modis ad par-
tum facilitandum confert) primo die Nouem-
bris, manè hora quarta secundum masculum
peperit, sed mortuum cum brachio & collo li-
uido; obstetrice tamen affirmante, paulo ante-
quam pateret partum vixisse, & in ipso vehe-
menti enixu expirasse. Ceterùm cum deinde
puerpera ipsa post duos partus laboriosos ma-
ximo dolore afficeretur, qui puerumque puer-
peras subsequi solent, exhibuimus cereuisiam,
in qua flores chamæmeli decocti erant. Hoc
enim, licet simplici remedio, tanquam tamen
arcano, etiam Alcmæiz, antequam Delphos
venirem, vti solebam; & etiam nunc semper,
cum maximo successu. Proinde eo decocto
sumpto, doloribus paulatim cessantibus, opti-
mè deinde fuit purgata in puerperio, & bellissi-
mè se habuit. Quanquam hæc ipsa post duas
septimanas in puerperio, incidit in abscessum
maxillæ, & dentium dolorem haud exiguum.
At cum perciperemus exterius in maxilla du-
ritiem quandam esse, accepimus diachyli cum
gummis ℥℥. supra coria rotunda quatuor eius-
dem formæ, paulo ampliora daleo, inducen-
tes: quorum continua impositione, vnius post
alterum, ruptus est abscessus paulo supra men-
tum; & facta mundificatione, & consolidatio-
ne per chirurgum sine manifesta cicatrice, rectè
fuit

fuit curata. Fortè hunc abscessum contraxerat ex frigore externo, cum octo diebus in difficili partu fuisset, antequam ultimus seu secundus partus prodiret. At cum hæc rescriberem mense Decembri anno 1589. bellè habebat; & etiam anno 1595. quo rursus Alcmariam à magistratu Alcmariano reuocatus eram.

SCHOLIA.

QUAE verò non vterum gerentis vitio, sed ipsius ^{Si ex parte} factus, difficultatis pariendi causa sunt, hoc ^{factus fiat,} modo corrigenda erunt. Si gemini facti fuerint, aut ^{curatio.} terni, aut plures, ac collum vteri obsederint, reliqui ad fundum vteri repellantur, & is qui magis paratus videbitur, prius educatur: sensim autem & circa contusionem omnia fiunt, oleo loci perunctis, ut idem Paulus refert. Et sic ex Moschione: Vbi duo, tres, ^{Si duo vel} quatuor, pluresve simul se ad orificium contulerint, ^{plures, quid} in sinum vulvae omnes sunt repellendi, & sic sigillatim recipiendi. Et ita si propter ipsius factus figuram, ^{agendum.} mater naturam, partus difficultas adsit, ad naturam situm reducendus est, quantum eius fieri potest, partim pellendo, partim adducendo, partim flectendo, & partim in rectum agendo, ut inquit Paulus. Et si manum vel pedem pramiserit, ne attrahatur per membrum, nam magis impingitur, aut luxatur, aut etiam abrumpitur; verum digitis humero factus, vel oxa affixus, rursus in convenientem locum introduatur; id quod iam pramissum est. Oportet autem obstetricè primò unguitibus incisis oleo illiniri, & digitis in vnum conductis, schemata mala infansu corrigere.

Si ne-
ut
quam
faceat, quid
faciendum.

Si ambæ
manus foras
veniunt.

Si ambos
pedes vel
vnum reie-
cerit, vel di-
uisi sunt.

In genua, in
nates.

Si caput
grande vel
contortum.

gere. Vbi enim valde infixus est, prius eum à loco in-
oportuno euellere oportet. Si rectè positus sit, & ad
manum perueniat, teneat eum, & sic educat. Sin in-
diuexum aut obliquum iacet, iuxta Moschionem,
immissa manu obstetrix eum componat; & si in ca-
put proximum inuenit, ipsum teneat & abducatur. Si
infans caput interius habuerit, & si duas manus eui-
cit, oportet obstetricem prius immissa manu sua ca-
put ad orificium corrigere, & comprahensis manibus
infantis, conari ne caput eius orificium vuluæ obthu-
ret, vt facillimè omne corpus infantis exire possit, quo
prioribus manus exierant. Quoties videlicet manus
emittat, non abducatur, relicto capite intrus orificium
matricis obturante; sed potius digitis in humerum
infixus, retrorsum agat, & in capacitatem vuluæ posi-
tum ita componat, vt manus eius erectas lateribus
iungat, & apprahens capite foras conari incipiat,
ne vitiosus, aut manu exarticulata prodeat. Si in pe-
des descendat, vt antea dictum est, age. si ambos eie-
cerit, duabus manibus suis obstetrix in inguinibus in-
fixis sursum repellat, & compositum foras eiciat. Si
vnum pedem, corrigatur; & si fieri potest, manibus
eius lateribus iungat, & apprahensis pedibus foras
adducere conetur. Si diuisis pedibus duabus partibus
vulua plantas infigat, immissa manu obstetrix eos
iungat ad orificia matricis, eosq; componat, & sic
educat. Si in genua exeat, retrorsum pellendus est,
& correctis manibus, forè & pedibus, adducendus.
Si in nates, retro infantem impellat, vel repellat, &
correptis manibus vel pedibus educat. Si grande ca-
put habeat vt exire non possit, intrinsecus repellendus
est, & vñctionibus vñcto orificio, immissa manu ob-
stetrix

stetrix eum adducat, tenens caput eius, adiuvante etiam conatu suo parturiente. Si caput contortum habuerit, immissa manu id corrigat, & humeris comprehensum leniter adducat, ne matrix ipsa quassetur. Si duplicatus; quod duobus modis fit, quoties nates in orificio inveniuntur, & in interiori parte fiet duplicatio, secundo modo quando caput & planta in orificio fuerint in superiori parte; potest obstetrix ita corrigere, ut plantis reuocatis sursum, caput hinc teneat, & sic infantem foras adducat. Si in diuexum iaceat, aut supinus, vel in dentes, praecipimus ut in vulua displicitus & apprehenso capite adducatur, enimvero obstetrix leuiter immixtis digitis in latus eum conuertat, & accepto spacio ut vel unam manum immittere possit, eum facillime ad integrum schema componat; & quascunque partes orificio propiores habuerit, easdem teneat, & sic adducat; ita tamen ut maxime caput infantis querat, & ipsum teneat, & sic adducat. Hac autem omnia leniter ab obstetrice & sine quassatione facienda sunt; ita ut frequenter oleum calidum, vel succum scenugraci, lini, & maluae decoctum infundat. Hac enim diligentia & lapsus infantibus preparat, ut sani eundem possint, & quae parit, sine vexatione & sine quassatione seruetur. Plures enim infantes post difficultum partum euasisse cognouimus, & viuere vidimus. Si latitudinaliter exeat, pendente una ex manibus eius, retrudatur manus: si autem non potest reduci manus, fac mulierem iam leuatam ambulare: si id non posset, iaceat supra lectum, & concute crura eius; & deinde adhibe linimenta ex muscaginibus: & si accedant dolores partus, sedeat in

Si duplicatus.

Si in diuexum iaceat, aut supinus.

Exitus fetus latitudinaliter, pendente una ex manibus eius.

sella, & compone foetum secundum figuram naturalem, adhibita sternutatione, & comprimat se donec egrediatur. Plura de his vide in libris Harmonia Gynaeiorum, & praecipue librum 4. Iacobi Ruef, cum

Si una cum
foetus figura
mala, os uteri
compressum
est, quid sit faciendum.

figuris schematum innaturalium partuum. At si una cum foetus figura mala, os uteri compressum, seu coarctatum fuerit, prius ab osculo uteri in sublime eleuetur foetus, & postea rursus ad osculum recta dirigatur, fiantque omnia placide, leniter, ac citra compressionem, oleo assidue locis affuso: hoc etenim ex salute tum foetus, tum parientis fuerit, & uterus ita quoque illasus manet. Vbi vero infans prae magnus fuerit, aut totus, aut ob capitis seu thoracis aut ventris magnitudinem, ea adhibenda sunt tum intus tum extra, qua laxare ac dilatare uteri os possunt. huius exemplum posuimus Obs. 70. precedente. Ita &

Si infans nimis magnus, quid agendum.

Historia
difficilis partus
ex magnitudine
foetus.

anno 1561. mense Decembri ad mulierem obesam quoque accitus, cum duobus diebus in partu difficili fuisset ob magnitudinem foetus, & variis diuersisque remediis obstetricis tum muliercularum usa fuisset, sed alio duriore existente, unde uterus magis comprimebatur, glandem immitte iussi, & statim ubi aluum deposuisset, atque uterus per linimenta & olea emollientia relaxatus esset, & puluerem hunc sequentem parturienti dedissem, mox feliciter peperit. Hoc modo à me componitur & in usu habetur: R. rad. dictamni albi vulgaris ℥vj. ligni aloës, lapidis dactylor. misce, & fiat pul. datur ℥j. cum vino. Est quoque in usu apud nos pul. partur. ex sola radice dictamni albi, si cum aqua raphani dentur ℥ij. non enim solum vermes, sed foetum mortuum expellit: etiam in aqua sabina, ut experti sumus in difficili partu etiam

etiam ad mortuum foetum expellendum & secundam propulsandam. Sumpserat & hac pul. dominarum ʒ β. cum decoct. artemisia, flor. chamamel. sabina ʒ iij. & syr. de artemisia. ita in officina paratus habebatur: ʒ cinnamomi ʒ β. ʒinz. galanga, curcuma, baccarum lauri, añ. ʒ ij. caryophyl. nuc. moschata, añ. ʒ j. β. croci ʒ j. cumini prepar. ʒ j. β. macis ʒ j. sem. iuniperi ʒ ij. sem. Zedoar. ʒ j. sacch. ʒ vj. fiat puluis, & immissa glande, & irritatione eiusdem, epoto puluere partus, clamabat quod lectum confoderet, & aluo soluta, muliebribus prius inunctis, enixa est, ut dixi, foetum premagnum. At si foetus magnus eo quo iam diximus nondum procedat modo, aut etiam infans mortuus fuerit, modò spes sit salutis, omnino necessarium est foetum secare, ex communi sententia tum Aëtij tum Pauli, ut postea dicemus. At si propter foetus imbecillitatem aut paruitatem difficultas pariendi contingat, prater id quod mulieres sunt hortanda, ut strenuè mediis abdominis musculis eundem foetum conentur expellere, vinum maluaticum dandum (si nempe motus pueri ob imbecillitatem vix sentiatur) modò non adsit febris; alioqui iuscula ad refocillandum foetum conueniunt. Si verd ex parte membranarum contingat pariendi difficultas, vbi secunda solidior ac crassior fuerit, quàm ut rumpi possit, discindatur, inquit Aëtius. tamen, secundum alios, obstetrix prius tentabit nam vnguibus leniter discerpere & rumpere possit. Verum si propter tunicarum tenuitatem, in quibus humor continetur, difficilis fiat partus, propterea quod humor in membranis contentus ante debitum tempus effluxerit, ita ut vteri sint resiccati; eis albu-

Si foetus sit imbecillis, quid agendum.

Ex parte membranarum si fiat difficilis partus, curatio.

522 DE MULIERVM MORBIS,
mina ouorum cum malua aut foenugr. decocto ex-
colato, aut cum ptisana cremore tepido infundantur;
decreto eiusdem Aëri; cuius exemplum quoque po-
suimus Obs. 71. precedente huius libri. Memini, so-
rum meam mihi aliquando narrasse, quod Catha-
rina Iacobi, vxor Florentij Teylingij, sororij mei, pro-
pter membranam nimis tenuem statim perruptam
effuso humore, plerumque per sex pluresve dies in
difficili partu permanserit, non sine vita periculo,
obstetrice imperita, nec Medicum vocante. Ita enim
obstetrices quadam sunt nimis sciola & obstinata,
attamen planè indocta, ut nec legere nec scribere no-
rint; quales & nos, proli dolor, aliquando nouimus:
& præter quod ipsæmet non sciunt adhibere remedia
ad partus difficiles ob varias causas, ne Medicum
quidem doctum admittunt, ut eas doceat, ac imperet
quid factu opus sit.

OBSERVATIO LXXVI.

*De quibusdam mulieribus, quæ ob mortuos
infantes ex difficili partu laborarunt.*

ANNO 1552. 17. die Martij, mulier Alca-
riana nobis vicina cum gemellos mor-
tuos in ventre haberet, & quinque diebus aut
pluribus in partu periclitaretur, nec, ut fieri as-
solet, obstetrix cum omnibus suis remediis ten-
tatis ab utero depellere posset; tunc me prius
vocauit cum mulier parturiens animam ageret,
humore multis diebus iam effuso. totus venter
frigebar, eratque interstitium in ventre, ut fa-
cile

cilè ibi gemellos mortuos adesse censeremus; quos & ante tres quatuorve dies mortuos etiam esse obstetrix referebat. Ego verò tardiùs vocatus, iussi tamen ventri vt adhiberet linimenta ex oleis relaxantibus calidè, tum fomenta; similiter vt decoct. ex sem. lini, fœnugr. malux, vnà cum mucilaginis & oleo liliaceo vterum intus humectaret; ac eiusmodi perfusionibus relaxantibus, aperientibus, & humectantibus, & moderatè calfacientibus, etiam cataplasmatibus similibus ventri impositis vteretur præcepi. dedi per os decoctum artemisix, sabinae, cum aqua lilior. deinde accepi sabinam viridem adiecto paucis croco contusam, eamque linteolo obuolutam pelli instar, & oleo liliaceo immersam, iussi vt in vuluam poneret, & ibidem aliquantulum hæreret. A quibus medicamentis vix per quartam partem horæ mulier fœtum mortuum reiecit; & deinde post horas quatuordecim alterum etiam mortuum cum maxima difficultate & labore peperit. Erantque ambo gemelli non solum mortui, sed plumbei atque corrupti, & valde fœtidi, vt vidimus. Sed misera paupercula multis diebus præcedentibus, sed frustra, defatigata, quamuis statim vt accessimus, (sed proh dolor tardiùs) ad vires refocillandas, iusculis tum aliis resumptiuis vteremur, cum vires tamen neque post partum vllò modo reparari possent, paulo post obiit; nimis nasuta existente obstetrice, quæ Medicum non vocauerat oportunè, ita vt multæ parturientes, proh dolor, earum negligentia perdantur.

tur. Etiam altera rustica mulier, anno 1552 ad Mosam pagum per quinque dies etiam partu difficili laborabat, ex foetu non solum mortuo, sed eodem male posito, quæ erat vxor rustici illius Petri cognomento Diutis. Ad hanc quoque vocatus, obstetrici imprimis mandavi, vt ad naturalem situm, quantum possibile esset, foetum deduceret, partim flectendo leniter, partim pellendo sine vehementia, & partim in rectum ducendo. vbi igitur dixit, rectè caput ad ostium vteri lapsum esse, & nunc partum expectare, hanc potionem propinaui: & decoct. fabinae, verbenæ, artemisiæ in vino Rhenensi ℥ij. aquæ liliorum alborum ℥j. pulueris dominarum ℥j. syr. artemisiæ ℥ss. misce, sumpsit vnica vice. Interim nostro iussu ventrem inferiorem inungebat obstetriz oleo amygd. dul. sesam. cheyrino, liliorum, butyr. recenti, & pinguedine gallinæ, simul commixtis, & digitis inunctis oleo amygd. dul. & oleo liliaceo, vt commodius arte obstetricandi vteretur, & infantem mortuum suscipere. Post duas horas, cum pro deplorata parturiens haberetur, ab assumpta portione, magno cum meo honore, à foetu mortuo liberata est, cum animam agere videretur. At hic, proh dolor, ex crassa ipsius obstetricis rusticæ imperitia, cum violenter partum ederet agra, anus & vulua vi foetus magni ac mortui perrupta sunt, ita vt vnum foramen factum sit. Solet id enim aliquando in difficili partu, & valde violento, & in foetu mortuo, eoque magno existente, fieri, cum vehementi

menti & magno enixu partum reiiciunt. Quod
equidem saepe ob imperitiam obstetricum eue-
nit; vti in hac parturiente rustica primipara
contigit, quamvis duæ adessent obstetrices, sed
rustica & parum in arte obstetricandi perita.
Hac etiam de causa, ne illud amplius fieret, &
vt hoc periculum euitetur, consulo semper an-
tequam fœtus reiiciatur, aut enixus contingat,
vt pannum lineum molliusculum, instar pilæ
oblongum & contortum paratum habeant, &
vt in anum ponant, mando: idq. ob hanc cau-
sam vt in quolibet conatu infantem eiiciendi,
firmiter obstetrix eundem pannum in anum
imprimat, ne eiusmodi continuitatis solutio
fiat. Estque hoc consilium Erotidis seu Tro-
tulæ, lib. De pass. mulier. cap. 20. De iis quæ
post partum accidunt. At bona fortuna hæc
rustica nacta medicastram & chirurgi viduam,
quam nos monuimus quid agere deberet (nam
obstetrices negligentes, quanquam post lotio-
nem à sordibus & purè puerperam repurgas-
sent, per aliquot dies illud inconueniens seu
graue symptomata subtricerunt) filo serico par-
tes solutas vniendo, vt moris est, fuit tandem
probè curata. At anno 1566. mense Decem-
bri feliciori successu Elizabetha Henrici, Iaco-
bi cereuisarij vxor, in cuius cupis gallus pro
insigni erat, filiam cum peperisset, & secundam
prolem parere non posset, his infrascriptis per-
me, nutu Dei, aliam femellam priore multo
maiores, nempe secundam peperit: & cinna-
momai puluerisati ʒ iij. cassiæ lignæ, doronici
Roma-

Romani, añ. ʒ. ꝑ. nucleum vnum dactylorum,
 fabina ʒ. ꝑ. perlarum finissimarum ʒ. ꝑ. fiat pul.
 partiatur in duas partes; detur cum vino mal-
 uatico: & olei amygd. dul. liliorum, sesami-
 ni, butyri recentis, ping. gallina, anatis, añ. ʒ. ꝑ.
 misce, inungatur venter inferior: & manus
 Christi cum perlis ʒ. ꝑ. detur cum panata ce-
 reuisiaria, pro debilitate. Sumpto puluere, &
 prius vna dosi, & hora post altera, post horas
 quinque peperit secundum fœtum, nempe fe-
 mellam. Verum vxor Cornelij Iacobi pictoris
 in octauo mense, anno 1571. cœmiterium tran-
 siens prolapsa, post casum domum reuersa fœ-
 tum non sentiebat: at 14. die prius post casum
 subsequuta sunt partus cōamina, & ingens
 menihum fluxus; vnde obstetrix accita fuit, vt
 à partu, qui etiam credebatur mortuus esse, li-
 berari posset: sed adeo debilis erat, vt ex nimio
 illo fluxu lipothymiam incurreret, & quasi syn-
 copem. tunc prius sub noctem ad eam vocatus
 sum 22. die Februarij. Sumpserat autem eodem
 tempore panatam cereuisariam cum nuce mo-
 schata, ex obstetricis tum astantium consilio; &
 valde angebatur, etiam deliquio animi subse-
 quente, ob fluxum, enixu partus cessante. Ob de-
 liquiū animi dedi sequens: & syr. de limonibus
 ʒ. ij. perlar. subtilissimè tritarū ʒ. ꝑ. misce, statim
 euomuit. Post vomitū paululum recreata hanc
 puluerem sequentem vt vna hora post alteram
 exhiberent mandauit: & deinde peperit fœtum
 mortuum; cuius brachium etiam ruptum erat
 ex casu precedente: alioqui erat fœtus optimè
 forma-

formatus, sed octimestris; qui partus viuere non
solent: & rasuræ dactylor. nucleor. 3ß. sem. viol.
3 j. cinnamomi 3 j. perlarum gra. v. fiat pul.
subtilissimus; diuidatur in duas partes. accipit
cum vino maluatico; interim digitis obstetricis
tum ventre inunctis oleis sequentibus. Et pul-
uere exhibito paulo ante 10. horam noctis, &
deinde hora 12. altera dosi sumpta, & circa 12.
horam noctis peperit fœtum mortuum, sed ipsa
salua euasit, quamuis ab omnibus pro deplora-
ta habita. Anno 1576. 12. Augusti paupercula
cùm per octo dies in difficili partu hæssisset, &
fœtum mortuum haberet, neque parere posset,
& obstetrix de vita parturientis desperaret, his
sequentibus etiam à partu mortuo, Dei nutu, li-
berata, peperit fœtum mortuum, & sana euasit;
quæ adhuc uiuit nunc uidua, vti & altera præce-
dens etiam nunc uidua mense Decemb. anno
1589. cùm hæc rescriberetur: & olei sesamini, lilior.
cheyrini, añ. 3ß. venter inferior sub vmbilico ad
inguina vsq. iis inungatur: & rad. dictamni albi
3 ij.ß sem. viol. 3 j. sabin. 3ß. cinnamomi elect.
3 ij. rasuræ dactylor. gr. v. pulueriscentur subtilis-
simè, & diuidatur in duas partes, vna dosi sum-
pta, & deinde altera, post duas horas fœtum
mortuum corruptū reiecit. Alia quoq. mulier ex
infima plebe, Delphis in vico facis cereuisiariæ
dictæ, anno 1591. 22. die Aprilis cùm in difficili
partu esset, fœtu etiā per 4. dies mortuo, duabus
præsentibus obstetricibus, manu extra vterum
propendente, nullo nixu adiuta, viribus destitu-
tis, pro deplorata cùm haberetur, his sequētibus
reme-

528 DE MULIERVM MORBIS,
 remediis per me descriptis fœtum mortuum
 reiecit: & sabina viridis ꝓ ij. artemisia ꝓ ꝓ. ebul-
 liant semel in aqua artemisia, & lilior. vnica
 vice; & huius expressionis accipe ꝓ ij. ꝓ. pul-
 sem. viol. rad. dictamni albi, cinnamomi, añ.
 ꝓ ꝓ. misce. & butyri recentis, olei liliorum, añ.
 ꝓ j. ꝓ. pingued. gallina, anseris, caponis, añ. ꝓ
 ꝓ. misce. per totum ventrem ab vmbilico vsque
 ad pubem & inguina inungatur. Ad vires de-
 biles capiebat sacch. perlatum cum cereuisia.
 Et, Deo adiuuante, præter omnium spem reie-
 cit fœtum mortuum: deinde bene purgata re-
 cte habuit, & conualuit.

SCHOLIA.

FŒTVS autem viuus suo motu nisi q̃ partum &
 adiuuat & accelerat. At mortuus prorsus cessat
 à motu: adest ventris frigiditas, vt antea diximus,
 & dolor iuxta vmbilicum grauis, spiritus exhalat
 fœtidus, faciei q̃ parturientis color prauus est. Et
 quia non se mouet, multo difficilius prodit quàm vi-
 uus: ideo & fortiora adhibenda sæpe prasidia. Inter
 simplicia betonica ꝓ j. bibitur in vini cyathis tribus:
 & partus mortuos extrahunt radices panacis appo-
 sitæ. & dictamno vis est partus emortuos vel trans-
 uersos eiicere, nec potu tantum, sed & illitu & suffi-
 tu valet. Ex Harmonia Gynæciorum part. priore,
 cap. 16. De pessariis fœtum mortuum expellentibus:
 Latiridis ꝓ ꝓ. cum succo porri conteres, & facies
 pessarium duorum digitorum & subiciēs: citò edu-
 cit. Citri folia coques in aqua, & bene inde fomen-
 ta vuluam intus, & partum educet, etiam si mor-
 tuus

Quæ par-
 tum mor-
 tuum edu-
 cit.

zusus sit. vide Bonaciolum muliebrium lib. 1. Suffitu
 ungula asinae, ut abortus euocetur: nec aliter adhi-
 betur, quoniam viventem foetum seu partumocyssi-
 me interneat, cum mortuum educat. Alij addunt
 hunc pessum ad foetum mortuum educendum. Ari-
 stolochia rotunda, myrrha, ellebori, añ ʒss. excipian-
 tur succo pulegij, linteis deinde raro inuoluantur,
 fingaturq; pessus, qui in uterum demittatur. Suffitus
 praeterea ex fimo equi, aut asini, aut ex ungula eo-
 rundem. Alij utuntur trochiscis ex gummiis, inde su-
 migia parantes, vel ex truncis caulium, myrrha, &
 felle tauri, pessos conficientes. vel ex myrrha, elleboro
 nigro, opopanace, felle tauri, p. e. Et si istis non pella-
 tur, ad sectionem veniunt: de qua postea. Nunc hi-
 storiam adducamus, quomodo mulier quaedam foetum
 corruptum paulatim excreverit, quae & hoc tempo-
 re adhuc vivit, nempe anno 1593.

OBSERVATIO LXXVII.

De muliere foetum corruptum paula-
tim exonerante.

MULIER praegrans, quae extra fossam
 aqueam habitabat, cum ad 15. septima-
 nas grauida fuisset, ab eo tempore menses non
 fluxerunt. Sed cum ex onere subleuato dolo-
 rem in ventre sentiret, aperti sunt menses anno
 1564. circa Natiuitatem Domini. Cum autem
 yems asperrima esset, mensesque fluere, ge-
 ni quoque intensum, ita ut tutum non esset am-
 ulare per plateas glacie concretas, non sine me-

tu cadendi; hæc tamen eo tempore in forum
prodiit: sed, curru occurrente, prolapsa in ter-
ram, & rota currus circumacta sese eleuare su-
bito non potuit, atq. femur fractum fuit: quin
ipsa referebat (ac alij quoque qui idem vide-
rant) rotam ipsam currus molitoris (qui graue
pondus, & sarcinas frumenti vel farinæ multas
sustinet) pectus ventremque ipsum transisse.
Ceterum hæc ipsa per chirurgum à fractura fe-
moris curata fuit: sed menstruæ purgationes ab
eo tempore paulatim stillabant: non tamen co-
piosè, ventre tumido permanente, etiam mam-
millis magis accrescentibus & in maiorem mo-
lem eleuatis ac extuberantibus. Postea quoque
à fractura femoris probè curata denuo incede-
bat. Verum cum curru in Hagam Comitum cir-
ca 26. Februarij diem anno 1565. veheretur, do-
mum rediens ex concussione currus maximè in
ventre dolere cepit, & 27. Feb. die menses aper-
ti admodum copiosè fluxerunt. deinde cum
mamillæ duræ essent, & quasi sanguis ab iis
distillaret, nouitate rei obstetrix quæ aderat
commota me in consilium adhibuit. postea
etiā lac è mamillis fluebat. Ego verò iudica-
bam fœtus corruptelam adesse, vel quòd in in-
fantiā verteretur; vt postea latius in Scholio.
Ceterum cum omnia mihi referrentur quæ au-
tea mulier passa esset, femur fuisse ruptum,
deinde curatum, & currum per ventrem tran-
sisse cum grauida foret, ego fœtum corruptum
adesse iudicabam, obstetrix verò molam car-
neam esse existimabat, ventre ipsius gravidæ
duro

duro permanente. Sentiebat quidem modò
in hoc, modò in aliud latus, cùm sese volueret
aut moueret. Eo autem tempore quo vocatus
eram, lecto incumbabar, & facies ei alba & ex-
sanguis erat, mammillæ durissimæ, & valde
dolebant, vt obstetrix abscellum quasi in iisdem
expectaret. 28. Februarij ad eam accitus, vt ven-
trem durum obstetrix inungeret sequenti lini-
mento iussi: & pingued. gallinæ, anatis, porci-
næ, mucilag. scœnogr. alihææ extract. cum aqua
maluæ & lilior. olei liliorum, butyri recentis,
añ. ʒ β olei sabinæ ʒ iij. misce. mammæ inun-
gebat oleo amygd. dulcium; & potum sequen-
tem sumsit: & syr. artemisiæ ʒ ij. aquæ artemi-
siæ ʒ iij. aquæ lilior. albor. ʒ ij. pulueris partu-
rientium ʒ iij. pul. dominarum ʒ j. pul. sabinæ
ʒ β. diuidatur in duas partes. Vna ebibita
manè, & cùm post meridiem redirem, mensi-
bus fluentibus, incepit particulas carneas ipsius
fœtus corrupti excernere paulatim, tum ossa
quasi cartilaginea & mucosa, vt non compacta
& vix ossa apparerent, quæ obstetrix reseruau-
rat, & nobis ostendit. Mammillæ ex inunctio-
ne iam dicta molliores euadebant, postquam
fœtum ita corruptum paulatim excerneret. Ho-
ra quarta pomeridiana (quanquam agrè ad-
mittebat) reliquum potionis cum altera parte
pulueris propinaui. Nocte valde angebatur (non
tamen febricitabat; quod mirum est in fœtus
corruptela) & euomuit sanguinem per supe-
riora, vt idem etiam per os & nares exiret. At
à vomitu multo melius habuit, & alleuiata est

ab illo tempore, & sanguis ex mammillis amplius non exibat, omnisque durities mamillarum cessauit, quamuis effluerit per aliquot dies lac corruptum ex mammillis: deinde paulatim, præter multa putida sanguinolenta & saniosa, particulæ fœtus seu embryonis, ex utero emanabant, vt deinde viribus refocillatis tandem curata fuerit.

SCHOLIA.

Historia
Alexandri
Veronensis
Medici de
fortu mor-
tuo corru-
pto, & pau-
latim reie-
cto.

ALEXANDER, Benedictus Veronensis, Medicus doctus, refert lib. 25. cap. 33. historiam que-
que mirabilem de Veneta matrona, cui, cum par-
tam legitimam exclusisset, aliter inter uterum man-
sisse mortuus, qui in magnis puerperæ difficultatibus
tabesactus, fluore quodam profluit ex naturalibus oris:
denum ortis in ventre tribus fistulis, ex vna, qua
omnium maxima erat, integra infantis caluaria ex-
tracta est, cunctis mirantibus; deinde singulis diebus,
reliqua ossa demta sunt; vnde mirabili opere natura
sanitati restituta est. At in nostra muliere, licet cor-
ruptela fœtus adesset, tamen cum viderent lac in
mamillis existere, non solum gravidam eam esse ar-
bitrabantur, sed fœtum adhuc viuere, quod motum
antea sensisset priusquam ex eleuatione pōderis men-
ses aperti fuere; quanquam postea & currus ven-
trem eiusdem transisset, etiam femore rupto, dein-
de sanato. Solent enim quedam in tertio, alia in
quarto mense fœtus motum sentire; imò nonnulla
velanti (quod tamen puto admodum rarum esse) in
septem septimanis, vel duobus mensibus, fœtum posse
sentiri. Attamen, teste Hippocrate lib. De pueri na-
tura

tura (ut antea quoque diximus) plurimae mulieres paulo ante trigesimum diem perdidērunt informem: sed quae post 30. diem perdidērunt, conformatus iam comparuit. At de motu fœtus prius dictum est, ut non opus sit ea repetere. Quod lac habebat prius grauida, eoq; effluente cum fœtus corruptus esset, minus mirum; cum & in mola saepe sint visa mulieres lac habere; quod & à multis obstetricibus & mulierculis obseruatum intelligo. quamuis pleriq; authores dicunt mammillas quidem intumescere & indurescere, ut sit in pregnantibus, tamen de lacte mentionem non faciunt. Noui Medicum qui eius erat sententia, iuxta Auicennam, & molam posse fieri non solum ex semine viri corrupto, sed & mulieris, & quibus menstrua deficiunt; etiam lac generari posse in virginibus; quas & mola laborare fieri posse contendebat. De lacte verò in virginibus, Hugo Medicus, cum inter nos hac quaestio oborta esset, semel se lac in virgine vidisse affirmabat. Et Ericius collega meus se ter hoc ipsum vidisse referebat; iuxta illum aphor. Si mulier quae neque grauida est, neque peperit, lac habet, huic menstrua defecerunt. Sed ibi loquitur Hippocrates de mulieribus, & non virginibus. Mola tamen, ut dictum est prius, iuxta Gal. 14. De usu partium, non fit sine viris. Quod mulieribus verò sanguis per mammas effluere possit, id quidem certum est ex Hippocrate. Quibuscunque mulieribus sanguis ad

aph. 39. lib. 9.

aph. 40. lib. 3.

iam peractorum pluries me vidisse fateor, & talis desipientia optimam moliri curam, testimonium perhibeo, quoniam verum est, & tanto id verius censeo, quanto quod ab Hippoc. antiqua medicina magistro sapius relatum est. Amatus quoque centur. 2. curat. 21. affirmat vidisse se sanguinem per mammarum papillas effluere in duabus nobilibus; altera Lusitana, altera Itala, quarum nulla in insaniam aut furorem deuenit; sed potius sanguine ex saphena misso, ilico restituta sunt. Hac etiam Antonius Musa Brassauola vidit in muliere gemellos nutriende, qui ita exugerent, ut sanguinem in lac conuertere non sinerent; sicuti in coitu nimio, cum sanguis in semen conuertere non potest. Ita hic, sed in corruptela fœtus, primò sanguis ex papillis emanabat, postea & lac: quale etiam antea dictum est, signum esse, si vltro effluat in gravidis, quod fœtus sit imbecillus. hic verò non tantum imbecillus, sed mortuus erat & corruptus. Mulier hac, de qua nunc agimus, agebat annum 20. et curata postea alios infantes sanos peperit. Quo exemplo admonentur grauida ne pondus eleuent graue, & ut se custodiant à casu.

OBSERVATIO LXXVIII.

De muliere ex partu mortuo simul occumbente, & de altera vna permanente.

RVSTICI Vxor, ex infima plebe, prope flumen Sciam dictum habitans, cum quatuor diebus ex partu mortuo difficile pareret, & brachium propenderet, quod obstetrix libenter

benter abscidisset; exhibito nostro puluere parturientis, peperit quidem fœtum mortuū iam corruptum; at viribus antea ex longo partu exhaustis, etiam ipsa exspirauit. Verū cū rusticus postea alteram duxisset vxorem, ipsa quoq. nono mense duos gemellos mortuos, sumpto puluere parturientium ad 3 j. cum aquæ lilior. 3 ij. & vini Rhenensis optimi 3 j. partibusque vteri relaxatis cum vnguentis emollientibus & relaxantibus, reiecit, in vita permanens.

SCHOLIA.

SI istis validioribus secunda vxor non peperisset, vel fœtus mortuos excussisset, consulissem embryotomiam vel incisionem, quā Albucasis & alij docent, & Aërius lib. 16. cap. 23. De fœtus extractione siue sectione ex Philumeno. Interea admonet Medicum, vt in eiusmodi sectionibus peragendis prius spectet nam febricitet mulier, nec ne, num praesidiū capax sit, an deplorata. Sic & Paulus lib. 6. cap. 74. Aliis remediis non iuuantibus, si quidem salus adhuc speratur, tunc manū admoliemur: sin contrā, attingi non debet. Quæ igitur perniciem sui portendunt, inexpugnabili dormiendi necessitate premuntur. Lethali enim affectu periclitantes, teste etiam Aëtio, lethargico sopore occupantur, febricitant, propeq. muta euadunt, & dum maximis clamoribus vocantur, vix incertum quippiam susurrantes, rursus in soporem deferuntur: quædam & vibratim conuuluntur, aut nervis conturbantur, aut tremunt, aut alimentum non sentiunt; ac pulsus creberrimus debilissimusq. percipitur; vel valide inturgescens, iuxta

Ll 4

Paulum,

Paulum, deprehenditur, sed languidus. quæ incolu-
mes futura sunt, nihil eiusmodi patiuntur. Sic anno
1590. mulier cū in partu esset, & fœtus mortuus,
brachio extra pendente corrupto, cū adhuc valida
esset, consului ut obstetrix brachium amputaret,
quo sic melius pareret. quod cū facere nec aude-
ret, nec vellet, post duos trēsve dies adhuc permanens
in difficili partu, miserè mulier obiit. Quomodo fiat
sectio, docet Aëtius loco citato. Puerpera igitur, in-
quit, in lecto supina recumbat declinū capite, erectis
diductisq; cruribus, detineaturq; utrimque à peritis
robustisq; mulieribus. Si verò non adsuerint, mulie-
ris thoracem vinculis quibusdam lectulo adfirma-
bunt, ne corpus attrahendo, attractionis vim dissol-
uat. Ac primò dua vel tres panis buccellæ vino ma-
defactæ ad arcendum animi deliquium offerantur, iu-
giterq; in ipso opere vino facies respergatur. Chirur-
gus autem prius difficultatis causam speculo inspi-
ciens, sit ne thymus aut callosa eminentia vel quip-
piam eorum quæ prædiximus, videbit. quicquid fue-
rit, volsella arreptum scalpro polytomo amputabit;
sin tunica os uteri obstruxerit, eam quoque secabit.
Si verò tunica abrumpenda soliditas obstabit, hanc,
si fieri possit, ensiculo hastato, (scolopomacherium
vocant) vel alio simili incidemus; quam deinde inci-
sam dilatabimus, locumq; idoneum prodituro fœtui
preparabimus. At si caput infantis locum obstruxe-
rit, in pedes vertendus est, & ita educendus. Quod
si adeò inhaeserit, ut nullo pacto ad profundum im-
pelli queat, vncus instrumēti attractorij in oculo, ore,
aut mento figendus est, & ita infans extrahendus.
Instrumentum autem attractorium dextra manu
deteren-

detentum immitti oportet; vncum verò eius sinistra digitis occultatim sensim deduci, quousque ad vteri cavitatem pervenerit; postea cuiuspiam prædictorum locorum insigi; deinde alterum instrumentum ex altera parte oppositum, simili prorsus modo imponi, & insigi, ut æqualis & in neutram partem attractio, imò & tutior fiat: forte enim vnum tantum instrumentum in attrahendo elabi posset, & fœtum dimittere: æqualiter verò, nec rectè tantum sed & obliquè attrahemus; digitumq; aliquo pingui illitum intra vteri os & membrum obstructum immittimus, orbiculatimq; circumducemus. Dimidio autem fœtu prodeunte, primum instrumentum peculiariter superioribus partibus, inde secundum alternatim figendum est. Quod si caput vel natura, vel hydrocephali morbo plus æquo intumuerit, ensiculo, quem polytomum vocant, vel communi scalpro incidemus, deinde contractum extrahemus. Quod si ne ita quidem prodierit, totum sinciput conteremus, & ossa digitis eduemus. Si verò aliquod os eminuerit, ossario aut radicario forcipe auferemus, ac tum demum instrumentum attractorium insigemus, & infantem eripiemus. Prodeunte autem capite, si thorax vteri ostio impingatur, hastatum ensiculum, aut scalprum polytomum duobus digitis occultentes, intercostalem membranam circa clauem pectoris vsque ad profundum secabimus, ut, excretis humoribus, moles thoracis concidat. Sed si egresso thorace, venter mortui fœtus intumuerit, & hydropis formam imbuerit, eadem regula vtentes, ventrem incidemus, & intestina eximemus. Sin manus altera ad sinum pudoris exierit, prope humerum articuli excidetur. Oportet

hic igitur linteo manui prodeunti implicato violenter
 attrahere, vt humeri articulus exeratur, tunc q³ pu-
 dendiplicas digitis hinc inde deducere, & postea arti-
 culum scalpro secare; deinde sinistram manū immit-
 tere, & capitulum dirigere, atque ita foetum educere.
 Vtrinque verò manu prodeunte, vtramq. secabimus;
 deinceps caput conteremus; ac tum demum infantem
 extrahemus. Quòd si venter locum obstruxerit, linteo
 annuribus inuoluto violenter attrahemus, vt loca pubis
 & sumen efferantur, quod tamquam mollius incide-
 mus. Sin alterū cras in sinum padoris deciderit, linteo
 implicato valde attrahentes & pudendiplicas didu-
 gentes ad inguen crus abscindemus. Si duplicatus foetus
 occurrat, neque dirigi possit, se capitulum magis para-
 tum fuerit, eius ossa conteremus, cuti nequaquam dis-
 secta; deinde cuiuspiam eiusdē capituli partii attractoriū
 instrumentū insigentes attrahemus, tum crura diri-
 gemus, & ita foetū educemus. Sed si crura magis ex-
 posita sint, coxa articulum abscindemus, & ita coxas
 transcendemus, vt caput relinquatur facili cōtritioni
 paratū. Si verò obstructio duplamenti pertinacior fue-
 rit, pedibus magis procidentibus, caput in articulatione
 vertebrae amputare oportet, deinde thoracem transcen-
 dendo, pedes attrahere; & si reliquis membris capitu-
 lum relabens detineatur, sinistram manū oleo illitam
 in intimos recessus immitteremus, caput q³ perquiren-
 tes sensim ad os vteri deducemus, cui deinde manu de-
 tento vnum vel duo attractoria instrumenta insige-
 mus: erunt q³ loca figendo instrumento maxime ido-
 nea in capite, oculi, meatus aurium, os, pars menti in-
 ferior, in thorace, axilla, clauēs, hypochondria, pectus
 vertebrarū articuli, iugulum; in cruribus, ossa pubis
 femina.

femina infantis pudendū. Ostio tamen vteri inflam-
mato nulla vis adhibenda est, sed perfusionibus pingui-
bus affatim vtendum, eiusdemq; natura in se sionibus,
irrigationibus, cataplasmatibus; vt inflammatione qua-
dantenus remissa, & valua ostio dilatato, fœtus, sicuti
diximus, deferatur. Vbi verò integram sectionem fœ-
tus perfecimus, omnia eius membra sunt compo-
nenda, diligenterq; spectandum an quodpiam desit, vt
nullum prorsus interius omitatur: deinde localū pro-
tinus educemus. Eadem ferè habet Paulus loco citato.

OBSERVATIO LXXIX.

De secunda relicta.

Vxor Andreæ Cloethij, cognomento Ant-
werpiani, puerpera annos nata 40. Alcma-
riæ eo tempore habitans, anno 1554. mense
Martio, secundam relictam cū reddere non
posset, binæ obstetrices ad eandē accitæ fuere.
Verūm iis nihil proficiētib; me vnā consulta-
runt. Cū satis adhuc robusta esset, vt sternuta-
mentū ex elleboro albo fieret mandauī: deinde
vt obstetrix digitos inūctos oleo liliaceo immit-
teret; lentè quidē, ne vterus procideret aut sub-
sequeretur, primū in obliquū deducendo, huc
illuc circumagendo, deinde paulo validius attra-
hendo. Hoc enim pacto, vt Pāulus docet lib. 6.
cap. 75. à connexu solui solet: sicuti etiā, Deo ad-
iuuante, factū est. verūm cū 4. diebus puerpera
secessum non habuisset, antequam hæc fierent
balano imposito, vbi aluum exonerasset, obste-
trix melius suo officio fungebatur. Postea ta-
men hæc ipsa incidit in quandam febriculam,
sed leuem: sumebat rob cerasorum & ribes
ad

540 DE MULIERVM MORBIS,
ad alterationem & sitim. At quinque postea
diebus interpositis ventre dolebat; qui dolor
cessauit inunctione olei chamæmelini & ane-
thini. Febris iam aberat: ideo adhibito deco-
cto cicerum cum hordeo mūdato in vino Rhe-
nensi, bene purgata fuit. quanquam diebus
aliquot intermissis crura inflata fuere; sed vn-
ctione vng. popul. & alabast. detumuerunt. Sed
oborta quoque leui inflammatione gutturis,
aluo cum foliorum senæ infus. soluta, ex garg.
aquæ plantag. viol. exiguo adiecto sem. coron.
facta ebullit. & colaturæ immiscendo diamori
& mell. ros. paululum, ea ipsa cessauit. Con-
tra vigilias, quibus & tunc afficiebatur, præ-
scripsi oleum pap. & mandrag. añ. 3 ij. opij
thebaici gran. ij. croci gran. vnum: & bene
dormiuit. Sed post duas septimanas dolore
ventriculi accedente, ex ʒβ. pilul. ex aloë, tri-
bus assumptis pilulis, cum facilis solutionis
esset, hic dolor quoque sopitus est, & bene de-
inde habuit.

SCHOLIA.

Ex secundis interiorem Empedocles Animam vo-
cauit, exteriorem Chorion; sed ambas alij hyste-
ras nominant. Dum enim fœtus adhuc utero geri-
tur, ipsum natura conformans, machinata quoque
est loca, per quæ alimentum ac spiritum posset à ma-
tre suscipere, & reliqua quoque eiusdem fœtus ex-
crementis idonea comparauit. Etenim toti ipsi mem-
brana tenuis (ut anatomia docet, & à Donato quoq.
annotatur) vndique est circumiecta, quam *ἀμνιον*,
id est,

id est, amiculum appellant, fœtus velut sudorem ex-
 cipiens: huic extrinsecus tenuior alia incumbit, quam
 æmox loeidn, id est, intestinale nuncupant, in ipsius
 vesica perforata, quæ & hæc in se ipsa colligit usque
 ad partum ipsum, velut fœtus lotium. His autem
 extrinsecus in orbem altera membrana circumiecta
 est, totum vterum intrinsecus subiungens, qua me-
 dia fœtus vtero connectitur. Nam in singulis orifi-
 ciis vasorum quæ intrinsecus in vterum pertinent,
 per quæ etiam sanguis menstruus in ipsum, quo tem-
 pore vtero geritur, fertur, aliud vas gignitur; arte-
 ria quidem in arteria, vena verò in vena orificio, ve-
 sint ea quæ generantur numero equalia in orificio,
 quæ intro in vterum desinunt: colligatq; ea membra-
 na hæc, tenuis quidem sed fortis, ita ut simul in mu-
 nimētum, & ligamentum eorum sit, cum inter sese,
 tum cum vtero. Et quoniam exiguum est vasorum
 quodq; cum primum ab vtero exoritur, cuiusmodi
 sunt arboris radices extremae in terram defixæ, quæ
 tamen paululum progressæ per coniugationem coa-
 lescent, ita ut ex duobus vnum procreatur, rursusq;
 eorum singula cum singulis eiusdem generis coale-
 scunt, fitq; id perpetuo quoad parua omnia in duo
 magna coeunt, quæ velut stipites quidam fœtus, per
 locum vmbilici inseruntur. Quatuor itaque omnino
 hæc vasa sunt: duæ scilicet arteriæ, & totidem venæ,
 nullis diuersi generis inter se commixtis, sed venis qui-
 dem semper cum venis, arteriis cum arteriis in idem
 coeuntibus: per quæ vasa, velut per truncos quos-
 dam fœtus ex vtero sanguinem & spiritum trahit.
 Verum inter hæc omnia, & vasa exigua quæ dicta
 sunt, media est iam dicta membrana, quæ veluti

tran-

ῥοπίον, seu
secunda,
quid sit, vn-
de nomen
sumpserit.

ῥοπίον nuncupatur, quod nihil aliud est, quàm vaso-
rum multitudo membrana tenui connexorum, quæ
haud facîle numerari queat, Gal. auctore 15. De vsu
part. Interim *ὤσγειον* seu *δευτερον* appellatur, Com-
ment. aph. 49. lib. 5. à Gal. & cap. 75. lib. 6. à Paulo.
Latini Secundam & Secundas nominare solent: sic
quidem appellantes, quòd velut secundũ domicilium,
ac receptaculum sit ab utero, & velut fœtus indu-
mentum, ut inquit Aërius cap. 24. lib. 16. Hæc secun-
da quoniam ex umbilico pueri hæret, & umbilicus po-
stremus ex utero exit. Namq; si primus exiret, non
accederet per ipsum puero nutrimentum, quoniam ex
ipso dependet, Hipp. auctore lib. 1. De morb. mulieb.
Pars affecta. Propterea fœtu excusso foras prodire debet in natu-
rali partu. sed quoniam contingit interdum, ut fœtus
in lucem edito, ipsa præter naturam detineatur; inde
quòd eius detentione uterus quodammodo afficiatur,
& quòd eadem detenta morbus sit in numero atque
in excessu, nemini in dubiũ venit. Detinetur autem,
aut propterea quòd fundo uteri connexa est, aut licet
seiuñcta fuerit, tamen circa aliquam uteri partem in-
stet pila conuoluta est; vel propterea quòd os uteri
clausum sit, ita ut foras prodire non valeat. Hoc est
quòd Aërius refert ex Philumeno: In loculorum de-
tentione, qui etiam secundi appellantur, interdum
uteri os clausum, interdum apertum reperitur, ac
nonnunquam inflammatum, nonnunquam infla-
matione carens; atque locus ipse interdum uteri
fundo adhuc coniunctus, interdum seiunctus est. Ità
edito tandem partu, secundas lethaliter interdum hæ-
rere vidimus, quas non minus quàm abortiuam re-
formi-

Affectus
quis sit.

Causæ.

Prognostica

formidamus : corruptionem enim accelerant . pro-
pterea protinus eximendas procuramus : æstate præ-
sertim , vnde facile mulieres exanimari videntur ,
vbi putridi vapores cordis vitalia , stomachum , cere-
brumq; subeunt . Vidimus , & furore percitas non-
nullas insanire , ac furere . Quomocunq; tandem
ipsa derineatur , neque statim ac violenter extrahem-
da est , neque eiuseductio parui facienda , seu negli-
genda erit . Ob eam rationem vasa obstetricis est
umbilicum protinus femori puerpera adalligare , ne
temerè retrocedant secunda : tum sternutamenta
concitantur vtiliter : illa quoque spiritu intenta se-
cundas deprimunt : siq; umbilicus apparet , subitò
Corrip-
endi-
us est , atq; deligandus ; cui fini filum prom-
ptum habere necessum est . Iuvant crebra vel inanes
vomitiones : os & nares obthurentur , Hippoc. præ-
cepto aph. 49 lib. 5 . præsertim si mulieres imbecille
nō fuerint . Quod si nec sic exciderit ; si ergo os (inquit
Aëtius) vulvæ apertum est , & loculum seiunctum in-
teneris , qui alicui vulvæ parti pile modo convolutus
inhæserit , facillima curatio est : manum enim fini-
stram calidam , & pingui illitam , seu oleo , in abditum
necessum immittere oportet , totumq; loculum extra-
here . At si vteri fundo cōnexus sit , simili quidem mo-
do manū calidam in pingui illitā immitteremus ; sed ap-
prehensum loculū non statim rectā attrahemus , vul-
væ procidentiam verentes : sed placidè , nulla violentia
inhibita . primò in obliquū sensim ducemus , huc & il-
luc circūvertentes ; postea aliquanto validius attrahe-
mus . Hoc enim pacto obediet & à cōnexionē soluetur .
si verò os vteri clausum fuerit , perfusionibus viemur ,
& sinistra manus digitis leniter aperire ac paulatim
dilata-

544 DE MULIERVM MORBIS,
dilatate conabimur. quod nisi successerit, mulieris
iacentis summi ouium lysin illinere oportet, rursusq;
loca persundere, & impinguamenta fomenta q;
hibere: & si patiens robusta sit, eo tempore etiam
sternutatoria è castorio & pipere confecta naribus
admonebimus, & poriones aliquas earum quæ men-
ses cient propinabimus. Quæ quidem omnia primo
& altero die peragēda sunt. Præterea suffitu utemur,
decoctis in olla aromatibus, qualia sunt, casia, nar-
dus, iunci odorati flos, artemisia, iris, sabina, dicta-
mnus, pulegium, & huiusmodi, olla sella supposita,
cui mulier insideat, vestimentis vndique circumse-
pta. Postea pertentabimus: & si os vteri apertum
inuenerimus, manum immitemus, & sicut dixi-
mus, fœtum enitemur educere. qui si parum obediat,
dilacerandus non est: haud multis enim postea die-
bus marcescet & in saniem solutus excidet. Hæte-
nus Aëtius. Atque hac ipsa ut rite fiant perita obste-
trici mandabimus.

OBSERVATIO LXXX.

*De secunda relicta in quibusdam puerpe-
ris: & quibus medicamentis ab
ea liberata sint.*

MULIERI cuidam Delphensi, honestæ ma-
tronæ, cum secunda relicta esset post
partum, mulierculæ astantes pro communi re-
medio quo vti solent, exhibuerunt horminum
satiuum cum sale, sed nihil profecere. Nos ad-
eam acciti dedimus ℞ j. trochis. de myrrha cum
℥ iij.

℥ iij. artemisiæ in vino Rhenano coctæ. Et cum
obstetrix diceret, secundam solutam esse, &
quodd tenderet ad exitum, facta quoque inun-
ctio est per eam ex olei amygd. dulc. lilior.
cheyrini, ping. anatis, gallinæ, porcinae, butyri
recentis, añ. ℥ β. tam intus quam extrâ. Altero
deinde Medico mox superueniente, ex elleb.
albo, pipere nigro, sternutamentum præscri-
ptum est: sed ab eo non sternutabat, lassata
prius. Et ideo ut vires resumeret, accepit ius
pulli cum ouo molli, pauco insperso cinna-
momo & pul. nucis myristicæ, totumque ven-
trem & inguina inungendo ut dictum est. A
potione ex trochis. de myrrha sumpta, post qua-
tuor horas probè à secunda liberata fuit. Altera
quoque puerpera anno 1559. mense Octobri
cum ℥ j. trochis. de myrrha, vini Rhenensis ℥
ij. & aquæ artemisiæ, sumpsisset, etiam secun-
dam reiecit. Ut super sellam collocarent impe-
trauimus, quo ita obstetrices melius suo mune-
re fungerentur. Alteri quoque mulieri quæ
extra portam fossæ aqueæ habitabat, à partu
difficili & periculoso euadenti, secunda post
partum relicta fuit. Duæ obstetrices præsentis
eandem pro deplorata habebant, & in lecto po-
suerant. Vocati nos de nocte, cum ex difficili
partu & longa mora debilis esset, exhibuimus
confectionem manus Christi perlatam (ut vo-
cant) & hunc puluerem propinauimus: & pul.
parturientis ex radice dictamni parati, cassiæ
lignæ, pul. seu rasuræ lapidis dactylor. añ. ℥ j.
aquæ artemisiæ ℥ ij. vini Rhenensis ℥ j. ebibit.

M m

&

& tertia obstetrix magis perita superueniens manu pingui intincta, è lecto muliere in sede leniter collocata, eduxit secundinam. Atque ita perfusionibus adiuta, & potione ac linamentis relaxantibus, tandem & à secunda hæc quoque liberata fuit. Sed paucos post dies incidens in febrem & fluxum ventris, nec me aut alios Medicos consulens, postea, vt mihi relatum fuit è vita decessit. Verùm textoris vxor, mulier parua staturæ & tenera, cum bis fœtum mortuum peperisset cum magno periculo; ac tertia vice cum rursus pareretur, ac sex diebus iterum in difficili partu esset; 29. Octob. 1581. ad eam accitus sum. Cum igitur fœtus dudum esset mortuus, hunc puluerem exhibui: \mathfrak{R} . rad. dictamni albi, cinnamomi $\mathfrak{a}\mathfrak{n}$ $\mathfrak{3}$ j. sem. viol. $\mathfrak{3}$ β . fiat pul. subtilissimus: sumebat cum \mathfrak{z} iij. aquæ artemisiæ, quod febricitaret. Die sequenti cum fœtus, seu partus, quasi dimidius vsque ad humeros in exitu foret, nec foras prodire posset, pul. rursus exhibitus est cum vino Rhenano, quod minus febricitaret, fœtusque mortuus planè corruptus subsequēbatur. At obstetrix cum non posset habere secundinam, & puerpera pro mortua quasi haberetur, non sine febre; mandauimus vt obstetrix inum ventrē totum inungeret linimento sequēti: \mathfrak{R} . olei lilior. cheyrini, lini, axungia gallinæ, caponis, caninæ, $\mathfrak{a}\mathfrak{n}$. \mathfrak{z} j. misce. Iterum hic pul. ad secundinam expellendam, & cum non purgaretur, exhibitus est: \mathfrak{R} . pul. rad. dictamni albi $\mathfrak{3}$ ij. β . cum aqua flor. chamæmeli \mathfrak{z} iij. detur. at nihil subsequum.

um. Mulierculæ muscum pruni arboris por-
 tantis cærulea pruna, tanquam in his sympa-
 thia esset, cum vino colatum dabant, quibus
 multas adiutas dicebant, licet muscus restrin-
 gat: sed nihil his iuuantibus, tandem per partes
 corruptas, vt prædixeramus, excidebat. & rur-
 sus exhibito puluere sequenti cum vino, magis
 putrefacta per partes prodibat: & rad. dictamni
 lbj ʒ j. ꝑ. sem. viol. cinnamomi selecti, añ. ʒ
 ꝑ. rasuræ dactylorum gra. iij. Quarto Nouemb.
 leinde & sexto rursus puluere propinauimus;
 quibus perfecte, partibus omnibus corruptis
 paulatim excidebibus, à secundina liberata fuit;
 demum bene purgata rectè deinde valuit. At
 Antonia vxor Iohānis Musij Pedemontani cūm
 secunda post partum liberari non posset, imo
 ventre tum muliebribus per obstetricem oleo
 oliaceo & amygd. dul. pinguius inunctis ac fo-
 tis, post ʒ ij. ꝑ. pul. parturientium ex dictamno
 exhibitos, & decoctum rad. schœnanthi & di-
 ctamni in aqua lilior. & artemisiæ, etiam bala-
 neo immisso vt aluum redderet, secundam mox
 iecit, & deinde bene purgata optimè habuit.
 Heyla vulgo, seu salutaris, obstetrix valde ex-
 perta apud Delphēses, cuius opera multæ mu-
 ieres in difficili partu viebantur, in obstetrican-
 ti arte gnara, dum praxin Delphis exerceret:
 ac ipsa ad secundinam depellendam capiebat
 equinum, & ponebat in puppa, & cum
 vino in scis puerperis expressum dabat, cūm
 nulla alia remedia iuuarent: atque eo modo
 plurimæ à secunda liberatæ fuere.

SCHOLIA.

QUOD si istis remediis iam dictis, & sternutatione, tum sabina decocto, & trochis. de myrtha vel borace, (quibus etiam foetus mortuus reicitur) secunda, vel, ut alij vocant, secundina, non expellatur, verendum est vtro eam esse affixam & alligatam. Id deprehenditur his coniecturis, quod neque medicamentis, neque vehementissimis illis conatibus mulieris, vel sternutatione, sit reiecta, & quod ante tempus puer emissus fuerit, idque aliquando sine doloribus magnis precedentibus, ut aliquando obseruauimus secunda reiecta. Dolores enim qui praecedunt partum, fiunt, dum disrumpuntur vena & arteria cotyledonibus uteri alligatae. Itaque si dolor non praecesserit, fracta est tantum secundina, & vtro adheret: ideo manu comprehendenda, aut vinculo, & leniter trahenda, ne disrumpatur in partes, maxime quo diutius retenta fuerit. Memini cum apud puerperam Schiedami essem, secundam fuisse retentam: sed cum quadam obstetrix nimis audax subito ad se secundinam attraheret, illico puerpera in deliquium animi cadens, statim expirauit. Quare si ita adhereat ut vnguibus non possit extrahi, immittantur medicamenta suppurantia: nam eadem non est dilaceranda, ut quae intra paucos dies putrefacta, ut & Paulus censebat, in saniem dissoluta excidet; quemadmodum & paulo ante ex Aetio diximus. Vt etiam euenit uxori textoris de qua etiam nunc in Obs. praecedente egimus. Interea illo tempore, ut & Paulus tum Aetius admonent, quia secunda ita emarcescens nimio suo foetore caput replet, & stomachum euertit,

Cautio.

euertit, odoramenta iugiter suffiendae sunt, quae possunt huiusmodi calamitatibus repugnare, & loculum subducere. Ad quos vsus excellunt, cardamomum & caryca, si apertè suffiantur, & bdellium cum sabina, rhus cum styrace, vnguis aromaticus, ladanum, iisdem castorei ʒj & pulegi tantundem, ex mulsa propinato. Conueniunt & leniora ex his quae menses ducunt; artemisia decoctum, lauri bacca, myrrha & cyclamine cum vnguento mixta, ouis & caprae loculi aresacti è vino triti, & propinati, aut cum vnguento impositi, aut pro amuleto gestati. Verum, ut paulo antè diximus, fieri potest ut in ea parte putrescat: ut & nos vidimus puerum putrefactum: quod & Rondeletius testatur se vidisse, & frustulatim reiectum. sed, ut ille vidit, relictis magnis ossibus in utero per longum tempus, quae post in utero matris mortuae reperiuntur. Vxor fuit chirurgi Monspeliensis, qui post mortem, ut causam alicuius affectus interni cognosceret, passus est illam diffecari. Quia verò odoris grauitate (ut paulo antè diximus) caput replet, stomachum putrefacta euertit, & alia inducit sepiissime symptomata grauissima & sauisima, ad id necesse est per intervalla iniicere ea, quae vim habent detergendi quod putrefactum est. Ad id valebit (teste Rondeletio) vnguentum basilicum in multo oleo li-
 lior. vel amygd. dissolutum, vel in decoct. sequenti:
 R. rad. mal. viol. añ ʒij. rad. aristoloch. longa vel
 rotunda añ. ʒj. sem. lini, saenugr. añ. ʒß. flor. cha-
 maeli, & centaurij minor. añ. p. j. frum. p. ij. fiat
 decoct. in aqua & oleo, & in eadem dissoluatur vng.
 basilicum: vng. Egyptiacum ad deterfionem etiam
 iniici potest. Arrodit enim & potentissime abstergit,

M m 3

& sua

Historia
 Rondeletij.

560 DE MULIERVM MORBIS,
& sua acrimonia facultatem expultricem mouet.
Periclitantur mulieres, si adhareat & contineatur,
& moriuntur: vel ob vsum medicamentorum acrium
vltus in vtero fit. Quamobrem optimum erit ante-
quam adhibeantur remedia, id predicere, ad vitan-
dam calumniam. Potio sequens saepe danda est: R. sa-
binæ, artemis. añ. m. j. fiat decoct. in aqua: in lib. ss. de-
cocti, adde vini albi vel clari lib. ss. arom. cum cinna-
momo, & detur frequenter, si sine febre est. Vel, R.
boraci ʒ j. capiat cum ʒ ij. vel iij. predictæ deco-
ctionis, aut cum vino albo. Aut detur tantundem
trochis. de myrrha, vel ʒ j. carabes, maximè si cum
magno fluxu sanguinis sit. Nam vrinas mouet, se-
cundas deicit, & sanguinem fluentem retinet. Deco-
ctum vel aqua fabarum distillata, vt & aqua flo-
rum croci, detergit, secundinas pellit, & dolores illos
sedat. Quare non est omittenda in hoc negotio. Me-
mini Mariam Francisci, in fora frumentario Delphis
habitantem, 6. mense peperisse foetum mortuum, &
post partum relictam fuisse secundinã. ad quam 27.
Septemb. die anno 1578. accitus, valde debilem rep-
peri, cum insigni satis profluvio sanguinis. Quare hanc
mixturam sequentem saepius sumpsit: R. conser. viol.
borag. citri conditi (scilicet cort. eius) añ ʒ ij. frag.
lapidum precios. vt alcohol puluerisatorum ʒ j. ma-
nus Christi cum perlis ʒ ss. syr. de limonibus ʒ j. fiat
mixtura, & solis auri cooperiatur. Deinde sumptio
hoc pulvere cum cereuisia: R. rad. dictamni albi ʒ j.
sem. viol. ras. dactylorum, añ. ʒ ss. fiat pul. & in-
uncta vulua intus & extra oleo lilior. amygd. dul. sexta
hora à quo sumpsisset puluerem, hora diei 10. à se-
cundina liberata fuit. Post aliquos dies in suffoca-
tionem

tionem vteri incidens, cum neque ex odoratu foetido-
rum ad os, tum aliis praesidiis ad se rediret, quasi pro
deplorata habita, hoc assumpto puluere à suffocatio-
ne curata, probè deinde valuit, satis bene in puerpe-
rio repurgata: & gran. iuniperi, calami arom. incisi,
añ ʒj. rad. ostrutij (eius loco pharmacopœus sum-
psit semen eius, cum radix ad manum non adesset)
rad. gentianæ, añ. ʒβ. sem. pastinacæ ʒj. fiat pul-
subtilissimus in duas partes diuisus: ac vna parte as-
sumpta cum cereuisia, miraculi instar suffocatio
vteri cessauit.

OBSERVATIO LXXXI.

De dolore post partum eueniente.

Ad dolores post partum (quos vulgares mu-
liericulæ nostræ suo idiomate, *nae-weeden*,
vocant) magna cum laude vtor sola flor. cha-
mæmeli decoctione in cereuisia communi: mi-
raculi instar dolores post partum compescit.
Matrona quædam cum peperisset filios, quot-
annis post partum per sex dies, diebus inter-
polatis, bibebat ʒvj. olei amygd. dul. recenter
expressi, cum saccharo, & ita dolores miti-
gabat, & irritabat purgationes sopitas. Sic in
Italia, vt ex præceptore nostro Romæ Gissiber-
to Horstio accepimus, rusticæ mulieres oleum
commune, (sed minus rancidum ibi quàm hîc)
accipiebant: quod & laudatur. At matronæ
ibidem potius accipiunt ʒiiij. olei amygda-
lorum dulcium expressi. hoc ilico vidi à do-
lore post partum liberatas; & commodè eo in

M m 4 multis

552 DE MULIERVM MORBIS,
multis vti sumus. Valuit & decoctum florum
chamæmeli & artemisiæ cum iure pulli, etiam
pro clysteri, cum fæces etiam retentæ essent in
vixore puerpera Beroaldi, cum oleo lilior. & vi-
tello oui. Vbi ventositas adest, commodè da-
tur vinum decoctionis cumini, vel paulum cu-
mini puluerisatum & inspersum, modò febris
absit.

SCHOLIA.

Dolores
post partū.

ANTEQVAM puerpera rectè purgentur, dolores
post partum sepe iis oboriuntur. Matrix enim
tunc (inquit Erotis) tamquam fera siluestris, pro-
pter subitam euacuationem quasi vagando huc il-
luc declinat, vnde vehemens efficitur dolor. Pro do-
lore exhibet vinum calidum in quo cuminum bullie-
rit. Ceterum oportet in omnibus causam quoque do-
loris animaduertere. Sic mulier quædam Elizabetha
Gellij cum pateretur enormes torsiones in venire post
partum, Iohannes Tiengius, Medicus insignis, bis
terve subsequentem portionem dedit, & omnis dolor
exanuit: & verbenæ, calendula, viol. añ. p. j. schæ-
nanthi ʒ ij. sem. dauci, gentianæ, fœnugr. sem. al-
thææ, añ ʒ j. fiat decoct. pro lib. ʒ. (nempe in aqua,
si adsit febris: alioqui in vino, quamuis non expresse-
rit) exprimatur, addendo syr. de artemis. ʒ j. misce.
Sed & alia, Magdalena dicta, post partum graues
dolores matricis & totius ventris incurrebat, cum re-
tentione omnium superfluitatum & menstruorum,
& ventris stipticitate. exhibita fuit hac portio: & rad.
paoniæ ʒ j. schœnanthi, gentianæ, flor. chamæmeli,
añ ʒ ʒ. folior. senæ ʒ ʒ. fiat decoctio in aqua artemi-
siæ

fia pro ℥ iij. colatura adde cassia recens extracta ℥ iij.
 misce. Vesperis sumpsit, & curata est ab omnibus ac-
 cidentibus iam dictis. Memini ipse, dum Alcmaria
 praxin adhuc exercerem, uxorem Iacobi Themisto-
 cli nauta, paulo antequam pareret, Amsteldamo
 una cum marito Alcmariam venientem, in dorsum
 fortiter cecidisse supra scapham: ex quo casu, altero
 die peperit. Post quatuordecim dies à puerperio dolor
 ita intendebatur in dorso, & adeò vrgebat, ut mul-
 tis diebus dormire non posset, subsequente febre, sed
 non adeò vehementi. Potionem sequentem dedi: R
 cassia recens extracta ℥ vj. diacathol. ℥ ij. dissolvantur
 in aqua scabiosa & scolopend. q. s. mumia ℥ j mel-
 lis ros. colati ℥ j. qua medicina copiosè aluum depo-
 suit, dolore cessante, una & febre, etiam loco dolen-
 te inuncto linimento sequenti: R vng. dialibæ, olei
 anethini, chamamelini, axungia vituli, añ ℥ ss. misce.
 rectè deinde valuit. Si dolor post partum sit à vento-
 sitate, dentur semina ventositatem carminantia. Va-
 lent & ea quæ ad inflationem uteri diximus. sed vi-
 dendum nam adsit febris, & nunquid dolor ille sit
 ex frigore, ut magna ex parte contingit; raro enim
 ex calore, ut videre licet cap. proprio De dolore post
 partum apud Gilbertum Anglicum, tum alios, & in
 libro de Harmonia Gynaciorum. Ideo & rectè nos
 admonet Alexander Benedictus Veronensis, quòd
 mulierem à puerperio ipso, à frigore & vento, clauso
 cubiculo obscuro tuebimur, à strepituq; ac clamore,
 vestimentis bene operiam, atque iubebimus si vel mo-
 lam enixa sit, aut emortuum infantem, ut somno
 moderato quiescat, alta ceruice, sine vlllo iniucundo
 odore. Etiam hac conveniunt omnibus post partum,

M m 5

etiam

etiam si bene pepererint : & sunt tractanda non aliter quam si febricitarent, ne in febrem incidant : eam enim aliquando incurrunt, ut quibusdam exemplis in lib. nostris De febribus demonstrauiamus. Ideo cibus in initio sit praparcus, crapula enim facile febris excitatur, ac sitis validior. propterea prima die ius gallinaceum damus pingue, ac ouum sorbile, vel carnem in cœna ac prandio duntaxat. sed modus etiam seruandus est, ne inconcoctis cruda superingerantur. Confectionem interdum damus diamargariton, aut dianisum. Vinum vile est quod modicas vires habeat, subdulce, hyeme tepidum; frigidus enim vulua tenetur. Ea victus ratio ad decimum vsque diem seruatur vtiliter. Vitamus carnem assam, & quicquid astringit. Alius si nihil reddit, iniectis clysteribus mollienda est; vti nos fecimus in illustrissimi Principis Auracii vxore. si ñ non iuuant, vel si clysteres abhorreant, ut sepe euenire solet, mannam damus cum castia. Si partum purgationes sequuntur, bono est; si herent, non est bonum, sed tunc promouenda sunt, ut postea dicemus. Ita ex Moschione : Ponenda est in lecto, cùm prius post partum sponsia longa deterfuerit, in cubiculo obscura, modicè patentibus pedibus, ut quicquid ex ea foras exire ceperit, non impediatur, pannis loca ipsa contegantur, ita ut frequenter mutantur. Sed & lanis mundis & ventrem & pectinem tegi oportet; & si sine quassatione partus effectus est, oleo viridi cum modico vino admixto ipsam partem irrigari; si verò laboriosus partus precesserit, oleo dulci & calido ipsa loca calefieri: deinde biduo eas à cibo abstinere. Hic tamen ratio habenda ut pro viribus parçè alantur: nostra enim puerpera

pera omnimodam ineliam non sustinent: tum astantes muliercula nostra quadam pessimè faciunt, quæ ad multos cibos tum pulres sumendas eas cogunt, dando cerevisariam panatellam iuncto caseo, qui tamen obstruit. Ad in Frisia muliercula faciunt, sed pessimè, quamvis dicant lumbos roborare. Utantur simplici cibo, oui sorbilibus, & pulribus, primis diebus. & si levis suspicio adsit de febre, vinum interdicator. septimo die vinum exhiberi poterit aquæ exiguo temperatum. Addunt & hæc alij, ut si pepererit masculum, quod 30. diebus sese in lecto contineat, nec foras prodeat, si feminam, 40. Nonnullæ tamen statim à partu resurgunt, sæpe tamen suo damno. Cuius enim crudelis partus est, & exitus tardus, in primis tenuem victum huic exhibere oportet. Symptomata post partum plura esse possunt, de quibus mox agemus.

OBSERVATIO LXXXII.

*De quibusdam symptomatibus puerperis
evenientibus.*

In puerpera febricitante ex mēstrua purgatione suppressa rectè usus sum decocto hordei mundati, glycyrrhizæ & schœnanthi, in hunc modum: ꝛ hordei mundati m. j. glycyrr. raf. ʒss. schœnanthi ʒ j. ꝛ. coquantur in aqua communi pro lib. j. id quidem vel in febre non obest, & simul purgationes sopitas aperit, ut evenit puerperæ in Gryphone aureo decumbenti. Debilioribus ʒ j. schœnanthi in iure pulli bullire iubeo. Hoc modo Florentiola, Medicus Bono-

556 DE MULIERVM MORBIS,
Bononiensis utebatur. Valet & ius cicerum.
Mulieres Bononienses dant ius columbæ in
quo bullierit schœnanthum, ad purgationes
promouendas, si febricitent; estque remedium
Nicoli. At in robustioribus puerperis si men-
ses diu retineantur, vena tali incidenda. vt in
puerpera in insigni follis è regione domus ci-
uicæ, cum maximo successu fecimus, menstrua
purgatione subsequente; etiam sumendo ʒj.
pul. dominarum cum aqua artemisiæ. Puerpe-
ræ verò Alcmarianæ, cùm aluus restricta esset,
valde debili existenti, ius sequens exhibitum
fuit: ꝛ follic. senæ ʒvj. tamarindor. num. ix.
prun. damasc. qr. j. vuar. passul. ab acinis repur-
gat. ʒj. feminis anisi, anethi (nam in ventre
etiam maximè dolebat) ʒj. ꝛ. flor. viol. bugloss.
borag. añ. m. ꝛ. sem. petros. p. j. confusa in gal-
lina pingui, prius mundata à fecibus & intesti-
nis & interaneis, collo pedibusq. abscissis con-
futa, coquantur in aqua, ad dissolutionem car-
nis ab ossibus: omnia cum iustulo contundan-
tur, & postea colentur vnà cum iure, adiecto
paucò vino & sacch. pro sapore delectabiliore.
Ex eo iure cyathum subinde sumens & restau-
rabatur, & simul secessum habebat. At Mariæ
Teylingiæ in puerperio febricitanti ʒj. ꝛ. man-
næ selectæ cum iure pulli propinata, probè al-
uus soluta est, febrisque cessauit. Puerperæ Del-
phensi cùm lotium retentum esset, sola inun-
ctio olei scorpionis profuit. Noui & aliquas
puerperas melancholicas factas, & quasi insa-
nientes, si filiam peperissent, si masculum, eo
malo

malo non afficiebantur: sed paucis adhibitis remediis sanæ euadebant, quemadmodum & illa apud Amatum centur. 2. curat. 52.

SCHOLIA.

VARIA symptomata aliquando puerperis post partum eueniunt, & præter dolores, qui aliquando post partum contingunt, innumera alia contingere possunt. Præcipua verò hæc sunt, sanguinis retentio, aut eius fluxus nimius, & ulcera, & immittes dolores. Si enim non repurgantur, & sanguinis fiat retentio, alij morbi quoque oboriuntur. Sic ex retentione sanguinis vertigines oboriuntur, syncopes, febres, & vniuersaliter agritudines ex repletionem; quemadmodum de retentione menstruum diximus. Utere iis quæ menses leniter educunt; sed videndum num adsit debilitas. Sic puerperæ debili existenti tali vena aperta non fuit, ut alteri robustæ: sed summitates schœnanthi, capill. ven. melissæ, rad. apij in iure decocta fuere, & vrina apparente turbida, mox leni adhibito fumigio sub vestibis ex pilulis dictis: R. bdellij, myrrhæ, galliæ moschata, añ. ʒ j. trochis. de myrrhæ ʒ j. fiant pilule cum melle ros. & vna supra prunas iniecta sumus recipiatur per vuluam, cauendo tamen ne nares attingat. menses fluxere. Si verò nimia purgatio subsequatur, & vires deficient, leniter constringatur cum iis quæ de nimio prefluvio menses diximus. Sic istis diebus noctu vocatus sum ad puerperam quæ ex nimia & continua purgatione inciderat in syncopen: frictione digitorum ac manuum reuocata, factis etiam ligaturis membrorum superiorum, ex hac condito, meo iussu, sæpe capiebat: R. conser. ros.

Sanguinis
retentio.

Superflua
purgatio.

568 DE MULIERVM MORBIS,
 ros. antiq. ℥ j. diacydon. sine spec. ℥ β. fragment. lapid.
 precios. ℥ ij. manus Christi cum perlu ℥ β. cornu cerui
 vsti ℥ ij. trochis. de carabe ℥ j. syr. de ribes, cydoncor.
 menthacei, añ. q. s. fiat conduū. At altera qua post ab-
 orsum nimio sanguinis fluxu laborabat, sumpsit com-
 mode has pilulas: ℞ pilul. de bdellio, trochis. de terra si-
 gillat. de carabe, añ. ℥ j. cum syr. myrt. fiant pil. dentur
 manē. Sed & istis diebus vng. comissa cerati instar
 super ventrem inferiorem positū profuit. Reliqua vide
 loco de iis qua menstrua superflua constringant; qua
 non opus est vt repetamus. Ita quoq. si febres eas ap-
 prahenderint, subtilia regimen, & aqua hordei in po-
 tu dato; deinde reliqua secundum exigentiam febris ad-
 ministra. sed quia de his copiose diximus in libris no-
 strarum Obs. De febribus, eosdem consulo. Si consin-
 gant post partum vlcera, de his quoque prius dictum
 est. volunt interea vt ex ros. axungia recentis & al-
 bumine oui fiant pess. Si vulneretur vterus, vel vul-
 ua accedat ruptura, quidam vulnere adhibent pessos
 ex succo arnoglossae, succo portulacae, & oui albu-
 mine; vlceri vero ex cera, oleo ros. spuma argenti, ac
 cerusa, & alumine vng. conficiunt. Ad rupturam Ero-
 ris pul. rad. consolide maioris inspergit. Vide apud ean-
 dem quid sit faciendū si ruptura fiat in ano & vul-
 ua. Ad dolores vteri, vt precedente Scholio & Obs. Si.
 etiam ex parte diximus, cataplasmata anodyna vn-
 ctionesq., & alia remedia mitigatoria administran-
 da. Aliqui exhibent trypheram opiatam in potu. Vbi
 dolor immitissimus est, hoc electuario vtitur Guaine-
 rius: ℞ piper. longi, sem. hyoscyami albi, añ. ℥ x. opij
 ihebaici, croci, añ. ℥ v. pyrethri, castoreij, añ. ℥ j. anmeos,
 baccarum lauri, cumini, folior. ruta siccor. calamen-
 tha,

Puerperae si
febricitent.

Ad vlcera &
vulnera.

Ad dolores.

thæ, añ. 3 iij. margaritar. hyacinthi, ñ 3 j. moschi fini
 3 β. cum melle despumato q. s. fiat electuar. eo non
 utendum nisi ad minus sex menses praterierint ipsius
 preparationis. datur autem à 3 β. vsque ad 3 j cum
 vino calido, decoct. artemisia. quamuis tamen istud
 statim dolorem sedat, non est utendum eo nisi magna
 cautione, si reliqua non iuuerint: cum alia habeamus
 anodyna. His alij addunt contra rugas in ventre post
 partum remanentes: axungi enim caponis inungunt
 ventrem. Si post partum difficilem uteri prolapsus fiat,
 curetur ut prius dictum est. Si mammilla doleant ex
 lacte, Erotis apponit argillam cum aceto, mammilla prius
 aqua calida fota. alij mammillis dolentibus apponunt
 panem in melicrato infusum cum oleo dulci contritum.
 Si lac ad mammillas confluat cum tensione, grauedine,
 dolore & feruore, ex Mosch. primo impone spongas
 molles cum posca, vel panem in posca infusum cum pal-
 mula tritis. Et si lac stringere velis, apponatur pulica-
 ria seu psyllium, vel coriandrum viride: si adsit feruor,
 relaxentur cum oleo & aqua calida: Si lactare non
 velit, lac stringitur pyrite lapide trito cum cerato. Vi-
 de ea quæ scripsimus Obs. 18. lib. 17. de lactis exsicca-
 tione. At vna passa trita lac euocat. De defectu lactis
 diximus Obs. 14. & 16 lib. 17. Vide in eodem libro de
 aliis affectibus mammillarum; & de fissuris papillarum
 in eodem libro sub finem; & quæ Aërius lib 16. cap. 35.
 ad caput 50. De mammillarum affectibus scripserit.
 Vide & de lacte grumoso vel vitiat. Addemus autem
 quedam, antequam hunc librum finiamus, de regimi-
 ne infantis, & de regimine nutricis, ex diuersis aucto-
 ribus. eo quod Medici de his rebus aliquando consu-
 antur, ut ita tirores etiam ea ad manus habeant.

Contra ru-
gas ventris
post partum.

Mammillæ
si affician-
tur post par-
tum.

DE

DE REGIMINE INFANTIS.

Erotis de re-
gimine in-
fantis cap.
18.

AVRES infantis (inquit Erotis) premenda sunt statim: & hoc multoties est faciendum. Postea observandum ne lac subintret aut nares cum ab-lactatur. Et ligetur umbilicus tribus digitis à ventre mensuratis. quia secundum retentionem umbilici, erit virga virilis maior vel minor. Ut verò rectius lo-quatur, unge palatum cum melle, & nares cum aqua calida; & factis vñctionibus, semper mundifi-cetur, & mucilagines semper emungantur & emun-dentur. Puer praterea saepe est fricandus; & quali-bet eius membra in vnaquaque parte fascia sunt re-tinenda, & iungenda: & rectificanda sunt eius mem-bra; caput videlicet, frons, nares, venter, & renes temperentur, ne multa ex eis exeat vñctuositas vel humiditas. Quod si aliquid istorum appareat, diu-tius à solita fasciatione cogatur abstinere, & diutius dormiat. Postea verò in aqua calida balneetur, & ad suam consuetudinem reducatur: & si opus sit de me-dicinis soporiferis, parum detur, ut dormiat: (non tamen opium, ut nostra muliercula pessimè faciunt.) Curis eius aqualiter est mouenda: quod etiam con-suevit fieri post mammillarum susceptionem. In prin-cipio natiuitatis, oculi cooperiendi sunt, & summo-pere cauendum ne sit in loco lucido. Ante ipsum sint diuersa picturae, panni diuersi coloris, margaritae. Co-ram eo cantilenis & facilibus vtendum vocibus, nec asperis vocibus canendum: & rauci soni vitandi, sicut bombardarum. Postquam hora loquendi appropin-quarit, nutrix eius linguam frequenter cum melle & butyro vngat. Et hoc maximè faciendum est, cum

am loquela tardatur. Caram eo frequenter est lo-
quendum & facilia verba proferenda. Cum verd
tempus natiuitatis dentium venerit, gingiua singulis
diebus cum butyro & axungia gallinae saepe fricanda
sunt, & aqua hordei linienda; gula & spondylia in-
genda. Quod si venter eius laxabitur, superpona-
tur emplastrum quod sit ex cumino & aceto: & ad-
misceatur saccharum, gummi Arab. bol. Arm. & si-
mililia. Cum tempus aduenerit in quo comedere inci-
piet, dandi sunt infanti magdaleones ad modum
plandis facti de saccharo ac lacte, & similia, quae
possit in manu tenere, & cum eis ludere, & de eis
sugere, & aliquid transglutire. Caro quae est in pecto-
re gallinarum & phasianorum, est ei tribuenda. Et
postquam bene capere coeperit, mamillarum substan-
tiam maturè incipiens, eas in nocte sugere permittas.
ita & in die ordinatè ducendus est, bene obseruando
ne tempore calido à lacte remoueatur. Si vnum
membrum pueri sit maius alio, ad bonam habitudi-
nem sic potest reduci, si talis dispositio fuerit recens;
quia inueterata nullo modo reducitur. Fomentetur
ergo primo cum decocto brancae vrsinae, rad. althaeae,
foliorum apij, petroselini & marathri, diutius bul-
liendo in aqua, & membrum patientis ponatur su-
per vas, & cooperiatur panno lineo vt sudet. Postea
chamamelum & althaea incoquantur. & in illa visco-
sitate malaxetur cera, & totum membrum inde coo-
periatur. postea ligetur fascia linea strictè, & ita
membrum patientis sudet per noctem vnā: manè
verò fricetur, vt spiritus excitentur, & fluant ad lo-
cum dolorosum. Quo facto, fricetur statim cum
dialthaea ita composita, vt sint duae partes dialthaeae.

N n

&

& tertia de oleo laurino: commisceantur, & vngatur membrum pradiſto modo ter vel quater in die. Tunc quoque accipe diaceraſeos, ceroneum oxycroceum, & ad inuicem pulueriſentur. Deinde decoquantur alibea, & puluis ille malaxetur cum illa viſcoſitate, quouſque bene adhareat: & membrum totum patientis cooperiatur, & ſaſcia ligetur. Et ſic ſomentando, & emplaſtra ponendo, poterit allenuari. Quibus factis, iniungatur requies & otium, & vtrur calida & humida dieta, optimo vino, & medio-criter rubeo, quod bibat quouſque curetur. Inſuper & balneo aquæ dulcis vtratur. Haſtenus Erotis. Moſchio autem hac dat: Ex quibus probabis infantem aptum eſſe ad nutriendum? Ex hoc videlicet quod illa, qua illum in vtero habuerit, omnibus menſibus ſana fuerit. vitali etiam menſe ſi ſit ſanus natus ipſe paruulus. Si omnibus partibus fuerit integer, omnes poros patentes habeat, vocemq; ſolidam ſtatim vt cadit, emittat. Hæc omnia integræ ſanitati ſunt teſtimonia, & pleno tempore natum infantem oſtendunt. Quoties in die lauandus infans eſt? Semel. Neceſſitate verò aliqua occurrente, bis: frequens verò lauacrum flaccidum corpus facit (liber Matricis habet, capiti eius nocet). In quali loco lauandus? In obſcuro, & temperatè calido. Quibus rebus infantis ſuperficiem lauari oportet aut aſpergi? Antiqui vino cum aqua ſaſa abluebant. Alij verò lotium pueri & puluerem gallarum vel myrtæ aſpergebant. Nos autem ſalem tritum & aphronitrum aſpergimus: prædictæ enim res odore ſuo infantem feriunt, nec tutum eſt infantem nimium adſtringi: inde enim denterius habet. Si verò multum mollis eſt infans, ad-

mixto

Harmon-
gynæciorū
part. prior.
cap. 20. &
ſeqq. de in-
fante, &
quomodo
tractandus.

exto sale (aliàs, melle) vel oleo, vel succo fœnugr.
merge, aut line per totum corpus, ita vt neque ocu-
neque ori ex his aliquid incidat. Deinde cum sic-
ur corpus, aqua frigida eum abluere, & aqua ca-
a ipsum lauare debes. Digitis verò in naribus, vel
immissis, omnia purgare, & oleum oculis infan-
infundere. Deinde minimum digitum in ano in-
tis immissum, meconium (in Græco πύπρον) tollat,
umbilicum lana ligatum immediatè sui praece-
& linteolo oleo intincto contegere. Propter quam
usam oculi infantium oleo irrigantur? vt tunica
ibus constant, emolliantur, extergantur, vt inte-
um visum habere possint. Quare iubentur ma-
es post lauacrum infantum auriculas & nares ex-
care? Ne remanente ibi humore, graciles aurium
ri, perfrigescent, & malè accipiantur. Quomodo
ortet infantes ungere? Primò ad dētes positos, dein-
etiā supinos femoribus suis ante supposito linteolo,
vt aliquando singulatim manus iungat. Aliquan-
o vtrascq; iungat, & extendere etiam iuuat. Simili-
r etiam pedes, singulasq; corporis partes formare:
quæ concauae esse debent, premantur: quæ verò gra-
lia, constringantur; & quæ exstantia, adducantur.
culorum etiam ipsorum folliculos frequenter fri-
re, caput verò diligenter rotundum facere, Patel-
s etiam in genubus mouere, deinde omne corpus
ciendere & remittere, & vniuersas partes suis offi-
is commemorare. Quomodo fasciandus est infans
post lauacrum? (in margine annotatum erat: Fortè:
Quomodo disponendum est lauacrum?) Sedere debet
utrix, & genubus iunctis femoribus suis, in linteolo
infantem accipere, & sublati fasciis oleo tepido un-
gere:

564 DE MULIERVM MORBIS,
gere: & in pelui grandi aqua calida limpida, & sine
odore missa temperata. Deinde manum sinistram
sub axillam infantis sinistram tenere, ita vt pectus
supra cubitum iaceat. Deinde in aquam positum le-
niter fomentare. primò dorsum, deinde supinum
conuersum, & partes ipsas fouere, ita vt omnes sor-
des, quæ in collo sunt, & concava loca, sicuti sunt
axilla, & inguina, diligenter extergantur. Immis-
soq; digito intra os, saluas omnes tollere, & leniter
gingiuas & linguam conficcare. deinde leni manu
supra pectinem premere, vt vrina officium comme-
moret. Sed cum viderit corpus eius aliquantulum
calefactum, sufficienter obruisse, lauare, & in tepida
aqua deponere, vt ad vsum frigida assuescere possit
infans. Quomodo oportet infantem fasciare? Super-
posita femoribus eius fascia munda, & lata sufficien-
terq; longa è lana, vt singulas per partes voluere va-
leat, ita vt omnia loca, quæ sunt gracilia, constrin-
gantur, & antè laxius circumcingantur. Deinde
coniunctis genibus, & talis lana interponatur, ne ita
coniunctis aliquid de membranulis cassetur. Caput
pannis aut lanis mundis contegatur. Vbi oportet &
quomodo infantem iacere? In locis mediocriter ca-
lidis, ita vt nihil oleat, & nec valde sit lucidus locus,
stratumq; eius sit concuum, nec valde molle, ne
multum iacendo, spina infantis aut collum contor-
queat. In mediocri mollitie collocatum etiam caput
infantis iacere debet. Quanto tempore fasciandus est
infans? Apud quosdam diebus quadraginta: apud
alios sexaginta. Apud nos quamdiu in integro sui
corporis infans coaguletur & solidetur: quòd si citius
soluatur, euenire ei solent languores, dum sano cor-
pore

pore sunt nati. Tardius verò solui debet qui imbecillus est. Semel omnis fascia, & non delapsos solui-
mus, sed per partes paulatim. Si verò semel solueri-
mus eos, & corpus mundauerimus, nouitate ipsa per-
cutitur, & malè accipitur. Post quot dies umbi-
licus infantis cadere solet? post tres vel quatuor. Vul-
nusq; quod remanet, plumbi puluere bene curetur.
Quomodo concauitates umbilici formantur? Fru-
stum plumbi ad similitudinem denarij factum appo-
nimus, quod possit pondere suo concauum facere.
Quando oportet infantem cibum accipere primum?
Cum post omnem commotionem (aliàs, commuta-
tionem) quietus fuerit effectus; hoc est, post nonam
(aliàs, octauam) vel x. horam, talem cibum pri-
mum accipiat, qui stomachum & ventrem purgare
possit, & eum nutrire, sicut est mel modicè decoctum.
Si enim crudum fuerit, & austerum est, & inflat: si
verò paulo plus fuerit coctum, constringit. Quomodo
mel ei dandum est? Nutrix debet os eius illinire, &
mulsam tepidam instillare, & sic secunda die lac of-
ferre. Cuius lac accipere debet infans? Maternum
lac dare oportet: aut extraneum, non maternum, si-
quidem adhuc ex labore partus & turbatione, &
purgatione, lac eius malum est crassum (aliàs, pin-
gue) & indigestibile. Quod verò est lac bonum? Bo-
num lac est mediocriter candidum, nec subliuidum,
nec gypso simile, nec subacidum, sed moderatè coa-
gulatū & stillatim in vngue leniter dilateretur, nec se-
cundò diffundat. Reliquæ autem differentie malum lac
ostendunt. Maternone lacte nutriendus est infans,
an nutricis? Amabilius quidem potest à matre nu-
triri, verum matrona ut post partum sana esse possit,

N n 3,

melius

melius à nutrice potest nutriri. Unum enim lac maturum sufficienter duobus infantibus ministratur. Post quod spatium lauacri ad mammillam applicandi sunt? Post modicum, donec omnis turbo lauacri digeratur: quicquid enim prius accipitur, corrumpitur & non nutrit. Nam & ipsa nutrix si non digesserit balneum, & exsiccatis antea mammis infantem applicet, male habebit infans. Quomodo lactari debet? Manibus acceptum infantem aliquantulum in latus ponere, & ad utrasque mammillas conuertere, ut modo dextram manum infans, modo sinistram liberam habeat, & de ambabus mammis accipiat. Deinde ori eius appositam papillam teneat, & quasi latenter lac exprimat, ne cum labore infans didam sugere incipiat. Quoties in die infans lactari debet? Frequenter in die lactandus est, modo ex sinistra, modo ex dextra mammilla; quoniam semel, quod ei sufficiat, accipere non potest. Lassatur enim diutius lactando, aut de bono lacte citò satiatur. Non ergo determinandus est modus, sed cum visus fuerit velle, oportet eum accipere. Ita tamen ut ante lauacrum, nec in lauacro vnquam accipiat didam, ne laedatur corpus (alias, cor) eius. Qui enim ante lauacrum, vel in lauacro lactantur, scias eos variis & multis languoribus detineri. Quibus signis intelligere possumus, infantem debere cibum accipere? Eo quod precordia eius concaua sunt, vel etiam tantum tempus transiit, ut cibum accipere debeat, os etiam aperiat, & labia frequentius moueat, & cum in lacte intinctum digitum labiis eorum applicuerimus, sugant cum quodam ploratu. Quomodo verò apprehendimus an propter cibum ploret, an non? Fasciam principaliter

ipaliter inspiciamus, ne stricta sit, ne iacens pedem
aut manum contorserit, aut aliqua re puncturam
senserit, aut de abundantia cibi aut lactis ploret, in-
spice: & ne à plurimis coopertoriis granatus; aut ne
paruitate eorum perfrixerit, aut nimio sole aestuaue-
rit. Si verò aliqua re punctus est, subito plorare in-
cipit. si coopertoria plurima vel parua, id visu pro-
batur & tactu: aut enim frigidus esse debet, aut
multum calidus. Si autem abundantia lactis vel ci-
bi premitur, huc atque illuc se proicit, & plena
præcordia habet. Si aestuauerit, cum anhelitu rubet:
si verò aliqua causa inæqualitatis est, & ille languet,
& lac accipere non vult, & macrior effectus est. Ex
prædictis signis omnes ploratus eius separari possunt.
Quomodo infantem à lacte deducere debemus? Post
annum & sex menses, aut suppleto biennio, denti-
bus iam abundantibus & firmis, quod possint non
tantum cibum diuidere, sed etiam diligenter eum
manducare. Quem cibum primum infanti dare
debemus? Panosum, hoc est, micas in mulsæ vel in
condito, vel in lacte infusas, vel succum alicæ, vel
pultes. Deinde bibere quid ei dabimus? Aliquando
aquam, aliquando vinum aliquantisper per vascu-
lum vitreum ad imaginem papillæ formatum & per-
tusum, quod rusticitas * Vrula appellat. (Nostris da-
tur cereuisiola tenuis, & recte.) Ante paucos ve-
rò dies, paulatim cibum offerre conuenit, & raro ad-
didas applicare, & nouissimè ex toto lac negare, &
quæ amara sunt mammillis illinire. Quando gestan-
dus est? Ante cibum gestandus est: nunquam statim
post, ut non quod accepit rumpatur aut reiciatur.
Quæ sunt exercitia quæ facere possunt infantes? In-

Quomodo
tractandus
nuper natus
infans, ex
Bonaciolo.

primis ad pilam ludant, ut alius manus extendant.
Hæc exercitia vtilia sunt infantibus. Addit hæc Bonaciolus lib. 1. Mulieb. cap. 8. quomodo infans recens natus sit tractandus. Recrementum (quod papaverculum vocitant) plus quam pro partus magnitudine, colore cruentum atque admodum atrum piccum vendicit: quamobrem quia valde tenellus est, muria pauci salis, cui admista sint, costus, sumach, fenugr. origanum, eundem præter os & nasum, circumlinire diligentiores iussere. Demum lauatrix manu dextra, lauo brachio eius pectori adactò, eum præhendat, tepida aqua æstate, hieme calida, meraciore generosove temeto, ouorumq; vitellis binis adiectis, à pluvie quacunque nares digitis, vnguibus excisis, perpurgando, anum minimo digito adaperiendo, exquisite pelluat. Quod plerumque bis aut ter in die (æstu potissimum) facere conducit atque expedit. Deinceps verò leuigato lintealo madidum infantem desiccet; singulaq; membra leuibus pressuris efformet, ac excultius effigiet. Vesicam, ut lori egressus facilius sit, deprimat: leuibus pannis extensus, brachiis ad costas porrectis, obuoluetur: institisq; capitis capite operto, peruinciatur. In ipsius nares oleum coniciatur. Denique capite eleuato super latus, quo melius pituitosa materia ex capite expurgetur, cunabulo suauiter semicirculari motu quasso, succent ante quapiam, obdormiat: mellis per diem (primum scilicet) suctu contentus, nec nisi flenti propinetur. Demum usque quò parentis temperatura pristina natura restituetur, eundem nutrix interdum bis aut ter lactet. Tantisper enim puerpera lac in pumicis modum coit, quod colostrum appellatur, ac propterea infantes qui hoc

hoc lactauerint, colostrati: sed iis nutricis potius lac exhibere conuenit, quando matris exitiosum sit. Maternum tamen praeferatur si bonum sit; ut mox de nutrice dicturi sumus. At cum umbilici exesa vellere pars ceciderit, (quod post tres aut quatuor dies iugiter accidit) cochlearum cinis vtiliter imponitur.

Paulus verò Aegineta lib. I. cap. 5. hac de educatione pueri paucis scribit: Primum infans recens natus melle nutriri debet; mox lacte: idq; bis in die, aut plurimum ter. Cum autem promptè & alacriter puer assumit, ac spes est eum posse quod oblatum est concoquere, tunc & cibus solidior rectè datur qui non ipsum repleat. At si fortè imprudentibus nobis puer repletus fuerit, somniculosior autem statim & torpidus magis euadat, venter intumescat infleturq;, & vrinae aquosiores reddantur, quae repletionis notae sunt, nihil exhibere oportet, donec cibos prius ingestos consumpserit. Abunde autem fuerit duobus annis lacte puerum enutrire, inde ad cibos solidiores transgredi. Conuulsione plerique ac praecipue corpulentissimi, (ut de morbis pauca adiciamus) habitissimiq;, & lacte copiosiore crassioreq; vefcentes, atque astrictas aluos habentes (quippe qui satietate vexentur, & recrementis squalescant) ac potissimum plenilunio, corripi assolent. Quo morbo omnes ferme ante septimum solem pereunt: ob id die septimo (iis superstitibus) tanquam eorum saluti magis credamus, nomina imponuntur. Proinde iecur asini, panace modica admixta, in os instillatam à comitialibus morbis & aliis, quadraginta iugiter diebus factitatum, puerperia tuetur. Cerebrum capra per annulum aureum traiectum, priusquam lac detur infan-

Educatio
pueri ex
Paulo.

Bonaciolus
iterum.

N n 5

tibus,

ribus, contra comitiales ceterosq; infantium morbos instillatur. Ceterum praecox illis risus atque celerimus, lachrymae ante quadragesimum solem maxima ex parte haudquaquam conceduntur, quamquam die eodem quo satus esset, Zoroastrem vnum risisse lectitauimus: sicuti & Crassum, Crassi in Parthis interempti auum (ob idq; Agelastum appellatum) nunquam risisse ferunt, quomodo & plurimos nunquam fuisse: alios quoq; multos, quod ratum sit, maxima sapientiae auctores, veluti Socratem, Diogenem Cynicum, Heraclitum, eodem semper vultu, nec aut hilari magis aut turbato (quales apathes Graeci nominant) extitisse. Qui sanè animi tenor in rigorem quandam, naturaq; duram atque inflexibilem toruitatem summo opere exit, humanos etiamnū affectus proculdubio adimit. At quoquo modo res se habeat, si ante quadragesimum diem risus eruperit, ominosum id atque timorū plenū vulgo iudicatur. Cuius temporis partem plurimum obdormiunt. Etenim homini animalū vni per aliquot menses somno confestim genito premi sopiriq; datum est. Subinde iam longior indies insomniat. Somniare etiamnū eos cominus compertū est. Nam & pauore expergiscuntur, & suctum imitantur. Plerosq; verò nunquam: quibus exitiale contra somniorū assuetudinē indicium fuisse, multorū exemplis veteres inuenere. Insuper recens natus vertex adeo mollis est, ut cerebrū palpitare perpēdatur; qui sanè serius duratur. Quinimo Zoroastri ita palpitasse, ut impositam manū valentissimè repelleret, futurae scientiae praesagio constat. Pueris primores 7. mense dentes gignuntur: priusq; his superiores, illis inferiores; at omnibus ferè prius parte supera haud dubiū est. Ex quibus qui pri-

mus

mus ceciderit, ut terram non attingat, in armillā inclusus, in brachioq; assidue habitus, muliebriū locorum dolores efficacissimè prohibet. 7. eosdem anno decidere, ac alios suffici, dilucet. Quosdam & cum dentibus (tamen si rarenter) nasci, sicut Marcum Curtium (qui ob id Dentatus cognominatus est) & Cn. Papiū Carbonem, præclaros viros, inclaret. Id quidem in viris mali fuisse auspicij, antiquitas negavit. At in mulieribus ea res infausi ominis atq; inauspicati exempli Regum temporibus extitit, quādo Valeriam, ita natam, civitati Sessapia, ea tempestate florentissima, in quam deportata fuit, aruspiciū responso vaticinante, veridico exitio fuisse, dignissimi authores scriptitauerunt. Aliqui etiamnū dentium vice osse continuo superna oris parte gignuntur; sicuti Prusiæ regis Bithynorū filium fuisse tradunt. Sed ex dentibus quaterni primi ^{τετράδοντες} à Græcis nominantur, ij exinde quatuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. Ultra quos utrinq; ferè maxillares seu molares quaterni sunt; præterquam in iis, in quibus tres vltimi, qui serò gigni solent, non increuerunt: horum utrimq; bini caninis proximiores, columellares vocitantur. Quare viceni omnes erunt. Ex quibus primores singulis radicibus; maxillares utiq; geminis, quidā etiamnū ternis quaternisve nituntur. Atq; ex radice eadē in pueris novus (altero deciso) dens subit, qui multo sæpius priorē expellit. Interdum verò aut supra aut infra eum sese ostēdit. Sed non desunt, quibus tricenos binos viris dentes attribuere, feminis numerū minorē (excepta turdulorū gente) placuerit. Quibus non plures fuere, lōgioris vitæ promitti spatia putant. Paulus de dentiū ortu inquit: Dentiū 7. mense

Ex Paulo
lib. i. cap. 9.
de dentium
ortu.

&

& tendinum, aliquando conuulsiones etiam, eueniunt. Tunc igitur puero nihil dandum, quod mandipostulet; digito autem in lauacro gingiua continenter contrectari, & gallinaceo adipe vel leporis cerebello emolliri debent. Vbi iam dentes prodierint, ceruix, caput, & maxilla delicatis lanis puris contigentur, oleoq; dulci & calido fouebuntur: idemq; meatibus auditoriis instillabitur. Ceterum plenius infantem tunc alere & calida lauare oportet: & si alui profluuium experiatur, tentabimus eum epithematis, quae praecipue sistunt, contrahere, inspergendo lanae cuminum, aut anethum, aut apium. Salutare est etiam semen rosarum admiscere, & summatim calidis desiccare. At si venter nihil reddit, melle in glandis figuram coacto, inferius leniter irritabitur: aut nepita detrita cum melle illinetur. Porro conuulsionibus puerorum optime videtur auxiliari heliotropium in aqua elixum, si puer in hac lauatur. Confert & irino, aut cyprino & sicyonio perungere, & vniuersum calefacere. Cum autem exorsis dentibus, digitos mordet vulneratq; bene fuerit radicem iridis derasam, nec admodum siccam, ore continere. Hoc remedium vlceribus quoque opitulatur: butyrumq; cum melle illitum adiuuat. Gingiuarum autem pruritus, veteris salsamenti caro lenit. Quibus autem in hoc primo dentitionis rudimento impatientissimis, difficulter nascuntur, iis qui dentes, qui primi cadunt, alligati facilem (efficacius si terram non attigere) dentitionem praestant. Lacte caprino, aut leporino cerebello, adipeq; gallinaceo gingiua perfricentur, cerebrum pecudis in vino potu detur. Dentium delphincinis ex melle gingiuis illinitur. Eius quoque dente
gingi-

Ad facili-
tandam den-
titionem, ite-
rum ex Bo-
naciolo.

gingiua tanguntur. Canicula dentes eundem habent effectum. Infantibus tamen nihil butyro vtilius per se & cum melle, priuatim & in dentitione, & ad gingiuas, & ad oris vlcera. Dens quoque lupi adalligatus infantium pauores (quos etiam lapis stellatus arceat) dentientiꝫ morbos prohibet; quod & lupina pellis praestat. Cinis caninorum dentium cum melle pueros tardè dentientes adiuuat. In cochlearum corniculis arenacea durities inueniuntur, ea dentitionem adalligata facilem reddunt. Cerebrum viperæ pellicula illigatum. Ad idem & serpentium grandissimæ dentes valent. Bouis capiti lapillum inesse produnt, quem ab eo expui si necem timeat; inopinatis tamen capite præciso exemptū, adalligatumꝫ dentitioni mirè prodesse: eiusdem cerebrum ad eundem vsum alligari iubent. Limacisꝫ lapillum osculūmve in dorso offensum. Dehiscentibus gingiuis, caput & collum oleo ex aqua calida abluto fricentur. Quando incipit infans dentes habere? Non omnes equaliter plurimis verò à quinto mense nasci incipiunt. Quæ sunt signa quæ infantes ostendunt dentire? Gingiuarum prurigo, & feruor maxillarum, & in ceruice neruorum dolor. Vnde frequentius sanguinolentus humor per os aut nares (aliàs, per aures) exire solet. Quibus vtendum est rebus tunc infantibus, vt non laboriosè & cum tormento dentes eiiciant? A quinto mense olea dulci, & adipibus gallinaceis, & cerebellis leporis, gingiuas frequentius fricare, nouissimè mediocriter decocto melle illinire. Cùm verò feruor emerferit, vaporatone & cataplasmatibus vtī; ita vtrā nutrix eius vinum non accipiat, & parciū cibos sumat. Ad feruorem faucium quibus vtendum est? Omnibus quæ relaxare possunt;

Harmon.

gynæc. part.

prior. cap. 24.

de illis quæ

infantibus

accidunt.

Ex Paulo
lib. 1. cap. 8.
ad pruritus
gingiuarum.

Ad prurigi-
nem cor-
poris, ex
Mosch.

Ex Paulo
lib. 1. cap. 6.

Ex Mosch.

possunt; sicuti melle modicè cocto, & ex eo mulsa,
& succo ptisanae, & ceteris his similibus. Ad pruri-
tum giuiarum, fomento viendum est, & liberali
vntione ex oleo discocto in quo cera momentum eli-
quatum sit. Ad pruriginem corporis eorum quid fa-
ciendum est? Vaporationem lauacri calidi, & perun-
ctione olei cum quo modica cera soluta est. Si verò
exanthemata & pustulae cum humectis vulneribus
exierint, quid faciendum? Viuimus illis quae con-
stringere & siccare possunt. post lauacrum autem
persudentes aqua calida in qua decocta est rosa,
lentiscus, celsa agrestis, myrtus & coria mali gra-
nati. cataplasmatibus autem misce folia plantagi-
nis, intyborum, portulacae, & vuae lupinae. Illini-
mus oleo rosaceo vel myrrino, cum cerusa, spuma ar-
genti & alumine. Pustulis (inquit Paulus) quae
puero per cutem eruperint, primum sanè multum fa-
cescere negotium oportet. vbi verò probè decreue-
rint, tunc iam curare tentabimus balneis, quibus ini-
ciantur myrthi aut lentisci folia, aut rosa. deinde
rosaceo lentiscino viendum: ceratoq; cum cerusa:
adhuc nitro abstergere lenius expedit: nam valen-
tiora non sustinebit. Optimum verò est, nutricem
dulciori victu vti. laudatur item maximè si puer ip-
se neque pleniore, neque nimis tenui cibo alatur. At
si venter ipsius non respondeat, tunc mel cibo infu-
sum simul coquere oportet. Si ne sic quidem descen-
derit, terebinthina instar cicoris iniicies. Humecta
aluo, milium potissimum offerre conducit. Et au-
thore Mosch. si venter infantis solutus fuerit, quid
faciemus? Si adhuc lactet, omnia quae stringere pos-
sunt nutrici damus: epithema quod est de palmu-
li &

lis & lenticula inducimus. Contrà, si plurimis die-
bus non fuerit assellatus, mulsam & olera, quæ ven-
trem mouere possint, etiam nutriti demus. Sonitum
verò narium & oris strepitum, quòd frequentius de
humoribus occurrit, quomodo sanamus? Mulsam
ex modico melle cocto factam, frequentius infanti-
bus damus. Ad tussiculas verò eorum, semen lini,
amygdalas, succum liquir. & tragacantha; vrimur
& electuariis. Quòd si quando tussicula aut graue-
do puerum, inquit Paulus lib. 1. cap. 7. affligat, lin- Ex Paulo.
ctus ex melle, quos Græci melitissimos vocant, adhi-
bentur. Conuenit igitur, puero liberaliore aqua ca-
lida loto, caput ipsius melle copiosiore illinere, deinde
digito linguam leniter premere: multum enim hoc
pactò pituita vomitu egeret. Oboritur (lib. 1. cap.
10.) puero etiam vlcus quod aphtha vocatur, nunc
subalbidum, nunc subrubrum, aliàs crusta modo
nigrescens, quod omnium periculosissimum & le-
thale est. Remedio erit iris cum melle, & sicca in-
spirata, item rosarum folia contusa, earumq; flos,
crocum, myrrhæ exiguum, galla, lachryma thuris,
& cortex eiusdem, & simul & priuatim singula
melle rincta: ad hæc mulsa, & mali Punici dulcis
succus proficit. Ad femorum interirrigines myrtus
arida, iuncus angulosus, & rosa inspersa iuuant.
Ad aures humentes. Aurium humiditates lana ex
alumine imposita, aut mulsam, aut vinum vetus in-
stillatum, aut crocum ex vino detritum siccant. De
siriassi lib. 1. cap. 13. Siriassis, quæ Latinis Aduſio
infantium dicitur, est inflammatio partium cir-
ca cerebrum eiusq; membranas. Concauum in ea sic
sinciput, concaui itidem cum pallore oculi; accedit &
corpo-

Hippocratis
Aphorismi
nouiter na-
torum mor-
bos enarran-
tes.

corporis totius siccitas. Succurrit huic malo vitellus
oui sincipiti cum rosaceo linamenti impliciti modo
impositus, sic tamen vt continuè renouetur. Opor-
teret eidem loco imponere folia herbe quam Græci He-
liotropion, Latini Solarem nuncupant, cucurbitæ
ramenta, cucumeris, quem peponem dicunt, cutem
carni adiacentem, aut hortensis solani succum cum
rosaceo. Et, teste Moschione, Siriasis cerebri est ser-
uor cum meningis, ita vt occipitium infantis conca-
uum fiat, cum igneis & frequentissimis febribus. De
aliis puerorum affectibus, morbis atque vitiis, passim
in nostris libris Observationum diximus: quibus bre-
uiter & Hippocrates hos morbos nouiter natorum
adiungere possis. In ataribus autem, talia contingunt,
paruis & nuper natis puerulis, oris vlcera (quæ aphthæ
vocantur) vomitus, tusses, vigilie, pauores, vmbilici
inflammationes, aurium humiditates. In progressu
verò cum iam dentire incipiunt gingiuarum prurigi-
nes, febres, conuulsiones, alui profluvia: & maxi-
mè cum caninos edunt dentes; & iis præsertim pue-
rû qui crassissimi sunt; & aluos duras habent. Cum
verò iam magis adoleuerint, tonsillæ & vertebra quæ
in occipitio, ad interiora luxationes, crebri anhelitus,
quos Græci asthmata vocant, calculi, lumbrici rotun-
di, ascarides, verruca, quas Græci acrochordonas vo-
cant, satyriæ, strumæ, & alia tubercula, & præci-
puè antè dicta. Grandioribus autem, & iam acce-
dentibus ad pubertatem, plurima ex his, & febres
diuturnæ magis, & ex naribus profluvia sanguinis.
Plurimæ autem passionēs puerulis iudicantur: non-
nullæ quidem in quadraginta diebus; nonnullæ in se-
ptem mensibus, quedam verò iam ad pubem acceden-
sibus.

tibus. Quæ verò permanserint, nec in pubertate finierint, puerulis, aut feminis, cum menstrua erumpunt, consenescere consueverunt. Sed & isti de infantium, siue puerorum, tuenda bona valetudine aphorismi, ex autoribus vndiquaq; congesti, viles censentur. I. Quoniam eius naturam quo nutrimur sapimus, bonorum morum nutritrix, bonaq; eucrasie ac mediocris ætatis semper est eligenda. II. Bono cibo nutrices si nutriantur, boni chymi lac generant, quod crescendo dat bonos ipsi nutritio succos. III. Solo lacte pascendus est infans, vsque quò dentes anteriores producat. IIII. Cum ex eodem simus & nutriamur, lac maternum sanguinis consueti atque cogniti alimonia genitum, lactibus ceteris natura infantis cõformius existit. V. Ut hædi lacte ouino nutriti, pilum gignunt teneriorem, & agni lacte caprarum aliti, lanam ferunt duriorẽ: sic nati nutricibus alienis educati, à propriis matrum naturis multum discrepant. VI. Qui suos partus deserunt, ablegantq; à sese, & aliis nutriendos dedunt, vinculum, coagulumq; animi atque amoris, quo parentes cum filiis natura consociat, intercidunt atque diluant. VII. Infantis aliorum educationi dati facta est ex oculis eius amolitio: vigor enim ille materna flagrantia, sensim atque paulatim exstinguitur; ipsiusq; affectio animi atque amoris, in ea sola vnde alitur, occupatur; & matris quæ genuit neque sensum vllum, neque desiderium capit. VIII. Moderatus fœtus ante pueri lætationem ad membra spiritalia dilatanda ceteraq; confortanda & ad caput purgandum conuenit. IX. Pueri mense septimo dentire incipiunt: denticant verò citius, qui lac calidius sugunt. X. Cum ignem

Aphorismi
de infantium
que puero-
rum tuenda
bona valetu-
dine.

O O

igni

igni addere non liceat, eucratu puer ad plurimum
vsque, aut eius nutrix, nequaquam vinum gustare
debet: quoniam sufficienter calefacit corpus, caputq;
vaporibus replet, atque in his furiam quoque & ma-
niam irritat. XI. Puer à septem annis ad quatuor-
decim vsque, nec multis nec violentis promouendus est
gymnasia, ne eius augmentum talibus impediatur:
tunc enim animus bonis moribus & honestis ornan-
dus est disciplinis. XII. Animi mores corrumpuntur
malis consuetudinibus, ex cibis ac potibus & gymna-
siis, inspectionibus, auditionibus, & à mala musica.
XIII. Multi multis annis agrotantes, propter ma-
lam animi consuetudinem, contraria motuum ipsius
anima immoderatione curantur. XIII. Diligentia
multa studendum est, ne vllum animi immoderatum
motum, ad tertium annum vsque cum corpore par-
uuli patiantur: ea propter nutricem oportet esse pru-
dentem, & consuetudinis pueri expertam. XV. Ne-
cesse est calere corpus quod adolescit, & ad vires &
incrementum tendit: vice versa, illud supra modum
frigere, cum coeperit aboleri, & tanquam maturum
atque caducum in ruinam praeceps festinare. XVI. Vi-
num & cereuisia inimica sunt pueris: nam eorum
capita malo vapore replent, & calefaciendo mentem
eorum perturbant. XVII. Infantium dolores tribus
modis leuantur; nutritis papilla ori eorum apposita,
motuq; mediocri, & vocis modulamine. XVIII. Qui-
bus infantibus alius siccata est, hanc, quantum est
cicer vnum terebinthina, aut mellis vncia soluit.
XIX. Rubrus corallus infantium lactentium collo ap-
pensus ad os vsque ventriculi deueniens, lactis vomit-
um prohibet, roboratq; horum coctionem. Postea-
quam

suam in lacte nutriri (inquit Paulus) infantes desie-
 rint, liberiore eis modo & suo ingenio hilariter vive-
 re permittemus: exercitia autem & alimenta lenio-
 ra præscribentur. Ab anno sexto & septimo, tum pue-
 ri, tum puella, literatoribus blandis humanisq; tra-
 dentur. tales enim cum animi remissione & gratia
 locent. Animi autem remissio ad probam corporis
 ducationem plurimum adfert momenti. Duodeci-
 num annum egressi, ad grammaticos, & geometras
 mittendi sunt; corpusq; eorum exercere oportet. A
 quarto decimo usque ad primum & vigesimum, ma-
 thematicis disciplinis, & sapientiae studio incumbunt:
 exercitiis pluribus propter corporis robur credentur;
 ut & animo & corpore laborantes, à libidinis impetu
 coercantur. Hic etiam vinum circumcidendum est.
 Etate florentibus educatio absoluta tum animi tum
 corporis congruit, eoq; exercitiis omnibus, praesertim
 quibus quisque assuevit utendum, cibo item pleniore
 & valentiore. Declinantibus autem moderata com-
 petit animi & corporis educatio. Exercitia enim qua-
 cuq; fuerint pro horum ratione imminuere oportet:
 alimento detrahendum, ut quorum habitus iam
 frigescere incipiat. Sed hac de Regimine infantis, &
 etiam puerorum affectibus ac morbis, dicta sufficiunt;
 tum & de iis passim in nostris Observationibus dixe-
 rimus. Quod si quis pleniorum de puerorum morbis
 & symptomatis tum dignoscendis, tum curandis, do-
 ctrinam desideret, his adiungere poterit libellum il-
 lum Sebastiani Austrij Rubeaquerensis, De puerorum
 morbis. Nunc de Nutrice tam ex veteribus, quam
 Neotericis pauca adiciamus.

Ratio victus
 infantium
 atque reli-
 quarum de-
 ceps ætatum
 ad usque de-
 clinantes,
 ex Paulo
 lib. 1. cap. 14.

DE NVTRICE, VEL REGIMINE
NVTRICIS.

De nutrice
ex Mosch.
cap. 18. in
Parte 2.
Harmonia
gynæciord.

Paulus lib. 1.
cap. 1. de
nutrice.

Erotis de
pass. mulier.
cap. 19. de
electione
nutricis.

Vitanda nu-
trici ex
Paulo.

QVAenam sit ad nutriendum apta docet Mosch. nempe Adolescenta, quæ pulchra etiā sui corporis sit colore, & iam bis pepererit, & pectus latum habeat; ipsasq; mammas neque nimium laxas & rugosas, neque interim valde tensas papillas, neque multum graciles, neque valde breues, & quæ non multas cavernas habet: neque iterum parua & brevis, animosa, & quæ cum integro affectu puerum amare possit, & quæ nunquam irascatur, si fieri potest, grata & munda sit. Eodem modo & Paulus. Deligi nutrix debet nulli morbo obnoxia, ætate mediocris, ita ut iunior quinque & viginti annos compleuerit, grandior quinque & triginta non excedat: pectore sit amplo, magnis mammis, papillisq; neque conuiuentibus, neque auersis: reliquo corpore nec admodum obeso, nec nimium gracili. Præterea magnum est infanti commodum, si nutrix non multum antè pepererit, magisq; si masculum. Ita quoque Erotis: Iuuenem oportet esse nutricem, clarum colorem cum albedine & rubore permixtum habentem, quæ non sit partui vicina, neque multum à partu remota. Non sit maculosa: neque infirmas, neque nimis grossas habeat mamillas: pectus grossum & amplum: pinguis sit mediocriter. Vitanda ei sunt (inquit Paulus loco citato) admodum siccantia, salsa, acria, acerbæ, & validè calefacientia. Item odores tum fædi tum suaues præter modum, condimenta aliq; acria nocent. Ad hæc Venere nutrix abstineat: manus humerosq; molendo texendoq; exerceat:

erceat: puerum vlnu gestet, vbi tres iam menses qua-
 tuorve excesserit. Ita quoque Erotis: Non comedat Ex Erot.
 salis, nec acuta, nec stiptica, nec porros aut cepas,
 neque ceteras species qua admiscuntur cibariu pro sa-
 pore, vt piper, alliam, erucam: & precipue vitet al-
 lium, solitudinem, ac sibi à menstruorum prouoca-
 tione caueat. Qua vita agenda est nutritrix? Commu-
 niter sicut omnes homines vt sana esse possit. Exerce-
 ri ergo debet lauacro, vel perunctione corpus reficere, Ex Har-
mon. Gyna-
ciorum.
 cibumq; sufficienter sumere, semperq; ebriositatem
 & indigestionem vitare. Qua sunt exercitia qua
 manibus nutritrici fieri possunt? Exercere se debet nu-
 trix in aliquo opere, praesertim partibus supernis, vt
 lac plurimum & digestum habere valeat: & si fieri
 potest, ad virum suum non accedat, ne per vsum Ve-
 nereum purgatio se commoueat; qua superueniente,
 copiositas lactis exterminetur aut extinguatur. Pri-
 mis verò diebus quibus lactare incipit, simplicem ci-
 bum & leuem accipiat, & aquam bibat, ne solidum
 lac mox natis infantibus cum difficultate per angu-
 stos gutturi meatus descendat. Et cum paruuli, ac-
 cedentibus diebus & mensibus, solidantur, & fortio-
 res fiunt, iam etiam solidiorem & fortiozem cibum
 capere nutritrix incipiat. postea verò vinum sic vt &
 conditum subiungat. Et si ita per ordinem actum
 fuerit, vt docuimus, infans sine laesione & sine indi-
 gnatione saluus custodiri potest. Nam si nutritrix ebie-
 rati deseruiat, infans infirmabitur. Infans namq;
 separatus à matre non praeualet hac & his similia su-
 stinere. Sicut enim ramusculi, dum adhuc in eadem
 arbore consistunt, vnde nati sunt, sustinent tempe-
 states & ventos; separati verò ab arbore, inserti in

Paulus lib. 1.
cap. 3. de la-
cte nutricis.

Erotis.

Quomodo
lac vitiatum
corrigatur,
ex Paulo.

alia, non praevalent sustinere, quousque radicem in-
figant. At laudatissimum lac est, moderatum spissi-
tudine, copia, colore, odore, & gustu. Commenda-
tur & quod in vnguem pollicis instillatum, eo incli-
nato ad lucem, neque subito neque tarde videtur
defluere. Iam vero in hunc modum probari potest:
infuso lacti in vas vitreum, coaguli exiguum admisce-
tur, digitusq; agitur: in quo postquam concreuerit,
inspicietur, num casei portio minor quam serum fue-
rit. hoc enim lac inutile est: contrarium huic, conco-
ctu contumax: probatissimum, quod utraque habet
mediocria. Et si lac minuat (inquit Erotis) pulvis
de farina fabarum, & similiter risi, & de pane si-
mila cum lacte & sacch. facta dentur ei ad sorben-
dum: quibus augmentetur lac: in quarum decoctio-
ne parum de semine fœniculi admisceatur. Si autem
lac eius fuerit grossum, nutrimentum ipsius subtili-
andum erit; & ita etiam cogatur laborare. Cui in-
super dandus est syrupus acetosus, & vinum subtile.
Si vero lac eius fuerit subtile, nutrimenta sint grossa
& fortia, & somnis utatur longioribus. Quod si
venter pueri solutus sit, dentur nutrici quae consti-
pant. Quomodo lac vitiatum corrigatur docet etiam
Paulus lib. 1. cap. 4. his verbis: Lac vitiatum corrigi
debet. Si crassius fuerit, pituita vomitu elicietur, qui
optimè oxymelie epoto citatur: laboribus cibum prae-
cedentibus eadem extenuabitur. Tunc nimirum in
cibo conducunt, origanum, hyssopum, satureia, scan-
dix, & thymus, item radícula exigua, vetusq; sal-
samentum cum oxymelire. At si acrius tenuiusq; lac
euaserit, multis quidem laboribus nutricem leuare,
sorbitionibus autem & carnibus suillis, saepeq; & vini
dulcis

dulcis potu reficere conuenit. Si lac fuerit imminutum, sorbitionibus & pleniori modo sustendenda est; vinum dulce potui dabitur: pectus & mammillas perfricare oportet. Quibusdam cucurbitula quoque defixa abundè præsinit. Medicamenta verò etsi lacti generando proficere quidem aliquid sciam; non tamen frequenter ipsis vti præceperim, vt quæ violentius consumant. Est autem sceniculi radix, & semen prisanæ incocta; item cyrifi folia ex vino nigro aut prisanæ: melanthion dulce & anethum, pastinacæ radix atque semen. quæ calida prius irrorata, admouenda sunt. Omne verò lac vitiosum, siue crassum, siue acre fuerit, & fœtidum, puerum qui prius suxerit, eadem qualitate inficit. Lac autem acre nunquam ieiuno exhiberi debet, fœtorem eius vinum odoratum & cibi dulces emendare possunt. De caseato lacte ipse 3 lib. cap. de mammillis idem tractat. Quid est facien- Ex Harmon.
dum si nutricis lac fuerit exterminatum? Si hoc con- Gynæc.
tigerit, alterius mammillas accipiat: vel si non sit alia, illi cuius lac exterminatum sit, competenti diligentia procuocandum est; & si lapsus est, cibis & potionibus competentibus confortetur. Secundam authoritatem etiam antiquorum, vbera omnium pecorum manducata, sicut vespertilionum etiam combustorum cineres, & noctuæ cum vino bibere dabant, vel cum aqua soluta mammis illinebant. Quæ nos omnia reprobamus: importunitas enim hæc stomachum exterminat, & cibum corrumpit. Illis verò quæ plus quàm debent lac habent, fortioribus exercitiis & laboribus, & stipticis rebus minuatur. Si verò spissum est, accipiat cibum digestibilem, & qui modicè nutrire possit, neque siccus sit; aquam bibat; & quotidiana

no lauacro vtatur. Nam & nutriti cibos falsos accipere non permittimus, quoniam paruulum corrumpunt, & lac & vires infantis minuunt. Nutrix verò cibos bonos & succos, qui facile digeruntur, accipiat. Portiones, quæ stomachum custodire valeant, & lac augere, bibat. Illam verò quæ aquosum lac habet, rarius oportet lauare; & vinum bibat, & cibum accipiat solidum, sicut sunt pultes duræ, oua elixa, frixa; & porcina caprinæve carne vtatur. A somno expergesactam, quid facere oportet nutricem? Deambulare modicè, mammæ fricare, vt lac quod somnus constrinxit, solvatur; & sic infans applicetur. Subinde (vti diximus antea De regimine infantis) maternum lac potius sugat: quippe quod alimonia, qua dum in vtero infans erat, alebatur, perquam simile existat: muliebria namq; in vbera delata concoctione lactescunt, & ob id eidem vel maxime conueniens: quod etiamnum quotidiano experimento compertum est, propterea quod maternis mammillis puerperi ori admotis, alliceatur, ac deniq; quæq; eidem officerent, arceantur. Etenim à partu purgationibusq; lactis copia excitatur; adeo vt pleriq; non modo de papillis, sed & passim per vbera, aliquibus etiam per alas, effluat: in posterum quoque quoties nec concoquatur neque exeat, sed redundet supra modum succus, globuli obdurescunt intumescuntq; quas murinum finum aqua pluuiæ dilutum, reficit. Eisdem à partu adeps anseris cum rosaceo & araneo, custodit. Mammis puerperis vexatis, otidum adipem vtilem esse inuentum est. Anserino adipe mammis perunctis, dolores mulceri existimant. At vbi lactis putrescentis vbertate atque affluentia mamilla rubore

Maternum
lac præfer-
tur ex Bo-
naciolo.

ore suffusa obduruerint inflammanturq³, quod die
tertio omnibus maxima ex parte obuenit; muricum
vel purpura testarum cinis cum melle efficaciter sa-
nat. Atque aduersum eas quæ eam fortunam inci-
derint, plerique Medici se medicos non inueniunt.
Ego (inquit Bonaciolus) certè scio (pace ac venia
dicere liceat) rarò quampiàm, quæ se illis credidisset,
huic pesti ereptam. Verùm ita nos eius curationem
iis quæ infrà perscripta sunt intra quartum diem ex-
pediuimus: Abrotani, menthae, apij, añ. m. j. psillij,
acacie, gallarum, añ. ʒj. cumini ʒß. rad. alth. m. ij.
castorij ʒß. sem. lini ʒij. rad. brassicæ rubrae vsla-
tum ʒxiij. cancerorum fluuiatilium exustorum toti-
dem: hæc cum in aqua menthae quod sufficit subfer-
buerint, donec pars tertia decesserit, mammae sepius
foucantur. Mox à somento emplastro tali illinan-
tur: Acacie ʒij. cyclaminis ʒj. mucilag. sem. lini,
psillij añ. ʒj. ex succo apij quod sufficit, emplastrum
molle confice. Subinde, tempore procedente, sanda-
racha, myrrhaq³ adicienda sunt, sandaracha præ-
ponderante: quæ si mammæ obdurent, fetu florum
maluarum ac radicum althææ ex aqua fontium ad
tertiâs decoctarum præstanter succurritur. Hercules
à partu ob dictas causas duritiâ iis accidere in con-
fesso est. Quandoquidem vbera tota fungosa exsistunt:
adeò ut si casu aliquo pilum mulier poculo hauerit,
dolor in mammis (quod malum pilare vocitant) ni-
mirum moueatur: neque aptius sedatur, donec vel
sponte, vel mulëtra pressus pilus egrediatur. Cancrî
etiârum fluuiatiles illiti, vel marini, pilos in max-
ima, vel muricum carnes appositæ tollunt. Sed quo-
niam natura non ita fert, ut succus idem pluribus vnâ

locis erumpere possit, hinc quàm diu è mammis lac emanauerit, magna ex parte menstrua purgationes astringantur, assidue dixerim, haud perpetuo, quando & iam quibusdam lactantibus (vt nos ipsi nouimus) muliebria proruperint. Lac autem donec mulier conceperit asseruari, tum autem desinere atque aboleri, tam in homine, quàm in quadrupedum viuiparo genere, inclaret. Quanquam feminis partum alentibus, si ex eodem viro rursus conceperint, lac minime corrumpi, Nigidius author est. At si quid (utpote quia lac integrum non sit, aut quia parens vieta, languida, aut nobilis, admodumq; delicosa sit,) matrem puerulum lactare inhibuerit, nutrix eligenda, cuius etas inter viginti quinque & triginta quinque annos: sit viuidi coloris, fortis ac robusti colli, pectorosa, musculosa, dura ac multa carnis, non obesa, non gracilis: cuius etiam mammae solidae ac firmæ sint, mediam magnitudinem modicamq; duritudinem obtinentes. [Noui & ego nutrices, quæ magnas mammas habebant, & valde somnolentæ erant, cumq; noctu lactarent infantes, ac statim somniculose dormirent, eos oppressere, ac suffocationis causam procul dubio dedere. Ideo præstat nutricem, postquam infanti lac exhibitum fuit, eundem in cunabulis ponere.] Sit autem iisdem lac plurimum, odoratum, candidum, perdulce, equabile, neque admodum crassum, neque tenue; cuius super vitreum umbonem rectè probatio fit, si neque prorsus fluat, neque umbone reclinato omnino constet: aut si in vasculo illius portio emulgeatur, myrrha tantillo adiecto, sero pariter atque casco pars aqua detur. Probatisimum etiam si in vngue hæreat, nec defluat, at-

que

que quod à partu quadraginta & quinque, sexaginta ve solibus abscesserit. Si marem iusto partu illa pepererit, neque abortiri assueta. Si laudatorum motum extiterit, quæ neque acutissime anima passionibus afficiatur, neque penitus obtusi sensus aut stolidi sit: quæ lactare prohibent. Quæ nihilominus admonenda est, ne concumbat, ut probatis cibariis vescatur: ut quaque vice aut lactationem partui mellis paucillum ex paucis vino lingendum tribuat: item ut lactis quicquam mulgeat, ut mammula pressione puerperij suctionem inueniat, ne forte vehementi suctu, & gula instrumenta oblectantur, & malarum ossa luxentur, quod sæpius contingit: ut singulis lactationibus non vberem lactis copiam, sed parcam exhibeat. Quod si defuerit, remedia adhibenda sunt. Nam suillum lac potum deficientia puerperarum vbera mirè replet. Asininus lien inueteratus ex aqua illitus mammis abundantiam præstat. Terreni vermes cum mulso poti lac deuocant; atque perdiciis oua sorptui data mulieribus. Glauciscus è iure sumtus, & smarides cum ptisana sumpta, vel cum feniculo decoctæ, lactis copiam faciunt. Item cancri cum lapatho & apio in iure cocti vbertatem præstant. Iis itaque obseruatis, puerulus & bene habebit, & commodè lactabit. Hactenus Bonacius. Et ita ex præcedentibus authoribus, quibus modis nutrix regenda sit, constat.

ABSOLVTO igitur hoc libro Vigesimo octavo de mulierum affectibus, superest adhuc liber Vigésimus nonus, de extremis quibusdam partibus corporis; ut ita earum morbos & causas accuratius pariter tractemus. Transibimus itaque ad sanandas podagras & chiragras, & articulorum dolores, gravissimos plerumque morbos; quiq; nonnullis sepe ut peculiare adherent. Ita tota cyclopadia nostrarum Observationum de morbis precipue ad Medicum spectantibus absolvasur.

FINIS LIBRI XXVIII.

CATALOGVS OBSERVATIONVM MEDICINALIVM,

quæ in hoc libro vigesimo octauo
continentur.

*Primus numerus notat Observationem;
Secundus paginam.*

- | | | |
|-------|--|-----|
| I. | O BSE RVATIO, de mensibus seu men-
struis purgationibus retentis. pag. 1. | |
| II. | De menstrua purgatione subito retenta. | 13. |
| III. | De mensium suppressione, sanguine ad alias
partes delato. | 20. |
| IIII. | De suppressione mensium, plenitudinis ra-
tione. | 27. |
| V. | De medico imperito, qui menses nitebatur
euocare in puella planè extenuata. | 35. |
| VI. | De puella ex sola refrigeratione vel nuda in-
temperie frigida menses restrictos habente:
& de altera muliere mensium suppressione
laborante à succo pituitoso ora venarum
uteri obstruente. | 42. |
| VII. | De vidua longo tempore menses suppressos
habente ex pituitosiore sanguine. | 50. |
| VIII. | De muliere vtcunque biliosa, ex bilioso sanguine
menses detentos habente. | 56. |
| IX. | De menstrua purgatione retenta ex melancholia. | 60. |
| X. | De muliere ex longo mensium profluuiio laborante. | 65. |
| XI. | De superfluo mensium profluuiio cum insigni
virtutis debilitate. | 72. |
| XII. | De insigni menstrua purgatione ex abortu
lethali. | 79. |
| XIII. | De superflua menstrua purgatione ex anastomosi. | 83. |
| | | De |

- xiiii. De mensibus superflue fluentibus ex aperitione vasorum. 91.
- xv. De purgatione menstrua ultra nouem menses perdurante lethali ex refectione vasorum vteri. 95.
- xvi. De mensium profluuiio venis vteri perruptis, ex graui pondere subleuato. 98.
- xvii. De menstrua superflua euacuatione ab arrosione. 102.
- xviii. De immodico mensium fluore ob sanguinis tenuitatem, caliditatem & acrimoniam. 107.
- xix. De fluore muliebri, aut menstruis albis. 113.
- xx. De menstruis albis per modum consultationis. 117.
- xxi. De fluore muliebri, post naturalem mensium purgationem. 128.
- xxii. De profluuiio muliebri in muliere admodum biliosa. 136.
- xxiii. De fluore muliebri aquoso & pituitoso. 140.
- xxiiii. De muliere laborante Gonorrhoea. 148.
- xxv. De vteri suffocatione in vidua ex semine retento. 151.
- xxvi. De vteri praefocatione, partim ex menstruis retentis, partim ex semine intus remanente. 158.
- xxvii. De muliere praefocata & pro mortua habita, tandem ad vitam restituta. 168.
- xxviii. De muliere, quae ex ira frequenter praefocationem vteri patiebatur. 176.
- xxix. De praefocatione vteri ex semine retento lethali. 185.
- xxx. De praefocatione vteri in praegnante, & de altera in ipso partu eueniente. 187.
- xxxi. De vteri suffocatione post menses fluentes orta. 189.
- xxxii. De vteri suffocatione ex semine retento. 198.
- xxxiii. De vteri vehementissima praefocatione ex semine retento. 205.
- xxxiiii. De vteri praefocatione ex menstruis retentis. 209.
- De

xxxv.	De vteri procidentia, per modum Consultationis.	213.
xxxvi.	De quibusdam vteri præcipitatione laborantibus.	226.
xxxvii.	De vteri stillicidio cum imbecillitate & intemperie frigida & humida eiusdem.	232.
xxxviii.	De spiritu in vtero collecto cum grauissimo dolore.	234.
xxxix.	De vteri inflatione cum insigni dolore post abortum oborta.	238.
xl.	De intenso vteri dolore.	241.
xli.	De vteri inflammatione.	244.
xlii.	De inflammatione seu apostemate vteri calido.	251.
xliiii.	De oris vteri inflammatione.	260.
xliiiii.	De apostemate vteri frigido in abscessum transmutato.	269.
xlv.	De vteri scirrho.	276.
xlvi.	De vteri cancro ulcerato & lethali.	283.
xlvii.	De cancro vteri.	287.
xlviii.	De ulcere matricis.	295.
xlix.	De antiquo vteri ulcere & lethali.	305.
l.	De pruritu vulvæ.	309.
li.	De vulvæ excoriatione.	312.
lii.	De vteri rhagadibus ac fissuris.	314.
liii.	De condylomatibus vteri.	316.
liiii.	De fycosi vteri.	319.
lv.	De vtero imperforato.	323.
lvi.	De puella ab Hernia inguinali si nupserit, num sterilis sit futura, per modum Consultationis.	326.
lvii.	Num vir aut mulier sterilis sit, per modum Consultationis.	337.
lviii.	De difficultate imprægnationis in duabus mulieribus: vna pituitosa, altera biliosa.	352.
lix.	De dubia cõceptione vel imprægnatione.	364.
lx.	De vteri mola.	375.
lxi.	De mola reiecta, quasi oculos multos habente: & de aliis diuersa forma.	383.
	De	

- LXII. De Mola instar accipitris caput rostratum habente, eiecta. 397.
 LXIII. De mola post fœtum perfectum reiecta. 406.
 LXIII. De mola, aut sanguine crassiore, quem hydrops subsequatur, deinde mors. 416.
 LXV. De cissa, pica, malacia prænantium. 447.
 LXVI. De muliere quinto mense menstruas purgationes habente grauida, in qua metus erat de abortu per modum consultationis. 457.
 LXVII. De prægnante vomitum enormem habente, unde abortus metuebatur: & de Altera alui profluuiò laborante. 466.
 LXVIII. De fœtu mortuo cum intensissimo dolore ventris inferioris cum straguria & dysuria. 472.
 LXIX. De partu facilitando in nobili Domina etiam ictero laborante. 480.
 LXX. De partu difficili ex magnitudine fœtus. 482.
 LXXI. De partus difficultate ob innaturalẽ positionem fœtus ac humore elapso. 490.
 LXXII. De partu valde periculoso: & de primipara ex primo partu moriente. 497.
 LXXIII. De quibusdam mulieribus in partu periclitantibus & egregiè liberatis. 500.
 LXXIII. De muliere obesa in hieme difficulter pariente. 508.
 LXXV. De partu difficili ob geminos. 514.
 LXXVI. De quibusdam mulieribus, quæ ob mortuos infantes ex difficili partu laborarunt. 522.
 LXXVII. De muliere fœtum corruptum paulatim exonerante. 529.
 LXXVIII. De muliere ex partu mortuo simul occumbente: & de altera viua permanente. 534.
 LXXIX. De secunda relicta. 539.
 LXXX. De secunda relicta in quibusdã puerperis, & quibus medicamētis ab ea liberatę sint. 544.
 LXXXI. De dolore post partum eueniente. 561.
 LXXXII. De quibusdam symptomatibus puerperis euenientibus. 565.
 De regimine infantis. 560.
 De Nutrice seu regimine Nutricis. 580.

ERRATA.

Pag. 3. linea 10. ana. ij. lege ana. m. j. 7. 6. abnre
 eg. uti. 9. 10. sanguini leg. sanguinis. 9. 17. canillo
 eg. alij. 17. 12. duritia leg. durities. 18. 16. imper-
 orata leg. imperforata. 55. 9. oreofelini leg. petrose-
 vi. 57. 14. R. acetosi, leg. syrup. acetos. 84. 3.
 lunia leg. plunial. 138. 5. medicum Amsterda. leg.
 medici Amsterdamensis. 164. 3. pulsus leg. pulsus.
 27. 8. ana. 3 vj. leg. 3 vj. 236. 16. tumefactio sequi-
 ur leg. tumefactio. 254. 5. annexo leg. annexus.
 61. 10. cibo leg. cibi. 261. ultima. composita leg. compo-
 tum. 267. 2. contrario leg. contrarium. 272. 13. exhibi-
 us leg. exhibita. 348. 2. ferilis leg. sterilis. 407. 6. instar.
 eg. instar. 407. 26. Leydius leg. Heydius. 474. 16. C.
 g. 2. 545. 1. 3 ij. artemisia leg. 3 ij decoctionis artemi-
 e. 549. 27. vel leg. C. 580. 2. adolescenta lege ado-
 lescensula.

pp

NOMI

NOMINA AVCTORVM

*quorum testimonia
in hoc*

VICESIMO OCTAVO LIBRO

De mulierum morbis,
citantur.

A ETIVS.	Empedocles.
Alcomarus.	Ericius, siue, Heydius.
Amatus Lusitanus.	Erotis.
Apuleius.	Fernelius.
Archigenes.	Florentiola.
Aristoteles.	Fontanonus.
Artius.	Fuchsius.
Aspasia.	Galenus.
Auicenna.	Gassarus.
Azuranius.	Gatenaria.
Bayrus.	Gemma.
Barsdorpius.	Gellius.
Benedictus Fauentinus.	Gilbertus Anglicus.
Benedictus Veronensis.	Gordonius.
Benedictus Victorius.	Gradus.
Bertrutius.	Guainerius.
Bettus.	Hertogius.
Bonaciolus.	Heurnius.
Capella.	Hippocrates.
Cleopatra.	Hollerius.
Cronenburchius.	Hollerij interpres.
Dioscorides.	Horstius.
Dodonaeus.	Iacchi n s.
Elidens Bononiensis.	Ioannes de Boys.
	Leonellus

ORV
 Leonellus Fauentinus.
 Amherchius.
 Martbifius.
 Montagnana.
 Montanus.
 Moschio.
 Niculus Florentinus.
 Nieuuenius.
 Nigidius.
 Paulus Agineta.
 Philagrins.
 Plinius.

Rbasif.
 Rocheus.
 Rondeletius.
 Ruffus.
 Sauonarola.
 Sebast. Austrius.
 Silaius.
 Soranus.
 Tiengius.
 Valeriola.
 Valefcus de Taranta.

Pp 2 RERVV

RERVM AC LOCORVM MEMORABILIVM ET

INSIGNIVM QVÆ IN HOC

xxviii. libro de Mulierum
morbis continentur,

INDEX COPIOSISSIMVS.

Numerus paginam notat.

- A.
- A**ORTVS causæ variæ 456. 457.
458. 465. 468.
Abortus ab immensitate partus.
464. à nidore candelæ extin-
ctæ. 452.
Abortus differentię à corruptio-
ne, effusione & eiectione. 458.
Abortus signa. 459. prognosti-
ca. 462. differentia à partu na-
turali. 485.
Abscessus quomodo rumpendus.
275.
Aegidij versus de procreatione
hominis in utero. 369.
Agarici drachma vna sumta vteri
strangulatum persanat. 208.
Agrestes mulieres profluuium mu-
liebri raro detineri. 127.
Alcmariana mulier empiricorum
opera in erosione & ulcere vte-
ri vsa in cachexiam prolapsa.
105.
Alcmariana puella naturalibus
clausis nata quomodo curata.
323.
Amat. Lusit. 541.
Amati Lusitani consilium super
mola in monacha. 397.
Amati Lusitani historia curatio-
nis prolapsus vterini. 237.
Amati Lusitani opinio de missio-
ne sanguinis è cubito in reten-
tis mensibus ex plenitudine. 31
Ambra & moschus gestata inui-
tant ad venerem. 359.
Amom. membrana. 540.
Amomosis, diapedesis, diuresis,
arroso quomodo differant. 70.
71.
Anerthum molam eiicit. 386.
Animæ creatio à Deo; sed quo
tempore infundatur, furor ac
stultia est inquirere. 370.
Anus & vulua vi fortis vnum
foramen facta. 524.
Aphorismi aliquot de infantium
bona valetudine tuenda. 577.
Apostemata vuluæ quomodo tra-
ctanda. 274.
Aquisgrani balnea. 445.
Aquosa materia quomodo per
nucham descendat ad vterum.
116.
Aromata non rectè adhiberi na-
ribus in suffocatione vteri. 151.
Asininum lac fluorem rubrum sa-
nat. 135.
Asininum stercus proprietate san-
guinem constringit. 99.
Auctoris literæ ad Pensionarium
Delphensem. 442.
Auctoris vxor menstruorum pro-
fluuium ex apertione vasorum
laborans. 91.
Auraci Principis vxor ex florum
odore in vterinum malum in-
currit. 193.
Autumni tempore cur mulieres
magis obnoxie vteri præfocatio-
ni. 163.
- B.
- B**ALNEA Aquisgrani. 445.
Balnea Caldariana. 228.
Balneum ad fluorem album. 147.
Balneum

- alnei pro cedemate cruris. 437.
 atauæ mulieres munditiei dedi-
 ta. 14.
 ayri ceratum ad vteri prociden-
 tiam. 230.
 benedicti Veronenſis historia de
 muliere hysterica. 160. eius-
 dem historia de foetu mortuo
 extracto. 532. de duabus lu-
 daïs apostemate vteri laboran-
 tibus. 253.
 eniuenij historia de muliere quæ
 decennio sine vtero superuixit.
 222.
 etti historia de mola edita anno
 MDXXXVII. 532.
 oethi vxoris curatio per Gale-
 num. 119. 120.
 oethi liberalitas erga Gale-
 num. 145.
 rutorum famellæ cur molam
 non concipiant. 392.

C.
 ALDARIANA balnea. 228.
 Callus in quo differat à scir-
 rho. 278.
 Canceri cura palliativa. 294.
 Canceri ulcerati & non ulcerati
 signa. 285.
 Canceri vterini differentia ab in-
 flammatione. 286.
 Candelæ extinctæ odor abortus
 causa. 452.
 Caprarum stercore cinis cum
 aqua pluuiali haustus sangui-
 nis ex vtero impetum sistit. 99.
 Ceratum Bayri ad procidentiam
 vteri. 230.
 Cereuisia Gedana mulier Alc-
 mariana ab hydropse liberatur.
 113.
 Chamæmeli florum decoctum in-
 signe ad dolores relictos à par-
 tu. 516.
 Citta, pica, malacia. 447. 448.
 quando incipit. 448.
 Claretum ad facilitandum par-
 tum. 414.
 Conceptio. 368. 369.
 Conceptio an fieri possit absque
 delectatione in coitu. 333.
 Conceptio dubia quomodo in-
 uestiganda. 364.
 Conceptio quomodo procuran-
 da. 354.
 Conceptionis aut imprægnatio-
 nis signa, eaque diligenter me-
 dico inuestiganda. 367. 368. 372.
 Conceptioni aduersatur corporis
 exsiccatio. 38.
 Conceptionis tempus idoneum
 incipientibus aut cessantibus
 mensibus. 7. 336.
 Conceptionem comitantium va-
 riorum accidentium curatio-
 nes. 449.
 Cornelij Gemmæ epistola. 421.
 Corui ouum grauidis fugiendum.
 464.
 Cucurbita radicibus mammarum
 in profuuiis menstruorum affi-
 genda. 88.

D.
 DELPHENSIS mulier octies ab-
 orsum passa. 117.
 cum Dentibus qui nati sint, &
 quid hoc portendat. 571.
 Dentitionem in pueris quæ adiu-
 uent. 573.
 Diapedesin minus periculosam
 anastomosi.
 Diogenis Cynici sordidum fa-
 ctum. 153.
 Diuretica per accidens menses
 euecare. 49.
 Diuretica quomodo differant à
 cientibus menstrua. 48.
 Dodonæi historia de muliere quæ
 tredecim annis in vtero gesta-
 uit foetum mortuum. 477.
 Doloribus à partu relictis opti-
 mē mederi decoctum florum
 chamæmeli. 516.
 ad Dolores post partum quæ con-
 ferant. 568.
 Domina cui sanguinis ex ruptura
 venarum vteri fluxus restringi
 non potuit. 71.

E.
 ELIDEI medici arcanum in-
 signe contra fluxum immodi-
 cum mensium. 66.
 Elizabetha Daciæ regina. 416.
 Embryo. 369.
 Empedocles secundam interiorem
 animam vocauit. 540.
 Empiricus quidam in extenuata
 menses ciere studet. 35.
 Emplastrum ad fluxum album. 147.
 Equinum simum è vino exhibi-
 tum secundam expellere. 547.

F.
 FERNELII historia de muliere
 vteri hydropse laborante. 379.
 Pp 3 Finis

Fimum equinum secundam expellere, diuino exhibitum. 547.
Fluor albus aut muliebris quid & unde 114. 115. quomodo a profuuiis menstruorum differat. 122. quomodo differat a gonorrhœa 124. copiosus est si fiat a vitio viscerum, patior si vteri. 126.
Fluoris muliebris causarum signa. 125.
Pro Fluore muliebri sanando secretum præceptoris Auctoris. 137.
Fluor muliebris abortus in puella octo annorum. 126.
Fluor muliebris rarissime puellis contingit. 126.
Fluori albo commodum balneum, suffumigium & emplastrum. 147.
Fluxus criticus non sistendus. 82.
Fœcundæ feminae qualis esse forma debeat. 336.
Fœcunditatis exploratio. 339.
Fœcunditas ab æqualitate temperamentis & naturæ. 332.
Fœminæ purgantur quadrato. Luna motu pro ætate. 4.
Fœtui unde alimentum. 541.
Fœtus proceri causæ. 488.
Fœtus septimestris cur vitalis esse possit, non octimestris. 372.
Fœtus mortuus tredecim annis in utero gestatus. 447.
Fœtus mortuus quomodo extrahendus. 536.
Fœtus mortui inuestigatio. 336.
Fœtum mortuum educentia. 528.
Fœtum mortuorum gestationis exempla. 477.
Fœtus motus quando sentitur. 532.

G.

GABBARA procerus. 489.
Galenus historia de præfatione muliebri. 182.
Gatenariæ historia de vipera per anum expulsa fumo corij combustis. 161.
Gemelli. 374.
Gonorrhœa quid, & quomodo curetur. 148. 149.
Gonorrhœam confundi cum exulceratione pudendorum. 150.
Gradi historia, quomodo ipse deceptus sit falsa imprægnatione suæ uxoris. 401.
Gradi historia de muliere absque

matrice Papiæ viuentis. 222.
Gradi historia de Medico quibrevi molam se curaturum promittebat. 385.

H.

HÆTICA febris mulieri biliosa menstruorum profuuiis laboranti superueniens. 97.
Hippocrates altera rebus humanis a Deo data lux. 369.
Hydrops singulis mensibus per uterum expurgatus. 116.

I.

IACCHINVS decocto ligni Indici & dictamni mulieri toto quinquennio non purgatæ & sterili menses euocauit. 5.
Imaginatrix facultas moderatrix formæ. 377.
Imprægnatio. 369.
Infantis regimen ex Erote. 560.
Infans quo tempore mouetur. 370.
Infantem ante 40. diem ridere. ominosum. 570.
Infusus ad sistenda menstrua. 109.
Ioannes Capella medicus Francisci Regis. 9.
Ioannes de Boys pharmacopœus Parisiensis. 199.
Ioannis Matthij Medici epistola. 428.
Ioannis Tiengij vxor a fluore muliebri per ipsum curata. 138.
Italas mulieres pessime viuere, & optime vestiri. 380.
Ius restaurans & simul aluum subducens in puerpera. 556.

L.

LAC colligi crescente Luna. 2.
Lac probatum in nutrice. 587.
Lastucam menses prouocare quomodo intelligendum. 50.
Leporis coagulum cum acetopetum ad profuuium muliebri. 135.
Leporis vulua in cibo assumpta conceptum accelerat. 355.
Literæ Auctoris ad Cripium Pens. Delph. 442.

M.

MARES an in dextra, facellæ in sinistra vteri parte concipiantur. 374.
Mariz

I N D E X.

- Mariae Sanfeuerinae Comitissae Nola mirabilis vxina. 23.
 Medico non esse turpe loqui de partibus naturalibus. 361.
 Melissa conserua ad palpitatio- nem cordis. 449.
 Mensis Lunaris. 371.
 Menstrua cur Flores & Tempo- ra vulgò dicantur. 20.
 Menstrua moueri decrecente Lu- na. 9.
 Menstrua quâdo fluere incipiant, quando desinant. 8.
 Menstrua per oseieâa. 21.
 Menstrua purgatio cur quibus- dam citius, quibusdam tardius procedat. 8.
 Menstrua purgatio in prægnanti- bus à quarto ad septimu men- sem tuta. 470.
 Menstrua purgatio qua mensura in muliere sana. 80.
 Menstrua purgatio quibus ante xiv. annum non procedat. 11.
 Menstruas purgationes frustra sæpe prouocari. 37.
 Menstrua quæ ducunt quomodo à diureticis differant. 48.
 Menstrua quomodo prouocanda post partum in febricitante. 565.
 Menstruis euocandis sanguinem tribus diebus ante tempus pur- gationis solitū mitti debere. 30.
 Menstrua retenta aut etiam ni- mium fluentia hydropis causa. 30.
 Menstruorum fluxus æstimandus pro quantitate & qualitate. 81.
 Menstruorum retentionem impe- dire conceptionem. 364.
 Menstruorum profluuium quid propriè. 68.
 Menstruorū profluuij signa præ- sagientia 75. demonstratiua. 76. 78.
 Menstruorum profluuij in anæ- stomosi curatio. 87.
 Menstruorum profluuium cura- tum quomodo. 112.
 Menstruorum profluuium expi- tuita. 143.
 Menstruorum profluuium quod sequitur abortum periculosius quàm quod fit à fortu gran- diori. 80.
 Menstruorum profluuium obnoxia mulieres vegetæ. 126.
 Menstruorum profluuium per anæ- stomosin quæ conueniant. 89.
 Menstruorum profluuium sistendò experimentum muliercularum 100. 101.
 ad Menstruorum profluuium in- signe secretum Elidei. 66.
 in Menstruorum profluuium non tutò vtédum localibus in prin- cipio. 128.
 in Menstruorum profluuium cu- curbita affigenda radicibus mammarum. 88.
 in Menstruorum profluuium an in- guina vinciri debeant. 88.
 Menstruorum suppressionis cau- sa. 16. 17. 25.
 Menstruorū suppressionis signum. 22.
 Menstruorum suppressorum pro- gnostica. 26.
 Menstruorum suppressioni tem- pestiue succurrendum. 27.
 Menstruorū suppressio an omnis ab utero. 116.
 Menstruorum suppressionis ob- pinguedinem, curatio. 39. ob sanguinem biliosum. 58.
 Mola uterique. 375. 377. 380. 382.
 Mola diuersimodè à barbaris Me- dicis nominata & descripta. 379.
 Molæ variaz species. 377.
 Molæ causa in facultate forma- trice posita. 376.
 Molæ quæ causa materialis. 393.
 Molæ distinctiua signa à vera conceptione, ceterisque simi- libus affectibus. 400. 404. pro- gnostica. 405.
 Molæ curatio. 409. 414.
 Mola quot modis generetur. 396.
 Molam cur nulla præter homi- nem animalia gignant. 392.
 Mola non nisi concumbentibus mulieribus contingit. 392.
 Mola pluribus oculis plena. 387.
 Monacha quæ per os menstrua euomebat. 21.
 Monstrosi partus. 493.
 Mulier cur partes naturales gi- gnendi intus habeat. 6.
 Mulier quomodo tractanda si de conceptione dubitetur. 364.
 Murium stercus mammæ indu- ratas rescere. 184.
 Murium stercus venerem stimu- lat. 356.

Narium

N.

NARIVM venæ incisæ menses retrahunt. 88.
 Nati mense decimo vel vndecimo qui. 398.
 Natura vniuscuiusque propria à Medico exploranda. 204.
 Nepita menses prouocat. 54.
 Nonagenarius prolem suscipit. 332.
 Nutricis regimen. 380.

O.

OBSTETRIX qualis esse debeat, & quomodo se gerere debeat. 502. 504. 548.
 Obstetrices culpatae. 522.
 Obstetrices consilium abhorrendum pro muliere grauida. 366.
 Obstetricis sella. 503.
 Opiatae variae contra sterilitatem pro varietate causarum. 358. 359.
 Opium suspectum remedium. 288.
 Oitruj radix liberat ab vteri praefocatione. 203.
 Ouum foetidum mirifice conferre ad procidentiam vuluæ. 229.

P.

PAGVS prouinciæ in quo pleræque mulieres vteri procidentia laborantes nihilominus concipiunt. 223.
 Parere posse mulierem post decimum & vndecimum mensem. 397.
 Partientibusque obseruanda. 506.
 Parturientium dolor quomodo differat ab inflammatione vteri. 495.
 Partus naturalis quis, & quis in naturalis. 487.
 Partus naturalis quando & quomodo fiat. 485.
 Partus naturalis differentia ab abortu. 485.
 Partus quomodo facilitandus in mulieri pingui. 509.
 Partum facilitantia. 414. 481. 507.
 ad Partum bonum opus est vigore duorum corporum. 500.
 Partus xxx. diebus integrè conformatur. 533.
 Partus difficilis causa. 492. 505. curationes. 510. 511. 513. 517. 522.

Partus difficilis signa. 495. prognostica. 498.
 Partus difficilis mulieribus quarum viri latos habent humeros. 483.
 Partus difficultas quale symptoma. 487.
 Partus granditas causa abortus. 464.
 Partus monstrosi. 493.
 Partus numerosi. 464.
 Partum subsequantium variorum accidentium curationes. 599.
 ad dolores post Partum quæ conferant. 563.
 Passerum cerebella iuuant conceptum. 359.
 Pastinacæ erraticæ folia & semen conceptum adiuuant. 355.
 Perdici plumæ ad vteri praefocationem. 202.
 Pessi ad inflammationem vteri. 265.
 Pessi ad molam seu grumum sanguinis. 439.
 Pessus ad conceptionem. 355.
 Pessus ad sistendos menses. 109.
 Pilulæ ad molam educendam. 413.
 Pilulæ de bdellio Rondeletij. 146.
 Plato vim olfaciendi vtero tribuit. 152.
 Portulaca ad profluuium menstruum. 134.
 Praefocata ante tertium diem non sunt sepeliendæ. 186.
 Praefocata à semine paratissima ad imprægnationem. 185.
 Prægnanti quæ ratio vitæ instituenda. 452.
 Prægnantibus quando contingat fauidium. 494.
 Prægnantium error in computatione mensium. 403.
 Prægnantium symptomata. 448.
 Præsidis Hollandiæ Corn. Sufij vxori grauidæ sanguinem ex vtero fluxisse sine abortu. 12.
 Pudendorum exulceratione confundi cum gonorrhœa. 150.
 Puella nouennis vterum gestans. 9.
 Puerpera quomodo se regere debeat. 564.
 Puerpera quot diebus se in lecto continere debeat. 565.
 Pulegium menses prouocat. 54.
 Puluis ad vteri suffocationem. 561.

Puluis

I N D E X.

Pulvis dominarum ad euocandos menses. 15.
 Pulvis faciliens partum. 501.
 Pulvis fœminarum Delphensium ad præfocationem vteri. 204.
 Pulvis in febre ad purgationem in partu. 408.
 Pulvis insignis ad fluorem album. 142.
 Pulvis matricis. 206.
 Pygmæi in extremis Indiæ finibus. 289.

R.

RHOTOMAGENSIS Prædis filix ridere solitæ ante vteri præfocationem. 160.
 Ritus infantis ante diem 40. omni-nosus. 570.
 Rondeletij historia de puero frustulim reiecto. 549.
 Rustica venam sibi incidî impetrans fluentibus mensibus. 20.
 Ruta molam elicit. 386.

S.

SANGVINIS fluxum quæ sistant. 98.
 Sanguinis impetus non confestim localibus reprimendus. 54.
 Sanguinis per vterum immodici fluxus differentia. 69.
 Sanguinis profluvio post abortum mulier extincta. 79.
 Saniei à semine differentia in fluxu. 150.
 Scarificationes crurum conferunt ad suppressa menstrua in corporib. albis & pituitosis. 4.
 Scire omnia nemo potest. 404.
 Scirrhus in quo differat à callo. 278.
 Secunda vnde dicta. 542.
 Secundarum interior ab Empedocle Anima dicta. 549.
 Secunda relicta quomodo extrahenda. 539.
 Secundinæ retentæ causa. 542.
 curatio. 543-549.
 in Secundinæ retentione quæ pars afficiatur. 542.
 à Secunda relicta quomodo ali-quæ euaserint. 546.
 pro Secundina depellenda secretum. 103.
 ad Secundam repellendam secreta muliercularum. 547.
 Secunda quomodo extrahenda. 548.

in Secundæ retentione prognostica. 542.
 Sella obstetricis. 503.
 Semen maris cum semine fœminæ necessario misceri ad generationem. 329.
 Semen non putrescere in vasis. 172.
 Siriasis quid. 575.
 Spadanius fons acidus. 441.
 Spiritus erumpere ex pudendo. 235.

Sterilitas quid. 330.
 Sterilitatis causa. 331. chratio. 350-360.
 Sterilitatis causarum signa. 343.
 Sterilitas in biliosa quomodo amouenda. 355.
 Sterilitatis accidentia varia, & eorundem curatio. 362.
 Sterilitatis occasio à forma inepta mulieris. 335.
 ad Sterilitatem variæ opiatur. 358-359.
 Suffumigium ad fluorem album. 47.
 Superfoetatio non symptoma sed res naturalis. 450.
 Superfoetationum aliquot exempla. 451.

T.

THAPSI barbari succus cum oleo sem. lini mixtus sanat verrucas. 322.
 Thymus in vuluam immixtus mulierem excitat à præfocatione. 169.
 Tonsor Haganus quinta essentia se curaturum uxorem M. Adriani Vermij frustra pollicetur. 96.
 Tryphera magna pollens ad in-Stationem vteri. 239.

V.

VALESCI Tarantani historia de quadam cuius vulneratam vuluam menses resistere. 25.
 eiusdem opinio de mulieribus habentibus ingentes vteros ob statum in eo collectos. 237.
 Vena secatur in cubito in mensibus retentis ratione plenitudinis. 28.
 Venæ sectio quando conueniat in suppressis mensibus. 4.
 Venæ sectionem in brachio materiam

- riam ad vterum fluentem de-
tinere. 87.
Venenum pro sui natura varias
corporis partes afficit. 167.
Viduis cur familiaris vteri stran-
gulatio. 156.
Vinum non rectè adhiberi in suf-
focatione vteri. 151.
Vinum vterum ascendere facit.
204.
Virga virilis secundum præfio-
nem umbilici maior erit aut
minor. 560.
Virgæ vitia quæ conceptus ad-
uersentur, & quomodo arte
subueniendum. 361.
Virgines aliquando lac in mani-
mis habere possent. 533.
Umbilicus infantis quando &
quomodo præcidendus. 505.
Urina mirabilis Comitissæ No-
læ. 23.
Vterus quare mater dicatur &
hystera. 56.
Vteri situs. 6.
Vterus cur tetros odores refu-
giat. 197.
Vterus an à suo loco dimouea-
tur. 166.
Vterus in coitu deorsum moue-
tur. 223.
Vtero an vis olfaciendi. 152.
in Vteri morbis primò totius
corporis ratio habenda. 129.
Vteri apostematis secundum va-
rias causas signa. 254.
Vteri canceri varia exempla. 292.
Vteri cancer unde 283. eius
curatio. 286.
Vteri condylomata quæ & quo-
modo curanda. 316.
Vteri dolor à spiritu conclusus.
234.
Vteri doloris causæ variz & cu-
ratio. 242.
Vteri excoriatio. 313.
Vteri fistulas sanari non posse.
308.
Vteri flatibus oppleti curatio.
237.
Vterinus furor. 175.
Vterus inflammationibus obno-
xius. 247.
Vteri inflammationis variz cau-
sæ. 247.
Vteri inflammationis signa. 249.
Vteri inflammatio & cancer quo-
modo differant. 286.
Vteri inflammatio quomodo dif-
ferat à dolore partus. 495.
Vteri inflammationis curatio.
244.
in inflammatione oris vteri an va-
na cubiti secari debeat. 264.
Vtero inflammato cur dolor lin-
cipit potius quàm aliam par-
tem capitis afficiat. 250.
Vteri oedema quid. 279.
Vteri os aperiri in omni pro-
fluvio. 126.
Vteri os post conceptum contra-
hi. 373.
Vteri præfocatio, suffocatio, vel
strangulatio. 151, 154.
Vteri præfocatio à quibus cau-
sis. 179.
Vteri præfocationis variz affe-
ctus. 164.
Vteri suffocationis differentiz ab
aliis affectibus. 172.
in Vteri suffocatione quæ pars
affecta. 155.
Vteri præfocationem signa præ-
sagientia. 163. signa eiusdem
demonstratiua. 164. progno-
stica. 184.
Vteri præfocationem quæ acci-
dentia comitantur, & eorum
causæ. 167.
Vteri præfocatio in prægnante &
in ipso partu. 187.
Vteri præfocatio ab aëre vterum
implente post menstruum pur-
gationem. 162.
Vteri suffocatio ex iracundia. 176.
Vteri præfocationis à mensibus
retentis curatio. 209.
Vteri suffocatio à retentione
menstruorum mitior, quàm quæ
à semine retento. 181.
Vteri præfocatio quomodo ro-
tum corpus inficiat, à similitu-
dine ictus phalangij ac scorpio-
nis. 157.
Vteri præfocatione an vellicandi
pili vuluæ. 135.
pro Vteri suffocatione secretum.
163.
in Vteri præfocatione qualis pur-
gatio. 212.
Vteri præfocationi cur mulieres
autumno magis obnoxiz sint.
163.
in Vteri præfocatione cur quæ-
dam non loquantur. 159.
Vteri præfocationem raro pa-
tiuntur quæ dulcia ferre pos-
sunt. 176.
Vtero

I N D E X.

Vtero quæ immittenda in suffo- catione.	195.	Vteri stillicidium.	232.
Vteri procidentia.	213.	Vterum suppressis mensibus ex- siccari, falsum.	154.
Vteri procidentix causæ.	222.	Vteri thymi quomodo curentur.	321.
Vteri procidentix prognostica.	222.	Vteri tumores quomodo à scirrhis distinguantur.	278.
Vteri prolapsus ouo Seruthio- cameli similis.	221.	Vteri venarum obstructionis ou- ratio.	40.
Vteri præcipitationis varia ex- empla.	226.	Vteri vicerati signa distinctiua.	301. 302.
ad Vteri procidentiam topica va- ria.	230.	Vulvæ exulcerationis causæ.	300.
ad Vteri procidentiam ceratum Bayri.	230.	curatio.	303.
Vterus quomodo & quot modis imperfectoratus.	324.	Vulvæ pruritus causæ.	311.
Vteri rhagades.	315.	ad Vulvæ pruritum topica.	312.
Vteri scirrhi causæ.	280.		
Vteri scirrhi curatio.	277. 280.		
Vterus facillè scirrhum incurrit.	248. 276.		

Z.

ZOROASTREM eodem quo natus
die risisse. 670.

F I N I S.

